

1 **ALLEN (John)**. Synopsis universae medicinae practicae; sive de morbis eorumque causis ac remediis judicia. Accesserunt nun demum casus nonnullis oppido rari - Venetiis, Basilium, 1748 - DUE parti in un vol. in 8° cart. d'epoca, pp. 647. Ogni parte con frontespizio proprio. 1951 L. 150.000

(Blake, 1748. L'opera più importante di Allen con in fine la "Pharmacopoeia" ed il "Syllabus symptomatum"; Hirsch, I, 107). Edizione mancante a Wellcome.

4 **ALLEN (John)**. Synopsis universae medicinae practicae; sive de morbis eorumque causis ac remediis oppido rari - Venetiis, Basilium, 1748 - DUE VOLL. in 8° cart. d'epoca, pp. 647. 1954 L. 350.000

(Blake, 1748. L'opera più importante di Allen con in fine la "Syllabus symptomum" Hirsch, I, 107). Edizione mancante a Wellcome.

Fondazione Diabete To
Museo del Diabete
Libri Antichi

55



B 510

SYNOPSIS

UNIVERSÆ
MEDICINÆ PRACTICÆ:

S I V E ,

DOCTISSIMORUM VIRO RUM

DE MORBIS

Eorumque Causis ac Remediis Judicia.

ACCESSERUNT NUNC DEMUM

Casus nonnulli oppido rari.

PARS PRIMA.

AUTHORE

J. ALLEN, M. D.

EDITIO NOVA VENETA,

ad tertiam LONDINENSEM prioribus, triente plus,
auctiorem, exacta, additis præterea FORMULIS re-
mediorum ex quinta AMSTELODAMENSI desumptis.

Τῆς αὐτῆς διαβολῆς ἐκὶ γυνῶναι τὰ ὑποδῶς εἰρημένα.

Ἰπποκράτ. περὶ διαίτης.



VENETIIS, MDCCXLVIII.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

MUSEO DEL DIABETE
della Associazione
KAREN BRUNI BÖCK
Via Beaumont 72 - Tel. 011 4751127
10138 TORINO

VIRIS PERILLUSTRIBUS,

Eruditissimisque, D. D.

ORNATISSIMO SPECTATISSIMOQUE

PRÆSIDI,

CENSORIBUS MERITISSIMIS,

ET RELIQUIS

INCLYTI MEDICORUM

LONDINENSIIUM COLLEGII

Sociis Doctissimis:

Exiguum hoc OPUS,

Obsequii & Honoris ergo,

Quam humillime D. D. C. Q.

Συνοχλαστῆς Indignissimus,

J. A.

A D
LECTOREM.



Edicina, omnium artium nobilissima, si ad ejusdem præcognita, institutiones, & theoriam spectemus, nuperis annis progressus & incrementa admiranda accepit; agnoscendum est tamen & vehementer dolendum, quod praxis, pars ejus longe utilissima, haud pari passu processerit. Ars medendi non nisi tardo pede progreditur. In seculorum revolutione, ingenio singulari valens perraro assurgit, qui in hac etiam parte artem cudit; sed homines istiusmodi indolis, teste medicorum ab Hippocrate catalogo, in ingenti temporis tractu apparent rari nantes in gurgite vasto. Interim loco sanioris praxeos & melioris medendi methodi hypotheses novæ & theoriæ novæ quotannis ad nauseam usque nobis obtruduntur, quæ ostentationis multum, utilitatis parum habent. Tritum utcunque sit illud, Qui speculantur, non medentur, non tamen a veritate prorsus alienum esse ex observatione satis frequenti constat.

Præsentis instituti propositum est praxin legitimam & laudabilem UNDECUNQUE DESUMPTAM VEL MUTUATAM omni opera maxime compendiario exhibere, & optimorum scriptorum auctoritate firmiter stabilire. Hoc est, quod impræsentiarum subivi, munus, quo officio (sperare fas est) fortassis aliquando manus magis idonea cum majori laude & utilitate defungetur;

ut

ut uno intuitu videamus; quo usque ⁵ventum est
in vera ac solida medendi cognitione.

Ut plurimum tantum monitoris officium præsto.
Morbi omnes ex præstantissimis scriptoribus hic ad
vivum depinguntur; præcipuæ morborum causæ,
& de eorundem eventu judicia, traduntur; indi-
cationes curativæ exponuntur, & remedia nonnul-
la, præstantiora saltem, breviter attinguntur, &
concinna aliquot formulæ subduntur, ut cito, tu-
to, & jucunde, & qua fieri potest certitudine,
medeamur.

Citationes authorum non ex numero, sed ex pon-
dere & momenti sunt æstimandæ. Aphorismos præ-
clarissimi Boerhaavii haud satis pro merito lauda-
vi; quoniam uniuscujusque manibus præsto esse &
charissimos haberi nullus dubito: est enim opus om-
nibus numeris absolutum, & tantum non divino
afflatu exaratum, auro contra æstimandum, decies
& amplius perlegi dignissimum, immo in sinu per-
petuò gestari.

De morborum Ætiologiis (ingenue fateor) non
nisi paucissima in medio protuli: origines & causæ
proximæ morborum plerumque longe abstrusiores
sunt, quam ut nostræ mentis acies eò usque pene-
trare possit; & revera, si dissimulare nolimus,
agnoscendum est, quod hæc ut plurimum usque adeo
nos lateant, ut in iisdem pervidendis hætenus Tal-
pæ simus: In alto navigamus LONGITUDINIS
IGNARI.

Meipsum quod attinet, ne sim plane ἀσύμβολος,
de proprio penu ex adversariis meis depromptum;
ubique fere, nunc demum in hac tertia Editione,
nonnihil interspersi, quæ usui publico libenter manci-

pavi, & utinam ne illa sint sola omnium manca
& jejuna.

Qualescunque tamen sunt hæ lucubrationes, satis novi non esse aliquid, quod hoc loco proferre possum, quod limatiores vel utiliores illas reddat; neque ornatiores in futurum polliceor, ut sint hujusce opusculi aliquid præsidii.

Unicum tantum præfandum restare censui, nempe; ut te certiore faciam me hæc collectanea in lucem edidisse non ex suasu amicorum, vel quæstus, aut gloriolæ captandæ gratia; sed inductu consilii, ut mihi visum est, recti honestique, & publicum, tam ægrotantium quam medentium (maxime juniorum) emolumentum respicientis.

Valeas itaque, Candide Lector, & hæc ver-
suras sine fastidio accipias, atque hoc levidense
φιλανθρωπίας nostræ pignus, animique erga te bene-
voli documentum, fac æqui bonique consulas.

Medicus est Minister, Natura Me-
dicatrix: Deus interim hisce clemen-
ter benedicat.



SYNOPSIS

UNIVERSÆ

MEDICINÆ PRACTICÆ, &c.



CAPUT PRIMUM,

Sive Fasciculus Morborum primus.

FEBRES IN GENERE.

Ex observatione & inter legendum.

Art. 1.



EBRES (ut recte annotavit clarissimus Sydenhamus) ^{Præ-} ^{mium.} cum Appendicibus suis duas fere tertias partes omnium, quæ sunt morborum, complent; ideoque his exponen-

dis, utpote quæ etiam totis corporibus inhærescunt, merito exordiri statuimus.

Art. 2. Febris autem (inquit idem) nihil aliud ^{Febris} ^{quid.} est, quam *natura conamen materie morbificæ, corpori valde inimicæ, exterminationem in agri salutem omni ope molientis.*

A 4

Art.

Februm divisio. Art. 3. Februm divisio maxime generalis & generalis est in *Essentialem & Symptomaticam*.

Essentialis. Art. 4. Febris essentialis est cujus causa primaria in ipso sanguine delitescit, a nullo alio morbo solidarum partium originem ducens, aut quocunque modo pendens, atque hæc est *Febris absoluta & proprie dicta*.

Symptomatica. Art. 5. Febris symptomatica est Febris secundaria, quæ non propriam subsistentiam habet, sed a graviore alicujus partis affectu originem trahit, & frequentissime ab insigni aliqua inflammatione pendet, unde *Febres variæ inflammatoriæ dictæ*.

Essentialis divisio. Art. 6. Febris essentialis dividitur in *Ephemeram, Intermittentem, Continentem & Continuum*.

Ephemera. Art. 7. Febris omnium mitissima est Febris ephemera, sive diaria, i.e. Febris unius diei; ab insolato, exercitio nimio, vel aliquo alio accidente externo oritur, & spatio 24. horarum ultro terminari solet. Sola quiete, & in lecto decubitu curatur.

Intermittens. Art. 8. Huic proximæ sunt Febres intermittentes, scilicet, quotidianæ, tertianæ, quartanæ simplices, tertianæ, quartanæ duplices, &c. Hæ more Febris diariæ spatio 24. horarum plus minus pro isthac vice finiuntur; verum pro peculiari illarum genio, singulis, vel alternis diebus, vel quarto quoque die, recrudescere solent.

Continens. Art. 9. His congener est Febris *συνεχής*, seu continens, quæ quidem est Febris continua, sed non uno tenore pergens; ad plures dies sine *ἀντιπείξια* protenditur, habet tamen sua remissionis & exacerbationis tempora, statis, vel incertis periodis se invicem excipientia; intermissionem vero nullam habet.

Continua. Art. 10. Februm gradus proximus & ultimus est *συνόχος*, sive Febris continua proprie dicta, quæ ab initio ad finem ubique est æquabilis, sine *symptomatum exacerbatione & remissione periodica*:

CAP. I. *Febres in genere:*
ca: hujus generis sunt Febres maligne, Febres pestilenciales, ipsa pestis, &c.

Sydenhami sententia:

Art. 11. Ille dubio tramite errat, atque incerto ducitur filo, qui in Febrium curatione non continenter ob oculos habet *anni constitutionem*, quatenus huic aut alteri morbo epidemice producendo favet, cætorisque morbis omnibus una concurrentibus in ejus similitudinem ac formam detorquendis: hæ autem variæ constitutiones aut habitudines ab occulta & inexplicabili quadam aeris alteratione pendent, quæ proprias ac sibi peculiares Febres producant, quæ *stationariæ* nobis audiunt.

Ratio habenda est anni constitutionis.

Art. 12. In novis Febribus cunctandum est paulisper, & ad magna remedia non nisi pede tardo procedendum; interim morbi genium ac morem diligenter pensitando indicationes præsertim a *lædentibus*, & *juvantibus* sumendæ sunt; neque pudeat fateri me non semel in curandis Febribus, ubi nondum constaret, quid mihi agendum esset, nihil prorsus agendo & mihi & ægro consuluisse optime; dum enim morbo invigilarem, quo eum opportunius confodere valeam, Febris vel sponte sua sensim evanuit, vel in eum se typum redegit, ut jam mihi innotesceret, quibus armis esset debellanda, „ Non enim levis est consolatio viro pro-
„ ho in rebus dubiis, facileque errori obnoxio se
„ saltem inculpatum tueri, si se minus utilem
„ præbere nequeat. „

Et in nova Febris ingressu paulisper cunctandum est.

Art. 13. „ Calidum solum non est Febris causa, „
„ sa, (*inquit Hippocrates de vet. medic.*) sed
„ est calidum & amarum simul, calidum & acidum,
„ calidum & salsum, aliaque innumera. „
Ex frequenti etiam observatione compertum est Febrē in corporibus sanis evenire posse, in quibus nullus apparatus morbificus, vel quoad plethoram, vel cacochymiam, &c. occasionem subministraret; nihilominus hujusmodi homines præceden-

Febris causa.

Evenire potest in corporibus sanis.

cedente insigni aliqua aeris, victus, &c. rerum non naturalium, mutatione, Febre corripuntur, propterea quod eorum sanguis novum statum & conditionem adipisci gestit, qualem ejusmodi aer aut victus postulaverit.

*Indicatio
generalis.*

Art. 14. Indicatio generalis in curatione Februm est, ut sanguinis commotio intra modum naturæ proposito congruentem contineatur, ea nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo iglescat, unde periculosa symptomata, nec illinc nimium torpeat, ne naturæ conamen frustretur; atque hinc exurgit norma sanguinem mittendi plus minus, vel prorsus omittendi.

*Vomito-
rium.*

Art. 15. Si adsit vomendi proclivitas, vomitorium propinare necessum esse omnino videtur; alias etenim accidere solet diarrhœa in Febris progressu, ægro interdum admodum periculosa. In initio Febris emeticum propinari debet, sed, si omissum fuerit, quovis morbi tempore adhiberi potest, modo vires ægri ferre valeant; post hoc autem paregoricum hora somni propinandum est, diebus insequentibus, si repetitio venæsectionis minus indicetur, & non aderit diarrhœa, enemata alternis diebus in usum venire possunt, usque ad decimum vel duodecimum diem, quo tempore negotio ad secretionem vergente medicamentis calidioribus liberalius indulgendum censeo ad concoctionem accelerandam. Si fermentatio recte progrediatur, nullis omnino remediis opus est; despumatio etenim est opus naturæ.

*Cathar-
ticum ex-
hiben-
dum sub
finem.*

Art. 16. Usitato circa diem decimumquintum, si adsit in urina laudabilis separatio, & symptomatum remissio, catharticum adhiberi debet, ne sedimentum a fermentatione hic illic depositum in sanguinem remigrans recidivam conciliet; quandoque tamen ad diem decimum septimum differendum est.

*Catharsis
post V. S.*

Art. 17. Pro comperto affirmo, nihil ita certò atque ita potenter ægrum refrigerare, atque catharsim post venæsectionem celebratam: testatur enim ex-
perien-

CAP. I. *Febres in genere.*

perientia catharsin post venæsectionem quibuslibet aliis remediis foelicius certiùsque Febrem perdomare, tum quatenus intestinis illuviem dimovet, tum quatenus anodyno viam sternit. (Schedul. Monit.)

Art. 18. Ad genuinam sanguinis depurationem duplex secretio requiritur; una per *fæces* fit, altera per *secretio.* flores, hæc sensim & paulò pleniori διαπνοή, potius quam sudore manifesto ut plurimum peragitur; separatione hac per flores jam facta, minus periculosa est diarrhœa.

Boerhaavii sententia.

Art. 19. Febris est frequentissimus morbus, inflammationi individuus comes, qui ingenti symptomatum numero plerumque stipatur. *Febris quid.*

Art. 20. In omni Febre, a causis internis orta, horripilatio, pulsus velox, & calor, vario tempore, & vario gradu, adsunt; hæc autem ubi velociter decurrunt, Febris acuta, ubi tardè, lenta audit. Febris fere semper cum sensu frigoris incipit, & progrediente morbo maxime a velocitate pulsus primario cognoscitur; adeoque velocior cordis contractio cum aucta resistantia ad capillaria Febris omnis acutæ ideam absolvit, quæ a causis infinitis produci potest. Sanitas ægroti videtur esse *cynosura* primaria, in quam natura in Febribus collimat; frequenter vero Febris in mortem definit, quandoque in alium transit morbum. *Symptomata quæ in omni Febre adsunt.*

Art. 21. Curatio Februm generalis summam comprehenditur in vitæ ejusque viribus consulendo, acre irritans corrigendo & deturbando, lentorem dissolvendo, expellendoque, & symptomata mitigando. Si in Febre exorbitare natura deprehendatur, moderamen fit abstinentia, victu tenui, potu aquæ, venæsectione, clysmate refrigerante, &c. Si segnior appareat, excitabitur ope cardiacorum, aromaticorum, volatiliū, &c. Sublata Febris causa symptomata reliqua cessabunt, quatenus ab ea primario pendent, adeoque, si fer-

De symptomatib.

si queunt sine vitæ periculo, singularem curationem vix requirunt, nec temere turbari debent: Si vero intempestiva & nimis sæva fuerint, singula sunt lenienda suis remediis propriis, habita semper ratione causæ & status morbi ipsius.

Ettmulleri sententia.

*Quidvult
natura
per Fe-
brem.*

Art. 22. Febris est *motus naturæ*, seu quædam lucta, quæ spirituum plus minus alteratorum ope id, quod est hostile œconomix animali, eliminare satagit.

De dieta.

Art. 23. Quod magis acuta est Febris, cò tenuior convenit diætæ; licet ægri ad plures dies jejuni jaceant, perinde erit, *nec unquam vidi febricitantem fame pereuntem*, sed potius, si quid ingeritur, Febris exasperatur, &c. nam in alimentis appetitus præscribit rationem, *quantum, & quale, & tempus*.

*Vomitoria
& sudori-
fera.*

Art. 24. Vomitoria in Febribus fere omnibus in principio sunt proficua. Sudoriferorum usum ipsa natura nobis monstrat, signis coctionis apparentibus sunt optima; & etiam in toto morbi decursu sunt utilia; immo horum usu promiscuo Febres non raro curantur. Spiritus salis armoniaci, vel sal volatile ejusdem, est febrifugum universale, & in usu repetito raro fallax. Saccharata quæcunque in Febribus insigniter nocent. *Hippocrates* in omni Febre vinum porrigit. Semper observavi quamdiu urinæ sunt crudæ, tamdiu res ægri in statu existunt ambiguo; quando vero adsunt signa coctionis fausta possumus ominari; opus hoc coctionis est folius naturæ. Inter signa lethalia nullum est certius, quam frequens manuum ad nares admotio sine ulla materiæ effluxione.

Baglivii sententia.

*Naturæ
ductus se-
quendi
sunt.*

Art. 25. In morbis acutis, atque inflammato-riis paucis opus est remediis; satis enim fuerit vias observare diligenter, qua natura exitum ten-
tat,

tat, curamque eò perducere, naturæ obsecundando, alioquin ægrotus pessum dabitur.

Art. 26. In Febribus universalibus, id est, quæ ipso de sanguine suscitantur, non admodum laborandum est circa partem affectam, ut inde curativæ deducantur indicationes: Febrium siquidem primordia, partesque affectæ in iisdem, nos plerumque latent, & si unquam paterent, oportet *indicationem dirigere ad constitutionem massæ sanguineæ febricitantis*, potius quam ad sophisticam speculationem causarum proximarum, aut quæ in Febribus primoprime sunt, quæ nostræ aciei minime subjiciuntur. *Inanes speculationes missæ faciendæ.*

Art. 27. Ideo si primæ viæ sint obductæ, exque egerendæ atque expurgandæ fuerint, danda opera, ut Febrium fomes tollatur; Si vero sanguis febricitans sit exaltatus, & vehemens, ejus reprimendus est impetus; si nimis crassis humoribus irretitus, atque coagulatus, exaltetur, ac dissolvatur. In hisce enim *tribus præceptis* omnium prope illarum Febrium cura versatur, quæ ortum non ducunt ab organi læsione, verum ab humorum congerie, aut in ipso sanguine, aut in primis viis. Et cum ad crisin natura vergit, aut eas jam exciverit, tum a remediorum copia tanquam a peste cavendum. *Tria præcepta de curandis Febribus.*

Art. 28. Ex odore, quem ægri spirant, soleo sæpe, utrum morbus facilis vel difficilis, brevis vel diuturnus, vel alterius generis futurus sit, judicare. In ægris qui morituri sunt, nonnullis ante mortem diebus solet, dum pulsum tangimus, ab eorum exhalare corpore foedus quidam ac veluti *cadavericus odor*, qualem spirant in templis cadavera, ut sæpe observavi, & velim, ut serio animadvertant medici. *Animadver. in præct. nov.* *Odor cadaveris præsentis mortis præsignium.*

Farrago sententiarum.

Art. 29. Hippocratis Aphorismus de diætâ in morbis acutis sic se habet: ubi peracutus est morbus, *Regula de diætâ.*

bus, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo victu uti necesse est; ubi vero non, sed plenius cibare licet; tantum a tenui recedendum, quantum morbus remissior extremis fuerit. *Sect. 1. Aph. 7.*

Incommodum nimia re-mediorum copia.

Art. 30. Graviter errant illi, qui acutos & inflammatorios morbos remediorum copia tamdiu afficiunt, donec natura, quod se vertat nescia, & hinc inde, tum a morbi vehementia, tum a remediorum pondere, varie distracta, tandem cogatur succumbere: perturbato enim, distractoq; motu illo ordinato naturæ a repetitis toties, vel absque methodo exhibitis medicamentis, nec Febris minuitur, nec crisis stato tempore succedit; sed pateriens dubio Marte colluctatur; vel in perniciem, vel in chronicos morbos delabatur. *Baglivius.*

Incommo-dum V. S. nimis crebra.

Art. 31. Observatione constat, quod crebra sanguinis missio homines Febri aptiores reddat præ cæteris: quare vulgo dicitur, quibus sanguis semel detrahitur, eos, nisi quotannis idem faciant, in Febrem proclives esse, & pinguescere. *Vvillis.*

Prognosticon generale.

Art. 32. In Febribus continuis, si pulsus sit fortis uno tenore pergens, ut ut deliria, tremores, tendinum subsultus, cæteraque dira in genere nervoso symptomata subitam ruinam minari videantur, semper bene præsagit: e contra vero pulsus celer, debilis ac vacillans mortem præ foribus adstantem indubitanter prædicit, ut ut reliqua symptomata adblandiantur. *Morton.*

Acumen ingenii oportus est.

Art. 73. In curatione Febrium summum ac acerrimum medici ingenium requiritur. Judicio præpollenti, facultati innata, & incommunicabili, plurimum debetur. Morbi genius, anni constitutio, ægroti temperamentum, & vivendi modus, symptomata singula & universa, & innumera alia incidentia & accidentia, omnia conjunctim & divisim animo præsentis & sereno diligenter perpendenda sunt; e quibus omnibus inter se rite collatis sagaci medico, lente festinanti, exurgit clara

CAP. I. *Febres intermittentes.* 15
ac distincta medendi methodus; & plerumque in-
sequitur felix morbi exitus. Veritatem hujusce
mei effati longa jam annorum serie non sine gra-
tissimo animi delectamento feliciter expertus sum.

FEBRES INTERMITTENTES.

Mortoni sententia.

Art. 34. Febris intermittens est calor præternaturalis in sanguine accensus ab insolita spirituum expansione statis periodis redeunte; in hac autem Febre algor, rigor, calor, & sudores se invicem excipiunt; adsunt etiam in paroxysmo ægritudo universalis, nausea & vomitus, dolor capitis, lumbago, &c. Paroxysmus quidem acutus est, morbus vero ipse ut plurimum plus minus chronicus. Febris intermittens simplex facillime cognoscitur; ultro enim sese in conspectum dat: quotcunque autem sint earum varietates (sint quotidiana, tertiana, quartana, &c.) fermentum morbificum omnium idem est, & viribus corticis Peruviani certò ac citò cedit.

Definitio
Febris in-
termitt-
tentis.

Art. 35. „Species Febrium intermittentium
„ communes sunt *quotidiana, tertiana, & quar-*
„ *tana, simplex; quotidiana, tertiana, & quar-*
„ *tana duplex; semitertiana, &c.* Sunt etiam Fe-
„ bres intermittentes quinto sexto vel septimo
„ die recurrentes. Contigit mihi in praxi vide-
„ re foeminam per integram septimanam Febre
„ laborantem, deinde proxima septimana omnino
„ liberam; atque ita alternis septimanis febrici-
„ tantem, & alternis apyrexiam habentem, id-
„ quæ per longum tempus. Cortice peruvianocu-
„ rata fuit. „

Species
Feb. in-
termitt.

Historia
rara.

Art. 26. Neque venæsectio, neque vomitoria, cathartica, aut diaphoretica, neque aliud quodcunque remedium in paroxysmo exhibitum aliquid ad curationem hujus morbi promovendam conducere observantur; a iusta dosi vini benedi-
cti

Curatio.

Si trihorio ante tertium paroxysmum expectatum exhibita sæpius Febrem tertiam curatam novi. *Antimonium diaphoreticum* paulo ante adventum paroxysmi datum interdum morbum tollit; *Sal absynthii* febrifugum audit, & sequentem haustum usu comprobavi, ℞. *Aq. card. ben. theriacal. fil-lat. ana* ℥ij. *sal. absynth.* ℥ss. *syrup. limon. misce*; sumat æger dimidiam partem trihorio ante paroxysmum, & reliquam in primo insultu. „ In Febribus intermittentibus (inquit Dolæus) pro singulari secreto mihi est *lapis Lazuli* a ℥ss. ad ℥j. „ cum spiritu vini ante paroxysmum traditus. Efficacia plurimorum amarorum (antequam vires corticis Peruv. satis exploratæ fuissent) experta fuit, uti *absynthii, cardui benedicti, rad. gentian. flor. chamæm.* (fere specifici) & privatim *decocti amari febrifug. seq.* ℞. *Fol. matricar. card. ben. absynth. summit. centaur. min. flor. cham. ana* mj. *sem. card. ben. citr. ana* ℥j. *sal. absynth.* ℥iss. *coq. in aq. font. q. s. ad bibs. dosis* ℥iij. vel iv. quarta quaque hora extra paroxysmum. Item pulvis febrifugus sequens; ℞. *flor. cham. subtilissime pulverisat.* ℥i. *antimon. diaphoret. sal. absynth. ana* ℥ss. m. f. pulvis pro una dosi quarta quaque hora extra paroxysmum utilissimus est quidem iis, quibus vires corticis defecerunt, vel quando ob *ἰδιοσυμπτῶτα* non possumus exhibere. In confesso est his & hujusmodi remediis Febres intermittentes æstivo tempore quandoque curari: Cortex vero *Peruvianus* consensu medicorum (hodie omnium) est *catholicum febrifugum*, quod omnes Febres intermittentes, in quavis anni tempestate, in omni ætate, & temperamento, penitus, cito, tuto, & feliciter sanat: neque opus est, ut medici ingenia sua amplius torqueant in aliis febrifugis explorandis. „ Cortex *Peruvianus* sudorem omnino nullum excitat; tantum omni- „ genas concoctiones e vestigio emendat sine ul- „ la sensibili evacuatione nisi aliquibus alvum ali- „ quo-

Cortex
Peruvia-
nus reme-
dium po-
lychre-
sum.

„ quoties, idque leniter admodum movet. Modus
 „ exhibendi nunc dierum omnibus innotescit. *Hæ-*
 „ *tenus* de Febribus intermittantibus simplicibus.

Art. 37. Symptomata vero Febrium intermit- *Febris in-*
termitt-
tens spu-
ria.
 tentium *spuriarum* nonnunquam sunt perquam ve-
 hementia, & typus Febris ipsius in variis suis sta-
 diis sub larva vomitionis, diarrhoeæ, doloris ali-

cujus gravissimi, &c. absconditur. A periodica
 symptomatum vehementium exacerbatione & re-
 missione, nec non ab urina lateritii coloris verus
 morbus potissimum dignoscitur: alios etenim mor-
 bos frequentissime simulat, unde arrepta occasio-
 ne creantur nunc hæc nunc illa gravissima sym-
 ptomata, vomitiones, Diarrhoeæ tormentosæ,
 cholera morbus, colica, dolores lateris punctorii,
 tanquam pleuritici, ophthalmia, apoplexia, he-
 micrania, spasmi universales, vel particulares,
 dolores nephritici, &c., Item dolores parturien-
 „ *tium amuli*; in foemina quadam hujusmodi do-
 „ lores, alternis diebus recurrentes, duobus vel
 „ tribus a partu septimanis accedentes semel ipse
 „ observavi idemque ab alio observatum fuisse au-
 „ divi. Et (quod rarius adhuc videatur) dolo-
 „ *rem unius cruris* periodice revertentem in homi-
 „ ne quadragenario semel in praxi adnotavi: do-
 „ lor fuit vehementissimus per 24. interdum per
 „ 30. horas durans, unde ingens intumescencia to-
 „ tius membri superveniebat; tumor cruris erat
 „ quasi partim *flatulentus* & partim *œdematosus*
 „ qui non nisi longo post tempore fasciatione ad
 „ pristinam dimensionem redactus erat. Ambo hi
 „ ægroti cortice Peruviano sanati fuerunt.

Art. 38. Versatilis quidem est horum affectuum *Curatio.*
 Proteiformium genius, sed ab uno eodemque fer-
 mento pendent omnes, & unica antidoto, nempe
cortice Peruviano, cum prudentia adhibito, faci-
 le profligantur.

Art. 39. Nemo unquam a Febre intermittente *Prognosis.*
 interimitur, nisi in primo paroxysmi stadio, du-

rante, scilicet, algore ex spirituum oppressione orto. Febres intermittentes, ubi valde chronicæ evadunt, viam sternunt ad alios morbos maxime funestos.

Historia. Art. 40. „ Sequens historia inter casus oppido
 „ raros meritò recenseri potest. Paucis abhinc
 „ annis Vvincauntoniæ in agro Somersetensi mor-
 „ tuus est senex, Theologus, nomine *Bulgin*;
 „ hic annum agenstrigesimum quartum in Febrem
 „ intermittentem quotidianam incidit, quæ per
 „ totum vitæ cursum (dictu mirabile! verissimum
 „ tamen) per sexaginta scilicet annos, usque ad
 „ vitæ in extrema senectute, terminum, duravit.
 „ Febris cum frigore præeunte, calore & sudore
 „ succedentibus per diuturnum istud spatium, ut-
 „ cunque non semper cum eodem sævissimo im-
 „ petu, constanter tamen, quotidie illum invasit.
 „ Postremò senio potius quam morbo confectus
 „ nonagesimum quintum agens annum obiit. Hæc
 „ narratio a filio & filia prædicti senis adhuc vi-
 „ ventibus, fidei indubitatae ambobus, renuntia-
 „ ta est.

Farrago sententiarum.

Causa proxima Feb. intermittentium. Art. 41. Post accuratum examen totius histo-
 riæ Febrium intermittentium causa proxima con-
 stituitur *viscositas* liquidi arteriosi, superveniente
 dein causa quacunque velocioris & fortioris con-
 tractionis cordis, atque resolutionis ejus, quod
 stagnaverat. *Boerhaave.*

Galenus methodus in quartanis. Art. 42. Galenus hæc methodo curavit quarta-
 nas; primo propinavit vomitorium, die sequenti
 dedit *succum absynthii* bibendum, & denique bi-
 horio ante paroxysmum dedit *theriacam*. „ Sed
 „ his adminiculis tutò inniti nequimus. Febris ter-
 „ tiana veteribus, quibus vires antidoti Peruvia-
 „ næ ignotæ fuerunt, curatu erat valde difficilis,
 „ & quartana opprobrium medicorum audiebat;
 „ at hodie secus esse nemo non novit: quo enim
 „ lon-

„ longius recedunt intermittentium paroxysmi a
 „ natura Februm continuarum , aut quo majus
 „ fuerit intervallum inter accessiones , eo minus
 „ periculi ab illis impendet , quoniam amplior est
 „ locus commodiorque curationi. „

Art. 43. Epithemata & epicarpiâ quandoque
 prosunt Febribus intermittentibus abigendis ; ejus-
 modi est *Empl. febrile pro carpiis* *D. Michaelis*
℥. Fulig. furni splendent. ℥iſſ. terebinth. 3vj. tel.
aranear. 3ſſ. camphor. ʒij. ol. scorpion. q. ſ. m. f.
emplast. pro carpiis. Mortonus duo sequentia ex
 propria experientia commendat. *℥. Pulv. oliban.*
terebinth. venet. ana p. æ. f. pericarpia. 2℥. Fol.
chelidon maj. rutæ ana m. j. fuliginis e lignis com-
buſtis, ſapon. venet. ſalis marin. ana p. æ. cum
aceto acerrimo ſ. maſſa, &c. „ *Empl rubrum fe-*
 „ *brisugum* ſequens ſcrobiculo cordis applicatum
 „ in tenellis infantibus frequenter prodeſſe depre-
 „ hendi. *℥. Thur. ſubtiliſſime pulv. 3v. mini 3j.*
ol. olivar. q. ſ. f. empl.

Epithe-
mata.

Art. 44. Qui corticem Peruvianum ore aſſume-
 re pertinaciter reſpuunt, curari poſſunt cum ene-
 matibus ex ejusdem decocto ; iſtiusmodi eſt *enema*
febrisug. Fulleri, ſed pueris certius ſolet opem fer-
 re quam adultis.

Enema
febrisu-
gum.

Art. 45. Dum febrilis horror , aut frigus uni-
 verſam cutim convellit , tum oleum diſtillatum
caryophyllorum epigaſtricæ regioni illitum remiſ-
 ſionem horroris undequaſque procurat. *Baglivus.*

Ad algo-
rem.

Art. 46. Anſam mihi ſuppeditari autumabam a-
 liquid ad artis noſtræ incrementum ediscendi, id-
 que aliquoties tentans, non infeliciter proceſſit,
 in Febribus ſcilicet intermittentibus, circa initium
 paroxysmi, haſtu calido ſucci limonum cum ſac-
 charo & aq. fontan. tanti ſemel atque iterum ex-
 hibito, exacerbationes vel in totum ceſſaſſe, vel
 ſaltem in dies præter expectationem ſimul cum ſi-
 ti deferuiſſe, & intra paucos dies plane ſiluiſſe,
 deprehendi, ſubſequenti utique manifeſto effectū,

Vires ſuc-
ci limo-
num.

urinæ scilicet, & imprimis sudorum larga promotione. Piso p. 315.

Specifica
alia.

Art. 47. Sunt & alia nonnulla remedia a quibusdam plurimum decantata, tanquam Feb. intermit. specificè curantia. Nempe *pulvis corticis interioris fraxini* a ℥ss. ad ℥j. cum paucis *sale absynthii* in vehiculo idoneo exhibitus, more *corticis Peruv.* vires ejusdem adæquare, immo superare dicitur; felici cum successu sæpe exhibuit doctissimus & insignis medicus D. Hen. Vaghan. Idem perhibetur *de cortice ulmi prope radicem*. Flores *salis armoniaci* optimum febrifugum censentur, præcipue in Febribus intermittentibus. De quo remedio audiatur clarissimus Boerhaave; non novi (inquit ille) melius febrifugum quam gr. xx. *salis armoniaci* in calido haustu, una vel duabus horis ante paroxysmum. *Succus rad. gentian. inspissatus*, & in vehiculo appropriato cum myrrha assumptus propter ejus vim febrifugam non immerito usurpari potest ad instar cort. Peruv. cujus succedaneum fere est (inquit Ettmullerus.) Sed forsitan *cortex radicis prunæ sylvestris*, i. e. *spinæ nigra* vulgo appellata, est adhuc præstantius medicamentum, quod olim honorandus D. Sloan in literis mihi datis communicavit. *Camphora* est remedium diaphoreticum nobilissimum, & omnium adhuc notorum certissimum. Insignis est ejusdem usus in curandis Febribus intermittentibus, & viribus corticis Peruviani magnopere opitulatur.

Recidivæ
præcau-
tio.

Art. 48. Unicum hic, quod multa experientia didici, in bonum commune evulgari volo de *Recidivatione* præcavenda: nimirum, Febre cortice Peruviano prius fugata, cui penso istius remedii uncia vel ad summum sesquiuncia semper sufficit, intra triduum vel quatrimum propinare soleo *medicamentum aliquod chalybeatum*, & huic operi levissimas præparationes eligo, & in hunc fere modum præscribo. ℥. *Vin. chalybeat. pharm. Londinens.* ℥ij. *tinctur. stomach. amar.* Quincii ℥iij vel

CAP. I. Febres intermittentes.

21

℥iij. vel iv. misce dosis coch. iv. vel v. bis in die; vel loco hujus infusum chalybeatum amarum sequens. ℥. Limatur. ferri ℥iv. succ. limon. N. iv. aurant. acid. N. vj. infund. per hor. 24. deinde add. rad. gentian. ℥ss. aristoloch. rotund. ℥j. cort. uvinteran. rad. calam. arom. ana ℥ij. summit. absynth. centaur. min. ana p. j. vin. alb. ℔iv. aq. gent. comp. ℔ij. infund. frigide per septimanam & decantetur pro usu. Vel ℥. Flor. sal. ammoniac. martiat. ℥ij. myrrh. elect. ℥j. rubig. ferri ℥ij. extract. rad. gent. q. s. m. f. pil. med. dos. iv. bis in die, superbibendo infus. stomach. amar. sequent. ℥. Rad. zedoar. cassumuniar. ana ℥ss. cort. flav. aurant. Hispalens. ℥ij. sem. cardamom. min. ℥ss. summit. absynth. Rom. p. s. infund. in aq. bullient. ℔j. coletur frigide. Atque ita ventriculo optime consultum est, & res in vado fit; Febris nullatenus recrudescit, nisi ex gravi aliquo sex rerum non naturalium errore. Interdum in casu ancipiti & in corporibus valde debilitatis chalybs & cortex Peruvianus junctim maritati melius cedunt, quam alteruter eorum seorsim exhibitus; in hunc finem decoctum nigrum sequens est remedium appropriatum; ℥. Cort. Peruv. pulverisat. ℥ij. chalyb. cum tart. præp. ℥j. coq. in aq. font. ℔iij. lento igne ad ℔ss. addendo sub finem coctionis cinnam. acutissim. ℥ij. colatur. add. aq. absynth. magis comp. ℔ss. m. vel in magis delicatulis vinum chalybeatum prædict. & tinctura sequens usus tempore commista; dosis a coch. iij. ℥. Cort. peruv. pulverisat. ℥x. calam. arom. cinnam. ana ℥j. cort. aurant. ℥ij. cochinel. ℥ss. macera per biduum in vin. ab Ulissiponens. ℔iij. filtetur, &c. hanc ob venustum colorem tincturam Burgundicam vocant.

Infusum
chalybe-
at. amar.Infusum
stomach.
amar.Decoctum
nigrum.Tinctura
Burgun-
dica.

FEBRES REMITTENTES.

Morrioni sententia.

Art. 49 Febris $\Sigma\upsilon\upsilon\epsilon\chi\eta\varsigma$, continens sive remittens

B 3

Typus
Febris re-

mittentis simplicis. tens ex manifesta exarcebatōe & remissione, singulis ut plurimum, vel alternis, diebus, stata & certa hora, periodice recurrentibus, facillime dignosci potest; atque equidem ab intermittente inde duntaxat discriminatur, quod calor febrilis in intervallis hujus Febris nunquam penitus extinguatur, & singuli exarcebatōis paroxysmi cum algore & horrore minus incipiant. Sub finem cujuscunque paroxysmi æger sudoribus plerumque perfunditur; & urina, quæ durante paroxysmo rubedine multa perpetuo tingitur, in remissionibus hypostasim laudabilem ut plurimum deponit. Atque sic se habet typus Febris remittentis simplicis.

spuria. Art. 50. In Febre vero remittente *spuria* gravia symptomata in genere nervoso suboriuntur, nempe, dolores in musculis, tendinibus, & membranis, rheumatismum, pleuritidem, colicam cæterosque id genus morbos inflammatorios, & spasmodicos simulantia, & a partibus glandulosis enormes subsequuntur humorum excretiones; vomitio scilicet immodica, cholera morbus, diarrhæa, dysenteria, &c. unde typus *Συνεχὴς spuria* multum obscuratur; paroxysmi periodici inde incerto, & nonnunquam sæpius eodem die recurrere solent, scilicet evacuatione, vel dolore aucto, calor & pulsus minuuntur; his autem diminutis illi augentur.

Prognosis. Art. 51. Febris remittens simplex, qua talis, & quam diu talis, raro admodum, si unquam, est funesta; priusquam exitialis evadat, typum ac genium suum mutat, & transit in *Συνεχὴς malignam*. Spuria vero sive mixta, ut ut in se non sit funesta, ratione symptomatum adjunctorum ægrotautes haud raro è vivis tollit. Quò exacerbationes & remissiones diei hora magis certa redeunt, & quò remissiones magis sunt protensæ, eò melius, & vice versa. Evacuationes in *Συνεχὴς* a natura institutæ fere semper sunt *infidæ*, atque ut plu-

plurimum *symptomatiæ*: Evacuatio critica & salutifera fit solummodo per sudores, vel salivationem; prior est magis cita; altera vero æque certa, licet tarda & molesta. Durante morbi augmento pessimum signum est, si urina sensim in tenuem & pallidam mutetur, & pulsus magis celer debilis ac vacillans evadat, &c. e contra pulsus fortis & constans, urina rubedine multum tincta, & contentis saturata, multo magis quæ hypostasim laudabilem deponit, ubi morbus ad statum pervenerit, optimum præsagium exhibet, ut ut reliqua symptomata contrarium prognosticon denunciare videantur.

Curatio.

Art. 52. Febris remittens simplex viribus *corticis Peruviani* æque certo cedit, ac ipsa intermittens; quippe fermentum febrile in utraque fere idem est. Efficacia ejusdem Antidoti in *Συνεχῆ* spuria debellanda est propemodum æque certa, ac in simplici (modo rite ministretur, respectu ad symptomata vehementia habito) non autem adeo cita est, quoniam morbus est intensior, ideoque majorem remedii quantitatem postulat: in justa autem ac regulari hujusce antidoti exhibitione, atque repetitione, harum Februm cura radicalis consistit.

Art. 53. „Curationem symptomatum maxime
„urgentium quod attinet vel potius mitigatio-
„nem, in his sicut in aliis febribus, alibi (*Art.*
„102. 103. &c.) dicendum erit. Interim sat erit
„impræsentiarum adnotare, quod, si quando Fe-
„bris remittens, vel ex peculiari morbi genio &
„indole, vel ex errore aliquo typum mutaverit,
„& in continuam vel malignam migraverit, cu-
„rationem tunc prorsus aliam expolcit, ut infra
„videbitur.

Curatio
debet esse
alia, si
Febris
typum
mutav-
rit.

FEBRES CONTINUÆ.

Art. 54. „Febris *Συνεχῆς*, continua, sive Febris
„putrida dicta, est, quæ per plures dies sine exa-

Febris
continua
quid.

Fomes „ *cerbationibus & remissionibus* usque ad ultimam
Februm „ & integram sui cessationem perdurat, aut sal-
harum „ tem ita perhibetur. *Fermenta febrilia*, seu fo-
omnium „ *mes morbosus in febribus omnibus ante dictis*, &
fere idem. „ *in hac quoque gradu tantummodo differre videntur.*

Venæse- „ *Art. 55.* „ *Febres continuæ putridæ plerum-*
ctio. „ *que venæsectionem requirunt; intermittentes*
 „ & malignæ rarissime aut nunquam eandem
 „ admittunt. In Februm progressu ad statum ap-
 „ propinquantium sanguinem detrahere nefas est
 „ juxta antiquorum præcepta; *Cælius Aurelia-*
 „ *nus, Celsus, & reliqui sanguinem mitti solum-*
 „ *modo prima diatritho* requirunt, ultra vero nun-
 „ quam.

Non sine „ *Art. 56.* „ *De venæsectione in genere dicen-*
necessita- „ *dum est; in sanguine est radix vitæ, & sanguis*
te. „ *est ipse vitæ thesaurus; unde, si aliis modis æ-*
 „ *gro vel sine periculo, vel æque commode suc-*
 „ *currere poterimus, sanguini parcatur.* Rario-
 „ res sunt sanguinis emittendi occasiones, quam
 „ vulgo creditur. *Itali, Galli, & Hispani* sangui-
 „ nem mittunt, non unciatim, sed libratim. In
 „ *Germania* non ultra quinque vel sex uncias e-
 „ mittunt. Inter hos nos *Angli* mediam viam am-
 „ plectimur.

In qua „ *Art. 57.* „ *In brachio subter venam basilicam ja-*
vena. „ *cet arteria, subter medianam nervus, subter u-*
 „ *tramque tendo; juxta cephalicam nulla est arte-*
 „ *ria, neq; nervus, neq; tendo; Atq; hanc ob causam*
 „ *hæc ultima minimo cum periculo aperiri potest.*

Vvillisi sententia.

Quatuor „ *Art. 58.* in Febris putridis continuis quatuor
stadia Fe- numerantur stadia, vid. initium, augmentum
brum status, & declinatio; in initio plerumque adsunt
putida- symptomata sequentia, rigor aut horror, lassitu-
rum. do & perturbatio cum siti & vigiliis, dolor in ca-
 pite aut lumbis, nausea aut vomitus. In incremen-
 to sequentia, sitis intolerabilis, dolor capitis &
 vigi-

vigiliæ pertinaces, deliria, phrenitis, motus convulsivi, oris amator, sapor ingratus, linguæ scabrities, pulsus vehemens & citatus, urina summe rubicunda, plerumque turbida, contentis saturata, sine hypostasi aut sedimento laudabili. *Status morbi crisin* continet, quæ in Febre continua ferè idem est ac paroxysmus intermittentium, qui non nisi stato tempore, & post totidem horas, evenire solet, sic etiam motus critici in Febribus continuis a die quarto in quartum aut forsan a septimo ad septimum contingunt: Hæ *Crises* sunt plerumque per sudorem, vel hæmorrhagiam; sunt etiam aliquando *crises imperfectæ*, quæ morbum non solvunt, quales sunt per urinas, vomitum, secessum, exanthemata, bubones, &c. *Criseos* tempora sunt valde incerta. Si Febris in principio sit vehemens, plerumque intra dies quatuor expectanda est *crisis*; quod si tardior sit Febris in initio, circa diem septimum ad *ἀνάλω* perveniet; si vero adhuc remissius incipiat, ad diem undecimum, aut decimumquartum, vel ultra protrahi solet.

Crisis.

Art. 59. Interea notandum est, quod sicut paroxysmi intermittentium statim redeunt temporibus, ita *motus critici in continuis*; (diem autem quartum ut plurimum observant,) nam licet *crisis perfecta* ad 14^{um} 17^{um} aut 20^{um} diem prorogetur, tamen intermedio tempore motus leviores contingunt, quibus materia Febrilis velut per partes amputatur, donec pleniorum ejus discussionem natura aggredi valeat; *natura etenim ut plurimum, nisi alias perturbata, quarto quovis die partem oneris sui excutere tentat*; quare ut plurimum 4^{to}, 7^{mo}, 11^o, 14^o, motus critici, non planetarum directione, sed ob naturæ necessitatem eveniunt.

Nota bene.

Art. 60. Per declinationis stadium intelligo *Declinationem* conditionem ægri & morbi, quæ statum sequitur, sive in salutem sive in mortem tendat, vel alterationem quam sanguis subit post *crisin bonam* vel

vel malam, cum res adhuc in dubio versetur, quandoque etenim, crisi imperfecta existente, ægri diuturna imbecillitate labefactantur, & non nisi longo tempore, si omnino convalescunt.

*Ptyalis-
mus.*

Art. 61. Aliquando in declinatione Februm *incrustatio* in partibus oris successit (quasi species *aphtharum*) & etiam adest *salivatio* copiosa, velut ab assumpto Mercurio, cum fætoe anhelitus, item linguæ & gingivarum intumescencia.

*Divisio in
Feb. ar-
dentem
& len-
tam.*

„ Ut instituatur harum Februm therapia ratio-
„ nalis, utilissima est earum divisio in *Febres ar-*
„ *dentes & lentas*, utpote quoad medendi me-
„ thodum toto (quod ajunt) cœlo a se invicem
„ discrepantes. „

FEBRES ARDENTES.

*Causas
quid.*

Art. 62. Causus seu Febris ardens ea est, quæ cum majori æstu, siti fere intolerabili, aliisque symptomatibus insigniorem sanguinis *phlogosin* arguentibus, cursum suum peragit; symptomatis magis horrendis stipatur; crisin habet difficilem & eventum periculosum. (Calor ad tactum fere urens est hujus Febris *signum pathognomonicum*; & ut plurimum, habet conjunctam insignem alicujus visceris *inflammationem*.)

*Lipyria
Assodes
Elodes
&c.*

Art. 63. „ Huic Februm classi aliquo modo re-
„ ferri potest 1. Febris *lipyria* dicta (*Art. 104.*)
„ in qua interiora uruntur, exteriora vero fri-
„ gent. 2. *Assodes*, in qua ægri decubitus eun-
„ dem non ferentes jacendi situm perpetuo va-
„ riant in lecto indefinenter jactantes. 3. *Elo-*
„ *des*, in qua ægri profundissime sudant, sudore
„ nihil proficiente, &c. Sed revera hæc sunt po-
„ tius Februm symptomata, quam novæ species.
„ Ejusdem quoque commatis est Febris *Calentura*
„ dicta, quæ nihil aliud est quam peculiaris *de-*
„ *lirii* species. „

*Calentu-
ra.*

Art. 64. „ *Calentura* est Febris nauticis pecu-
„ liaris. Hoc morbo correpti singulari delirii spe-

„ cie

„ cie afficiuntur ; nimirum ajunt se in vireto ,
 „ quod semper in conspectu habent , & præsto es-
 „ se arbitrantur , ambulare velle ; & , nisi vi de-
 „ tineantur , in mare profiliunt ; atque hoc sym-
 „ ptoma est *signum huius morbi pathognomonicum* .
 „ In mari mediterraneo frequenter occurrit ; ju-
 „ venes robustiores & temperamento sanguineo
 „ præditi huic Febri sunt magis obnoxii . Larga
 „ sanguinis missione ut plurimum sublevantur .

Boerhaavii sententia.

Art. 65. In Causo adest calor ardentissimus ,
 siccitas in cute tota , naribus , ore , lingua ; re-
 spiratio densa , anhelosa , cita ; lingua sicca , fla-
 va , nigra , exusta , aspera ; sitis inextinguibilis ; nau-
 sea , vomitus ; anxietas , inquietudo , lassitudo
 summa : tussicula , vox clangosa ; delirium , phre-
 nitis , pervigilium , coma , convulsio ; diebus im-
 paribus exacerbationes .

*Sympto-
mata fre-
quentio-
ra .*

Art. 66. Tertio & quarto die sæpe lethalis eva-
 dit , septimum rarò transit , si perfecta ; solvitur
 sæpe hæmorrhagia (quæ , si tertio vel quarto die
 parca , lethalis ;) hæc prænunciatur cervicis do-
 lore , temporum gravitate , tenebricosa caligine ,
 præcordiorum contentione sine doloris sensu , in-
 vitis lacrymis sine lethali signo alio , rubore faciei ,
 pruritu narium , optima fit die decretorio ; solvi-
 tur & die decretorio vomitu , alvo , sudore , uri-
 na , sputo crasso ; accessio die pari pessima , si id
 ante diem sextum ; urina nigra , pauca , tenuis
 huic lethalis ; lethale sanguinis sputum ; lethalis
 sanguinis mictus ; deglutitio læsa mala ; extremo-
 rum refrigeratio pessima ; facies rubra & sudans
 mala ; parotis non suppurans exitialis , alvus ni-
 mis fluxa lethalis ; cum tremore abit in delirium ,
 inde in mortem ; transit in peripneumoniam sæ-
 pe cum delirio . „ In Febre ardente (inquit Hip-
 „ pocrates) si tinnitus aurium cum visus hebetu-

*Progno-
sis .*

„ dine

„dine fiant, & ad nares accedat gravitatis sensus, delirium portenditur. „

Intentiones curative.

Art. 67. In hoc casu integumenta debent esse minime aggravantia corpus; situs corporis paulo erectior; potus copiosus, blandus, demulcens, subacidus, aqueus, calidus; cibi leves, farinacei, hordeati, avenacei, ex fructibus subacidis confecti; requiritur Venæsectio, si morbi initium, plethoræ indicia, inflammationis singularis signa, calor intolerabilis, rarefactio nimia, revulsio necessaria, symptomata urgentia, neque alio remedio facile superanda, hanc exigant. Indicantur etiam quandoque *clysmata* blande *laxantia* & *refrigerantia*, prout vis ardoris, siccitas alvi, impellant; medicamenta *diluentia*, *nitrosa*, alvum lenissime *laxantia*, &c. „ Interim in animo probe tenenda est Vvaldschmidii admonitio; Febris maligna (inquit ille) in principio sæpe speciem Causæ præfert; cautus itaque sit medicus, ne in errorem incidat: animadvertendum ergo est, an Febricitans de cordis anxietate, virium jactura, aliisque gravioribus accidentibus conquerratur, & qualis sit urina, &c. nam longe diversa est harum Febrium curatio. „

„Remedia particularia his intentionibus satisfacienda a sectione de Febrium symptomatis (Art. 102. 103.) &c. petenda sunt.

FEBRES LENTÆ.

Ettmulleri sententia.

Febres lenta.

Art. 68. Febres lentæ, etiam si sint minus acutæ, sunt tamen continuæ, in quantum continuè affligunt ægros, sed tardiore motu sua absolvunt tempora; hinc diuturniores sunt, & symptomata habent minus urgentia. De Febribus his apud practicos pauca prostant. A vitiis lymphæ (vel pituitæ) potissimum oriuntur; & a Sylvio Febres lymphaticæ appellantur, (forsan rectius pituitosæ.)

Art.

Art. 69. Inter has eminent Febres *catarrhales* Febres
catarrhales. dictæ, quæ in principio & incremento conjunctum habent *catarrhum*, *coryzam*, *tussim*, *raucedinem*, &c. Hæ Febres sunt plerumque lentæ, interdum mites, vespere vero aliquanto exacerbari solent: adest lassitudo artuum, durant symptomata sub coryza & tussi gravioribus usque ad statum morbi, donec materia catarrhalis (ut vocant) cocta fuerit, & spissior mucus emungitur, & deinde cessat Febris. Sedes morbi est in glandulis conglobatis.

Art. 70. In Febre catarrhali conducit *decoctum* Curatio. *ligni sassæ*. (cum *rad. liquiritiæ* & *passulis* ad humorum acrimoniam) item *succus raparum expressus* cum paucis saccharo; item *volatilia* & *sudorifera*; solutio *gum. ammoniac.* &c. vid. catarrhum, tussim, raucedinem, &c. alibi.

Art. 71. Præter dictas observantur quoque Febres *lymphaticæ* (potius *pituitosæ*) Febres
pituitosæ. vitio lymphæ (pituitæ) glandularum conglomeratarum, quæ in certam cavitatem suam effundunt succum; inter quas eminent parotides & pancreas, quæ in os & intestina, & consequenter in massam sanguineam secretos liquores evomunt. Peccant hi humores, quando sunt nimis viscosi, salsi & acres; unde excitantur hæ Febres, (quæ quoque nonimproprè interdum Febres *scorbuticæ* audiunt.) Acutæ continuæ, nonnunquam etiam intermittentes, in hujusmodi lentas degenerant, & quandoque in *hæcticas* transeunt. Origo harum Februm est plerumque in stomacho ex indigestione & cruditatibus.

Art. 72. Ideoque tam in principio quam in incremento mitius *vomitorium* ad curam optime viam sternit, & postea visciditas vel acrimonia pro re nata corrigenda est, & symptomata mitiganda, & ventriculus roborandus, &c. Pro his scopis consequendis aliquo modo valent remedia sequentia, *Tartarus vitriolatus*, *pulveres testacei*, *antimonium* Curatio.

nium diaphoreticum, antihæcticum Poterii, tinctura corallii, salia volatilia, &c.

Febres
colliqua-
tiva.

Art. 73. „ Febres colliquativæ sunt, in quibus
„ corpus brevi tempore insigniter consumitur, &
„ emaciatur; partes solidiores & ipsa pingundo
„ colliquescit, nunc per diarrhoeam, nunc per
„ sudorem, nunc per urinam, nunc solo ardore
„ febrili sine ulla sensibili excretionem; Febris ali-
„ quando colliquativa ex cancro mammarum cum
„ diarrhoea observata est. Hactenus de Febribus
„ benignis.

FEBRES MALIGNÆ.

Ettmuleri sententia.

Febris
malignæ
Diagno-
sis.

Art. 74. Febris malignæ primum signum est su-
bitanea virium prostratio citra causam manifestam
cum pulsu debili; calor externus non adeo inten-
sus ac in quibusdam aliis Febribus, potius inte-
riora uruntur; adsunt vigilæ pertinaces mox a
principio morbi, inquietudo anxiosa; conquerun-
tur ægri, & monstrant regionem stomachi seu
præcordiorum; urina est sanorum similis; facies
interdum solet esse tetra, & a statu naturali mul-
tum mutata, livida interdum, aut plumbea. In
his Febribus, quod æstus & Febrilis ebullitio ut
plurimum remissior sit, malignitati, quæ sangui-
nem occupat, prorsus debetur, & spirituum ma-
gis affectorum & quasi sideratorum, quam turba-
torum humorum indicium est: aut saltem in hu-
moribus, præsertim sanguine, a fermentativis ma-
lignis miasmatis confusionem, & in textura &
motu intestino eorum inordinationem indicat, &
ita incalescentia quidem, sed interne tantum gli-
scens, non vero ad exteriora pergens, accidit;
unde natura quasi oppressa non potens est sym-
ptomata illa magis regularia exercere, quæ mor-
bo competunt.

Magna
varietas.

Art. 75. Ratione symptomatum adjunctorum
ma-

magna est varietas *Febrium malignarum*; dum quædam cum certis & insignibus cutis *efflorescentiis*, quædam sine iis, vel paucis admodum, quædam aliis symptomatis stipatæ sunt.

Art. 76. Nonnulli asserunt (ex observationibus *Vermiculi.* *li.* microscopicis) in omnibus Febribus malignis & ulceribus gangrænosus talem adesse putredinem sanguinis, ut exinde copiosissimi generentur *vermiculi*, qui, ubique scaturientes, & corpus lancinantes, tam varia inducant symptomata, necesse est: Sed hi vermes non nisi putredine præcedente generari possunt. In Febribus malignis sanguis est nimis fluidus, vix aut plane non omnino congrumescit (152.) sed hoc quoque est morbi *productum*. Malignitas aliquando est tanta, ut partes nunc internas nunc externas *sphacelo* ac *gangræna* correptas observare liceat.

Art. 77. Audita *Febre maligna* homines contremiscunt; siquidem omnes Febres malignæ sunt admodum periculosæ, & quoad exitum valde incertæ, unde *Galenus* malignas Febres statuta ad judicandum non habere tempora asserit. Surditas in principio periculosissima, in statu vero morbi salutem portendit. Narium stillicidium, ut & alvi fluxus, quocunque morbi tempore, sunt pessima signa. Muscarum venatio, aut floccorum collectio est fere semper lethalis. Interdum bubones circa genitalia apparent, quibus die undecimo erumpentibus morbus evanescit. „ Medicus (re- „ cte admonente *Waldschmidio*) nunquam ab æ- „ gro recedat, nisi prius inspexerit *oculos*, quo- „ rum insolita mutatio infaustum prædicit even- „ tum; & dum pulsum explorat, semper atten- „ dere debet, an manus ægrotantis sit tremula. *Prognosis.*

Art. 78. Venæsectio in Febribus malignis lo- *Curatio.* cum non habet: quo malignior est Febris, eo magis nocet; & quo tardius instituitur, eo deterius. — *Vomitoria* in primo principio morbi præ cæteris omnibus maxime conducunt, ante- quam

quam natura moliatur aliquam excretionem percutim; elapso vero primo principio elapsa est occasio: Et postea cura aggredienda est medicamentis sudorem moventibus; sudores etenim (ipsa natura monstrante viam) causam & morbi fomitem frequenter expellunt, hæc medicamenta *bezoardica* aut *alexipharmaca* appellantur: quo autem major est malignitas eo copiosius provocandus est sudor, respectu semper habito ad morbi genium, diversitatem, ægroti vires, &c. *ter ad minimum in 24. horis sudorifera sunt propinanda*; interponenda sunt *analeptica* & *blande acida*, inter quæ eminent *spiritus nitri dulcis*, (item *tinctura croci cum spiritu nitri dulcis extracta*) *succus citri, cydoniorum, &c.* *Camphora* est nobile alexipharmacum, sed omnes ejus usum ferre non possunt, præsertim mulieres & literati, quorum spiritus animales sunt mobiles & dissipabiles; est mirabile concretum, & si cum cautela usurpetur, vix datur par remedium. *Rob. sambuci* est egregium sudoriferum pro pauperibus. *Cantharidum* & *vesicantium* usus in statu morbi insigniter prodest. *Sal volatile C. C.* & *sal viperarum* sunt sudorifera, & malignitati resistunt; & hic locum habet *mistura simplex Paracelsi*, viz. *℥. sp. theriacal. camphorat. ℥x. sp. vitriol. ℥ij. sp. tart. rectificat. ℥vj.* digere in phiala hermetice obsignata ad tres septimanas, ut uniantur exactissime; dos. *℥j.* plus minus in vehiculo appropriato, ciet sudorem. „ *Item decoctum sacrum Fulleri*, & *haust. diaphoret.* „ *eiusdem, bezoard. mineral. tinctura bezoardica, oleum Heinsii* (Art. 192.) &c.

FEBRIS PETECHIALIS.

Ettmulleri sententia.

Febris petechialis symptomata. Art. 79. *Febris petechialis* est *Febris maligna*, in qua præter symptomata reliquis Febribus malignis communia, adest insignis laxitudo totius corporis.

poris, dolor universalis contundens & lancinans, maculæ raro die quarto, sæpius circa septimum erumpunt, præsertim circa pectus & scapulas, hinc abdomen, crura, brachia (collum) ordinario facies solet esse libera: interdum non maculæ solum sed vibices apparent, in declinatione aliquando quasi *pyralismus* exoritur cum euphoria ægri.

Art. 80 Maculæ hæ in morbo salubri efflorescentia intense rubent inslar pulicum morsuum, (petechiæ differunt a puncturis pulicum, quod in puncturis in medio punctum appareat, quod semper manet etiamsi reliquum ruborem comprehensione vel frictione pellas,) hinc pedetentim pallescunt, flavescent, sicque evanescent, & quo magis rubicundæ sunt, eo melioris notæ; è contra, quæ ex rubore livescent, vel nigrescent, pessimæ sunt, si retrocedant, ingens periculum imminet. *Contagiosæ* sunt hæ Febres, & interdum *epidemice* grassantur, admodum periculosæ sunt; plures moriuntur quam evadunt.

Art. 81. Quoad curam Febrium *petechialium*, eadem indicationes, atque supra circa Febres malignas in genere, hic obtinent; si præmature & nimis citò maculæ retrocesserint, applicanda sunt *vesicatoria*, quæ etiamsi raro aut nunquam denuo apparere solent, earum tamen absentia vesicatoriis quodammodo suppletur, & symptomata nervosi generis ex earum retrocessione interdum felicissime præcaventur. Apparentibus *petechiis* nihil amplius in primis viis moveri debet; ipsa enemata sunt suspecta.

Donckersii sententia.

Art. 82. *Febris petechialis*, sive *continua maligna epidemica* in civitate agroque *Coloniensi* circa annum 1673. ad hunc modum se habuit; ex improvviso plurimos occupavit anxietas præcordiorum, gravitas circa regionem ventriculi, appetitus dejectio, spontanea artuum laxitudo, nec non

*Symptomata.
Invadendi modus.*

vertiginosus capitis dolor, præsertim circa originem nervorum optitorum; quibus omnibus postmodum cum virium subita prostratione accessit Febris, putridæ plurimum referens ideam *synochi*, utpote quæ præmissis brevi horrore vel rigore, universum corpus magno, & quem dicunt, præternaturali perfundebat calore, sequentiaque secum adducebat symptomata.

Symptomata.

Art. 83. Pulsus in omnibus erat celer, & plerumque parvus ac debilis; sitis, invalescente morbo, cum linguæ siccitate inextinguibilis; urina in morbi principio ordinario quidem apparebat sana, aliquando tamen rubra & obscura, in fine vero augmenti, vel initio status turbata, in declinatione semper cum sedimento, saltem aliquali; alvus in aliis adstricta, in aliis laxa erat; infestabat ut plurimum ægros hypochondriorum præcipue sinistri dolor (quod notandum) per lumbos secundum spinam dorsæ ascendens lancinans ad scapulas extendebatur, & cui non raro se præbebat comitem *pleuritis* vel *angina*; multos in principio augmenti defatigabat alvi fluxus, cum quo non raro lumbrici excernebantur; multi quoque alii in medio augmenti in aurium tinnitum, gravedinem auditus, & aliquando oculorum suffusionem, quin nonnunquam in omnimodam eorundem sensuum ablationem incidebant; omnes denique affligebantur perpetuis vigiliis & delirio, quod in aliis levius, in aliis gravius fuit, concomitantibus semper rubris vel lividis aut subnigris maculis.

Solutio.

Art. 84. Horum similiumque symptomatum *syndromen* in omnibus, quorum cura mihi commissa fuit, vel (quatenus ex aliorum relatione potui colligere) quorum natura inversa curandi methodo non fuit plane consternata, septimum circa diem subsecuta fuit *crisis*, vel manifesta vel obscura.

Contagium.

Art. 85. Hic morbus in primo sui ortu aliquandiu

diu apud paucos veluti latebat, pedetentim vero symptomatum malignitate funerumque frequentia longe lateque sæviebat, & ad tertium usque annum plus minus invaluit, & nonnullis in locis tertiam incolarum partem è medio sustulit.

Art. 86. Si delirium circa diem criticum vel primum accidebat, vel majus evadebat, concomitantibus diarrhœa, obscura voce, & difficillima (citra faucium tumorem) deglutitione, necnon digitorum manuum labiorumque tremoribus convulsivis, indubia instantis mortis erant indicia; in hac Febre quando alius aliquis morbus se illi conjunxerit, multo periculosior fuit; lethalis fuit frequentius in cacochymicis, plethoricis, & valde obesis; pulsus parvus celer in morbi principio male ominatur; Maculæ parvæ & nigræ aut lividæ male portendebant: quibus vero floridæ tempestive prodierunt, nempe die quarto seu indicatorio, sub *legitima medicatione*, ut plurimum servatos vidi; alii autem, in quibus tales maculæ serius vel instante die critica sub cuticula obscure proreperent, septimoque die vel immediate post, magis debilitarentur, ac pejus haberent non evasere; exitialis quoque ægro ut plurimum fuit, si, præter pulsum a principio insigniter parvum, debilem & celerem, urina quoque semper maneat sani coloris & consistentiæ; si ægrotus mente consternatus se non ægrotare aut bene habere & continuo esurire putet; si cum magna faucium linguæque ariditate parum bibat; continuaque adsit oculorum lacrymosa distillatio: hæc enim & similia symptomata, si non certum interitum, saltem extremum vitæ discrimen denotant. Certus denique pronunciatur interitus, si circa criticum seu septimum diem, urina in eadem perseverante bonitate & claritate, delirium majus fiat; si sitis acuta sit cum tanta linguæ fauciumque ariditate, ut æger non nisi inarticulate loqui, neque nisi cum difficultate deglutire queat; si adsint con-

Prognosis.

Signa ut plurimum lethalia.

vulSIONES; insuper si, exiguis & fuscis sub cuticula obscure emergentibus maculis, alvi fluxus superveniat, mors in propinquo est.

Signa salutaria.

E contra verò si pulsus non sit nimis debilis, & si sit mediocriter magnus, & non præter modum celer; si delirium leve & insomnio quam delirio similis; si lingua non admodum sicca, sitisque tolerabilis sit; si maculae sint rubrae, majusculae, rotundae, clare, & distinctae, si post tertium diem erumpant; & urina circa idem tempus rubra & obscura, vel cum nubecula spectetur, bonum hinc lætumque prælagire oportet eventum, qui sine dubio septimo die insequitur, quando scilicet erupto sudore, quietoque oborto somno symptomata quæque graviora remittunt, & æger perfecte judicabitur.

Curatio.

Art. 87. Cum ab alvi purgatione semper inchoanda est, si nempe nullum aliud urgens symptoma aliter suadeat; sin verò morbus fuerit valde inflammatorius, pleuriticus, vel anginosus, &c. ante omnia præmisso clystere *venesectio* instituenda est, & remedia *antipleuritica* propinanda, & aliquando phlebotomia est iteranda (sed parcè & non nisi cum cautela aperienda est vena in Febribus malignis.) Cathartica calida sunt vitanda, lenitiva, & quæ sanguinem minus exagitant, sunt eligenda. Factis his juxta indicationes particulares evacuationibus, sanguinis naturalis effervescentia confortanda est convenientibus *Alexipharmacis*, sed non violentis, ac si hostis una vice expellendus esset. Ex innumeris remediis, quæ in hunc scopum apud authores inveniuntur, eligimus vulgatissima, atque ab omni ævo probatissima, & idcirco tutissima; *mithridatium* nempe, *theriacum*, *diascordium*, &c. Cavendum est imprimis ne sudorem expellere conemur sola vi medicamenti, antequam ipsa natura eum sponte excitare moliatur. Potus debet esse neque nimis calefaciens, neque valdè refrigerans; inchoante crisi cum

Potus.

sudor

Iudore nihil convenientius expertus sum, quam ut ægri *aquam hordei calidissimam* copiosè bibant cum vino mixtam, & quandoque cum *flor. papav. errat.* & *rasur. C. C.* incoct. *cibus* debet esse tenuissimus vel potius nullus.

Art. 88. Purgationis in morbi principio necessitatem & bonos effectus non tantum inculcat ratio manifesta (de qua, si quis velit, videatur author) *sed & experientia mihi confirmavit, adeo frequens, adeo certa, adeo clara, ut si hæc falsa sit; aut esse possit, nulla certa aut sit, aut fuerit; aut futura sit unquam.*

Art. 89. Remedia cathartica mihi usitata fuerunt vel huiusmodi *apozema* vel *electuarium* subsequens; ℞. *Fol. sen. mundat.* ℥iij. *sem. fœnic.* ℥i℥. *trem. tartari* ℥j. *coq. in q. s. aq. font. ad ℥vj. in colatura dissol. pulp. tamarind.* ℥ij. *syr. ros. solutiv.* m. ℥j. *sumatur partitis vicibus. Electuarium* sic se habet; ℞. *Pulv. tamarind.* ℥i℥. *confect. alkerm.* *pulv. jalap. ana* ℥℥. *resin. ejusdem gr. vj. diagrid.* gr. v. *cum q. s. syr. de cichor. cum rheo f. electuarium.* *Mixturam alexiteriam* ferè semper huiusmodi cochleatim bibendam propinare solebam; ℞. *Theriac. andromach. diascord. Fracastor. ana* ℥j. *sal. absynth.* ℥℥. *ocul. cancrorum* ℥ij. *aq. card. ben. meliss. ana* ℥ij. *theriacal. syr. papav. errat. ana* ℥j. *sp. sulph. q. s. ad gratum acorem, f. mixtura.* Ex magno ægrotorum numero, quos sub mea habui cura, licet aliquando quinque, sex, vel septem simul in eadem domo Febre ista laboraverint, nullus, quod meminerim, sit desideratus præter unum virum & unam fœminam. „ Fides sit penes „ authorem.

Art. 90. „ In calce libelli historias LII. hæc Fe- „ *bre decumbentium in medium profert, quorum* „ *duo tantum mortui sunt. Illius methodus est* „ *planè singularis; &, si dictis fides adhibenda* „ *sit, proculdubio curationes hæc laudano po-* „ *tissimum acceptas referre (ut mihi visum est)*

*Cibus:**Cathartica.**Alexipharmaca.**Successus admirandus.**Sed in dubium vocandus.*

„ debemus: in omnibus enim fere præscriptis lau-
 „ danum larga manu propinavit: exemplo sit bo-
 „ lus sequens, ℥. *Diascord.* ʒiſs. *laudan. opiat.*
 „ gr. ij. m. f. *bolus* pro una vice, concesso eodem
 „ tempore in potu ordinario *syrupo papaveris* er-
 „ rat. p. 467. His expendendis haud mihi suppe-
 „ rit tantum otii, sed ad propositum reverten-
 „ dum est.

Ferrago sententiarum.

DE FEBRIBUS IN GENERE.

*De diebus
eriticis.*

¶

*Indici-
bus.*

*Doctrina
eorum
valde ob-
scura.*

Art. 91. Hippocratis aphorism. 36. §. 4. Sudo-
 res febricitantibus boni, qui manare cœperint die
 tertio, quinto, septimo, nono, undecimo, deci-
 mo quarto, decimo septimo, vigesimo primo,
 vicesimo septimo, tricesimo primo, tricesimo
 quarto; ii enim sudores morbos judicant: qui se-
 cus evenerint, laborem, & morbi longitudinem,
 & recidivas significant. Aphorism. 24. §. 2. Index
 septimi quartus; sequentis septimanæ octavus ini-
 tium; spectandus quoque est undecimus, siquidem
 is secundæ septimanæ quartus est; rursumque de-
 cimus septimus spectandus: is enim a quarto de-
 cimo quartus est, & ab undecimo septimus. Die-
 rum (inquit *Lister*) indicum & contemplabilium
 ad *crises explicandas* tota doctrina valde obscura
 est. Est quidem trium concoctionum quædam
 mensura, ut ex anatomia & statica medicina pla-
 nè constat: ita Februm intermittentium periodi
 statæ sunt; in aliis vero morbis acutis, quales
 sunt Febres symptomaticæ, ut pleuritis, angina,
 variolæ, & Febres continuæ, *crises*, earumque
 indicia forte non ita prompte animadvertimus;
 quod parum naturæ, sed nobismet ipsis (quod
 tamen veteres non fecerunt) totam fere sanatio-
 nem vindicamus.

*Utilitas
vomitorij*

Art. 92. Nullum remedium (inquit D. D. *Fre-*
ind) sub initiis Februm est æque salutare ac vo-
 mito-

mitorium, sæpenumerò & necessarium est, si quan- ^{in Fe-}
do, quod plerumque fit, vel nausea, vel ventri- ^{brium}
culi gravitas, vel etiam capitis dolor invaserit: ^{principio.}
hoc medicinæ genus apud vetustissimos Græcos
haud infrequens fuit, & *Celsi* temporibus Romæ
perquam familiare. Medicamenti, quo vomitus
cietur, interior est quædam actio; quæ nusquam
aliàs se manifestiùs prodit, quam in celebri illa
radice *Ipecacoanha*. Hujus sane vis in attenuan-
dis humoribus eximia est; cui & fidem facit sum-
ma herbæ amaritudo, & vividus ille, qui appa-
ratu Chymico elicitur, *sal.* Equidem hanc radi-
cem non parca manu adhibitam esse comperi,
cum nulla fere vel per os, vel per alvum seque-
retur purgatio: Elapsa autem una aut altera hora
incalescere cœpit ægrotus, ita ut, pulsu excitato,
tandem in *uberrimum sudorem* colliquesceret.

*Virtus
singularis
rad. Ipe-
cacoan-
hæ.*

Art. 93. Hoc unum spondeo (idem laudatus
author) quemquam experiundo comprobaturum,
quod scilicet ex Febris *multæ evacuantibus so-*
lis, etiamsi haud alio fuerit remedio usus, cedere rantur.
consuescant; vix ullæ autem, quæ paulo vehemen-
tius invaluerint, medicina qualicunque si ab hoc
evacuandi instituto decesseris, restingui possunt.

*Febres
vix sine
evacua-
tione cu-*

Art. 94. „ Hæc est accuratissima *Danielis Lu-* *Methodus*
„ *dovici* methodus curandi Febres continuas, *Ludovici*
„ nempe, in principio præmisso vel omissa *vomi-* *in curan-*
„ *tu*, mox volatile aliquod v. g. *tincturam be-* *dis Febr.*
„ *zoardicam, mixturam simplicem, spirit. C. C.*
„ & pro circumstantiarum ratione cum *opiatis*
„ exhibendo; in statu *fixiora, terrea, alcalina;*
„ in declinatione *sancrina, corallina, &c.* hac
„ nempe methodo nec *crisin* negligit medicus,
„ nec otiosè eam expectat.

Art. 95. „ Quo mitiora pathemata sunt circa
„ primas vias & regionem stomachalem, eò mi-
„ tior & salubrior est Febris.

Art. 96. „ Facies turgida & subtumida morbi
„ longitudinem pronunciat.

*Signa pro-
gnostica.*

Art. 97. „ Quo magis sudant febricitantes, eo
 „ minor est sedimenti copia in urinis: Glutino-
 „ sus sudor est pessimus.

Art. 98. „ Quanto urina rubicundior est in ini-
 „ tio, tanto citius terminatur Febris, cum signis
 „ bonis ad bonum, cum malis ad malum. Uri-
 „ na alba aut pallida & admodum cruda in Fe-
 „ bribus ardentibus periculosa est, & plerumque
 „ mortem portendit, præsertim si adsit delirium;
 „ convulsiones enim sunt in propinquo.

Art. 99. „ Surditas in Febris; urina existente
 „ cruda, delirium grave portendit; sed si cum si-
 „ gnis coctionis jungatur, bene ominatur.

Art. 100. „ In Febris, si ægri non possunt
 „ discernere colores, imminent convulsiones.

*Cautela
 de usu o.
 pii.*

Art. 101. „ In omni Febre pulsu existente lan-
 „ guido, inæquali, aut formicante, cane pejus
 „ & angue opiata vitentur.

DE FEBRIUM SYMPTOMATIS gravioribus.

Inter legendum & ex observatione.

Frigus.

Art. 102. Frigus in Febrium initiis oritur ex
 immutata cordis contractione liquidis ad extre-
 ma fere stagnantibus; unde oriuntur, si diu ma-
 neat, *polyposa* in vasis majoribus *concretiones*, &
 interdum mors subitanea insequitur; ideoque quo
 majus in initio frigus eo periculosior est Febris;
 in peste incipiente frigus est summum. — Opti-
 me curatur potu aquæ calidæ *nitrosæ* cum paucò
 vino, *decoct. cocin. frictione blanda*, &c. (45.)

Calor.

Art. 103. Calor intensissimus in Febris & ve-
 lut incendium cum magno & forti pulsu fere sem-
 per *venæsectionem* postulat; quandoque etiam
clysmata lenientia calorem mitigat. Nimius sangui-
 nis fervor & ebullitio *julapiis, emulsionibus & de-
 coctis appropriatis* attemperandus est; sed appri-
 me cavendum est, ne ex nimia attemperazione spi-

spiritus elasticitate sua plus julto orbentur, & inde Febris ardens inopinato in malignam mutetur. (*Art. 67.*)

Art. 104. Febris *lipyria* dicitur, quando interiora uruntur, exteriora vero frigent; oritur ex inflammatione visceris interioris valde sensibilis; algor autem non est tactu medici judicandus, sed ægri judicio, qui se algere dicit, & regi jubet; tepent enim membra; hæc Febris brevi terminum absolvit, plerumque intra triduum vel quatrimum, & vix unus evadit, nisi statim ab initio occurratur.

Lipyria?

Art. 105. Ad sitim in Febris extinguentiam melius est frequentius & parcius bibere, quam una vice multum ingurgitare; sequens est potus gratissimus febricitantibus; ℞. *Aq. font. cum pane tost. decoct. ℥ij. vin. rhenan. ℥ss. gelatin. C. C. ℥ij. syr. cydon. vel e succ. citr. parum misce.* Convenit etiam *decoct. ad sitim Fuller. vel decoct. coccin. ejusdem.* Gargarismata quoque usui esse possunt, ut *gargarisma commune Fuller. decoctum rosarum* pro gargarismate, &c. Frequens ablutio oris cum simplici aqua multum confert ad sitim fallendam. *Sitis* (ut recte monet *Helmontius*) non oritur a calore sed a defectu salivæ, hinc guttæ aliquot *spir. sulphur.* plus levant sitim, quam integra mensura aquæ frigida; in eundem finem etiam conducunt *succi e vegetabilibus & fructibus*, ut *acetosæ, aurantiorum, limonum, citrorum, ribium, berberum, cydoniorum* &c. Præ cæteris commendabiles sunt hi succi per spontaneam residentiam post *sulphurationem* secundum *Helmontium* depurati, & in loco frigido asservati; *tamarindi* quoque optime conveniunt sitim leniendo, & alvum blande laxando: hæc vero *acida & refrigerantia* non sunt omnibus Febricitantibus indiscriminatim porrigenda, sed opus est maturo consilio: si enim præter sitim importunam adsit etiam summa debilitas, tum vinosa & spirituosius tutius propinanda sunt.

Sitis?

Art.

*Jusculum
avena-
ceum.*

Art. 106. Ptisana ex hordeo omnibus aliis for-
bitionibus præfertur ab Hippocrate in lib. de vi-
ctus ratione in acutis; & crebrior est ejusdem men-
tio apud veteres medicos; sed recentiores hordeo
vitio vertunt ejusdem cruditatem ac flatulentiam,
& *jusculum avenaceum* substituunt.

*Siccitas
lingua &
prunella.*

Art. 107. Siccitas & asperitas linguæ corri-
guntur *humectantibus & lenientibus*. Febris cum
prunella dicitur, quando lingua, crusta nunc al-
bicante nunc nigricante obducta, colore nigrican-
te puniceo apparet tincta; ipsa saliva infecta vide-
tur esse maxima causa. In *prunella* præter *muci-*
lag. cydon. &c. conducit sequens gargarisma, *℥℥.*
Liquor. e rapis coct. express. ℥ss. succ. sedi ma-
ior. depurat. ℥iij. mellis despumat. ℥j. sp. sal. ar-
moniac. q. s. m. Sequens quoque mixtura com-
modissima est, *℥℥.* *Alb. ovi unius, fortiter agi-*
tetur cum aq. spermat. ranar. ℥iv. mel. ros. ℥j.
m. Ad linguæ etiam ardorem & siccitatem quan-
doque in usu sunt sequentia, viz. *Mucilago se-*
quens ℥℥. *Mucilag. cydon. ℥ij. pulv. tamarind.*
amygd. dulc. excort. ana ℥j. ol. sulph. per campan.
gut. xx. syr. de rub. Ida q. s. misce decoct. ulmi
bat. gargarisma commun. Fuller. loboc. rub. vello-
hoch. vitellin. ejusdem.

*Nausea
& vom-
itus.*

Art. 108. Nausea & vomitus in Febris, cum
a crapula ortum ducant, leni vomitorio (v. g. *liquore*
posset. cum foliis cardui benedict. incoct. copio-
sè ingesto, addendo inter vomendum bis terve
sal. vitriol. ℥ss. vel coch. oxymel. scillit.) tutissime
curantur; ubi vero fermentum febrile ventricu-
lum petit, & enormes vomitiones biliosas excitat,
ut ægri vix quicquam vel medicamento vel alimen-
ti retinere valeant, imprimis convenit *jusculum*
tenuissimum pulli affatim ingerere, & postea re-
mediis appropriatis tonum ventriculi laxatum
firmare; sequens Julapium est valdè efficax, ℥℥.
Sal. absynth. ℥iv. succ. limon. recens express. ℥ij.
misceantur & finita ebullitione add. aq. cinnam.
hord.

hord. ℥iij. menth. Stephan. ana ℥j. sp. croc. ℥ss. ol. garyoph. g. iv. syr. cydon. ℥j. m. Interdum ad *laudandum* confugiendum est. Plura de vomitione sistenda videantur alibi (594.)

Art. 109. In Febribus aliquando accidit *Diarrhoea colliquativa* magno ægrotantium damno, quæ evacuatio non naturæ vi, sed morbi potius impetu & acrimonia turgentis humoris naturam stimulante fit, adeoque *symptomata* est, & sisti debet; convenit *decoctum album* pro potu ordinario; recte exhibentur *pulveres testacei absorbentes diaphoreticis admisti*, & postremo ad *diascordium, thetiacam*, &c. deveniendum est, enema sequens quandoque singularem præstat opem. *℥℥. Fol. ros. rub. m. ij. coq. in lact. chalyb. ℥ss. in colatura dissolv. diascord. ℥vj. m. f. enema diutissime retinendum.* Hic etiam plurimum facit, mihiq; in frequenti usu fuit, *enema de malicorio Fulleri*. In genere observamus in Febrium initiis alvum laxiorem quam adstrictiorem meliorem esse, in progressu vero morbi pejorem. Unicum hic notatu dignum observare liceat, nempe in diarrhœis colliquativis in declinatione Febrium accidentibus, & diu, non obstantibus remediis quibuscunque adhibitis, perseverantibus, solam sorbitionem *jusculi pullini* prohibitis omni alio victu & potu quocunque diarrhœam brevi penitus tollere & ægrum restituere, ut experientia me docuit.

Art. 110. Interdum Dysuria est symptoma molestissimum. *Emulsiones communes* effervescentiam humorum in Febribus ardentibus plurimum compescunt, & hoc vexatissimum symptoma plerumque sublevare solent, ut etiam *oleum amygd. dulc. cum syr. de alth.* Dysuria ex applicatione vesicatoriorum in Febribus *gum. arab.* commode medetur, *solutum scilicet ad ℥ij. in decoct. ord. ℥ij.* pro potu communi. Emplast. epispastic. Fulleri est omnium longe optimum & certissimum. Operæ pretium esset fortasse experiri vires *Campho-*

phora intermiscendo ipsam in compositione epispasticorum; num stranguriam vel ardorem urinæ insecuturum præcavere potis esset.

Sudor.

Art. 111. Sudor in Febribus, qui vel morbi initio vel quovis alio tempore ante diem criticum, nec adhuc visis coctionis signis profluit, est *symptomaticus*, & frequenter *colliquativus*, qui ægrotum gravat, & morbum exasperat, ideoque si modum excedat, arte, si fieri possit, cohibendus est: prohibetur surgendo ex lecto; corpus a nimis integumentis liberando; aerem frigidiusculum admittendo; a calefacientibus abstinendo; *leniter astringentia & blanda acida* capiendos, &c. egregiam vim in sudoribus sistendis habet *saccharum Saturni*.

Dolor capitis, &c.

Art. 112. Immanis capitis, lumborum vel artuum dolor in Febribus maxime in initio ut plurimum *Venæsectionem* postulat; manente nihilominus cum vehementia dolore injiciendum est *enema laxans*; fortassis levamen aliquale dolenti capiti conferre potest sequens epithema *℞. Sem. papav. alb. parum contus. ℥ss. placent. rosac. ℥j. vitel. ovi unius, acet. sambuc. n. q. s. misceantur super ignem; & f. epithema fronti admovendum, & sæpius renovandum.*

Vigiliae.

Art. 113. Vigiliæ pertinaces in Febribus succurrendæ sunt, ne dissipatis spiritibus vires frangantur. Investiganda est causa vigiliarum; si a fervore & siccitate proveniant, conveniunt refrigerantia & humectantia; si a dolore, propriis remediis leniendus est dolor; non nisi necessitate coacti ad *opiata* confugimus. Obiter monendus est medicus, ne criticis vigiliis seu ab inquietudine critica suscitatis auxilium hypnoticis præbere sataget.

Coma.

Art. 114. Prædicto malo contrarius est sopor nimius in Febribus, seu *coma*, sive *assidua somnolentia*; quando sopor morbosus evadit, excutiendus est omni arte, ne calor natus opprimatur; injicien-

CAP. I. De Febris eruptivis, &c. 49
di sunt *clysteres acres*; *epispastica* variis partibus
admovenda sunt, & *cataplasma de halecibus* sive
de raphan. *Fulleri plantis pedum* applicandum;
interne conveniunt *salia volatilia*, *cephalica*,
&c. (Art. 298.)

Art. 115. *Pervigilium* frequentissime est causa *Delirium*
delirii, non ideo delirium *hypnoticis* curari ten-
tandum est; nam id esset temerarium, sed inda-
ganda est causa, & remediis appropriatis auxilium
ferre conandum est. *Camphora* (inquit *Quincy*)
in delirio *Februm* somnum conciliat opio neuti-
quam proficiente. Delirii in *Febris* imminentis
signum est, *urinarum*, quæ antea valde tinctæ e-
rant & *flammæ*, in *tenuis* & *aquosæ* mutatio.

Art. 116. *Convulsiones* quoque interdum super- *Spasmi*
veniunt, *tremores* item & *affectiones spasmodi-*
cæ; in tali rerum statu diligenter expiscanda est
causa horum symptomatum, unde medicus intel-
ligat, quibus remediis internis opem ferre valeat,
interim *plantis pedum* applicari possunt *duo co-*
lumbi pullive recens mactati & per medios secti,
vel *toti pedes* involvi possunt *calidis pulmonibus*
agninis, *vitulinis*, vel *vervecinis*; renovari debent
hæ applicationes saltem ter in die.

DE FEBRIBUS ERUPTIVIS

in genere.

Inter legendum.

Art. 117. *Febres Eruptivæ*, quarum *crises* per *Februm*
eruptiones cutaneas expectandæ sunt, (quales sunt *eruptiva-*
variolæ, *morbilli*, *Febris scarlatina*, *Febris cum rum syn-*
rubeolis, *crystallis*, *Febris miliaris*, &c.) præter *ptoma pe-*
symptomata aliis *Febris* communia hoc habent *culiare*.
peculiare & sibi proprium, nempe, *ingentem pe-*
toris oppressionem, quæ harum *Februm* est signum
fere *pathognomonicum*; nimirum est quidam vali-
dus naturæ conatus materiam morificam a cen-
tro

tro ad circumferentiam propellendi ; unde certamina gravissima , anxietas præcordiorum , pectoris angustia & oppressiones maximæ : facta autem eruptione , statim hæc dira symptomata evanescunt . Ejusmodi pectoris oppressio in aliis quoque Febris est *crisium præcursor* (unde dictum illud , nox ante crisin est molestissima) in his tamen serius accidit , scilicet sub morbi finem ; in eruptivis vero non procul ab initio , imo frequenter propemodum in primo insultu ; quoniam *efflorescentia* in propinquo est .

*Symptomata
quædam
insigniora & febre
propria.*

Art. 118. , Præter symptomata aliis Febris communia (inquit Mortonus) in Febris eruptivis adsunt signa quædam quasi *pathognomonica* , talia sunt pulsus debilis , & celer , respiratio cita & anhelosa , hypochondriorum oppressio & angustia , urina pallida ac tenuis , coma , seu vigiliæ pertinaces , subsultus tendinum , nonnunquam spasmi manifesti , & deliria prorsus efferata , gravativa palpebrarum debilitas , oculorum rubedo , punctura dolorifica , & lacrymæ involuntariæ , in gutture dolor ulcerosus , raucedo clangosa , tussis perpetuo molesta . De Febre miliari & petechiali alibi .

Art. 119. In erysipellate , variolis , morbillis , Febre scarlatina , &c. (inquit D. Freind. Hist. Med. p. 75.) si symptomata vehementiora fuerint , si caput aut pulmones vehementius urgeant , aliæve partes ingenti dolore supra modum afficiantur ; ratio postulat , ut vena incidatur , ac tutò fieri licet . Et teste experientia (nihil enim frequentius expertus sum) audacter affirmo me nunquam observare potuisse eruptiones istiusmodi ex venæsectione retroire .

FEBRIS SCARLATINA.

Sydenhami sententia.

Art. 120. Febris scarlatina quovis anni tempore, sed ut plurimum sub autumnum, se prodit, Febris
scarlati-
na. infantes præ cæteris infestans; rigent horrentque in initio, ut in aliis Febribus, neque vehementer ægrotant; postea cutis universa maculis parvis rubris interstinguitur, latioribus magisque rubentibus, at non perinde uniformibus, ac sunt in morbillis: ad duos tresve dies perdurat rubedo, & deinde evanescit, cutem relinquens aliquantulo asperam & furfuraceam.

Art. 121. Quoad curam naturæ prorsus reliquenda est, vel, si medicatione opus sit, cum morbillis satis convenit. Curatio.

Art. 122. „ Febris scarlatina (inquit Morto-
„ nus) a morbillis minime distat, nisi efflorescen- Efflores-
centia
modus.
„ tia modo; morbilli confluentes dici potest. Idem
„ postulat regimen, eandemque medendi metho-
„ dum. Efflorescentia in morbillorum interstitiis
„ figuram diversam viz. oblongam, quadratam,
„ vel multangulam obtinet, unde cutis variega-
„ ta est: in Febre autem scarlatina una conti-
„ nuata inflammatione & rubedine cuticula per-
„ funditur.

MORBILLI.

Sydenhami sententia.

Art. 123. In morbillorum apparatu primo die calor & frigus se mutuo expellunt, die secundo Febris sensibilis adoritur vehementi ægritudine, Historia
morbillorum
ac-
curata. siti, inappetentia, lingua alba (non verò sicca)
tussicula, capitis atque oculorum gravedine, &
somnia perpetua stipata, plerumque etiam a
naribus & oculis stillat humor (signum certissimum
morbillorum ingruentium) insuper maculæ latæ
& ru-

& rubræ in facie & pectore conspiciuntur; sternutat æger, intumescunt palpebræ (viz. pauld ante eruptionem) vomit, sæpius tamen laborat diarrhoea cum dejectionibus subviridis coloris. Ingravescunt symptomata ad quartum usque diem, vel aliquando ad quintum, quo tempore maculæ pulicum morsibus similes prodeunt, quæ tam numero quam magnitudine auctæ racematim coalescunt, & faciem maculis rubris variæ figuræ interstinguunt, quæ quidem maculæ a parvulis quibusdam papulis rubris haud longè ab invicem distitis super cutis superficiem paululum elevatis conflantur, digitorum levi tactu deprehenduntur, oculis remotis fugiunt: a facie sensim ad pectus, ventrem, crura, &c. se diffundunt. Die sexto aut circiter asperescit facies emorientibus pustulis; octavo in facie penitus evanescunt, nono vix ullibi inveniuntur; tunc temporis augeatur Febris, & spirandi difficultas, urget rûsis, &c. *Morbilli omni vacant periculo, si modo perite tractentur.*

Curatio.

Art. 124. „Morbilli ab Avicenna *variola cho-*
 „*lerica* appellati cum ipsis variolis coævi sunt,
 „(*Art. 130.*) & quoad curam his cum illis satis
 „convenit; „*Diacodium* quotidie vesperi exhibendum est; *linctus* quoque & *apozemata pectoralia* propinari possunt ad tussim leniendam. Sin verò ex calidiore regimine, vel aliter, Febris, dyspnæa, aliave accidentia post morbillorum decessum supersint, *venæsectione* sola curantur, quæ sine metu in tenellis audacter celebranda est. In regimine intensè calido exanthemata aliquando livescunt, & nigrescunt, in adultis phlebotomia & temperatiore regimine sublevantur aut pereunt; in peripneumoniam incidunt.

Art. 125. „Morbilli nonnunquam (inquit Sylvius & omnes hoc scimus) per aliquot dies distingui non possunt a variolis, *ne quidem a medicis peritissimis, atque diu in praxi versatis:*

„lon-

„ longe proinde satius est in re dubia medicum
 „ vel suspendere suum iudicium , vel dubiè dun-
 „ taxat respondere.

Mortoni sententia.

Art. 126. Quoad curam morbillorum , in pri-
 mo stadio, scilicet , ante efflorescentiam paucif-
 sima remedia sunt adhibenda , nisi gravissima sym-
 ptomata superveniant, uti spasmi , enormes hu-
 morum colliquationes , &c. Si spiritus nimis ir-
 ritentur , & in spasmos rapiantur, remediis ap-
 propriatis compescendi sunt , nempe *julapis ex*
aquis cephalicis cum vinetura castor. , *pulvere ad*
Guttetam , &c. Et si nifus spirituum inde non mi-
 nuatur , guttæ aliquot *laudani liquidi* propinari
 debent . Ad *diarriæam* quod attinet , satius est
 palliativa curatione ejusdem molestiam , quoties
 insolito more sæviet , minuere , quam contra na-
 turæ legem eam penitus tollere , atque ita ægro-
 tantem occidere ; abstineat æger à cervisia , bi-
 batque decoctum album , & exhibeantur pulveres
 testacei ; non nisi extrema necessitate ad *landa-*
num perveniendum est . Ad tussim ferinam ab acri
 lymphæ ortam quadantenus cohibendam conve-
 niunt *mucilaginosæ* , *pectoralia* , *oleum amygdala-*
rum dulcium , &c. (*privatim syrup. e coral. & tin-*
ctura ejusdem.) , In tussi morbillorum pathogno-
 „ monica , sæpe permolesta , & convulsiva , &
 „ nonnunquam lethali nullum remedium præstan-
 „ tius novi (inquit *Harris*) quam *gummi traga-*
canthum copiosius sumptum in linctu vel deco-
 „ cto pectorali solutum , & pulveribus testaceis
 „ mixtum . Id enim gummi catarrhum maxime
 „ lenire solet , tussimque inde prognatam , sym-
 „ ptoma morbillorum primarium , sistere aut leva-
 „ re aptum natum est longe melius tutiusque nar-
 „ coticis , quantumcumque hæc laudantur a cla-
 „ rissimo Sydenhamo , &c.

Art. 127. Efflorescentia jam incepta , imo eru-

Curatio
in singu-
lis sta-
diis.

Spasmi.

Alvi flu-
xus.

Tussis.

Peripne-
monia.

Ophthalmia.

Diarrhea.

Ultimum stadium.

Tussis ferina si perstes.

V. S.

ptione plena existente quandoque suboritur *pneumonia* cum respiratione anhelosa, strangulatione suffocativa, deglutitione læsa, &c. quo in casu, multo usu fretus omnibus author sum, ut sanguis copiosius educatur, æque ac si æger morbillosa affectu correptus non fuisset. Idem in *ophthalmia* molesta ac periculosa faciendum moneo.

Ad *alvi fluxum* in hoc stadio compescendum non minus tutus quàm necessarius est opiatorum usus.

Efflorescentia peracta, si Febris venenatis symptomatis adjuncta remaneat, actum est de ægro. Contrà, si crisis fuit perfecta, cathartica hydragoga ad lymphæ colliquatæ affectus exitiales impediendos: non tamen præpropere massa sanguinis agitur, antequam venenum fuerit omnino subactum.

Quoties æger post morbillos *tussis ferina* & perpetua vexetur; primo in loco *venæsectio* celebretur, & si opus fuerit, post unum vel alterum diem iteretur, & una cum *linctibus* & *medicamentis lenientibus* quemadmodum in catarrho exhibere solemus) *cortex Peruvianus* copiosè exhibeatur, & *opiatum* hora decubitus pro re nata.

Art. 128. „ Ad præcavenda dira symptomata in hoc affectu evenientia, ab authore nostro enumerata, *phlebotomia* mature, in morbi initio, celebrata, & vomitorium exhibitum feliciter plerumque succedunt. (vid. Art. 119.)

Art. 129. „ Qui Variolis laborarunt, non sunt aded morbillis postea obnoxii, quare ætate gravior non ita promptè inficiuntur.

V A R I O L Æ.

Art. 130. „ Nihil de Variolis ante *medicos Arabes* scriptum invenitur. Hic verò morbus antiquior est, quàm vulgò creditur. Authores isti existentiam ejus usque ab initio septimi sæculi temporibus *Muhammedis* investigarunt, (Vid. *Freind. hist. med. p. 188. vol. 2.*) Variolæ

CAP. I.

Variolæ.

Et

læ ita appellantur, quasi parvi vari, quod cu-
 tem varient. Homini omni, soli & semel con-
 veniet Variolis & morbillis affici: in hoc autem
 censu non supputandæ sunt pustulæ variolosis
 similes, quas vulgò vocant *the Chicken-Pox*;
 pueris familiares sunt; Variolis veris quidem
 similes sunt, quoad magnitudinem & figuram,
 sed in eo ab iis distinguuntur, quod Variolæ
 cum rubore & inflammatione insigniori appa-
 reant, hæ verò albidiores sunt, & veluti vesi-
 culæ seroso humore repletæ, quæ intra tri-
 duum disrumpuntur, & exsiccantur, nullum-
 que afferre solent periculum, & plerumque si-
 ne Febre erumpunt. *Morbus est adeo benignus,*
ut nunquam sub curam medicam cadat. Vario-
 læ (inquit Dolæus) quoad ortum suum semi-
 narium habent nobiscum connatum, quod ali-
 quamdiu sepultum jacet, donec nata emergen-
 di occasione ex latibulo erumpat, & massæ san-
 guineæ commixtum symptomata terribilia, &
 sæpe mortem perducatur: inter multas hominum
 myriadas vix unus & alter per totam vitam ab
 his immunis manet. Ex cadaverum sectioni-
 bus patet viscera universa in corporis cavitati-
 bus contenta pustulis variolosis confertim affici,
 æque ac cutis externa.

Chicken-
Pox.

Sydenhami sententia.

Art. 131. Variolæ sunt *distinctæ* vel *confluen-*
 tes: *Distinctæ* seu discretæ cum rigore ac hor-
 rore invadunt; sequitur calor intensus, capitis &
 dorsi dolor vehemens, vomituritio, dolor circa
 scrobiculum cordis, somnolentia, in infantibus
 præsertim; quandoque etiam puroxysmi epilepti-
 ci, qui Variolas mox prorupturas, easque futu-
 ras esse mites ac benigniores plerumque præsa-
 giunt; quarto ut plurimum die ab invasione e-
 rumpunt, & symptomata febrilia evanescunt, nisi
 quod adulti in sudores sint propensi. In facie pri-

Variola-
rum dis-
cretarum
historia.

mō conspiciuntur pustulæ subrubræ , deinde collo , pectore , & universo corpore , quæ magis magisque inflammantur , & in dies elevantur , & subalbidæ fiunt , cute in interstitiis satis floridum colorem exhibente ; die undecimo faciei tumor ac inflammatio recedunt , & pustulæ exarescere incipiunt ; in hac Variolarum specie (si quando) die 14^o vel 15^o pereunt .

Confluentium historia.

Art. 132. Confluentes cum discretis symptomata communia habent , nisi quod hic atrociora sint omnia ; tertio die erumpit hæc species , aliquando citius , raro seriùs ; interdum verò , licet oppidò raro , ob gravius aliquod symptoma , lumbaginem doloremve lateris , &c. seriùs erumpunt , neque periculo vacant . Febris etiamnum durat , crescente morbo pustulæ non in spectabilem molem attolluntur , uti in discretis , sed sibi invicem implicitæ vultum omnem contegunt , & illum in tumorem elevant , dein ad instar pelliculæ albæ in cutis superficie conspiciuntur . Præterlapso die octavo pellicula alba quotidie exasperatur , & ad colorem fuscum vergit , eoque magis Variolæ confluerunt . *Magnitudo morbi a facie maxime æstimanda est , potius quam reliquo corpore .* In hoc genere adest in adultis salivatio , in infantibus diarrhœa ; salivationononnunquam sub primum eruptionis tempus se prodit , interdum post diem unum vel alterum ; die fere undecimo saliva viscidior facta difficulter excreatur , ægro suffocationem intentans , & circa id temporis ut plurimum cessat , & tumor faciei paulatim subsideat , & tunc ejus loco manus intumescere solent , aut debent ; diarrhœa non ita mature infantes invadit ; sub vesperam exacerbatur morbus . Variolis discretis laborantes octavo , confluentibus verò undecimo die maxime intereunt . Interdum accidit pleuritis , interdum coma , interdum maculæ purpureæ (*totidem quasi sphaceli*) pustulis interspersæ , (*mortis fere semper prænuntiæ ,*) quandoque

doque mictus sanguineus, & aliæ Hæmorrhagiæ, quæ idem ominentur, nonnunquam urinæ suppressio.

Art. 133. In confluentium genere æger (ut dixi) maxime periclitatur (a primo insultu computatione facta) die undecimo viz. in maxime vulgari confluentium genere, in crudiori adhuc 14^o, in crudissimo 17^o, rarissime 21^o. Ego Variolosum ab usu lectuli interdum semper arceo usque ad sextum diem a prima morbi invasione, quartum ab eruptione, quo tempore omne pustularum agmen in conspectu est: posthac eundem lectulo committo usque ad morbi finem.

*Regula
fere semper
observanda.*

Art. 134. „ In confluentibus (ut recte inquit „ Dolæus) periculosa plena res est alex; & medicus occasionem habet suas tentandi vires, & ostendendi, quid in arte medica calleat. „ Indicationes curativæ duæ sunt, nempe, 1^o ut æqualis tenor ebullitionis conservetur; 2^o ut pustulæ debito modo sustineantur; regimen calidius vitandum est; *gradus caloris earum expulsionem accommodatissimus naturalis omnino est*; non opus est, ut æger ante diem quartum (133.) lecto addicatur; neque ut ad propellendas Variolas ullum remedium sumat; quarto verò die, si eruptio ex votis haud succedat, exhiberi licet cardiacum aliquod blandius. Discretum genus ex sua natura plerumque omni vacat periculo. In confluentibus æger, a sudore, quantum fieri potest, prohibendus est, & ptyalismus in vigore conservandus; promovetur autem affatim bibendo cerevisiam tenuem vel liquorem alium non nimis calefacientem. Adultis propinare soleo *paregoricum cum laudan. liquid. gut. xiv. vel syr. de mecon. ʒj.* hora sexta vel septima vespertina singulis noctibus post plenam eruptionem ad morbi usque finem; temporibus autem *hypnoticum* quam pro recepto more præscribo, quoniam exacerbatio caloris quotidie sub vesperam fere

Curatio.

Nota bene.

reperitur, ex quo non modò incommodi nihil, sed magnum emolumentum, quod frequentius experientia didici. In hoc genere diarrhœa in infantibus est salutaris, & non temerè sistenda, contra in discretis. De venæsectione die octavo, & de auræ liberaliori exponendo, si quis velit, authorem consulat. p. 153. &c. Cum saliva admodum viscida evadat, uti soleo gargarismate sequente; ℞. Cort. ulmi ℥vj. rad. glycyrrhiz. ℥ss. passular. enucleat. N. xx. ros. rub. p. ij. coq. in q. s. ad font. ad ℥ss. colatura dissolv. oxymel. simpl. mel. ros. ana ℥ij. m. f. gargarisma. Interdum emeticum propinandum est. In urinæ suppressione æger è lecto debet eximi. Pustularum depressio & diarrhœa in Variolis discretis medicamenta cardiaca postulant. Febris illa, quæ die undecimo, &c. adoritur, diversa est ab ista, quæ eruptionem præcedit, nihil enim est aliud, quam Febris putrida propriè dicta hæc Febris secundaria; ad hanc autem fugandam nihil efficacius præstat, quam copiosa sanguiniseductio: non enim tunc cum Variolis res est sed Febre putrida; mittendus est itaque sanguis ad ℥x. vel xij. & anodynum bis in die propinandum; ob immensam alvi constipationem præscribere soleo elect. lenitiv. ℥i ss. in aqua lactis solut. Nihilominum anodynum statotempore continuandum est; si prima vice votis non respondeat, itereretur die proximo: atque hac ratione tam venæsectio quam catharsis per intervalla repeti possunt, prout Febris mos atque ægri inquietudo postulare videantur, donec tandem res in vado sit. Sched. mon. p. 81. &c. In Variolis confluentibus magna est virtus spiritus vitrioli a 5^{to} vel 6^{to} morbi die usque ad finem copiosè in cerevisia ten. exhibiti; commoda & incommoda hujus remedii, p. 526. &c. ubertim recensentur.

Variola anomala discreta.

Art. 135. Variolæ anomalæ: Discretæ hæc a legitimis discriminabantur, quod erumpant die 3^o, il-

3^o, illæ 4^o, postulæ minores fuerant; sæviebant tamen magis, & ante maturationem frequentius nigrescebant, ptyalismus (ut in confluentibus) aderat immediatè post eruptionem: *Confluentes* hæ ab aliis discrepabant, quod nunc die secundo, *Confluentes.* nunc tertio se primum monstrabant tumore subrubro atque uniformi, quibusdam in locis; in femoribus præcipuè, vesiculæ, ambustorum ad instar sero limpido distentæ eminebant, quod disrupta pellicula copiosè effluebat, subjecta carne nigredine & *sphacelo* quasi affecta; periculo non vacante ante diem septimum, in aliis confluentibus dies undecimus (ut plurimum) est criticus. Postremò hæ calidioris naturæ sunt & magis inflammatoriæ; ideoque temperato regimini indulgendum est. *Hydrogala* ex tertia parte aquæ & lactis unà simil coctis ægri palato & votis ut plurimum respondet, & ptyalismum feliciter promovet.

Mortoni sententia.

Art. 136. Variolarum quatuor sunt stadia, viz. *Quatuor stadia Variolarum.* apparatus, eruptio, maturatio, & delinatio, in quibus varia occurrunt symptomata, quæ diversam medendi methodum postulant.

Art. 137. Primum stadium est a morbi ipsius *Primum* insultu usque ad eruptionem generalem. In hoc stadio urina tenuis & pallida, præsertim si adsit frequens micturitio, male ominatur; urina rubicunda & contentis saturata contrarium indicat (insolitus aliqualis dolor vehemens, præsertim colicum æmulans, est pessimum signum.) Diarrhœa in hoc stadio non permittenda est, quin *Diarrhœa.* decocto albo & repetitis laudani dosibus est cohibenda, vel astringentibus sistenda. Vomitio in hoc stadio non statim supprimenda est, sed potius (nisi valdè enormis fuerit) cum repetitis haustibus liquoris possetici carduati, vel cum paucosale Vitrioli leniter promovenda est: Evacuatio-

ne autem hac levi peracta, vel si vomitio ex morbi ipsius genio modum excedat, illico tumultum spirituum compescere oportet, eorumque vires conservare alexipharmaco aliquo remedio cum opiato commixto, & post iusta intervalla repetito; sequens est formula mihi familiaris, ℞. Aq. card. lact. alexiter. cinnam. hord. menth. Stephan. ana ℥ij. sal. absynth. gr. xii. pulv. rad. serpent. virgin. e chel. cancr. comp. lapid. Contrayer. ana ℥ss. syr. caryoph. vel menth. ℥iss. m. f. julap. de quo capiat ægrotus coch. ij. iij. vel iv. quarta quaque hora, addendo singulis dosibus laudan. li- quid. guttas aliquot pro re nata. „ Sanguis (in- „ quit *Lister*) in Variolis non proprie mittitur, „ sed ex accidente tantum ut symptomati alicui „ vehementiori succurratur. „ In dolore capitis, artuum vel lumborum, item in dolore pleuritico, seu peripneumonico, ut etiam quandoque in co- lico, necessaria est *venæsectio*, ut symptomata ista averruncentur; *vesicatoria* etiam & *opiata* hic lo- cum habent; præcipue autem in affectibus coma- tosis. Ubi vigilæ in hoc stadio pertinaces fuerint, non raro in proximo stadio exanthemata conflu- unt, quorum eruptioni deliria, spasmi, cætera- que funesta symptomata superveniunt, quo no- mine hoc symptoma venæsectione & opiatis, ut ut spirituum vires inde minuantur, opportune cohibere par est, adhibitis interea vesicatoriis & alexipharmicis. „ Insolitus aliqualis dolor ve- „ hemens ante eruptionem Variolarum, privatim „ dolor colicam passionem æmulans, est pessimum „ signum, & fere semper lethale, ut plus semel „ observavi, præsertim si adfuerit etiam *mic- tu- ritio*. „

Dolores
spasmo-
dici.

Vigilia

Stadium
secun-
dum.

Art. 138. In stadio secundo exanthemata par- va instar acupunctarum primo in facie, collo, pectore, &c. erumpunt tumore renitente & ro- tundo; die secundo bases suas ampliant, & ter- tio (ultra quem hoc stadium non excurrit) in- sum-

summitatibus acuminantur; quo longius est hoc stadium, eo periculosior est eventus; in hoc stadio in benigniori saltem genere, ubi nullum adest funestum symptoma, haud par est ullo remedio naturam laceßere, utpote quæ propriis viribus instructa sine artis suppetiis satis valide suo officio fungi potis est.

Art. 139. Triduo eruptionis elapso Variolæ, *Stadium tertium*, sicut alia quævis tubercula inflammata, concoqui incipiunt, & lymphæ venenata per glandulas cutaneas naturæ lege collata acrimonia sua cuticulam a vera cute separat; unde apices exanthematum, paucarum horarum spatio, primum albescentes quadantenus intumescunt; dein lymphæ eadem pro morbi indole & naturæ viribus citius vel serius in pus mutata flavescent, aut saltem colorem cineritium vel subfuscum obtinent, ubi desinit hoc stadium. Durante maturatione Variolarum benignarum nulla exsurgit indicatio, nisi forsitan adhiberi possunt *laudani liquidi guttæ* aliquot ad dolorem leniendum, & somnum conciliandum. Inter maturandas Variolas, si tarde procedant, *℞. Lentium crasse contus. ℥j. ficuum ping. par. vj. ras. C. C. ℥ss. coq. in liquore posset. ℥ij. bibatur copiose ad libitum, & si adsit ptyalismus commode usurpatur gargarisma sequens, ℞. Lentium crasse contus. ℥j. rad. alth. ℥ss. ficuum ping. par. vj. vel vij. hord. mundat. p. j. glycyrrhiz. ras. ℥ij. coq. in q. s. aq. font. ad ℥ij. colatur. add. mel. ros. ℥ss. m. vel gargarism. Variolos. Fuller.* Vitentur acida in gargarismatis, nisi in maxima deglutiendi difficultate; deficiente salivatione, promoveatur urinæ profluvium exhibendo dosin unam vel alteram pulveris *Æthiopici*.

Art. 140. Stadium ultimum Variolarum est earum declinatio, in quo exanthemata pure maturo *Stadium ultimum*, & laudabili referta primum incrustari & scabie subflava obduci incipiunt; dein post unum vel alterum

terum diem pure concrefcente exsiccantur, & in arida tubercula ubique mutantur, quæ sensim emollita sponte evanescunt. Raro quisquam hoc morbo interimitur, nisi in declinationis stadio, scilicet in Variolis benignis; de his etenim ut plurimum hætenus locuti sumus. Declinatio cum ἀνρρηξία, & appetitu restituto optime significat. Petechiæ seu vesiculæ miliares in hoc stadio erumpentes funestum eventum denuntiant; deliria, vigiliæ, subsultus tendinum, &c. in hoc stadio pejus ominantur, quam in præcedentibus: paucissimi enim vel nulli hoc modo affecti convalescunt; scabies diu pure scatens, atque inde sæpe decidens, & renascens, meliorem sortitur eventum, quam ea, quæ derepente exarescit; Variolæ, quæ scabie fessili & adhærenti obducuntur, male præsagiunt.

*Variola
benigna.*

Art. 141. Ubi Variolæ fuerint figuræ exactissime rotundæ, discretæ, & margine admodum rubro circumcinctæ, neque petechiis, eruptionibus miliaribus, vel quavis alia nota exitiali, inter punctæ, & primo maturationis die in summitate albæ, tumore turgidæ, & die secundo circa basin auctæ, & in summitate acuminatæ, minus pelucidæ, & tertio materia in pus convertatur, eventus felix duodecimo saltem morbi die insecuturus expectandus est.

*Variolarum
malignarum
quatuor
gradus.*

*Gradus
primus.*

Art. 142. Quatuor sunt Variolarum malignarum gradus, viz. confluentes universaliter, confluentes particulariter, discretæ verum admodum parvæ & cohærentes, maxime confertim ubique erumpentes, & denique discretæ cum petechiis & eruptione miliari conjunctis. Primi gradus sunt, quando cutis universa erysipelatoso tumore (maculis nigris hic illic interspersis) cum æquali superficie quadantenus crassescit; post triduum cutis albescit, & pergamenæ speciem induit; atque hæ sunt Variolæ maxime exitiales; ægrum ultra secundum maturationis diem nunquam superstitem

tem novi. Variolæ secundi gradus magis vulga- *Secundus.*
res sunt, quando cutis faciei sola erysipelatosæ est,
& primo maturationis die pergamenæ speciem re-
fert, dum in artubus & trunco corporis exanthe-
mata fuerint fere discreta, non tamen regularia;
vix enim oculo distinguuntur ab efflorescentia
morbillosa, vix apices tollunt, sed sæpe livefcunt,
unde mortem instare certo præfagire licet. Va- *Tertius.*
riolæ malignæ tertii gradus, ubi quasi discretæ
verum admodum parvæ & cohærentes, quæ non
acuminantur, sed cute solummodo conspiciuntur,
ac si ab urticæ plaga exasperatæ, donec sub ini-
tium maturationis albescentes confluant, & spe-
ciem pergamenæ exhibeant. Rarius quenquam
hac specie affectum, nisi ope Ptyalismis diutius
protracti, ingentis urinæ profluvii, vel intume-
scentiæ artuum diuturnæ, ad decimum quartum
vel decimum quintum morbi diem superstitem
novi.

Art. 143. Gradus ultimus est, quando Variolæ *Gradus*
erumpunt quidem discretæ figura & magnitudine *ultimus.*
regulares, verum vesiculis aqueis, vulgo *the*
White-hives, petechiis, vel maculis lividis in in-
terstitiis, præsertim in collo, pectore, & artubus
distinctæ; atque hæ non minus sunt exitiales quam
confluentes.

Art. 144. In Variolis malignis Febris continua *Curatio*
mali moris post eruptionem remanet cum lingua *sympto-*
arida, pulsu debili, &c. Neque prorsus exulat, *matum.*
ut in benignis solet: materia enim morbosa, vel
propter malignitatem, vel morbi magnitudinem,
per glandulas cutaneas satis protrudi nequit, un-
de dira symptomata evenire solent; nimirum hæ-
morrhagiæ admodum periculosæ, quæ (ut pluri- *Hæmor-*
mum) (maculis purpureis & nigris eodem tem- *rhagia.*
pore in conspectum venientibus) funestissimæ
sunt, & vix aut ne vix arte cohibendæ, nisi for-
san Vitrioli fræno præpotenti (aq. styptic. reg.)
obsignari possint; nihil tamen profecimus, si non
und

*Micturiti-
tio.* una possimus vesicatoriis & alexiteriis generosissi-
mis vires spirituum pene extinctorum denno resus-
citare; venæsectio mortem accelerat. Micturiti-
licet non adeo formidabilis, pessime tamen omi-
natur; in hoc symptomate sublevando cineres bu-
fonum egregias obtinent vires (ut mihi usu com-
pertum est) dos. ℥j. cum aliis alexiteriis quarta

*Dolor
Gutturis.* vel sexta quaque hora. Dolor gutturis & deglu-
titio impedita est symptoma quandoque maxime
affligens & molestum; fauces itaque externæ ab
aeris injuriis pannis laneis mollibus duplicatis
muniri debent, quæ plus valent, quam crocea-
ta, vel alia quæcunque amuleta; & usurpentur
Salivatio gargarismata appropriata, &c. Salivatio copiosa,
& diu protensa cum insigni capitis & faciei in-
tumescentia bene significat; pyralismus vero bre-
vis & derepente suppressus, nisi profluvio urinæ,
aut intumescentia extremorum excipiatur, ma-
lum omen exhibet; salivatio diarrhœa excepta
pessime significat.

*Post Va-
riolarum
declina-
tionem
inappe-
tentia. &
calor he-
cticus.* Art. 145. Morbosi quidam affectus quandoque
post Variolas suboriri solent, inter quos inappe-
tentia primum locum vendicat, quæ frequenter
cum calore hæctico conjuncta est; quo in casu
ego multo usu doctus alexipharmaca (quod cæte-
ros professores serio moneo) ubi calor fuerit con-
tinuus jugiter ministranda duco; corticem autem
Peruvianum, ubi calor statis periodis recurrit,
cum felici successu exhibendum impero; & dein-
de postea ad alvum subducendam tuto progredior.

*Parotidis
Ales, &
Furunculi,
&c.* Parotides nonnunquam sub finem Variolarum
suboriuntur, quæ diu tanquam strumæ sine calo-
re vel rubore permanent; discutientibus non sunt
tentandæ, sed potius fotibus maturationem pro-
moventibus tractandæ sunt. Eadem via proceden-
dum est in furunculis, scabie saniosa; ulceribus
mali moris, impetigine furfuracea, &c. viz. ale-
xipharmacis & febrifugis ab evacuationibus reli-
giose abstinendo. Gangræna & caries ossium post

Variolas nullo medicamento cedunt. Tumores Gangra-
 œdematosi *frictionibus, fotibus lixivialibus & mo-* na & ca-
 re hydropicorum curandi sunt. De dolore capitis ries.
 post Variolas (*Vide Art. 279.*) Tumores
 œdema-
 tosi.

Freindii sententia.

Art. 146. Sunt nonnullæ Febres, quæ *purgan-* *purgatio-*
via commodè recipiunt, sunt etiam, quæ omni- *nis usus*
 no desiderant (sed de hac re nondum satis accura- *in Febre*
 tæ ab auctoribus traduntur regulæ) ex quibus nul- *secunda-*
 lam aliam æque *purgationi* opportunam reperio, *via.*
 ac eam, quæ Variolas confluentes, maturitate pu-
 stularum aut vigente aut jam inclinata, semper
 excipit; ea quippe Febris uti omnium maxime pu-
 trida est, & periculi plena, ita præ cæteris cura-
 tionem hanc aptius recipit. Atque hanc præ aliis
 medendi rationem in putridis hisce Febribus, quæ
 Variolis superveniunt, suadet Sydenhamus. Mihi
 quidem sæpius usu venit, ut in Variolarum statu,
 ubi pustulis exarescentibus Febris nihilo secius in-
 valuerit, ad *purgantia* confugerem, quæ ita peri-
 culo vacare, ita commodè adhiberi posse exper-
 tus sum, ut multorum vitas ab hac maxime me-
 dendi via conservatas esse haud absurde dixerim.
 „ Doctrina de usu *phlebotomiæ & catharsis* in Va-
 „ riolis confluentibus post imperfectam crisin in
 „ literis a peritissimo D. Cade ad eundem datis
 „ succincte admodum continetur; en ejusdem sum-
 „ marium.

Art. 147. In Variolis confluentibus, quamdiu *Quando*
 faciei tumor & inflammatio manet, & saliva re- *neque ve-*
 cte fluit, a *venesectione & catharsi* (pari ratione *nesectione*
 ac furunculo maturante) prorsus abstinendum esse *neque ca-*
 duco. Scilicet, ne istæ evacuationes, materiæ *tharsis*
 morbida a massa sanguinea separationem, & per *conveni-*
 pustulas, tanquam per tot phlegmonas, (cui uni- *unt.*
 co hoc tempore natura incumbit) ejectionem ob-
 turbarent. Insuper, procedente morbo, si eo tem-
 po-

pore, quo facies detumere, & ptyalismus decre-
scere incipit (quod die nono vel decimo ab eru-
ptione accidit) si his, inquam, diebus manus de-
bito modo tumeant, & nulla malæ notæ appareant
symptomata, haud omnino (me iudice) vel *phle-
botomia vel catharsis*, adhuc indicatur; sed totum
negotium recte committitur naturæ. Interim ta-
men in hoc morbi statu *enema* quotidie injicien-
dum præscribo, quo alvum facibus exonerare, &
Febris furorem coercere curo.

Quando
utraque
evacua-
tiones
sunt ne-
cessariae.

Art. 148. Attamen, facie diebus prædictis cri-
ticis detumente, quoties (quod nimis frequenter
evenit) pustulæ corporis non turgent maturo pu-
re, nec manus intumescunt; unde (nempe a ma-
teria morbida in sanguinis massa remanente eam-
que inquinante) ardens Febris nascitur; respira-
tio brevis & frequens oritur, corporis jactatio,
& obstinata (narcoticis incassum exhibitis) vigiliæ
urgent; quoties equidem diris his symptomatibus
vexatur æger, medico incumbit per *venesectionem*
& *medicamenta leniter purgantia*, sæpiusque de-
bitis intervallis repetita, humorem peccantem de-
trahere, & eo, quo possit, modo, laboranti sub-
venire. In Variolis denique confluentibus, licet
facies & manus & pustulæ corporis debito modo,
ac tempore, intumuerint, & saliva satis copiose
statuto tempore fluxerit; si tamen, Ptyalismo de-
sinente & dictis partibus jam subsidentibus, Febris
utcumque (quod in hac morbi specie ut plurimum
accidit) gravior assidue inhæreat, & symptomata,
ex hac nata (utpote anhelosa respiratio, vigiliæ,
anxietates, cum pallida & diluta urina) indefinen-
ter urgeant ægotantem; rebus sic stantibus, ne-
cesse habet medicus sanguinis quantitatem *venese-
ctione* minuere, (nimirum ut exinde pars reliqua
magis placide per vasa fluat) & materiam morbi-
dam (quæ per pustulas, jam induratas & crusta
obductas amplius transire nequit) *Catharsi* sæpius
repetita evacuare: his enim evacuationibus omis-
sis,

sis, semper evenit, ut vel memorata symptomata indies augeantur, & inter diem duodecimum & vicesimum quartum lethalia evadant; vel humor putridus in pulmonibus extravasetur, eorumque vesiculas corrumpat; unde ægrotus miseram vitam paulisper trahit, & brevi moritur tabidus.

Art. 149. Anhelosæ respirationi, crisi superveniente *phlebotomia* feciliter ac unice occurrit, quæ nisi confestim peragitur, actum erit de ægroto, neque hoc in casu pulsus humilis & angustus metueret; quippe sæpius observavi vacuato sanguine arteriam fortius vibrasse: unde constat pulsus obscuritatem non infirmitati virium, sed humoris lædæntis oneri, deberi. Venæsectio tamen mictum cruentum non modo non cohibet, sed auget, & mortem in procinctu stantem accersit: hoc tamen funestum fati impendentis prænuntium (Camphora bis in die exhibita & acidis larga manu propinatis) amovi, ægroque brevi morituro ad tempus succurri: sed ut vera fatear, ne unum quidem Variolis affectum, cui urina cruenta fluxerit, diem decimum sextum ab eruptione supervixisse notavi. De rationibus, quibus innititur hæc praxis, videatur auctor. „ Atque ita *purgationis* methodum in Febre secundaria tanquam unicam salutarem venditat D. Freind & alii apud illum nonnulli magni nominis medici: Ergo vero, qui sum tardioris ingenii, rurique dego, de hac re aliquanto dubius adhuc hæreo. Hi viri, ingenia certe artis nostræ lumina, seculique ornamenta, satis ingeniose ratiocinantur, omnesque fere summa eloquentia victos in illorum sententiam facillime descendentes inveniunt: sed sola experientia duce caute admodum progredi decet. „ In praxi mea per viginti circiter annos *clysmatum* injectionis utilitatem deprehendi; sed *cathartica* non nisi rarissime propinare ausus sum. „ Optandum erat, quod viri præfati meritissimi numerosiorem historiarum seriem tam morientium

In anhelosa respiratione phlebotomia est unicum remedium.

In mictu cruento est nociva.

„ tium

„ tium quam viventium protulissent , ut in re a-
 „ deo ancipiti æquius judicium ferre potuerimus .

Farrago sententiarum .

*Variola
 morbus
 novus .*

Art. 150. Variolas esse morbum novum satis demonstratur , quod in multis mundi partibus nunquam visæ fuerunt , ut apud *Indos occidentales* ubi nunquam apparuerunt , nisi postquam Hispani eo pervenere ; siquidem per contagionem *Æthiopis* cujusdam , illuc delati , magnam Indorum partem sustulerunt , ut testatur *R. a Fonseca* . *Helbigius* indubitanter affirmat incolas *Indiæ orientalis* Variolas nunquam tentasse ante commercium *Hollandicum* .

*Regimen
 frigidum .*

Art. 151. In Variolis *Alsaharavius* omnes in- frigidantes medicos nostri seculi multis parasangis anteivit ; maxime in primo Variolarum tempore , nempe , in sanguinis missione ad syncopen , & frigidæ immensa quantitate , & confertim exhibita , potione ; eaque sæpius repetita , paucis horis ; at quantum video , sine successu ; his enim non obstantibus , venenum intra habitum corporis resistebat .

*Sanguinis
 textura
 in Variolis
 malignis .*

Art. 152. Illud tantum (inquit *Lister*) curiosius animadverti (in Variolato cum maculis purpureis hæmorrhagia narium & mictu sanguineo) sanguinem refrigerium tenerrimum fuisse , & ejus crassamentum rubrum vel molliori pennæ pluma percussum facile dividi potuerit . In aliis autem multis , quibus urina cruenta , sanguinem e brachio missum adeo aquatum , putridumque esse vidi , ut fluctuaret crassamentum in vase , non aliter quam ipsum serum ; neque ullum servatum memini in tanta pestilentia , (76.) „ Variolæ præcedente crapula accidentes , ut etiam „ luxuriæ & intemperantiæ deditis , plerumque „ graviores sunt , & pessimi moris , & fere semper lethales . „

Art.

Art. 153. In Variolis confluentibus (inquit idem author) hunc in modum præscripsit; ʒi. Croc. ʒi. cochinel. ʒß. sacchar. tantillum; m. pro chart. viij. capiebat agra unam quarta quaque hora cum coch. i. vel ij. aq. theriacal. per triduum & postea sexta quaque hora; item diacod. ʒi. manè & vespere, & convaluit; & pro alia foemina ad eundem fere modum, ʒi. Croc. ʒß. cochinel. ʒß. sacchar. caud. ʒi. m. pro chart. vi. cepit unam tertia quaque hora.

Vires cochinel. in Variolis confluentibus.

Art. 154. Ego (inquit idem) neminem bis infectum memini, præter unam foeminam, quæ in hac urbe (Eboracensi) me teste, intra annum Variolis bis decubuit, & convaluit.

Rarissime aliquis bis inficitur.

Art. 155. Nihil observatione dignius est (inquit Ettmullerus) quam anhelitus & vox in Variolis; ubi enim prompte recteque agitur respiratio, vox facile sequitur, neque raucescit, admodum salutare signum est.

Signum salutare.

Stercus equinum in Variolis est sordidum quidem, sed egregium remedium, promouet sudorem, præservat guttur, &c. a quibusdam etiam deprædicatur Stercus ovium.

Remedia nonnulla singula.

Nec locum infimum obtinet oleum sem. lini, vel amygdalarum dulcium, ut practici quibusdam peritis satis notum est. Quodnam sit istud remedium, cui vires supereminentes Vvaldschmidius & Dolæus attribuunt, plane nescimus: optandum sane esset, quod tale medicamentum, de quo loquuntur in morbo tam exitiali, in rerum natura revera daretur. De hoc remedio hæc habet Vvaldschmidius; utimur alio quodam remedio in forma liquida, quod a primis statim diebus usque ad finem in adultis ad cochleare unum dari potest, quo ipso putato reconvalescentiam, divina adjuvante gratia, certe promitti posse, ut ut gravissima adsint symptomata; præcipue autem hoc remedium est dicatum inflammationi, quo & externe uti possumus. Et alibi; omnibus commendo liquorem contra Variolas a D. D. Dolæo & me millies ex-

„ peritum , quem & nos unà invenimus . Multo
 „ uberior est *Dolæus* in hujusce specifici laudibus ,
 „ ut & videre licet , p. 574.

Art. 156. „ Variolæ acu perforatæ tardius cu-
 „ rantur , & crûstas diutius retinent , unde cica-
 „ trices scædiores relinquuntur ; ideoque naturæ sa-
 „ tius sunt relinquendæ . „ Maculas a Variolis re-
 „ lictas (observante Barbette) præprimis delet *oleum*
 „ *myrrhæ per deliquium ex albuminibus ovorum para-*
 „ *tum* , ut & *oleum vitellorum ovorum* . „ Si quis li-
 „ nimentum velit , sequens in usu apud medicos
 „ *Londinenses* est elegans præscriptum ; *℥. Ol.*
 „ *amygd. dulc. ℥iſſ. cer. alb. sperm. cet. ana ℥j. bal-*
 „ *sam. Gileadens. ℥ſſ. f. ſ. a liniment.* „ *Ulceræ*
corrosiva. corrosiva (inquit *Bonetus*) in facie & alibi opti-
 me sanantur cum *spiritu vitrioli melle rosaceo ad*
sufficientem aciditatem permisto ; semper respon-
 dent voto medentis , etsi dimidiam genam ulcus ab-
 sumplerit .

Art. 157. Remedia in hoc morbo insigniora ,
 præter jam memorata , sunt , quæ sequuntur ; *Ker-*
mes , *gum. lacca* , *viperina* , *cinnabaris antimonii* ,
tinctura bezoardica , *tinctura corallii* , *decoctum ru-*
bicundum , *decoctum variolosum* , *gargarisma va-*
riolosum , *loboch rubrum* , *unguentum de bismuth* ,
ad foveas Bat. &c.

Inoculatio Variolarum.

Art. 158. Medicorum est morbos curare non in-
 ferre ; dices tamen medicum peritum ac probum
 humanarum infirmitatum providum morborum fu-
 turorum occasiones præscindere , vel saltem levio-
 res reddere , æque ac præsentis sanare , omni ar-
 te decere : Si hoc non concedatur , quamobrem
 venæsectionem imperamus , emetica , & catharti-
 ca adhuc sanis & vegetis prophylaxeos gratia pro-
 pinamus ?

Art. 159. Inoculatio Variolarum est nova praxis
 a *Constantinopoli* ad nos nuperis annis translata ;
 & mi-

& mirum est, quanta expectatione recepta fuit, quanta industria exulta; statim incredibiliter inclaruit: in ipsa domo regia, in multorum procerum & optimatum familiis magna ostentatione celebrata fuit; quo eventu & quali successu eandem exercentes ediderunt. Nihilominus sub tantis auspiciis & tam magnis exemplis inter gentem popularem minus increbuit; nostrorum hominum genio & cogitandi modo vix rite quadrare videtur. Quoad fas, & an cum bona conscientia fieri posse multum varieque litigatur; de certitudine & incertitudine Variolas genuinas producendi; itemque an alios etiamnum morbos, & humorum contaminationes, una cum Variolis, implantari posse vehementer ac strenue disputatur. Mihi quidem neque otium neque facultates suppetunt tantas componere lites.

Art. 160. Interim inoculationis operatio ad hunc modum facillimo negotio peragitur. Imprimis in promptu comparandum est exiguum pus (guttæ v. vel vj. puta) ab adolescente Variolis discretis decumbente, inter maturandum depromptum, quod parva phiala vel pyxide inclusum loco operationi assignato deportandum est, ubi omnibus præparatis inoculando vulnuscula duo infligenda sunt, unum in brachio, alterum in crure lateris oppositi; & pus prædictum penicillis applicandum, & ligaturis firmandum; non opus est, ut incisiones fiant profundiores quam per cutem, neque grano hordei longiores, penicilli ad finem 24. horarum removendi sunt, & ulcera emplast. Diachl. vel foliis brassicæ operienda, & in futurum semel vel bis in die pro ratione quantitatis puris ibidem scatentis detegenda & medicanda. Hoc facto morbus sensim producet, & symptomata sequentia plerumque exoriri solent.

Art. 161. Circa diem octavum post operationem erumpere solent pustulæ, iis, quæ in discretarum genere ordinario contingere solent, haud dissimiles, Symptomata supervenientia.

les, præeunte febricula, & reliquis usitatis symptomatis, sed mitioribus. Quoad loca incisa, 4^{to} die rubescunt, & inflammantur, die 6^{to} ad suppurationem vergunt, & pus ichorosum emittunt. Sub eruptione quidem pustularum invadente Febre ulcuscula paulo minus fluunt; post vero eruptionem, usque ad declinationem Variolarum, pus in dies augetur, ex quo tempore iterum sensim diminuitur; ita ut spatio quinque hebdomadarum ulcera plerumque penitus claudantur. Quanto major est evacuatio puris per ulcera hæc artificialia durante morbo, tanto mitior erit morbus. In genere observatum fuit Variolas per inoculationem inductas discretas esse, periculo ut plurimum vacantes, pustulas perpaucas, cuti foveas raro relinquentes. Subsequuntur sæpissime in variis corporis partibus tubercula & abscessus, nonnulla quidem levioris momenti, interdum vero mali moris, & difficilissimæ curationis.

*Prepara-
tio & re-
gimen.*

Art. 162. Ad corpus inoculationi præparandum multi multa loquuntur de Venaesectione, de usu emeticorum, & cathartorum, &c. Sed profecto, si inoculandus sit ætatis juvenis, boni habitus, & absolute sanus, nihil horum necessarium videtur. Sufficit temperati regiminis ad tempus ante operationem observatio. Operatione peracta inoculato solitum vivendi morem persequi concessum est, nisi quod fortassis carniū nimis liberalem indulgentiam prohibere prudentis erit. Morbo incepto idem regimen ac in Variolis discretis, modo ordinario contractis, observandum est, & si medicatione aliquali opus sit, Variolæ inoculatione inductæ eandem postulant medendi methodum.

FEBRIS PESTILENTIALIS & Pestis.

Diemerbroeckii sententia.

Art. 163. Pestis est morbus peracutissimus, perniciosissimus, & maxime contagiosus, ex maligno & occulto spiritibus calorigue nativo tota substantia infestissimo inquinamento ortus, a quo omnium viscerum, & imprimis cordis, functiones læduntur. *Pestis definitio.*

Art. 164. Pestis est diversum quid a Febre, & Febris est tantum ejus symptoma, ut multoties observavimus, ac proinde nonnulli Pestem male per Febrem definiunt, cum Febris non sit de ipsius essentia, ut infra probabitur. *Diversum quid a Febre.*

Art. 165. Inter signa Pestem præcedentia & præsagientia sequens *Noviomagi* observatum fuit, nimirum, maxima & incredibilis insectorum copia, qualis vix unquam visa fuit, ut culicum, papilionum, scarabæorum, crabronum, cicadarum, omniumque maxime muscarum, quarum utroque anno stupenda ubique copia reperiiebatur, ut ædium interiorum parietes undique muscis consiti viderentur, & foris ipse aer multis in locis quasi muscarum nubibus obfuscaretur. *Signum Pestem præsagens.*

Art. 166. De causis Pestis maxime ardua inter medicos quæstio movetur. In eo conveniunt omnes, illam excitari a cæca quadam pernicie, & inexplicabili aeris labe; sed unde labes illa emerferit, quomodo aer tantum vitium contraxerit, quid hoc elementum inquinaverit, de eodubitant, & in eo inveniêdo laborant omnes. Prima & primaria causa est *justissima summi Dei ira propter hominum peccata*; ab hac causa promanat illud τὸ Σέρον, quod pesti inesse animadvertitur, cujus etiam Hippocrates sæpe mentionem facit: & hoc omni ævo creditum fuit tam apud Gentiles, quam apud Judæos, & Christianos. *Causa.*

nos ; idem quoque sacræ literæ passim plus satis confirmant . Nos arbitramur Hippocratem per τὸ θεῶν intellexisse causam quandam morbificam , præter naturæ ordinem ac potentiam , a diis e sublimi immissam , vel in & ex aere de novo ab ipsis suscitatum , cujus essentia nec in certa elementorum mistione , nec in manifestarum qualitatum intemperie , nec in magna aliqua putredine , consistit , sed in novo quodam veneno , præternaturaliter a diis in hoc sublunari mundo suscitato .

*Quomodo
incipere
solet .*

Art. 167. Cum aer a venenoso inquinamento incipit alterari , pollui , ac ad venenositatem disponi , incipit simul etiam rebus sublunaribus valde infensus & noxius esse , interdum armentorum magnas strages edere , interdum segetes & terræ fructus corrumpere , inter genus humanum Febres malignas & Pestilentiales generare , & mox ipsam Pestem .

*Contagii
commu-
nicatio .*

Art. 168. Contagium est communicatio inquinamenti ab uno corpore in aliud , sive illa actio communicationis fiat per immediatum contactum , sive per medium ; requiritur autem apta dispositio ad hujusmodi seminarium recipiendum , alias non communicabitur . Pestilens venenum cum vestibus , aliisque rebus ad alias civitates & regiones deferri videmus . *Inexplicabilis quidem est hominum dispositio , quoad contagium recipiendum , vel non ; in aliis talis est , ut a Pestilenti veneno statim afficiantur , in aliis talis , ut difficulter ab eo lædantur , in aliis talis , ut eidem sine ulla noxa resistere possint .*

*Febris pe-
stilens un-
de .*

Art. 169. Febris Pestilens , Pestis comes , non oritur a veneno Pestilenti , sed mediante putredine , id est , non generatur propterea , quod humores a veneno Pestilenti inquinantur , sed quod cor Pestilenti veneno irretitum , obrutum , plurimumque debilitatum , inquinatos humores debito modo neque coquere , ac dilatare , neque regere , & sa-

& satis dispellere possit; qui hac de causa putrescunt, caloremque præter naturam concipiunt, sicque Febrem excitant; quæ ob dictam causam ordine posteriorem necessario est diversa ac separabilis a Peste, ejusque symptoma. Hoc ipsum confirmant dogmata & auctoritas tam veterum quam neotericorum, nec minus quotidiana praxis, & obvia exempla.

Art. 170. Multa symptomata horrenda & gravia Pestem comitantur, quorum nonnulla sunt ei magis propria, ut bubo, anthrax, & exanthemata; alia autem aliis morbis communia, quorum primaria hæc sunt, capitis dolor, phrenitis, sopor, vigiliæ, anxietas, debilitas seu magna virium prostratio, visus turbulentus, cordis palpitatio, linguæ siccitas, vomitus, singultus, lumbrici, fluxus alvi, hæmorrhagia narium, menstruorum profluvium, sanguinis mictus, sputum cruentum, dolores lateris, hepatis, renum, aliarumve partium.

*Pestis
symptomata.*

Art. 171. Bubones & carbunculi fiunt, a veneno Pestilenti, quod cor ex sese per arterias ad alias partes expellit. Bubo est tumor dolorosus earum glandularum, quæ sitæ sunt retro aures, & in collo, sub axillis, & in inguinibus. Carbunculus a pustula plerumque ortum ducit, & est partis alicujus gangræna, dum est in fieri, & sphacelus, dum est in facto; nulla vi naturæ aut artis edomari, & in pus converti potest, sed integer a vicinis partibus separatur. Carbunculi non habent certa determinata loca, in quibus exoriantur, sicut bubones, sed in quacunque corporis parte excitari possunt: modo enim conspiciuntur in thorace, vel collo; modo in abdomine, vel dorso; modo in brachiis, vel cruribus; modo in manuum pedumve digitis; modo unus aut alter, modo plures simul, vel in una vel in diversis partibus: imo sæpe etiam in partibus internis oboriuntur, ut in pulmonibus, ventriculo, renibus, &c.

Bubo.

Carbunculus.

Exanthema
mata.

Art. 172. Exanthemata Pestilentialia sunt maculae purpureae vel rubrae, vel nigrae, vel violaceae, ut plurimum rotundae, aliquando latae, oblongae aliufve formae, in summa cute efflorescentes.

Signa
prognost.

Art. 173. Acutorum morborum (inquit Hippocrates) incertae admodum ac fallaces sunt praedictiones. In Peste *Noviomagensi* observavimus sextae diei crises semper certo lethales fuisse. Quicunque circa novilunium aut plenilunium Peste corripiebantur, ii maxime de vita periclitabantur. Prostratio virium in morbi principio, animi deliquia, & cordis palpitantes plerumque lethalia signa erant; pulsus intermittens semper lethalis; sopores, sternutationes, motus tremuli, delirium, dolor in gutture, & raucedo, anhelitus foetens, male ominentur; Pleuritides semper lethales; suppressio alvi bonum signum, spem salutis exhibens; alvi fluxus contrarium, cum hoc vix centesimus aeger evadebat; sanguinis per sedes vel urinas signum lethale, ut & menstruum fluxus. Quo citius bubones prodibant, tanto meliores, si sine Febre, vel ante Febrem, prodirent, salutis magnam spem dabant, & contra; si in emunctoriis loco bubonum emergerent carbunculi, gravissimum periculum indicabatur. Si carbunculi tardius prodirent, malum, & si valde multi, pessimum; in locis carnosissimis, meliores, in nervosis, periculosiores; maculae purpureae, nigrae, virescentes, violaceae, quocunque tempore apparentes, semper lethales erant; cum rubris nonnulli evadebant, etsi paucissimi.

Prophylactica.

Art. 174. Praestantissimum & certissimum prophylacticum a Peste est fuga cum timore Domini copulata; recessus circumstantiae in sequenti versiculo continentur;

*Hac tria tabificam tollunt adverbia Pestem,
Mox, longe, tarde, cede, recede, redi.*

Diaeta.

Nullum melius Pestilentis aeris correctorium in rerum natura datur quam ignis, ut multiplex expe-

experientia comprobavit. Hippocrates famosam illam Pestem, quæ ex Æthiopia Grecos invaserat, olim per ignes edomuit, & extinxit: jussit enim per totam civitatem accendi ignes luculentos nocturnis præcipuè temporibus, ut aeris inquinamenta purgarentur. Ignis ligno juniperino vel fraxineo nutritus ad venenatas aeris corruptiones emendandas multum valere creditur. Accensio sulphuris & pulveris pyrii aerem purificat, & ejus corruptionem abigit; idem facit crematio succini, thuris, picis navalis, &c. Item suffumigium aceti cum ferro cadente vel ignitis lateribus excitatum. Quoad diætam consultum est Pestilenti constitutione temperantiam colere, quæ magnopere ad sanitatis conservationem prodest; omnis verò repentina mutatio periculosa est; quapropter a consueta victus ratione subito discedere maxime periculosum esset. Malum est vigente Peste jejuno stomacho in publicum exire. Carnes porcinae maxime damnosæ censentur. Omnia dulcia vitanda sunt. Vinum temperatè usurpatum prodest; sed ejusdem abusus est valde periculosus: Mercurialis testatur Patavii & Venetiis se vidisse bibaces plurimos extinctos esse, qui existimabant vinis generosis se propulsaturos esse Pestem. Vestes laneæ & crassiores inquinamentum contrahunt, & conservant; præferendæ sunt itaque vestes ex serico tenuiore vel satino, aliove simili. *Phlebotomiam*, quamvis a multis veteribus & neotericis medicis summe laudatam, nos tanquam valde periculosam, & damosissimam, planè rejecimus; experientia enim constabat Pestis invasionem brevi post venæsectionem iis, qui præservationis gratia adhibuerunt, insecutam esse, quapropter omnibus prohibuimus. Cauteria seu potius fonticulos plurimi insignes medici summopere commendant, & eorundem insignem utilitatem nos quoque multoties vidimus. Prophylaxeos gratia in

Venæsectio.

Fonticuli.

corporibus sanis & firmis sat erat, ut alvus servaretur libera, non fluida; in cacochymicis vero paulatim ac clementer alvum subducere necessarium duximus, & præ reliquis, cum Pil. Ruffi, utpote quæ tot sæculorum experientiis ad Pestilentem malignitatem comprobata sunt. „Ufu sulphuris communis *Hippocrates* Pestem istam famosam Græcia abegit: suffitus ejus pro aeris emendatione & pro potus medicatione perquam laudatur, uti quasvis corruptiones & alterationes, ita sanguinis putredinalem alterationem præcavet. In graviore malignitate indusium & vestimenta imprægnari possunt cum fumo sulphuris. „ *Ettmüller*.

Antidoti.

Art. 175. Quoad antidotos, inter simplicia imprimis duo commendavimus; ut primum erat *tabacum*, nempe illius fumus per tubulum seu fistulam ore attractus, & post paucam retentionem inde rursus dimissus, quemadmodum ordinariè a fumi fuctoribus sumi solet, illius usum in hac peste tam in meipso, quam in plurimis aliis, insigniter profuisse observavimus. Alterum erat *radix Helenii*, vel sicca masticata, vel in pulvere sumpta, vel saccharo condita; de antidotis aliis compositis consulatur auctor Cap. x. Pauperibus consulimus, ut quotidie manè duo vel tria cochlearia *aceti vini optimi* biberent, atque illud in hac Peste animadvertimus fuisse unum ex optimis præservativis; quamplurimis etiam spongiam cum *aceto theriacali* ebriam naribus frequenter admovendam dedimus.

*Authoris
vivendi
modus.*

Art. 176. Quod ad meipsum attinet, mirabantur quidem multi, quod ego, qui quaslibet ædes infectas indiscriminatim invisebam a tanta contagii violentia non læderer; imprimis, nec terro-ri, nec iræ, nec mœrori, locum concedebam; si fortè meipsum aliquo modo contristatum perciperem, tum tribus quatuorve vini haustibus assumptis cor exhilarabam, atque ita tristitiam fu-
ga-

gabam. In victu utebar cibis euchymis; potus mihi erat cerevisia communis, ut & vinum album tenue vel mediocre, quo interdum usque ad hilaritatem, nunquam ad ebrietatem, utebar. Mane inter horam quartam & quintam ægros invisurus nihil omnino cibi aut potus aut medicamenti assumere potui, sed *oblatis Deo precibus* solummodo aliquot grana Cardamoni minoris masticando jejunus primos ægros invisebam usque ad horam sextam: Tum vel *theriacæ* vel *diascordii* pauxillum, vel *corticem aurant. conditum*, vel ut plurimum *radicum helenii* conditarum tria quatuorve frustula comedebam; circa horam septimam vel octavam frustum panis cum butyro & caseo ovillo viridi jentabam, superbibendo haustum cerevisiæ; quandoque haustum *vini absynthitis* bibebam; circa decimam, si per otium liceret, fistulam unam *tabaci* exfugebam, & post prandium duas tresve, nec pauciores post coenam; sæpe etiam intermediis horis post meridiem duas tresve fistulas sumebam: Si autem ab ægrotorum foetore me vel tantillum alteratum sentirem, statim postpositis omnibus negotiis, qualicunque diei hora foret ad *tabaci* usu fugiebam: nam, ut verum fatear, *tabacum* pro primario præservativo semper habui, & revera tale esse, non sola ratione doctus sed experientia edoctus comperi; neque aliud melius pro ordinario usu hætenus inventum fuisse existimo; sed observatu dignum est, *quod non nisi insuetis auxiliabitur fumisuctio*; quapropter ego solo *tabaco* contentus nullis aliis suffumigiis utebar, & postea ejus usum rursus dereliqui.

Curatio.

Art. 177. Circa Pestis curationem semper plurimum hallucinati fuerunt omnes medici, dubii causarum, dubii remediorum. Causa enim morbi adhuc latet, neque ullum hætenus remedium proprium inventum est par tanto malo. In Peste actu laborantibus a *venæsectione* religiosè abstinendum est; *purgantia* quoque & *vomitiva* maxime fu-

Simpli-
cia.

fugienda sunt; alvi constipatio non est metuen-
da, etiamsi in longum protrahatur, utpote quam
nullis nocuisse animadvertimus. In ipso morbi
principio statim ad *antidota* & *sudorifera* con-
fugiendum est: hæc autem remedia *alexipharma-
ca* dicta multa sunt ac varia, quæ variis modis
miscentur, & componuntur pro morbi ipsius ge-
nio & reliquis circumstantiis, quarum decisio ex
medici iudicio dependet, neque certis regulis de-
terminari potest. Simplicia primaria sunt quæ se-
quuntur, *radix petasitidis, aristolochiæ, helenii, bi-
stort. zedoar. gentian. angel. ering. scorzoner. ser-
pent. virg. fol. scordii, rutæ, card. ben. absynth. ro-
rismarin. flores croc. calendul. sambuci, fructus ber-
ber. poma cydonia, citrea, aurant. limon. eorumq;
cortices, acetum simplex, sambucinum & calendula-
tum; aromata, mirrha, camphorâ, succinum, vipe-
ra, &c.* Compositiones sunt fere infinitæ, quamplu-
rimarum formulæ apud authorem videri possunt.
Author suspectum habet *crocum*, quoniam cere-
brum petere solet; *camphora* a quamplurimis val-
de laudatur, item *flores sulphuris*, & *sal absynthii*,
commendatur etiam *oleum vitrioli* & *oleum sulph.*
per campan.

Methodus
medendi.

Art. 178. Curationem sequenti methodo insti-
tuimus; imprimis cubicula nitida servari, & ter
quaterve de die aerem suffumigiis alterari ius-
simus, & statim ægris (morbi primo, secundo, vel
die tertio) *potiunculam sudoriferam* exhibuimus,
iisque bene stragulis contextis, sudores copiosos
per duas tres pluresve horas (habita semper vi-
rium ratione) promovimus; qui, si difficilius pro-
dissent, arenam calefactam siccam lineis faccis in-
fusam pedibus, axillis, & inguinibus apposuimus.
Si a primo sudore non levarentur ægri, post pau-
cas horas sudoriferum de novo repetendum est; si
post secundum sudorem Febris cum aliis sympto-
matibus adhuc incresceret, nec quidquam leva-
rentur ægri, pessimum erat indicium: post decem

vel

vel duodecim horas & sequentibus diebus adhuc quater vel quinquies (prout necessitas exigere videbatur) *sudorifera* reiteravimus. Intermediis autem horis varia *antidota* ad veneni violentiam extinguendam, ut & *condita corroborantia*, ac *putredini resistentia*, vel *apozemata convenientia*, aliaque quæ malignitatem a centro ad peripheriam pellebant, nec non cibos quosdam liquidos facilis digestionis, & antidotali condimentorum qualitate alteratos, exhibuimus. Symptomatum quoque morbo conjunctorum diligentem rationem habuimus, de quibus proximo loco dicemus.

Art. 179. Inter symptomata, quæ Pestem comitantur communissimum est Febris maligna pestilens, quæ ut plurimum gravis & periculosa existit. Hanc nos, durante hac constitutione, eodem fere modo, sicut ipsam Pestem, tractavimus, & *sudorifera* atque *antidota* ad illius curationem maxime profuisse observavimus dummodo abstinere-
mus a calidioribus, vel, si iisdem uti placeret, *alia frigida*, ut *acetum*, *succum citri*, &c. ad-
miseremus. Vigiliæ in Peste non magnopere metuendas esse docuit experientia; sed sopor in principio maxime damnosus & mali ominis erat; si ad somnum nimis proclives essent (quod admodum familiare erat) illos primo die a somno studiosissime prohibuimus, usque dum alexipharmaco assumpto prius bene sudassent. Ad anxietatem, virium debilitatem, & vomitum, miraculosè profuerunt remedia pauca sequentia: primum erat hæc mixtura; ℞. *Conserv. rosar. rub. ℥i℥. diascord. ℥iij. vel iv. aq. nostr. theriacal. (Art. 192.) ℥iv. succ. limon. recent. ac. cinnam. ana ℥i℥. m. stent per horam unam aut alteram; deinde per linteum colentur, colaturæ add. confect. de hyacinth. sine moscho ℥j. m. Secundum erat hoc linimentum; ℞. *Ol. nuc. moscat. express. ol. scorpion. vel laurin. theriac. androm. ana ℥j. ol. junip. ℥ss. succin. ℥j. ga-**

Curatio
Sympto-
matum
Febris.

Vigilia.

Sopor.

Anxie-
tas, vi-
rium de-
bilitas &
vomitus.

Siccitas
Lingua.

Hemor-
rhagia.

Bubo-
num cu-
ratio.

*℞. garyoph. vel cinnam. gut. iij. m. f. linimen-
tum pro scrobic. cordis, & ventriculi regio-
ne inungendis, bis terve de die superponen-
do hanc pastam ad ignem calefactam; ℥. Rad.
calam. arom. nuc. moscat. ana ℥j. garyoph. benzo-
in. ana ℥ss. fol. menth. ℥ij. pulverizatis add. mic.
panis secalin. ℥iij. vel iv. acet. rosac. q. s. f. pa-
sta.* Ad linguæ ariditatem post varias alias col-
lutiones tentatas solam *aquam simplicem* plus pro-
fuisse animadvertimus. Nihil perniciosius quam
hemorrhagia narium, & menstruorum, & sputa
cruenta; quam citissime omni arte sistendæ sunt,
aut actum erit de ægris. Illud sæpissime observa-
vimus, si alvi fluxus in principio non sisteretur,
postea plane incurabilem in omnibus fuisse.

Art. 180. Bubonum curationem per suppurationem omnino tentavimus; quamprimum igitur æ-
gri, sive in ipso morbi principio, sive in progres-
su duritiem aliquam cum dolore sentirent pone
aures, in collo, sub axillis, vel in inguinibus,
huic plerumque ad citiorem tumoris provocatio-
nem, & maligni ichoris extractionem, *vesicato-
rium* in inferiore ejusdem parte applicavimus, ita
ut *vesicatorium* ipsam duritiem attingeret, ut hoc
modo ulcere facto locus apertus teneatur, & da-
mnosi ichores melius effluant (*cucurbitulas* minus
approbamus;) secunda die ut noxia materia ad
bubones attrahi, ibique digeri, ac suppurari pos-
set, toti tumori *cataplasmata attrahentia & emol-
lientia*, ac *suppurantia* imposuimus, quibus præ-
ter alia etiam *cape*, *stercus columbinum*, *fermentum
panis acidum* & similia admista erat; nonnullis
etiam *solas capas sub cineribus aliquantum assa-
tas*, & deinde contusas, paucis *theriacæ & buty-
ri insulsi* admixto cataplasmatibus forma biduo vel
triduo imposuimus; cum autem tumorem jam sa-
tis magnum esse, atque ad maturationem tendere
videremus, tunc attrahentia amplius non addidi-
mus, sed *solis maturantibus* usi sumus, ut tumo-
res

res citius ad suppurationem perducī possent. Sæpe ab ipso principio usque ad perfectam suppurationem hoc solum emplastrum imposuimus, quod omnibus intentionibus satisfaciebat, eoque solo tumores ad integram sanationem non raro perveniebant; ℞. *Gum. balban. acet. dissolut. empl. oxycroc. diachyl. cum gummis ana ℥j. misceantur.* Notandum tamen nos quibuslibet tumoribus non imposuisse fortiora attrahentia, sed tantummodo iis, qui sub axillis, & in inguinibus oriebantur: tumoribus autem, qui prope aures vel in collo prodibant, talia non conveniebant; nam talium usu eisdem, cum maximo suffocationis periculo, imo cum multorum exitio, sæpe paucis horis enormiter accrevisse observavimus; quapropter sola emollientia, vel leviter tantum attrahentia his imponebantur; aliquando necesse fuit, cum tardius procedebant, tumores scalpello incidere, sed hoc antequam fere ad perfectam maturationem pervenissent, non est faciendum: sequenti digestivo usi sumus, ℞. *Scord. subtilissime pulv. ℥ij. vitel. unius ovi terebinth. Venet. mel. unguent. Apostolorum ana ℥ss. m.* Caveri debet ne ulcera nimis cito occluderentur. Videatur in annotationibus methodus experientissimi Pauli Barbette de curandis bubonibus per emplastrum magneticum arsenicale.

Art. 181 In carbunculis tractandis sæpe prima & secunda die imposuimus folia brassicæ rubræ oleo raparum inuncta, quod apud vulgares in frequentissimo usu erat. Postea statim, imo ut plurimum ab ipso principio, frequentem pulticulam applicuimus, qua nihil invenimus, cum quo carbunculorum separatio & curatio citius ac melius perageretur; ℞. *rad. consolid. maj. sicc. herb. scord. ana ℥ij. rad. alib. farin. sem. lini tritic. ana ℥ss. coq. in q. s. aq. font. ad pulticulam, deinde add. mel. terebinth. unguent. apostolor. ana ℥iij. pic. liquid ung. Basil. ana vij. vitel. unius ovi*
croc.

Carbuncu-
culorum
Curatio.

Exanthemata.

croc. ℥j. m. interdum etiam addebantur *theriac*, ℥ij. Apud vulgus in usu erat *pix navalis cum æquali parte picis liquidæ*, cum qua sola sæpius vidimus anthraces citissimè separatos, & dolores optimè sedatos. Quo mitius tractarentur, eo melius & citius curatos fuisse millies observavimus. Exanthemata mortis instantia præsentia erant, neque curationi tempus dabant, quam si admisissent, per *sudorifera & alexipharmaca* curari debuissent.

Sydenhami sententia.

Prognosis.

Art. 182. Acuti morbi ut plurimum Deum habent authorem; sicut chronici nos ipsos. Pestis vix Britanniam frequentius quam post annorum circiter quadraginta revolutione devastat; „ jam vero „ ex peculiari Dei clementia plusquam quinquaginta annos immunes viximus.

Pestis descriptio.

Art. 183. Pestis primo insultu rigorem & horrorem, quemadmodum & Februm intermittentium accessiones, fere perpetuum habet comitem; mox vomitus enormes, dolor circa cordis regionem, (ac si torculari premerentur) Febris ardens ægros indefinenter divexant, donec aut mors ipsa, aut benigna bubonis vel parotidis eruptio, quæ materiam morbificam foras ablegat, eos ab luctuosissimo discrimine liberet. Rarius quidem accidit, ut citra ullam Febris præsentionem ingruat, ac homines de improvviso è medio tollat, maculis purpurei præsentanei interitus nuntiis, etiam dum in foro versantur erumpentibus, quod tamen nisi in Pestis admodum funestæ exordio vix contingit; fit etiam nonnunquam, ut tumores prorumpant, nec Febre nec graviore aliquo sympto-

Aeris diathesis.

Art. 184. Aeris dispositio quantumvis λοιμός-δης Pesti excitandæ per se impar videtur; nec Pestis epidemica erit, nisi accedente idonea aeris diathesi.

Art.

Art. 185. Vel per *sanguinis missionem* vel per *Curandi*
sudores Pests expugnanda videtur; posterior me- *metho-*
 thodus sæpe funesta fuit: *venæsectio* vero larga *dis.*
 manu & repetitis vicibus celebrata, nullo tumo-
 re protuberante, nemini adhuc, (quod scimus)
 unquam funesta; rumore vero conspicuo institu-
 ta, semper damnosa, ratio in præpatulo est, nem-
 pe quoniam motui naturæ adversatur. Plures &
 gravissimi scriptores *venæsectionem* probant, præ-
 cipue Botallus, sed tam largam *venæsectionem* pau-
 cissimi admittunt. Alia est itaque methodus the-
 rapeutica, nempe, mittatur sanguis in lecto, &
 statim æger stragulis quamplurimis obruendus est,
 & caput obtegendum ad sudores ciendos ex tegu-
 mentorum pondere, & cum sudor promanare in-
 cipiet, alvi profluvium & vomitiones ultro seda-
 buntur, & tuncumat æger bolum sequentem cum
 Julap. cardiac. sexta quaque hora, sudorique in-
 dulgeat; ℞. *theriac. androm.* ℥ss. *elect. de ovo* ℥j.
pulv. gascon. gr. xij. *cochin.* gr. viij. *croc.* gr. iv.
succ. kerm. q. s. m. f. bolus; omni que arte con-
 tinuandus est sudor ad viginti quatuor horas, nec
 prius indusium mutandum est utcunque madidum;
 quod si sudatio citius abrumpatur, illico sympto-
 matum sævitia recrudesceat, & omnia in pejus ruunt.
 In sequenti luce commune *catharticum* exhibere
 soleo; atque hac medendi ratione, anno a peste
 proximo quamplurimis Febre pestilentiali corre-
 ptis sanitatem restitui, adeo ut ne unus quidem
 ex eo morbo mihi desideratus sit, postquam ean-
 dem exercere inceperam. Vinum liberalius ingur-
 gitatum, aliaque fortiora præservativa statis horis
 dietim assumpta, complures, qui alias salvi inta-
 ctique verisimiliter permansissent, in hunc affe-
 ctum conjecerunt. „ Temperantem sobriumque
 „ Socratem gravissima Pests Atheniensium non
 „ attigit; neque ullo fere ævo *eidem* *similes* at-
 „ tingit.

Vvillisi sententia.

*Pestis
causa pri-
maria.*

Art. 186. Pro castigandis hominum sceleribus Pestem primitus a Deo immissam ipsi agnoverunt ethnici; ideoque pro extirpatione ejus, precibus & piamentis, æque ac medicamentis insistebatur.

*Prophy-
laxis.*

Art. 187. Ad prophylaxin recordandum est Hippocratis præceptum; *labor, cibus, potus, somnus, Venus, omnia sint mediocriter.* Plures novi, qui (*Helmontii* verbis) vino & confidentia fortificando Archeum, nec aliis antidotis usi inter infectos sine contagii noxa versabantur.

*Methodus
D.Sayer.*

Art. 188. D. *Hen. Sayer* in praxi medicus felix, plerisque aliis hanc spartam renuentibus, peste laborantes audaciter invisebat (*Londini* anno 1640.) ut seipsum a contagio muniret, antequam domos infectas adibat, solummodo vini generosi haustum pleniorum ingerere, deinde perambulatione sua peracta, idem antidoton repetere solebat, tandem ad castrum *Vvallingfordia* occubuit cum duce quodam in eodem lecto discumbens. Illius medendi methodus sic se habuit; si, priusquam exanthemata aut bubones exterius apparerent, vocaretur, ut plurimum vomitoria exhibuit ex infusione croci metallorum cum vitriolo interdum Romano; vomitione finita, diaphoreticis statim exhibitis in sudorem conjiciendos præcepit; & deinceps intervallis quibusdam pro refectioe virium concessis, usque ad morbi declinationem diaphoresin continuandam: sin post stigmata apparentia accerferetur, vomitione posthabita tantum sudorificis insistebat.

Farrago sententiarum.

*Præserva-
tiva va-
ria.*

Art. 189. Si quis, (inquit *Bonetus*) qui cum ægris conversatur, qualicumque morbo affectis, nunquam, quamdiu intra sphæram vicinitatis talium

lium moratur, salivam deglutiatur, sed semper eandem expuat, ab omni infectione, Deo & natura juvantibus, erit immunis. „ Observatum fuit scabiosos & lue venerea laborantes peste minus tentari. Frustulum myrrhæ in ore detentum in locis contagiosis versantibus optimum præservativum censetur. Quidam medicus, sæviente peste, sibi ipsi & quibusdam aliis setaceum in utroque inguine comparavit; unde morbo intacti tuto evaserunt. „ Observarunt *Forestus*, *Diemerbroeck*, *Galli*, *Angli*, *Germani*, „ omnes *Smegmatopolas*, *Lotrices* & omnes qui ex officio sapone utebantur, immo qui saltem industria sapone elota gerebant in peste illico mori. „ *Boerhaave*.

Art. 190. Peritissimi (inquit *Piso*) nonnulli Indiarum medicalium plus præsidii in limonibus ponunt, Vires Limonum. quam in lapide Bezoar. aut theriaca contra malignos morbos, & pestilentes Febres, atque ipsa venena. Ego autem sine jactantia affirmo me ex nullo alio aliquo remedio simplici tot felices effectus in tota praxi mea observasse, quam ex limonibus.

Communis Turcarum praxis (inquit *D. Harris* in tractatu de morbis infantum p. 88.) in curanda Peste fit per succum limonum in omne jusculum liberalius instillatum, per frusta limonum saccharata ore frequenter masticata, & per potum apud nos vulgatissimum dictum Sherbett, hoc est, per ipsum regimen frigidissimum: utpote quibus alexipharmaca nostra calidissima bonis auspiciis sunt plane incognita, aut in nullo numero saltem habentur.

Art. 191. Ex regno vegetabili supereminet camphora, quæ ab omnibus practicis extollitur (inquit *Ettmullerus*) unde nobile & expertissimum oleum pestilentielle *Heinsii*, medici Veronensis, qui cum hoc mira præstitit, adeo ut ipsi post mortem Veronæ statua fuerit erecta: Compositum est ex ol. camphoræ succini & cort. citr. ana Vires Camphoræ.

p. x. quæ olea invicem bene juncta constituunt hoc mirabile remedium ; pro præservatione dos. gr. 5. vel 6. pro curatione a gr. vj. ad xv. in vehiculo idoneo expectando sudorem , *Sal vipera- rum* & *Rob. Sambuc.* laudantur.

Art. 192. In usu etiam sunt quamplurima alia remedia composita ad præcavendum & curandum gravissimum hunc morbum , ut

Aqua prophylactica.

℥. *Rad. angel. zedoar. ana* ℥j. *petasitid.* ℥ij. *fol. rut. m. iv. meliss. scabios. flor. calend. ana m. ij. nuc. jugland. immatur. concis.* ℥ij. *succ. pom. citr. (vel aurant. acid.)* ℥ij. *acet. vin. opt.* ℥xij. *digere per noctem & distilla lento igne ad siccitatem.* Optimum alexiterium habetur

Acetum Pestilentielle, Bat.

℥. *Rad. angel. zedoar. ana* ℥j. *baccul. junip.* ℥ij. *rut. m. iij. acet. opt.* ℥iij. *macera , ac cola.* Pro suffitu , & oris collutione grassante Peste

Aqua theriacalis. Diemer.

℥. *Rad. ostruthi , petasitid. angel. carlin. valerian. ana* ℥iij. *enul. campan. cort. aurant. sicc. ana* ℥iij. *herb. scord. absynth. ana* ℥ij. *card. ben.* ℥iij. *flor. ros. rub. ℥ss. stachad.* ℥iij. *bacc. junip.* ℥iij. *cardamom. min. ℥v. cinamm. ℥j. vin. Rhenan. vel Gallic. ten. ℥xxij. aq. ros. ℥ij. vase bene obturato stent in infusione dies x. deinde add. fol. rut. m. vj. tanacet. m. iv. rorismarin. pimpenel. ana m. iij. maneant simul. in infusione adhuc per octo vel decem dies , quotidie baculo commovendo , postea affunde succ. citr. ℥ij. stent adhuc per 3. 4ve dies , postea super ignem leviter ebulliant , & colentur , ac in torculari fortissime exprimantur , colatura distilletur in b. m. & servetur ad usum.*

Cataplasma Pestilentielle. Bat.

℥. *Stercor. columb. ℥iv. croc. ℥ss. Mirbridat. theriac. Lond. sem. sinap. ana* ℥j. *tereb. q. s. m.* Pro bubonibus rumpendis.

Item *Spiritus theriacalis camphoratus , tinctura be-*

bezoardica Batean. Et alia innumera apud scriptores medicos.

SUDOR ANGLICUS.

Vvillisi sententia.

Art. 193. Sudor anglicus cœpit anno 1585. circa initium mensis Augusti, duravitque usque ad finem Octobris; & quamvis Sennertus dicat, hoc malum deinceps 40. annos regioni huic familiare & perpetuum fuisse, tamen nostrates, & medici, & historici, qui tunc aut prope ea tempora vixerunt, cum perfecta & magna intervalla habuisse observabant; cumque 66. annorum spatio solummodo quater redierit, viz. anno 1506. 1517. 1528. 1551. vix unquam supra sex menses desæviisse, & nonnunquam spatio trimestri terminatum fuisse, eumque tempestatem valde humidam semper præcedaneam habuisse. At vero singulis quibus increbuit annis, maximas ubique edidit mortalium strages; ut ab unoquoque ejus regno quibusdam in locis tertia pars hominum brevi desideraretur. Tanta fuit ejus malignitas, ut quamprimum urbem aliquam invaderet, singulis diebus quingentos aut sexcentos occuparet, & ex ægris primo vix centesimus evaderet.

Morbi historia.

Art. 194. Morbi typum a Sennerto compendiose & methodice descriptum, etiam nostris authoribus consonum, hic inserere visum est. Morbo hoc correpti statim sine bubone, carbunculo, exanthematibus, languore dissolvebantur, & animo deficiebant cum summo virium languore, inquietudine καρδιαγῶν, capitis dolore, pulsu crebro, celeri, inæquali, cordisque palpitatione maxima; sudore vero difflebant perpetuo & copioso, qui non finiebatur, antequam morbus solveretur, quod intra 24. horas contingebat: nam qui sudorem non proliciebant, neque cardiacis utebantur, & qui impatientius calorem ferebant,

Morbi typus.

bant, auramque frigidam captabant, ii omnes subito intra 24. horas moriebantur. Postea ubi morbi hujus ratio innotuit, ut ægri sudores elicerent, ac cardiacis se munirent, pauciores moriebantur.

Curatio
describitur.

Art. 195. Circa curationem paulo accuratius scribit *Polydorus Vergilius*: post ægrotantium plurima experimenta & observationes, a juvantibus & lædentibus factas, ita usu venit, ut remedium unicuique promptissimum inventum sit, quod hujusmodi est. Si quis interdiu sudore corripitur, cum vestitu protinus cubatum eat; si nocte, tum quiescat, nec se a loco moveat usque ad 24. horas exactas; interim ita se stragulis oneret, quo non provocetur Sudor, sed sua sponte molliter scillet, cibi nihil capiat, si tam diu famem tolerare possit; neque plus potionis consuetæ, ac calefactæ hauriat, quam modice satis sit ad sitim extinguendam; inter hanc curationem imprimis caveat, ne manum quidem aut pedem suum refrigerandi, recreandique causa extra stragula proferat, quod facere lethale est. Addunt alii toto isto nycthemeri spatio a somno prorsus abstinendum fuisse. A sudatione hac Pestilenti recuperati postquam aliquandiu sani persistissent, quandoque in eam rursus, imo interdum vice tertia, incidebant.

Cajus apud D. Freind. Hist. Med. p. 333.
Vol. II.

Sudor Anglicus.

Art. 169. Sudor Anglicus fuit morbus temporarius, magnæ Britannię indigena. Coepit primo anno 1483º in exercitu regis *Henrici septimi* quum ad portum *Milfordiensem* appulisset; *Londini* sæviebat a 21º Septemb. ad finem Octobris. Et exinde quinque aliis vicibus in insula nostra comparuit, idque semper æstivo tempore primo in 1485º deinde in 1506º & tunc tertia vice in 1517º ubi tanto impetu æstuabat, ut in instanti quasi, tribus nempe horis, mortem inferebat; inter optimates multi, & populares plurimi moriebantur;

in

in quibusdam oppidis incolarum dimidiam partem abstulit. Tum demum in 1528°. quarto redibat, quando ægroti intra sex horas perierunt; vita ipsius regis *Henrici octavi* valde periclitabatur; plurimi inter *Aulicos* interibant, Anno sequenti, viz. 1529°. semel tantum *Belgiam & Germaniam* infestabat, apud quos multi occubuerunt. Postremo anno 1551°. *Angliam* ultimo invisit; *Westmonasterii* centum ac viginti in dies moriebantur, *Salopiæ* speciatim, ubi *Cajus* author noster commoratus est, ingenti hominum clade invaluit, & tanquam *Pestis Athenis* tremenda est ejusdem descriptio, hoc oppido per septem menses deflagavit, quo tempore mille hominum trucidavit. Maxima proprietate ab illo vocatur *Febris Pestilentialis contagiosa unius diei*.

Art. 197. Modus invasionis sic se habuit. Imprimis singularem aliquam partem affecit; sympto-

Symptomata.

Art. 198. Medici hujus novi morbi adeo exitialis aspectu terrifico perculsi primo obstupuerunt, nec quid faciendum sit bene norunt: Experientia vero a juvantibus & lædentibus petita paulo maturius docti eundem debito regimini & medicamentis obtemperare didicerunt. Indicatio curati-

Methodus medendi.

va primaria, ac præcipua fuit *sudorem liberum* *promovere & diutius sustentare* : Sudor enim quoquo-
modo imminutus, abruptus, vel suppressus mortem
accelerabat, quocirca ægroti omni opera a frigore
muniendi fuerunt, & si sudores sponte sua haud sa-
tis copiosi fluxerunt, medicamentis diaphoreticis &
sragularum plurium impositione provocandi fuerunt,
& vires cum cardiacis & vino sustentandæ. Mor-
bus hic acutissimus quindecim horis ad *agmen* ex-
surgebat, sed non ante hor. 24. res in vado fuit.
In quibusdam necesse fuit sudationem repetere, im-
mo in robustioribus quandoque ad duodecimam vi-
cem. Nonnulli, qui sudoribus haud sufficienter in-
dulserunt, in *Febres mali moris* inciderunt. Primis
quinque horis potus omnino prohibendus erat; ho-
ra 7^{ma} morbus increvit, qua delirium supervenie-
bat; somnus per totum morbi decursum sedulo ex-
cutiendus erat, & carnes non concedendæ.



C A P. I I.

Sive Fasciculus Morborum secundus.

I N F L A M M A T I O.

Inflam. Art. 199. **I**nflammatio in genere est tumor reni-
matio in tens ad tactum cum rubore, ardore,
genere. dolore urente, tensivo, pulsatili, punctorio & gra-
vativo, quibus semper accidit Febris plus minus
acuta. Tumor vel resolvitur, vel suppuratur, vel
in scirrhum abit, vel gangrænescit, & mortem
infert.

A N G I N A.

Cælii Aureliani sententia.

Art. 200. Inflammatio faucium, *Synanche* dicta, est difficultas transvorandi (cum suffocationis periculo) ob vehementiam tumoris faucium; in morbo nascenti adest querela sine ratione, atque difficilis motus colli & gutturis, item saliva plurima, & subdolens faucium sensus cum asperitate sensibili, difficultas deglutitionis salivæ, tum spirationis, velut impedimentum tanquam obstantis crassioris humoris; crescente malo partes affectæ rubent & tument, uti tonsillæ, & summitas gutturis fere ad suffocationem; dehinc intumescit collum atque vultus; humores evadunt crassiores, oculi prominentes, sanguinolenti; demum lingua ultra dentes ad exteriora prolabitur, siccescunt fauces, gelidus torpor articulos invadit; pulsus est celer & densus, locutio cum fummo dolore, neque articulata, postremo amputata, livor vultus, recursus poti liquoris (per nares) gutturis atque pectoris stridor, & quibusdam quasi *sonitus caninus*, pulsus defectio, quibusdam oris spumatio, mors.

Art. 201. Lanis mundis ac mollibus, & non infectis, dulci atque calido oleo infusis protegendum est collum cum thorace; adhibenda est phlebotomia intra diatriton. Aqua calida pro potu ordinario præbenda est.

Boerhaavii sententia.

Art. 202. Angina duplex est: Species prima sine ullo tumoris externi internive signo, altera cum tumore aliquo; prior in fine morborum diuturnorum, maxime post ingentes & repetitas evacuationes, contingit; pallorem faucium & siccitatem, & tenuitatem, comites habet; quare nervos & musculos resolutos plerumque habet; fere

*Angina
descri-
ptio.*

Curatio?

*Angina
sine tu-
more fere
semper le-
thalis.*

semper est signum imminentis mortis . „ Anginae gravissimæ sunt (*inquit Hippocrates prognost.*) & celerrime interimunt , quæ neq; in faucibus , neque in cervice quicquam conspicuum faciunt , plurimum vero doloris & orthopnæe inducunt . Remedia vasa vacua bono succo vitali replentia , calefacientia , & corroborantia indicantur ; sed raro curatur . Quandoque etiam oritur subito sine signis manifestis prægressis ullius morbi ; vix capit medelam ; & fere semper post mortem suppuratum pulmonem demonstrat .

Angina cum tumore. Art. 203. Angina cum tumore accidens varias occupat partes , uti linguam , ejusque musculos , palatum , tonsillas , uvulam , pharyngem , laryngemque earumque musculos , ossis hyoidis musculos , fistulam pulmonalem , oesophagum ejusque musculum , &c. quo plures harum partium inflammantur , eo sævior est morbus & periculosior : decurrit enim consuetum inflammationis generalis iter , eademque facit ac patitur mutationes in resolutionem , pus , gangranam , scirrhum .

Indicationes curative. Art. 204. In specie hac inflammatoria omni arte tentanda est resolutio ; 1.° Venesectione larga , & , si opus fuerit , aliquoties repetita . 2.° Purgantibus ore haustis , vel clysmatibus . 3.° Victu potuque tenuissimo . 4.° Nitrosis subacidisque medicamentis . 5.° Vapore tepido assidue hausto ; 2℥. Acet. sambuc. rosar. calendul. ana ℥j. aq. stillat. sambuc. ℥vj. misce . Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces . Fomentis , epithematis , epispasticis , &c. his successu carentibus , denuntiata prius acerba prognosi , celebranda erit bronchotomia , de qua operatione consulatur auctor , ut etiam de Angina œdematosa , catarrhosa , scirrosa , suppuratoria , gangrenosa , singulatim .

Laryngotomia .

Art. 105. „ In illa Anginae specie , quæ Cynanche appellatur , agro suffocanti Laryngotomia restitui potest . Morbus ipse periculosior est , quam hæc operatio , quæ hoc tempore magis

„ ad

„ ad praxin esset revocanda . Circumspectione
 „ nihilominus hic summa opus est, ne, si aliæ
 „ quoque partes pulmo scilicet, pleura, gula,
 „ &c. inflammatae, aut jam pure repletæ, irri-
 „ tus sit labor, & calumniandi anslam præbeat.
 „ Omnibus igitur bene consideratis operatio hoc
 „ modo est aggredienda: reclinetur aliquantum
 „ caput, quo in conspectu magis prodeat trachea,
 „ annulique ejus cartilaginei a se invicem magis
 „ recedant. Incidatur deinde cutis secundum lon-
 „ gitudinem laryngis usque ad foveam. Hæc u-
 „ trinque ministri digitis deducatur, quo oculis
 „ chirurgi occurrant muscoli duo longi sterno-
 „ hyoidei, cultro ligneo vel osseo a se invicem
 „ parum removendi, mox, larynge sese exhiben-
 „ te, sectio in ea fiat ope phlebotomi, loco in-
 „ ter anulum cartilagineum tertium & quar-
 „ tum medio, sedulo cavendo ne cartilagines
 „ ipsæ lædantur. Flatu prodeunte cultellum au-
 „ fer, vulnerique fistulam argenteam infigito,
 „ bene prospiciendo, ne, longior justo, posti-
 „ cam tracheæ partem attingat, unde tussis
 „ continua. Suffocationis periculo cessante, quod
 „ die tertio aut quarto plerumque contingit,
 „ vel saltem contingere oportet, fistula ablata
 „ vulnus ordinario modo secundum artem cure-
 „ tur, nam ab aliis non differt. Chirurg. Bar-
 „ bet. p. 498.

Ettmulleri sententia.

Art. 206. Angina est faucium & colli inflam-
 matio; dividitur in *synanchen*, quando interni
 faucium seu pharyngis muscoli inflammantur;
parasyanchen, quando dicti externi afficiuntur;
 in *synanchen*, quando internæ laryngis partes sunt
 inflammatae; *parasyanchen*, quando dictæ exter-
 næ patiuntur. In *synanche* pulmones quoque sæ-
 pius afficiuntur, unde insignis respirandi difficul-
 tas,

*Angina
divisio.*

*Tonsilla-
rum In-
flamma-
tio.*

tas, tanquam in *peripneumonia*, adeo ut ægri ca-
num more ore hianti respirent. Tonsillarum in-
flammatiō ex lymphæ vitio Febrem habet conjun-
ctam, sed magis lentam, & omnia symptomata
sunt remissiora, quam in *Angina*; fauces rubent,
& tonsillæ tumidæ insigniter prominent. Periculo-
sus est Anginæ in *Pleuritidem* transitus. Angino-
sis spuma circa os apparens est lethale signum.

Curatio.

Art. 207. In cura omnia ea conveniunt, quæ
pleuritide in usu esse solent, speciatim animalium
stercora, ut equinum, caninum, &c. morbum in
prima herba detruncant; externe conducit cata-
plasma ex *nido hirund.* ℞. *nid. hirund.* N. j. cep:
sub cineribus assat. N. iiij. flor. sambuc. p. ij. coq:
in lact. & trajice per cribr. deinde add. alb. grac.
℥ss. ol. cham. stillat. ℥ss. lilior. alb. q. s. m. *Vena-*
sectio aliquoties repeti debet pro ratione circum-
stantiarum; omittenda est tamen in *angina mali-*
gna in qua *sudorifera* & *specificæ* sunt usurpanda,
& ipse medicus caveat sibi ab halitu ægrotantium;
Convenit vomitorium in principio anginæ mali-
gnæ, modo mature administretur. Purgantia lo-
cum non habent in angina, sed enemata & vesti-
catoria: Inter gargarismata *urina propria* valde
commendatur, item succus sedi majoris cum spi-
ritu vini & sal. armoniac. & stercore canino. Præ
reliquis convenit gargarisma ex decocto raparum
cum paucis sal. armoniac. Ad rumpendum abscessum
convenit gargarisma ex sem. sinap. in hydromel.
coct.

*Angina
notha Cu-
ratio.*

Art. 208. In angina notha, alias alba dicta,
non opus est *venæsectione* nisi in plethoricis; con-
ducunt potius in principio *sudorifera*, & post hæc
purgantia leniora cum externis *resolventibus*, gar-
garisma ex decoct. origani. rad. pyrethri, sem. st-
nap. cum aceto, &c. & postea succ. sempervivæ
cum syr. e moris.

Farrago sententiarum.

Art. 209. Angina temperamento sanguineo præditos, & rufos, præ reliquis, invadit; *venæsectio* copiosa in brachio celebranda est, mox in ranula; deinde tangantur partes inflammatae melle rosaceo spiritu sulph. ad summum acorem permisto, & vesicatorium nuchæ admoveatur. Si morbus sit diuturnior, *venæsectio* repeti debet & enemata injici, item catharticum propinari, &c. Sydenham.

Art. 210. ℥. Ol. amygd. dulc. flor. sulph. ana ℥j. chrystal. tartar. sacchar. cand. ana ℥ij. ol. n. m. g. iv. syr. de alth. ℥iij. m. f. linctus. Atque hunc præ aliis omnibus laudat Dr. Harris in observ. morb. grav. Ad salivam copiosissime educendam nihil pulv. sequent. (inquit author) præstantius efficaciusve novi. ℥. chrystal. mineral. sacchar. chrystal. ana p. æ. misce; teneatur in ore ℥j. donec saliva abundaverit, tunc expuatur; horæ post quadrantem vel dimidium repetatur; mirum quantum hinc salivæ, &c. Musgrave. Succus corticis viridis nucum cum melle depuratus commendatur a Galeno.

Art. 211. „ Venæsectionem in ranula omnes „ fere extollunt, quidam in vena jugulari; phlebotomia vero in pede alterutris præferri debet „ ob majorem revulsionem. Angina nulla tuta „ est, quanto minus tumoris, tanto magis periculi; securissima est, si rubor maxime foras „ vertatur. Interne antepleuritica fere omnia „ sunt, privatim oleum lini nunquam satis laudandum. Externe gargarisma anginosum, gargarisma ad pituitam, cataplasma anginosum, vapor ad anginam, &c. Fulleri. Item gargarisma frequens in angina notha. ℥. auric. judaic. 3℥. rad. pyrethr. ℥ij. herb. hyssop. p. ij. ficuum ping. scis. N. iv. coq. in aq. font. q. s. ad ℥j. sub finem addendo mellis ℥iv.

Remedia
ad salivam
mox
vendam.

Remedia
paria.

94 *Pleuritis & Peripneumonia, &c. CAP. II.*
℥iv. colatur add. pulv. subtilissi. alb. græc. ℥ij. sp.
vin. rectificat. ℥ij. sp. cochlear. ℥ß. misce.

PLEURITIS & PERIPNEUMONIA vera & notha.

Sydenhami sententia.

*Pleuritis de-
scriptio.* *Art. 212.* Temperamento sanguineo præditos præ reliquis Pleuritis aggreditur cum rigore, horrore, deinde calore, siti, &c. Elapsis paucis horis (licet aliquando multo serius) æger vehementi dolore punctorio in latere circa costas corripitur; qui nunc versus omoplatas, nunc versus spinam, nunc ex adverso versus anteriora pectoris se propagat; tussi etiam crebra affligitur: in initio materia pauca & tenuis ejicitur sanguineis intermixta particulis, postea copiosior & magis concocta sanguine etiam permixta; aliquando ad expectorationem copiosiore non provenit; febris pari passu incedit cum tussi, sputo sanguinis, dolore; & pro ratione liberioris expectorationis sensim imminuitur; alvus nunc nimis astricta, nunc soluta.

*Medendi
methodus* *Art. 213.* Est ubi *Venesectione* omissa æger ne tussire quidem valeat, sed immani dyspnœa laborans suffocatur; interdum ad apostema res redit, quod *empyema* dicitur; per accidens (viz. ex usu medicamentorum calidorum) aliis febribus Pleuritis interdum supervenit ex præcipitatione materiæ febrilis in Pleuram. *Venesectio* repetenda est ad 3^{am} 4^{amve} vicem, si sit indicatio; in adultis vix sanatur minori quam 40. circiter unciarum sanguinis impensa. Æger e lecto quotidie eximatur ad horas aliquot, prout vires suaserint, quod multum confert ad curationem.

*Peripneumoniae nothæ des-
criptio.* *Art. 214.* Peripneumoniam notham insultu primo nunc incalescit nunc friget æger, ex motu quolibet vertiginosus est, rubent & inflammantur genæ oculique, tussis, & inter tussendum admodum do-

CAP. II. *Pleuritis & Peripneumonia.* 95

doler caput, ad vomitum proclivis est, urina turbida est, & intense rubet, sanguis pleuritico-
similis; adest anhelatio, & dolor totius thoracis,
& pulmonum coarctatio. Ab *asthmate sicco* plane
distinguitur, quod in isto nusquam comparent fe-
bris indicia, in hac manifesto se produnt, licet
minora longe & magis obscura, quam in *Perip-
neumonia vera*.

Art. 215. Curatio venesectione, remediis pecto- Cura :
ralibus & dieta refrigerante perficitur. „ *Mistu-*
„ *ra expectorans Fulleri, vel syr. e Peto Batean.*
„ hic quandoque locum habere potest.

Cælii Aureliani sententia.

Art. 216. Peripneumoniam (uti plerisque alios *Peripneu-*
morbos) optime descripsit *Cælius Aurelianus* . *monia ve-*
Adest, inquit, febris acuta, gravedo thoracis, & *ra descri-*
sensus laborantium quadam difficultate laterum at- *ptio.*
que mediarum mammarum, decubitus supinus at-
que paulo erectior, supra latus jacendi difficultas,
vultus rubor tanquam florens, oculorum splendor;
sequitur anhelitus celeritas, tussicula sanguinolenta
ac biliosa vel fumosa jactans sputa, pleuritico-
rum fulviora vel spumosiora, spiratio difficilis, de-
siderium frigidi atque plurimi aeris haustu rapien-
di, frigidi potus appetitio, os siccum, lingua as-
pera, ac primum subalbida, dehinc rubra, pulsus
vehemens & celer, anxietas, jactatio, vigiliæ ju-
ges, ingemens atque turbulentus somnus; aucto
morbo spiritus difficillime trahitur cum sibilatu;
sequitur colli ac vultus inflatio, oculorum immo-
bilitas, visus nubilosus, mentis alienatio, articu-
lorum frigidus torpor cum livore, lingua crassior,
sudor superiorum partium, pulsus latens aut for-
micans; postremo pectoris resonans stridor. (En
accurata morbi descriptio, *erubescant moderni.*)
„ In *Peripneumonia* hæc adsunt (inquit *Hippo-*
„ *crates de humoribus*) febris vehemens, crebra
„ &

Hippo-
cratis de-
scriptio
Peripneu-
monia.

Curatio.

„ & calida respiratio, anxietudo, virium prostratio & corporis jactatio doloresque ad omopla-
 „ tam, claviculam & mammas, pondusque in pe-
 „ ctore, atque delirium.

Art. 217. Adhibenda est *phlebotomia*; potui or-
 dinario danda est *aqua calida*, item cibus forbi-
 lis & tenuis; conducunt eclegmata ex *lini semi-*
no, *fenugr. nucelis* & *melle decoct.* & *avorum*
vitellis confect.

Boerhaavii sententia.

Differen-
 tia inter
 veram &
 spuriam
 Pleuri-
 tim.

Art. 218. Pleuritis aggreditur nullam non par-
 tem integumentorum interni thoracis, pleuræ,
 scilicet vel mediastini; ideoque dolor punctorius
 in quamlibet partem thoracis incidere potest, sed
 frequentius latera obsidere solet, atque hoc febre
 conjuncta *veram* efficit *pleuritim*; si vero altius
 intercostales muscoli & his superiora laborant, *spu-*
ria appellatur.

Pleuriti-
 dis vera
 Curatio.

Art. 219. In Pleuritide vera sanguis mitti debet
 copiose quam mature per magnum vulnus, repe-
 tique debet pro ratione symptomatum urgentium;
 crusta alba absens *sanguinem mittendi finem* defi-
 nit. Externe conveniunt *fotus*, *linimenta*, &c.
 Interne *diluentia*, *resolventia*, *refrigerantia*, do-
 lorem *lenientia*; omnia calide & magna copia
 sorbenda sunt. Interdum locus inflammatus ad *sup-*
urationem vergit, quod scitur ex pertinacia do-
 loris, febris, &c. ultra quartum diem; *absces-*
sum jam fieri cognoscitur ex horrore sæpe recur-
 rente, remissione doloris, anhelatione, decubitu
 in unum tantum (i. e. in affectum) latus to-
 lerabili. Rupto abscessu pus stillat incava pecto-
 ris, & incrementum capit ex ulcere depluente,
 unde *Empyema*, de quo postea. Interdum vero
 locus affectus evadit *scirrhus* cum pulmonis &
 pleuræ adhæsiōe, unde *asthma* & *tussicula sicca*,
 malum immedicabile, nisi quod forsan aliquid le-

vaminis a labore & equitatione multa possit recipere. Interdum loca inflammata *gangrænescunt*, unde mors cita subsequitur; *gangrænam* inceptam esse scitur ex delirio, livido thoracis colore, sputo subbilioso, doloris sine ratione remissione, &c.

Art. 220. Peripneumonia est inflammatio pulmonis totius vel unius lobi; prior immedicabilis merito censetur ob magnitudinem morbi, altera *Peripneumonia typus & cura.* medelam quandoque admittit; eodem modo ac *ra.* iisdem remediis tractanda est ac *Pleuritis*, eundemque ut plurimum habet eventum. Si non resolvatur, *abscessum vomicamve* format intra quatuordecim dies, quod fieri ostenditur ex horripilationibus, doloris remissione, pulsus debilitate, manentibus adhuc dyspnœa, siti, febricula vespertina, &c. Exinde sequitur interdum suffocatio ex subita eruptione puris in asperam arteriam; interdum evacuatur ingenti sputo purulento; vel in thoracis cavitatem delabitur, unde *empyema*, *phthisis*, &c. postremo materies purulenta interdum intra pulmonales venulas resorbetur, & cruori miscetur, & in loca quædam alia deponitur, in hepar, lienem, cerebrum, &c. hinc fiunt *abscessus peripneumonici* ad aures, crura, vel hypochondria, ubi si cito evanescant, redeunte peripneumonia, casus est lethalis.

Art. 221. Peripneumonia notha oriri solet ex pituita lenta in toto sanguine nata, & sensim pulmones inficiente, donec in hunc morbum eat; *Peripneumonia notha typus.* senes, pituitosi, frigidi, catarrhosi, & gravedine laborantes huic morbo sunt obnoxiores: primo fallaci lenitate opprimit inopinantes, quippe levi fatigatione, debilitate, prostrato fere omni animi motu, anhelitu, oppressione pectoris incipiens; adeo leves motus excitat, ut vix calor, febrisve indicia moneant periculi: mox vagæ horripilationes, leviuscule febris insultus adsunt; unde subito crescente anhelitu, & debilitate, mors;

cujus in urina & pulsu vix ullum adfuit præ-
sagium.

Curatio. Art. 222. Curatur sanguinis missione, clysmati-
bus, victu tenui, diluentibus, abstergentibus, &
lenissime aperientibus assiduo propinatis. „ Brevi-
„ ter & rapim hæc pauca decerpsi, sed de his af-
„ fectibus præ omnibus quocunque scriptoribus
„ consulendus est auctor præclarissimus, & ad il-
„ lius mentem consequendam unice incumbendum
„ est, & summa impendenda est opera.

Ettmulleri sententia.

Pleuritis. Art. 223. Observatum semper fuit in *Pleuritide*
correptis, quod non solum Pleura, sed pulmonis
medietas simul in isto latere inflammata fuerit.
Interdum quoque cum pulmone inflammatur me-
diastinum, duplicatura nempe Pleuræ sub sterno,
quæ nomine caret.

*Pleuritis
notha.* Art. 224. Pleuritis notha est dolor lateris pun-
ctorius, sed sine febre aut tussi; ægri ut plurimum
in latus oppositum potius quam morbosum decum-
bere, queunt; contrarium observatur in *Pleuriti-
de vera*.

Prognosis. Art. 225. Si statim intra triduum sputum cru-
entum appareat brevem morbum indicat, sin ve-
ro serius longum. (ex Hippocrate) *Pleuritici* in-
tra 14. dies superne non repurgati *Empyeci* fiunt
(inquit Hippocrates) & tales, si in 40. diebus re-
purgentur a die ruptionis, liberantur, alioquin in
tabem incidunt; in his affectibus sputorum potius
habenda est ratio quam urinæ; Pleuritis in Prin-
cipio leviter apparens & usque ad 5^{um} diem sic
procedens, 6^{to} vero die exarcebata plerumque est
lethalis.

Curatio. Art. 226. In *Pleuritide benigna venæsectio* si
non juvet, non noceat, in *maligna* tamen vix
locum habet, sed semper erit nociva. Ex omni-
bus auxiliis *sudorifera* primarium obtinent locum,
& præ

& præ reliquis *antimonium diaphoret.* „ Antimo-
 „ nium diaphoreticum summe commendatur in
 „ Pleuritide tum vera tum spuria: egregie discu-
 „ tit humores congestos, acorem absorbet, do-
 „ lores demulcet, expectationem promovet, in-
 „ dicationibus fere omnibus satisfacit. *Vvedelius.*
 „ Antimonium diaphoreticum aeri aliquandiu
 „ expositum vim emeticam acquirere nemo non
 „ novit, ideoque usus tempore lavari jubeo. „
 „ Nobilissimum pectorale habemus in *liquiritia* &
passulis; saccharata non conveniunt; *papaver*
Rhæac ejusque flores, seu optimum specificum,
 in toto morbi decursu locum habent; omnia ca-
 lide sunt bibenda; *succus taraxaci* seu *dentis leo-*
nis vel *decoctum* ejus, ut & *eryngii*, laudantur,
 item *chærefol.* *Succus raphani* recens express. ex-
 pectorationem mirabiliter promovet. Ad dolo-
 rem lateris externe commendatur *stercus gallin.*
cum ol. cham. „ ut & sequens cataplasma, ℞.
 „ alb. porri in sartagine cum q. s. ol. cham. frixi
 „ ℥ij. surfur. frument. m. j. facum vin. alb. ℥iij.
 „ vel q. s. m. convenit etiam infus. seq. intus
 „ sumptum; ℞. Stercor. equi non castrat. ℥vj.
 „ vin. alb. ℔ij. aq. flor. spin. alb. ℔ss. infund.
 „ clausæ & calide per hor. dimid. deinde coletur
 „ cum expressione forti, colatura cum alb. ovor. s.
 „ a. clarificetur, & add. aq. theriacal. stillat. ℥iv.
 „ syr. balsam. ℥iij. m.

Baglivii sententia.

Art. 227. Durities pulsus est signum fere infalli-
 bile omnium Pleuritidum, quamvis reliqua signa
 non adsint; durus enim pulsus omnium inflamma-
 tionum partes nerveas vel membraneas obsidentium
 est comes indivulsus. „ Pleuritis vera (inquit
 „ Chelneau) cognoscenda est imprimis a pulsu du-
 „ ro. Nonnulli affirmant pulsum esse ferratilem,
 „ sed ingenue fateor me nunquam ferratilitatem il-

Signum
 pathogno-
 monicum
 Pleuriti-
 dis.

Pleuriti-
des ocul-
ta.

„ lam deprehendere potuisse; ideoque parvi pendo
„ tanquam rem fictitiam & imaginariam, conten-
„ tus duritie pulsus, quæ sufficit ad Pleuritidem
„ dignoscendam. „ Pleuritides frequenter sunt oc-
cultæ, quia indolentes, unde quandoque errorer
in praxi; fac itaque ægrum in dextrum vel sinistrum
latus decumbere, decumbenti impera, ut fortites
respiret & tussiat, & tunc pete ab illo, an dolorem
aut gravedinem perferat, quod si affirmet, res
manifesta est; hoc modo plures *Pleuritides* detexi-
mus magno ægrotantium commodo.

Prognosis.

Art. 228. Omnis prognosis a bona vel mala re-
spiratione maxime petenda est. Perperam agitur
cum *Pleuriticis*, qui nihil expuunt, nisi copiose ef-
fluant urinæ. Omnes *Pleuriticos* sanatos vidimus,
quibus in interiora auris dolor & exinde suppuratio
supervenerunt. Crusta alba non apparens in su-
perficie missi sanguinis est pessimum signum. *Pleu-
ritides recidivantes* omnes fere sunt lethales (ex
Hippocrate.)

Regula
de vena-
sectione,
&c.

Art. 229. Quando in Pleuritide viget indicatio
dissolvendi, *camphora* præ reliquis opus absolvit,
(præsertim in *Pleuritide epidemica & maligna*.)
Si sputum antea suppressum superveniat, & sit
flavorubescens nunquam imperato *venasectionem*;
nam post *venasectionem* sputum denuo supprime-
tur, & æger morietur. Quocunque die, secundo
scilicet, aut 4^{to} 5^{to} 7^{mo} &c. ante vel post missio-
nem sanguinis spirandi difficultas, & difficultas
pariter excreandi sputi pleuritico superveniant;
statim duo *vesicantia* tibiis admovenda sunt, jux-
ta illud *Hippocratis*; in *pulmonicis quicunque tu-
mores sunt ad crura optimi sunt*, &c. Post appo-
sita *vesicantia* observavi expectorationem statim
promoveri, spirandi difficultatem imminui, &
alvi fluxum, si adesset, feliciter sisti, & ægrum
sanari.

Vvillisi sententia.

Art. 230. Opinari ducor *Peripneumoniam*, & *Pleuritidem* affectus esse modo singulares & separatos, modo connatos & primitus coexistentes, & modo invicem successivos aut succedaneos esse. *Peripneumonia* non tantum *Pleuritidi*, sed frequenter etiam *anginae*, & aliis interdum affectibus succedit.

*Horum
affectuum
complica-
tio.*

Art. 231. De *Pleuritico* expectatur, vel ut morbus statim solvatur, partim crebra & libera *venesectione*, & partim *sudore critico* die 4^{to}, vel 8^{vo} exorto, vel ut, his non rite succedentibus, diutius protrahatur; & tunc sæpissime huic morbo *Peripneumonia* aut *Empyema* vel utrique affectus superveniunt, periculi pleni, qui ægrum e medio ut plurimum tollunt, aut in *phthisin* ægre sanabilem aut exitialem præcipitant.

*Pleuriti-
dis even-
tus.*

Art. 232. *Riverius* & *Zacutus Lusitanus* exempla notabilia adducunt curationis *Pleuritidis* per *cucurbitas* cum scarificatione loco dolenti adhibitas. Pro usu externo in linimentis utiliter addatur *album græcum*.

Cucurbita.

Farrago sententiarum.

Art. 233. Densa & exercitationi assueta corpora (inquit *Hippocrates in coac.*) citius ex *Pleuritide* & *Peripneumonia* intereunt, quam quæ sine exercitatione degunt. *Pleuritides siccae* (inquit idem) & in quibus nihil spuitur, gravissimæ; metuendæ quoque in quibus dolores ad superiora tendunt. A *Pleuritide Peripneumonia* malum; a *Peripneumonia Phrenitis* malum. *Hippocr. aphor.* sanguis missus est remedium magni & recentis doloris; at si levior, si vetustior casus est, vel supervacuum vel ferum id auxilium est, confugiendumque est ad *cucurbitulas* cum scarificatione: *Celsus*.

*Ad pro-
gnosin
pertinen-
tia.*

Polypi. Art. 234. Pleuritides, ultra acutam febrem, sunt *polypose concretiones* in pulmonibus, ut ex cadaveribus, & extracto sanguine patet. *Malpighius.*

Polypi. Art. 235. Adverti debet *Pleuram* Pleuriticorum & *Pulmonem* Peripneumonicorum post mortem fetorum semper exhibuisse spectandam magnam copiam *polyperum*: Polypus autem est sanguis diutius stagnans dilapsa parte rubra, & raro pleura sola absque pulmone inflammatur.

Linimentum. Art. 236. Dolorem externe optime leniunt linimenta ex *ol. amygd. dulc. sp. sal. armoniac. & camphora.* *Pitcar.* in MSS. ,, Item linimentum ,, seq. *anodyn. ʒi. balsam. Locatell. ʒi. ol. amygd. dulc. ʒj. ol. mac. per express. ung. e flor. aurant. ana ʒij. m. f. liniment.*

Prognosticon singulare. Art. 237. Quibus plurimus ex sputo strepitus in pectore sonat, & vultus demissus est, oculisque aurigine suffusus, & caligine obductus, in his mors expectanda est, ex *Hippocrate*, & authoris experientia. Vix datur præstantius remedium in fine morbi, quam syrupus vel decoctum *nicotianæ.* *Barbette.*

Cineres pro usu externo. Art. 238. *Lucius* monitu *Æsculapii* a Pleuritide curatus fuit applicatione epithematis ex cineribus ab ara desumptis & vino commistis. *Le Clerc.*

Remedia varia. Art. 239. Vires & usus remediorum sequentium artis *Apollinæ* gnaris satis innotescunt. *Aq. omnium florum, balsam. sulph. anisatum, ens veneris, decoctum coccineum, decoctum pleuriticum, emplastr. pleuriticum, fons lateralis, haustus pleuriticus, loboch. pleuritic. loboch. viride, oxymel asthmaticum, pulvis pleuriticus, sacculus lateralis, unguentum pleurit.*

E M P Y E M A.

Boerhaavii sententia.

Art. 240. Empyema est collectio puris in thora- *Empyema*
quid.
cis cavo, ut plurimum ex rupto Pleuritico vel peri-
pneumonico *abscessu*; cognoscitur a tempore inceptæ
inflammationis x. dierum sine purgatione, a tussi
sicca, gravitate ad diaphragma, decubitu in unum
latus, strepitu puris ad motus, Febre lenta, genis
rubentibus, oculis cavis, digitis in extremitate ca-
lidis, unguibus recurvis, & abdominis tumore.

Art. 241. Ad curationem quod attinet, cognita *Curat.*
vomicæ pulmonis, pleuræ, diaphragmatis, me-
diastini, vel pericardii disruptione, omni ope ni-
tendum, ut *pus* evacuetur per os, vel per urinas,
si natura has monstraverit vias, vel denique per
thoracis aperturam ope instrumenti idonei in late-
re affecto, inter costam 4 & 5, vel 5 & 6 ab infe-
rioribus numero ducto, pus lente & per vices edu-
cendo; ex indole puris educti, & reliquis ægro-
tantis circumstantiis, prognosis de vita vel morte
pronuntianda erit; si *Empyema* fuerit vetus, vi-
res collapsæ, capilli cadentes, alvi fluxus colli-
quativus, corpus tabidum &c. *paracentesis* facta
mortem accelerare solet.

Vuillisii sententia.

Art. 242. Empyema est collectio puris intra ca- *Signa*
Empyematis.
vitatem thoracis qua respirationis organa oppri-
muntur; illuc vero pus istud confluere solet, vel
ex *pleuritide*, vel *peripneumonia* (& quandoque for-
san ex *angina*) suppuratis & disruptis; post morbos
prædictos *Empyematis* secuturi major erit suspicio,
si post unam vel alteram septimanam sine sputo
copioso, rigores, & febris, & spirituum languo-
res, superveniant, & dein post 14, vel 20 dies *Em-
pyematis* plane facti signa erunt respiratio difficilis,

pectoris gravitas, materiæ fluctuatio, & molestiæ sensus e corporis situ mutato, sitis & febricula fere constans, genarum rubor, totius inquietudo & vigiliæ. De *paracentesi* vide locum, & de eventu ejusdem p. 201. Vide etiam *Mayerne*, p. 178.

Ettmulleri sententia.

Diagnos.

Art. 243. Cognoscitur, quando factum sit *Empyema*, quod remittat febris, quin etiam fluctuatio quædam puris hinc inde percipitur; rumpitur autem *vomica* circa diem 20. 30. aut 40. dum vero rumpitur, rigor fit, & febris intensior supervenit, adest tussis continua, quasi ex profundo, quia diaphragma gravatur ex incumbente pure, parum excernitur, febris mitior evadit, & magis lenta, respiratio est difficilis, & sentitur pectoris gravitas, si corpus inclinant pene suffocantur, sentiunt frequentissime *evaporationes* ex pectoris cavo ad os ascendentes instar *aquæ calidæ*; ulteriori progressu percipiunt in ore *saporem terræ* & quasi *putridum*, & pulsus intermittit.

*Curatio
per aper-
tionem
thoracis
& aliter.*

Art. 244. Apertio thoracis fit inter 5^{am} & 6^{am} costam (a supremis numerando;) mature fiat. Vide *Sculletum*. Quod ad remedia attinet, exhibenda sunt grumorum sanguinem *dissolventia* & *absorbentia*, & tunc præstat a *diureticis* incipere, in fine autem aliquod *sudoriferum* subnectere. Si moliatur aliquid natura, semper medicus sit ejus minister; V. G. quando urina purulenta redditur, dentur *diuretica*; in diarrhœa purulenta, *laxantia*; si ad sputum vergat, *expectorantia*, immo *vomitiva*; *nicotiana* est egregia; *fonticuli* etiam a quibusdam inter costas inuruntur, interne *balsamica*, *vulneraria*, decocta e *lignis*, *gelatina C. C. hedera terrestris* valde commendatur. Vide *vomicam pulmonis*. (54r. &c.)

PHRENITIS & PARAPHRENITIS

Villisi sententia.

Art. 245. Phrenitis est desipientia continua, scilicet principum cerebri facultatum depravatio ab inflammatione meningum orta cum febre synocha. Huic morbo affinis Paraphrenitis dictus est diaphragmatis inflammatio.

Art. 246. Phrenesin potius feбри succedere, & quia sanguis effervescens recrementa sua adusta capiti transfert, produci, *Hippocrates* olim, & nunc quisquam vel e plebe observat; in quantum, scilicet, febricitantis urina a turbida & crassa, in tenuem & aquosam mutata Phrenesin imminentem indicat; cujus idcirco affectus causa exinde colligitur esse *materia febrilis* in cerebrum metastasis.

Art. 247. Ex dissectionibus patet Phrenesin non a meningum inflammatione oriri, neque Paraphrenesin diaphragmatis; sed Phrenitis definiri potest; totius animæ sensitivæ sive spirituum animalium, quoad totam eorum hypostasim, phlogosis sive inflammationis; & prout incendium vel a cerebro tantum, vel ab hoc simul & cerebello, incipit, vulgo in Phrenitida & Paraphrenitida distinguitur, quod tantundem est ac functiones animales spontaneas ferre tantum & potissimum, aut una cum his vitales lædi.

„ Phrenitis (inquit *Lommius*) his signis innoscit; febris urget acuta, atque continua, continuusque mentis error, modo his, modo aliis animæ vitalis actionibus; expeditus in omnem audaciam homo est, & vicissim tum vigiliis, tum somno difficili, turbulentoque impeditur, sic ut interrupta quiete protinus cum impetu e cubili profiliat, vociferetur, ferociat, ac modo ploret, modo cantet, verbaque sine sensu, sine ordine proferat, interrogatus ab alio omnia aliena respondet; oculi sunt mobiles, flammei, cruenti,

Phrenitis
quid.Phrenitis
dis causa.Quales
morbi re-
vera sint
Phrenitis
& Para-
phrenitis.Signa dia-
gnostica.

ti, squalidi, quos æger crebro perfricat, modo siccos, modo lachrymis perfusos; lingua aspera & nigra, dentes strident, sæpeque cruor e naribus aliquis fertur, & interdum posteriora capitis dolent; idem manibus tremunt, digitisque floccos vellit, & festucas e stragulis legit; urina est tenuis flammea, interdum etiam (quod pessimum) tenuis albaque est.

Prognosis.

Art. 248. Phrenitis, aut brevi tempore in salutem, aut mortem, cum febre terminatur; aut diu protracta & post febrem superstes, demum vel sanatur, vel in alios morbos, nempe, *lethargum*, aut *maniam*, aut *melancholiam* transit, vel demum in *desipientiam perpetuam*, fracto, scilicet, (quod ajunt) cerebro.

Curatio.

Art. 249. Si Phrenitis in principio febris accidat, *venesectio* locum habet, & *enemata* sunt præcipui usus, cataplasmata pedibus admoveri debent ex *fol. rut. cham. verben. rad. brion. flor. papav. errat. cum sapone*; vel eorum loco *columbæ* vel *pulli* dum calent descisti; pro siti restinguenda bibat *Palmarii* potum divinum, scilicet *aquam fontan. cum succo limon. & sacchar.* vel emulsionem; *hypnotica* sunt caute usurpanda; in hoc affectu *placenta rosacea* vel *flores papaveris cum aceto & nuc. moschat.* capiti & temporibus cum fructu applicari potest.

*Boerhaavii sententia.**Vera vel symptomatica.*

Art. 250. Phrenitis est vel vera, ubi cerebrum vel potius illius meninges utraq; primario inflammatione afficiuntur cum delirio & febre acuta conjuncta; vel *symptomatica* ex metastasi materiæ febrilis in cerebrum.

Eventus.

Art. 251. Phrenitis vera 3^o, 4^o, vel 7^o die necat, vel abit in *maniam*, *lethargum*, *coma*, *catochen*: A *peripneumonia* & *ileo* lethalis, a *variolis* admodum mala.

Art.

Art. 252. Hæmorrhagiæ quandoque morbum *Indicatio.*
 solvunt. In Phrenitide vera prodest *venæsectio lar-* *nes cura-*
 ga. „ Immo in hoc affectu (inquit *Dolæus*) arte- *tiva.*
 „ riotomy in temporibus institutam commen-
 „ damus. „ Indicantur *diluentia* ex decoctis, *an-*
tiphlogisticis & nitrosis affatim exhibitis, *laxan-*
tia & clysmata, *capitis rasura*, *epispastica*, *cu-*
curbita in partibus inferioribus.

Art. 253. „ Certe in Phrenitide (inquit *D. Sectio v-*
 „ Freind) quæ febribus supervenit, sectionem *ve-* *na jugu-*
 „ *nae jugularis* quam maxime efficacem esse exper- *laris.*
 „ tus sum, cum alia remedia minus commode
 „ responderint: neque efficacem tantummodo,
 „ sed & adeo tutam, ut valde mirer aliquid de
 „ efficiendi difficultate, nedum periculo apud scri-
 „ ptores inveniri; nam hæc vena, uti nullo fere
 „ labore secatur, ita & secta facillime omnium
 „ sanescit. (Frequentissime etiam in aliis capitis
 „ morbis gravioribus in praxi mea *jugularem se-*
 „ cui.)

Art. 254. Paraphrenitis est morbus *Pleuritidi si-* *Para-*
 milis, ubi diaphragma vel saltem ejusdem margo *phrenitis*
 vere inflammatur, & longe frequentior est, quam *quid.*
 vulgo creditur; cognoscitur ex febre continua,
 dolore inflammatorio in inspiratione maxime ur-
 gente; hinc respiratio sublimis, celeris, suffoca-
 tiva, delirium perpetuum, convulsio, furor, gan-
 græna, (symptomata omnia atrociora quam in
Pleuritide); & licet totum malum cognitum sit,
 insuperabile tamen.

Ettmulleri sententia.

Art. 255. Phrenitis moderno usu vocabuli, est *Phrenitis*
 delirium intensissimum ex membranarum cerebri *affectus.*
 inflammatione ortum cum febre peracuta, veteri-
 bus *Sphacelismus* seu *Sphacelus cerebri*; est malum *Plerumq;*
 ut plurimum lethale, 3^o, 4^o, vel 7^o, die intereunt; *lethalis.*
 Lethalem phrenitidem denuntiant dyspnœa, facies
 ca-

cadaverosa, sudor syncopiticus, lingua & manus tremulæ; stridor dentium, stillicidium narium, &c. si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum conqueruntur ægri, funestissimum est signum, mox enim *delirium* & *convulsiones* aderunt, quod sæpius observavi; convulsiones superveniunt, quando inflammatio cerebri incipit abire in gangrænam.

Cura.

Art. 256. Cura nil habet peculiare præ cura in febre acuta cum delirio; *Tinctura papav. rhæad.* effervescentiam sanguinis compescit, item *camphora* & *nitrum*; quando ab alio morbo pendeat, curato morbo primario delirium cessat; ideoque *sudorifera* & *alexipharmaca*, sunt propinanda, ut *tinctura bezoardica*, &c. In febre ardente decoctum *tamarind.* *epithemata* etiam plantis pedum conducunt.

Acida;
&c.

Art. 257. „ *Blandiora acida* & *cinnabarina*
„ *cum emulsionibus* inter interna remedia omne
„ ferunt punctum in phrenitide ex præcepto *Vvald-*
„ *Schmidii*.

INFLAMMATIO VENTRICULI.

Ettmulleri sententia.

Inflam-
matio
Ventricu-
li.

Art. 258. Inflammatio stomachi est affectus periculosus, &, si quis alius, peracutus; adest febris ardens, & aliqualis tumor in præcordiis, circa Ventriculi regionem dolor insignis sub costis nothis, cum gravi æstu ibidem, siti inextinguibili, corporis jactatione & vigiliis; superveniunt deliria, vomitus, & non raro convulsiones lethales, raro evadunt; 3^o, vel 4^o die finiri solet; interdum, sed raro ad suppurationem tendit, & *abscessus* rumpitur, vel in Ventriculi vel abdominis cavo, malum fere semper incurabile.

Differen-
tia inter
Ventricu-
li & He-
patis in-

Art. 259. Distinguendum est inter *Ventriculi* inflammationem & *Hepatis*; in priore ardor & dolor magis in profundo sunt, in hepate inflamma-
tio

tio magis circumscripta est, & mitiora urgent symptomata. (268.) *inflammationem.*

Art. 260. Curatio eadem est ac in aliis inflammationibus, viz. per *venesectionem*, &c. *Sudorifera* primatum obtinent. Externe convenit cataplasma ex *stercore columbino*, *fermento*, &c. ad suppurationem promovendam ad imitationem *Sennerti*. Vid. *Boerb.* *Curatio.*

INFLAMMATIO INTESTINORUM.

Ettmulleri sententia.

Art. 261. Accidit in herniis, ileo, & ab aliis causis. In loco inflammato tumor rotundus tactui quandoque) percipi solet; adest vehemens dolor pulsatorius, fixus, distendens, &c. alvus occlusa, febris, vomitus, languor, &c. frequentius in *ileum lethalem* terminatur. Commendatur *omentum vervecinum*. Vide *Ileum* (666.) *Inflammatio intestinorum.*

Art. 262. Consulatur *Boerhaave* instar omnium scriptorum *de Intestinorum inflammatione.* *Boerhaave.*

INFLAMMATIO MESENTERII.

Ettmulleri sententia.

Art. 263. Inflammationes & tumores Mesenterii sæpius sunt fons & origo chronicorum & admodum latentium morborum, & fomes mirabilium turbarum ægros & medicos vexantium. Dolores adsunt nunc circa dorsum & lumbos, nunc in abdomine & circa umbilicum, tormina inferentes, lenti tamen omnes & diuturni, subinde cum febricula erratica; dolores subinde per intervalla recurrunt. *Inflammatio Mesenterii.*

Art. 264. Quando apostema suppuratum rum-patur, horror insignis, interdum rigor quatit ægrum, cum superveniente æstu non raro insigni, quem puris præsertim per alvum excretio successive comitatur. *Abscessus.*

Art. 265. Corpus sensim emaciatur; respiratio evadit difficilior; & subinde aliquid molesti, quod ipsi *Diagnos.*

ipſi ægri ſatis explicare nequeunt, in profundo abdominis circa & infra umbilicum preſentire affirmant, flatulentia ægros vexare ſolent. Sæpe multis annis affligunt huiusmodi tumores, in ſcirrhoſos & ſtrumofos abeunt.

Curatio.

Art. 266. Curantur hæc pathemata Meſenterii; cum diuturniores ſunt, ut alii chronici affectus, *cachectici & hypochondriaci*; tractandi ſunt tamen caute & ſine violentia. Convenit externe *empl. de cicuta cum ammoniaco, de ranis cum mercurio, &c.* Interne *deobſtruentia, millepedes, remedia ad ſtrumas, &c.* Apertio venarum hæmorrhoidalium per *hirudines*; *purgantia ſunt nociva, enemata utiſſima.*

INFLAMMATIO PANCREATIS.

Ettmulleri ſententia.

*Inflam-
matio
Pancrea-
tis.*

Art. 267. Inflammatio Pancreatis eſt affectus perquam occultus, vigilias, lipothymias, aliaque gravia ſymptomata inferens, in *abſceſſu* plerumque terminans. Interdum ſuperveniente ſalutari *fluxu cruento* curantur hi morbi.

INFLAMMATIO HEPATIS.

Ettmulleri ſententia.

Hepaticis

Art. 268. Inflammatio Hepatis & ejuſdem abſceſſus vocatur alias Hepatitis. In genere percipitur in omni Hepatis inflammatione dolor obſcurus & tenſivus ac gravativus in dextro hypochondrio & ejus profundo, qui ſub ſuppuratione punctorius plus minus evadere ſolet; adeſt febris lenta plus minus vero acuta pro ratione gradus inflammationis; ægri fere ſupini jacent, præſertim ſi diaphragma afficiatur, & tuſſis arida affligit. In genere in *pleuritide vera* omnia ſymptomata ſunt acerbiora, in *hepatitide remiſſiora*. Periculofum eſt malum, & quod ſæpius ad mortem deducit ægros;

CAP. III. De affectibus Capitis, &c. iii

gros ; aut discutitur , aut successive suppuratur , aut in *scirrhum* degenerat ; *abscessus* nunc per alvum , nunc per urinam , interdum per tussim expurgatur ; *singultus* est pessimum signum. (259.)

Art. 269. Convenit *venesectio* in pede , prosunt *Curatio* : *sudorifera* , & *antipleuritica* , *antihæcticum* Poterii , *sperma ceti* , *nitrata* , *saturnina* , *camphorata* & circa finem *diuretica* : externe *epithemata penetrantia* & *discutientia* , postremo *suppurantia* , rupto *abscessu vulneraria* & *balsamica* interne .

Art. 270. Omnibus inflammationibus internis *Phthisis* suppuratis & male curatis supervenire solet *phthisis*. *sequi solet*
De *hepatitide* præ omnibus consulatur *Boerhaave*.

INFLAMMATIO LIENIS.

Etmulleri sententia.

Art. 271. In inflammatione *Lienis* eadem fere *Inflam-* sunt symptomata in sinistro hypochondrio , ac in *matio* inflammatione *hepatis* in dextro ; ideoque *Lienis* *diagnosis* , *prognosis* & *cura* fere eadem sunt .



C A P. I I I.

Sive Fasciculus Morborum tertius.

DE AFFECTIBUS CAPITIS
& Nervorum in genere.

Art. 272. **C**larissimus noster Sydenhamus a *Proœ-* quodam interrogatus , quamobrem *miu* . non de morbis Capitis , æque ac de aliis , scripserat ; summa modestia ac candore respondere dicitur , *quoniam illos nondum intellexi* . Et equidem agnoscendum est scientiam nostram in hac regione valde mancā ac imperfectā esse ; ut-
cunque tamen in hunc oceanum propemodum
igno.

ignotum descendendum est, & a juvantium & lædentium contemplatione, quoquomodo possumus, cursus natura & experientia ducibus dirigendus est.

Cheynei de natura fibræ epitome.

Origo
morbo-
rum chro-
nicorum.

Art. 273. Diuturnorum morborum origines in genere sunt tres. 1^o. *Humorum lentor sive tenacitas.* 2^o. *Eorundem acor & acrimonia.* 3^o. *Deperdita aut saltem imminuta fibrarum tensio sive elasticitas.* Omnes Nervorum morbi ab infimo oscitatione nempe & pandiculatione ad usque summum, nempe apoplecticam dispositionem, varii tantum videntur gradus unius ejusdemque morbi, *debilitatis scilicet, aut relaxationis defectusque elastice facultatis partium solidarum,* quorum causæ sunt, eaque comitantur *lentor & acrimonia humorum.*

Natura
morbo-
rum Ner-
vinorum.

Art. 274. Morborum Nervinorum tria sunt genera. Primum est eorum, quorum symptoma præcipuum est *facultatis sentiendi debilitas temporaria aut perpetua, vel totalis ejusdem cessatio,* quam sequitur motus voluntarii suspensio; hujusmodi morbi ab humorum lentorum & viscosorum copia nimia tanquam causa principali oriri videntur. Multi sunt hujus generis morbi ab usque gravi apoplexia, qua omnium simul nervorum origo comprimitur, omniumque vibratio, ne ad animæ sentientis sedem propagetur, intercipitur, ad sensum ingenique hebetudinem & stuporem. Huc etiam aliquatenus referenda sunt *hypocondriacorum & hystericarum deliquia & paroxysmi.* Secundum est eorum, quorum præcipuum symptoma est *motus voluntarius aut impeditus aut abolitus;* tales sunt morbi generis paralytici, a paralyfi universalis usque ad segnitiam, & inexpeditum inhabilemque artuum motum, membrorumque frigiditatem; atque hi fibrarum & nervorum & præ-

ci-

cipue muscularium debilitati, imbecillitati, aut tono amisso deberi videntur. Tertium denique eorum est, quorum præcipua symptomata sunt *spasmi, contractiones, ¶ convulsiones musculorum*: tales sunt morbi convulsiivi dicti ab epilepsia, & convulsione, hypocondriacis & hystericis paroxysmis, usque ad oscitatum & pandiculationem: & hi in universum acriori stimulo debentur, quorum origo est falsa quædam & erodens acrimonia fluidorum, acida præterea & stimulans aura, vapor, aut obstructa perspiratio. Hæc Nervinorum morborum per genera sua distributio maxime naturalis, & latissime patens videtur. Fibrarum infirmitati indivulsus comes adhæret, & pro ejus gradu minor majorve est omnium functionum animalium *languor ¶ debilitas*.

Art. 225. Ex prædictis patet tres indicationes *Indicationes Curative.* five intentiones curativas oriri; scilicet, prima est *diluere, attenuare, eorumque lentorem tollere, ¶ canales obstructos aperire ¶ meabiles efficere*; Secunda est *humorum acrimoniam tollere, molecularum nexus dissolvere ¶ spicula frangere*. Ultima denique & præcipua intentio est *solidis partibus tonum suum ¶ vim elasticam reddere*. Huic enim ultimæ intentioni assequendæ minime allaborandum est, antequam duabus prioribus felicem operam tamdiu dederimus quamdiu id postulare videtur morbi indoles. Quamdiu enim humorum lentor aut acrimonia manet, frustra, aut si succedat, magno ægri damno fibræ corrugantur, & intenduntur, & profecto hoc monitum est maximi momenti. Præmissis universalibus, primæ intentioni satisfaciunt quæcunque particularum pondere, agilitate, aut quavis proprietate, succis crassis, viscidis, lentis, incidendis, attenuandis & fluidis reddendis idonea inveniuntur: Talia sunt *calomelas, æthiops mineralis, cinnab. antimonii ¶ nativ. antimonium diaphoreticum bezoardi-*

H cum

cum minerale & Joviale, sal Jovis, succi antiscorbutici, vina & cerevisia medicat. decoct. e lign. &c. Inter ea primum locum tribuo cinnab. antimonii, quæ scilicet ex omnibus una ventriculo minime molesta est, nec ita facile torminibus intestina excruciat, aut catharsin ciet, præcipue recens & artificiose elaborata. Ipse ego maximas ejus vires sæpe miratus sum, cum, nullo alio medicamento simul adhibito, laudum ejus vel minima pars communis esse posset.

Ad finem secunda intentione propositum assequendum mirabiles profecto sunt vires medicamentorum *sulphureorum*; eidem etiam proposito conducunt medicamenta *absorbentia* & *Alcalina dicta*, *gummosa* & *volatilia*: diligenter interim cavendum est, ne *volatilia* intempestive nimiave copia ingerantur: tunc enim humoribus haud satis dilutis, eos nimia vi agitabunt & ardorem febrilem excitabunt. In *gummosis* insignis est incidendi & attenuandi vis, *saponi* æmula, medicamentorum autem *smegmaticorum* vires in obstructionibus referendis, & iætero speciatim domando satis notæ sunt. Sed cum eximia calefaciendi vi polleant, nunquam adhibenda sunt antequam humores satis diluti fuerint. Ultimæ denique intentioni, quæ est fibras laxatas constringere, remissas intendere & corrugare, sequentia accommodata sunt, *cortex Peruvian.* *cortex Eleutherii*, *viscus arbores*, *cinnam.* *calam. arom.* *cort. aurant.* *amara quæcunque*, *catechu.* *rhabarbarum torrefactum*, *styptica*, e ferro parata, *aquæ chalybeata*; reliquis vero omnibus præstat *cortex Peruvianus*, ut a multiplici experientia per multos annos didici in omnibus laxæ fibræ morbis. *Tincturam Burgundicam* præscribere soleo.

C E P H A L A L G I A.

Celsi sententia.

Art. 276. In Capite interdum acutus & pestifer morbus est, quem κεφαλαίαν, Græci vocant, Descriptio morbi. cuius notæ sunt horror validus, Nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus sic ut vox supprimatur; vel sanguinis ex naribus cursus; sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis, maxime circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque gravis, neque periculosa, per hominis ætatem est.

Art. 277. In dolore, qui acutus est, & qui supra consuetudinem intenditur, convenit venæsectio, Curatio. sed nisi intolerabilis sit, supervacuum erit venam secare; satiusque est abstinere a cibo, si fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam bibere; si postero die dolor remanet, alvum ducere, sternutamenta evocare, nihil assumere, nisi aquam; sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit.

Vvillisi sententia.

Art. 278. Si dolor capitis inveteratus & fere Prognosis. continuus fuerit, ut jure suspicemur eum a tumore phlegmonode, erysipelate, scirrho, abscessu, aut vermibus oriri, curationis spes exigua aut nulla superest. Si dolor capitis sit immanis, atque vertiginem, vomitionem, aliosque affectus aut convulsivos aut soporosos adjunctos habuerit, frequenter in apoplexiam lethalem, aut epilepsiam, paralyzin, cecitatem, surditatem, &c. Quum caput parte aliqua (inquit Lommius) aut circumcirca dolet, si pus, vel aqua vel sanguis naribus, ore, aut auribus exit, scire licet malum solvi.

Curatio. Art. 279. Ad curationem hujus morbi detractio sanguinis e venis sedalibus *hirudinum* suctu locum habet, item *aque minerales cathartica*, *cremor tartari* in sero lactis solutus, *vesicatoria*, *opiata*, *infusum Coffee*, *sol. salvia*, *rorismarini*, &c. instar *Theæ* eptum. *Millepedes* quoque curandis Cephalalgiis pertinacibus opem sæpe egregiam præstant. Dolor capitis post *morbillos* aut *variolas* totidem horis a pastu accedens, præmissis universalibus, *antiscorbuticis* & *chalybeatis* curatur.

Post mor-
billos, aut
variolas.

Errmulleri sententia.

Cephalalgia calida. Art. 280. Cephalalgia est vel calida, prout sanguis magis fervet, tunc sensus caloris præsertim circa frontem percipitur; vel frigida, cum nihil tale occurrit, sed potius frigus sentitur, aut saltem adest gravedo capitis. Ex omni Cephalalgia per consensum frequentissima est ista, quæ fit ex *stomacho*. Cephalalgia *habitualis* inveterata est difficilis curatu, terminare solet in *vertigine*, *apoplexia*, *epilepsia*, *paralysi*, *cæcitæte*, *surditate*, &c. Ex omnibus dolor capitis *scorbuticus* est contumacissimus.

Frigida.

Per consensum.

Habitualis.

Scorbutica.

Biliosa & Pituitosa.

Curatio.

Art. 281. „ Cephalalgia (*juxta Dolæum*) re-
„ ste dividitur in *biliosam* & *pituitosam*; in prio-
„ ri casu dolor est valde acutus cum insigni ar-
„ dore; particulæ biliosæ acres vel salino-sulphu-
„ reæ in sanguine abundant; ideoque adhibenda
„ est *venæsectio*, leniter *purgantia*, aliaque ad
„ temperiem sanguinis alterandam, temperan-
„ damque facientia. In cephalalgia *pituitosa* ma-
„ teria peccans est crassa ac tenax, indeque do-
„ lor gravativus, adest stupor mentis, segnities;
„ hæc species *cathartica* fortiora postulat; profi-
„ cua sunt decocta *lignorum*, *salia volatilia*, *cin-
„ nabarina*, *cephalica* potus herbæ *Theæ*; si ma-
„ lum a stomacho debilitato trahat suum ortum,
„ tunc conveniunt *corroborantia*, *stomachica*, a-

„ ci-

„ *cidula spadenses*, &c. Ad Curam Cephalalgiae
 „ in genere apprime conducit dos *pil. cathart.*
 „ *cum mercur. dulc.* ℞. & *laudan.* gr. j. hor.
 „ *somn.* & aliquoties repetita; item decoctum e
 „ *lignis cum roremarin. salia volatilia*, *cinnaba-*
 „ *rina nativ. succinata*, *camphorata*, potio *Theæ*
 „ (*Coffee.*) In contumaci capitis dolore empl. de
ranis cum mercurio capiti raso apponi potest.

Art. 282. Hemicrania (cum dolet dimidium Hemicran-
 caput) est gravissima species Cephalalgiae; præ- nia.
 missis universalibus experimentum est singulare ca-
 taplasma factum ex *rad. cucumeris asinini* vel
brion. cum verben. & absynth. &c. Hemicraniis
 deploratissimis (inquit *Turner*) laborantes *Arte-*
riotomia, (vid. Art. 323.) aliis omnibus incassum
 tentatis, feliciter liberavi; idemque ab aliis præ-
 stitum novi. p. 365. vol. 1. Si dolor capitis sit in
 modum hemicraniae (inquit *Chesneau*) & par-
 vum locum occupet, etiamsi adsit febris conti-
 nua, nihil applicatione *ranunculi* præstantius in-
 veni, universalibus præmissis, dolorem ad mira-
 culum tollit; ad hunc modum utor, densus ca-
 pillis, si sit locus pilosus, parti dolenti impona-
 tur quodvis emplastr. adhæsivum cum foramine in
 medio ad amplitudinem denarii, ut in applica-
 tione *Pyrotici* solet fieri; deinde supra foramen
 applicentur *folia ranunculi contusa*, multo *succo*
madentia; in tenero loco & depilato duarum ho-
 rarum spatio cutem aperit; in capite vero, ubi
 pili nascuntur, non facile aperit, sed parte in tu-
 morem elevata dolorem sedat. Hoc unum adver-
 tendum, ut circa oculos ponatur parva quantita-
 te propter palpebrarum & partium circumjacen-
 tium inflationes, quas gignit, stupendas, nullius
 tamen periculi.

Baglivii sententia.

Art. 283. Sunt qui ob nimium sensum, sive si- Dolor ca-
 brarum ariditatem, capitis dolore laborant; in quo pitis ob

nimum
fibrarum
sensum.

casu, quoniam dolor solidi vitio potius quam fluidi oritur, ad *narcotica* libenter veniendum; nam tuto applicari possunt, quoniam non aliud debent efficere, quam obtundere nimum fibrarum sensum: ter aut quater observavi dolores capitis pertinacissimos, & fere ad maniam accedentes, irritis aliis, solo *pulv. de Guttet.* ad ℥j. dato feliciter cessisse.

Farrago sententiarum.

Euporist.

Art. 284. „ Acerrimi dolores capitis *euporisto*
„ sanari possunt ne npe *strophiole aqua frigida ma-*
„ *dido* collum circumdante, & cum a nativoca-
„ lore incalescit linteum pro novo permutandum,
„ unde dolor quasi excantatus desinit, & rediens
„ eodem stratagemate elusus fugatur; (*sed te-*
„ *merarium est experimentum.*)

Arterio-
tomia.

Art. 285. In hoc malo *Parisiis* nihil frequen-
tius, quam *sectio arteriae temporalis*; aliquando
chirurgus transversim secat; idque feliciter quam
ubi punctum incidit, sic enim magis coeunt di-
visae arteriae partes. *Trophimus. Serrier. M. Hom-*
berg memorat exemplum *Cephalalgiae pertinacis*
ac inveteratae per combustionem accidentalem cu-
ratae.

Remedia.

Art. 286. Camphora in spiritu quolibet cepha-
lico, & naribus attracta *Cephalalgiam* sedat,
Greenfield.

Varia.

Art. 287. Succus *hederae terrestris* naribus at-
tractus, cephalalgiam penitus aufert, *Raii hist.*
plant. videatur locus, p. 567.

In Cepha-
lalgia ha-
bituali.

Art. 288. In cephalalgia habituali & pertinaci
pulvis mari syriaci est fere specificum; dos. ℥ss.
ut ab amico medico accepi.

V I G I L I Æ N I M I Æ,
seu Pervigilium.*Inter legendum & ex Observatione.*

Art. 289. Interdum est morbus solitarius sine
alia evidente ægritudine; ita tamen ut nonnulli
istud sine molestia singulari ferant: alii vero mox
languorem & appetitum prostratum inde perci-
piunt; ab alio morbo fere semper pendet.

*Vigilia
nimia.*

Art. 290. Quod caret alterna requie durabile
non est.

Prognosis.

Art. 291. Melancholici maniaci & similes præ
aliis, molestissima patiuntur pervigilia, ita ut
quidam melancholicus per quatuordecim menses
fuerit vigil & insomnis, & tales, utut per longum
tempus in continuis sint vigiliis, hoc malum ta-
men sine insigni virium debilitate perferunt.

*Quibus
potissi-
mum ac-
cidunt.*

Art. 292. In senum Vigiliis non anodyna sed
confortantia & aromatica, analeptica ex vino dul-
ci, &c. sunt optima.

*Senum
vigilia.*

Art. 293. Somnus naturalis est status corporis,
in quo imminutus est spirituum influxus in orga-
na externa, nempe respectu motus eorum in vi-
giliis, non tamen penitus abolitus est. In somno
omnes secretiones excepto sudore vel insensibili
perspiratione, minuuntur. Somnus moderatus ad
sanitatem plurimum confert, coctiones perficien-
do, & vires redintegrando.

*Somnus
quid &
ejus com-
moda.*

M O R B I S O P O R O S I.

Inter legendum & ex Observatione.

Art. 294. Coma seu cataphora, lethargus & ca-
rus sunt affectus soporosi secundum magis & mi-
nus potius quam essentialiter a se invicem discre-
pantes; in hoc conveniunt, quod sudorem morbi-
ficum inducant; fiunt ut plurimum ab una eadem-
que causa, nimirum pituita in cerebro collecta.

*Morbi so-
porosi.*

Coma.

Art. 295. Coma est somnus profundus, a quo tamen æger excitatur, & oculos aperit, & respondet, iterumque mox profunde obdormit.

Lethargus.

Art. 296. Lethargus comati similis est, sed cum febre & delirio conjunctus; lethargici (*inquit Arelianus*) leviter sunt excitandi suis nominibus exclamati; etenim jugiter titillatu, vel impressione forti ac, punctationibus hoc facere, nihil aliud erit, quam stricturam asperare ob inquietudinem vexationis; blando articulorum fricamento utendum est; linguæ asperitatem vel ariditatem *spongia infusa aqua calida* humectemus, &c.

Carus.

Art. 297. Carus est somnus adhuc profundior sine febre, ex quo æger excitatus oculos vix aperit, & non respondet; attamen vellicatus sentit integra manente respiratione; est proximus ad *apoplexiam* gradus.

Curatio horum affectuum.

Art. 298. Ex his affectibus, eorum cura, qui a febre pendent, & sunt ejusdem symptomata, in capite de febribus recensetur; & reliqui, qui febre carent, tanquam leves *apoplexiæ* gradus spectari possunt. Ubi morbi soporosi aliis morbis, febribus, &c. superveniunt, non temere secanda est *vena*, sed *purgatio* instituenda, & quidem in his casibus medicus magni nominis D. *Radcliff* *resin. Jalap.* ℥j. ausus est exhibere successu mirabili. In caro, lethargo, aliisque soporosis morbis *acetum naribus insufflatum* plus excitat quam spiritus quilibet volatilissimus Alkalinus.

Coma vigil.

Art. 299. Coma vigil est, quando adest quoad externa sensuum organa somnolentia summa, quoad interna perpetuæ vigiliæ; æger clausis oculis permanet, & somnum capere videtur, attamen dormire nequit, variis imaginibus & deliramentis impeditur; raro est morbus *solitarius*, sed potius *symptoma* febricitantium; signum esse solet imminantis *Phrenitidis*.

V E R T I G O.

Vvillisi sententia.

Art. 300. Vertigo est affectio, in qua objecta *Vertigo* visibilia circumrotari videntur, sentiuntque affecti perturbationem seu confusionem spirituum animalium in cerebro, ut in nervos non rite influant: quare facultates visivæ & locomotivæ sæpe aliquatenus vacillant, ut laborantes corruant, & non raro a tenebris obfuscentur.

Art. 301. Quoad morbi hujus sedem notabile *Prognosis* discrimen occurrit; frequenter enim *anterius* constituta est, & vix omnino *caduca* est, & therapiam admittit; quandoque autem *posterius* orta longe periculosior existit, & non raro in *apoplexiam* vel *paralysin*, aut in morbum *convulsivum* transit.

Art. 302. Pro Vertiginoso post alia incassum *Curatio* tentata hunc in modum præscripsi; *℥. pulv. rad. singula*
pæon. mar. ℥ij. flor. ejusd. ℥j. sterc. pavonis albiss. ris.
℔ss. sacchar. albiss. ℥ij. dos. circiter coch. j. bis in
die superbibendo haust. decoct. salviae aut rorisma-
rini, Coffee tinctura imprægnati; vix credibile
est quantum ab hoc remedio juvamen recepit;
post mensem sanus evasit.

Ettmulleri sententia.

Art. 303. Vertigo a vertendo; omnia enim in hoc affectu circumrotari videntur; attamen non semper adest talis circumgyratio; sufficit enim motus *tremulus & undulatorius*. Tres sunt gradus, *Tres gradus hujus morbi.*
 1^o. *vertigo simplex*, quando sit saltim circumgyratio subito evanescens. 2^o. *Vertigo tenebricosa* seu *scotomia*, quando oculi caligine obscurentur, aut appareant coram oculis varii colores. 3^o. *Vertigo caduca*, quando æger protinus concidat, atque hæc ad *epilepsiam* quam proxime accedit. (375.)

Art. 304. Dum res externæ gyrari videntur, *Eventus*
 hoc

hoc fit in oculo non in cerebro, non enim in cerebro videmus. (de *Ætiologia* hujus morbi ex tunicae retinae dimotione videatur *Bellini*) Vertigo gravior & diuturnior ut plurimum in senibus *apoplexiam*, in junioribus *epilepsiam* prænuntiat; modo *anterior*, modo *posterior* capitis partem affligit; illa est curabilior, hæc periculosior.

Curatio. *Art. 305.* Vertigo frequenter fit per *consensum* a vitio stomachi, vel primarum viarum, in hoc casu convenit *vomitorium*; remedia *stomachica specifica*, *antepileptica*, &c. Pro cathartico extractum *hellebori nigri* & *mercurius dulcis*; convenit *venæsectio* in plethoricis; *sterutatoria* sunt præcipue vitanda. Præmissis ergo præmittendis ad *stomachica* & *specifica* deveniendum est, *semen sinap.* omni mane comestum est egregium, item *aromatica*, *confectio alkerm.* *cinnab.* *antimon.* *radix pæon.* *flores lilior.* *convul.* *salvia*, *rosmarinus*, *stercus pavonis* est *specificum* nobile; *cinnab. nativ.* *spiritus* & *salia volat. succinata*, &c. laudantur.

Mayernii sententia.

Methodus medendi. *Art. 306.* Methodus medendi in vertigine hoc modo se habet; si adsit plethora, sanguis mittendus est; post *venæsectionem*, (si necessaria sit) præsentibus nausea vel appetitu prostrato, vel aliis affecti ventriculi indicibus *emeticum* propinandum est; deinde *purgatio* per sedem instituenda, & postea *specifica* exhibenda. *Calamus aromaticus* quocunque modo sumptus ad vertiginem valet, imo pro secreto habetur. Medicus quidam Germanus multos vertiginosos curavit pil. sequent. per plures dies exhibit. (si recte conjecturam faciam vide locum p. 43.) ʒ. *sacchar. Saturni* q. v. *tereb. Cypr.* q. s. f. pil. dosis una gr. iv. vel v. pendens. D. Glisson Cantabrigiensis medicinæ professor, gravi vertigine per tres septimanas confli-

sta-

status, irritis aliis remediis, vertici raso appo-
suit empl. ex flor. sulph. & alb. ovorum, a quo
sanatus est, ut ipse retulit D. Bate. Pyroticum
vel setaceum applicetur posteriori collo; cauterium
bregmati post omnia. Electuarium epileptic. Ba-
tean. elect. Peruv. epileptic. Fulleri.

A P O P L E X I A.

Art. 307. „ Apoplexia est repentina suspensio Definitio.
„ omnis sensationis, & privatio motus totius
„ corporis excepto cordis & pectoris, quæ fre-
„ quentius motu solito fortiori ac violentiori a-
„ guntur. „

Cælii Aureliani sententia.

Art. 308. Apoplexia ita dicitur, quod tanquam Apople-
xia signa
præsa-
gientia.
ex lethali percussu repentinum faciat casum. Si-
gna præsagientia aliquando nulla; interdum vero
gravedo, vel dolor capitis, aut vertigo, aut au-
rium tinnitus, in solitos usus difficilis motus,
vultus mœstitudo, saltus membrorum, præcipue
labrorum, tremula locutio, oblivio mox dicto-
rum, vultus plenitudo, sed hæc symptomata sunt
etiam communia in epilepsiam vel maniam ven-
turis. „ Torpores & stupores (inquit Hippocra-
„ tes coac.) præter consuetudinem advenientes,
„ futuram apoplexiam vel paralyfin denuntiant.

Art. 309. In paroxysmo ægri voce privantur, Paroxys-
mus.
mente capti repente cadunt, immoti, respiratio-
ne & pulsu tantum superstites, color plumbeus,
atque involuntaria illacrymatio; crescente morbo,
vultus adductio, ita ut longior nota videatur ima-
go, præcordiorum prominentia, & totius corpo-
ris frigidus torpor, pectoris stridor, & superio-
rum partium sudores frigidi.

Boerhaavii sententia.

*Causæ
frequen-
tiores :*

Art. 310. Causæ Apoplexiæ frequentiores sunt .
1º. Polyposæ sanguinis concretiones . 2º. Spissitu-
dò inflammatoria cruoris . 3º. Crassa, glutinosa,
pituitosa, iners totius sanguinis natura . 4º. Sim-
plex plethora vasorum a quacunque causa . 5º. Tu-
mores intra cranium nati (quibus addi possunt san-
guinis vel feri extravasationes ex contusionibus vel
concussionibus vi externa impressis ; & innumeræ
aliæ causæ latentes .)

*Divisio
Apople-
xiæ .*

Art. 311. Divisio apoplexiæ in sanguineam &
pituitosam est utilis, sed non perfecta divisio ;
quum & serosa, & atrabiliaria, & polyposa sit,
& alia .

Prognosis.

Art. 312. Lenis Apoplexia solvitur supervenien-
te sudore multo calido, æquabili, urina multa,
crassa; hæmorrhoidum, mensium vel alvi fluxu,
vel febre magna . Paulo gravior solet mutari in
paralysin alicujus partis musculosæ; totius lateris
unius, unde *hemiplegia*; vel omnium partium in-
fra caput; unde *paraplegia*, quæ raro curatur,
semperque memoriæ, judicii, motuumque læsio-
nes relinquit . Exquisita apoplexia in mortem ci-
to finitur, raro septimum diem excurrrens .

*Curatio
varia .*

Art. 313. Curatio varianda est pro ratione cau-
sarum; si a causa frigida, pituitosa oriatur, co-
nandum est statim, ut pressio lentoris glutinosi a
capite avertatur per derivationes in alia & opposi-
ta loca, & per *evacuationes universales*; in usum
veniunt *vesicantia, caustica, frictiones, ligaturæ,
apophlegmatismi, sternutatoria, acerrimi usurpan-
di stimuli quicunque, vomitoria, purgantia vali-
da, clysmata acria*; ut sequens, ℞. Pul. colo-
cynth. ℥℥. fol. tabac. ℥i℥. coq. in aq. font. q. s. ad
℥x. admisce sal. gem. ℥ij. f. enema . In usu tamen
horum omnium augetur sæpe malum materie ma-
gis mota & impacta, viribus tamen mox proji-
ciuntur .

ciundis per evacuantia: hinc in concilianda dissolutione semper *evacuationi* & *avulsioni* studendum, quantum res pati queat; inde regula (*Hippocratis*) *venasectio*, ni juvet, occidit (& *Celsi* occidit vel liberat.) Si vero a causa calida oriatur, & morbus inflammatorius videatur, tum illico mittatur sanguis magna copia ex *venis jugularibus*, & repetatur pro re nata, unde, si morbus sit sanabilis, levamen accipiet; diarrhoea omni arte obtineatur; *diluentia*, *attenuantia*, & *diuretica* ingerantur; detineatur æger, quantum fieri potest, e lecto, saltem a decubitu declivi. De reliquis lector ipse consulat auctorem.

Ettmulleri sententia.

Art. 314. Signa Apoplexiæ aliquando probabiliter futuræ sunt dolor capitis, vertigo, tumor carotidum, memoriæ debilitas, spontaneæ oculorum illacrymationes, scotomiæ, incubus, vocis tarditas & hæsitantia, oris distortionem, dentium stridores in somno, stupor frequens brachii aut pedis, aut etiam refrigeratio extremarum partium. *Hujus affectus prodromi.*

Art. 315. In hoc affectu omnes functiones animales subito cessant, homo quasi fulmine percussus & attonitus in terram jacet, sine motu (hinc dicitur morbus *attonitus* & *sideratus*) respiratio ipsa plus minus imminuta cum vel sine stertore, pulsu adhuc nonnihil vegeto, & perquam duro, nisi in casu admodum periculoso, ubi deficit; color faciei & oculorum ut plurimum rubet, facies tumida; æger profunde dormit, & nequit suscitari; interdum resolvitur vesicæ & ani sphincter; supervenit tandem spuma circa os. *Paroxysmus.*

Art. 316. Hemiplegia seu hemiplexia est quando solummodo dimidium capitis & reliqui corporis afficitur (*more Apoplexiæ.*) *Hemiplegia.*

Art. 317. Apoplexiæ causæ proximæ sunt vel im- *Apoplexiæ causa.*

impeditus spirituum animalium motus in cerebro, vel impeditus sanguinis circulus per cerebrum; venus nimia potissimum in senibus ad Apoplexiam multum disponit, ut & animi affectus graviores, ira, &c. Contusiones & concussiones capitis, scabies retropulsa, vapores mercuriales, gas seu halitus carbonum.

Est mor- *Art. 318.* Apoplexia est morbus admodum hæ-
*bus hære-*reditarius; omnes, qui Apoplexia moriuntur,
ditarius. suffocati intereunt, unde quo *liberior est respira-*
tio, eo major est spes salutis, & contra; spuma
circa os est fere semper signum lethale.

Curatio. *Art. 319.* *Barbette* in curanda Apoplexia *inun-*
ctionem mercurialem commendat; metus est de vo-
mitu exhibendo, ne suffocatio acceleretur, quod
non paucos medicos deterret. In Apoplexia *sangui-*
nea venæsectio est necessaria, in *pituitosa* omit-
tenda, quoniam nociva est, sed potius exhiben-
dum est *vomitorium antimoniale*; æger non debet
in lecto decumbere, sed erectus sedere; *enemata*
acriora sunt injicienda parata ex *lavend. rut. ma-*
joran. nicotian. rad. pyreth. irid. nostr. vin. bene-
dict. sal. gem. pulp. colocynth. in petia ligat. &c.
In ipso paroxysmo non neglectis universalibus con-
ducunt *salia volatilia, sudorifera*, speciatim *au-*
rum diaphoret. Poterii, cinnabarina, species diam-
br. confect. alkerm. sudorifera ex lignis declinan-
te paroxysmo aliquandiu continuata sunt maxi-
me proficua.

Prophylax- *Art. 320.* Pro præservatione, præmissis rite
is. universalibus præ reliquis multum laudatur fre-
quens *salvia* usus quocunque modo; in *cubebis*,
cardamomo, *sem. sinap. & eruce* singulares la-
tent vires maxime in senibus in forma pulv. vel
aliter in vehiculo appropriato assumptis. „ Item
„ *fonticuli inter scapulares* hodierno usu compro-
„ bantur. „

Colei sententia.

Art. 321. Auctor putat acerbum frigus & gelu diutinum anno 1683. numerum *apoplecticorum* annis succedentibus adauxisse.

Causa Apoplexie singularis.

Art. 322. Potio infusionis *rorismarini*, *salvia*, *beton. lilior. convul.* &c. instar *theæ*, item *Coffee*, & fumisuctio *nicotianæ* ad præcavendam *Apoplexiam* laudantur; *balsama odorifera*, *Apoplectica* dicta, & usus *ptarmicorum* inordinatus damnantur. Sanguinem detrahit manu maxime liberali ad uncias scilicet, 30. 40. 50. imo 60. hancque praxin non modo ex propria experientia stabilire satagit, sed etiam auctoritate celeberrimi *D. Gibbons*, neque in junioribus tantum, verum etiam in ætate provectoribus injungit; & instantiam profert cujusdam annum 77^{um} agentis, a quo sanguinis inter 20. & 30. uncias detraxit, & tantundem alia vice intra ejusdem septimanæ spatium ob *vertiginem* aliqualem superstitem.

De larga sanguinis missione.

Catherwoodii sententia.

Art. 323. Auctor pro virili conatur, & nulum non mover lapidem *arteriotomiam* introducere tanquam *phlebotomia* longe præstantiorem in hoc morbo curando; locum designat in arteria temporali, operationemque neque difficilem esse, neque periculofam asserit; accurate digitis detinenda est arteria, ne subvolutet, & vulnus infligendum est non punctura, sed per incisionem cum dextra mucronis lanceolæ elevatione; detracta sufficiente sanguinis quantitate, premendum est vulneris orificium in os temporale cum digito maximo, quo *thrombus*, si accidat, cito dissipabitur, & fere momento temporis fluxus sistetur.

Arteriotomia.

Art. 324. „ Verum enimvero mihi videtur auctor noster meras umbras consecrari, ut *Hercules* „ les

Cui commodum adhibeatur ista pra-

vis ; du-
bitatur.

„ les stramineus appareat , novam crepat metho-
„ dum ; sed quomodo stabilitur hæc praxis ? In-
„ ter paucas , quas adducit hoc affectu laboran-
„ tium , historias , unicam tantum per arterioto-
„ miam curati affert ; sed de his non libet mo-
„ rari . Utcunque vero res se habeat , minime
„ futurum videtur (ut recte admonet D. Fre-
„ ind) ut nostri unquam homines huic medici-
„ næ generi assuescant .

Farrago sententiarum.

Inter legendum & ex observatione.

Varias
mortis
causas
detexit
anatomia
defuncto-
rum.

Art. 325. In paroxysmo Apoplectico intumes-
cunt venæ jugulares necnon pulmonum , quæ non
raro rumpuntur in Apoplexia demortuis . In de-
functorum cadaveribus sæpissime repertum est se-
rum viscidum in cerebri ventriculis , aliquando
sanguinis ingens copia in sinibus , aliquando tu-
mores ad pugni magnitudinem juxta conarium in-
ter cerebrum & cerebellum ; talis (observante Dre-
lincurtio) semestri spatio primo cecitatem , dein
surditatem , subinde sensuum omnium abolitionem,
& postremo necem intulit . In cerebro Apoplexia
mortui (inquit Cheselden) observavi universa va-
sa sanguifera plurimum distenta , ventriculos ipsam-
que cerebri substantiam lymphæ supra modum abun-
dantes , & duram meningem magnopere incrassa-
tam , &c. Vomitoria (inquit Dolæus) experientia
teste , quicquid reclamet Sylvius , divinam affe-
runt opem . „ Nullum est potentius remedium vi-
„ no emetico in omni soporoso affectu , dos. ℥i℥.
„ vel ℥ij. per os , ℥iij. vel iv. in enemate . Si in-
„ jecta enemata præter rationem moram faciunt ,
„ sollicitanda est dejectio acribus suppositoriis ,
„ speciatim incidatur frustulum saponis Venet. in
„ formam Glandis . „ Venasectionem in omni A-
poplexia , & in omni ætate , & in summa quidem
sene-

senectute admittimus; timidis, loco hujus, *hirudines* vel *cucurbitulas* concedimus.

Art. 326. *Rhodius* observavit, quod in omnibus affectibus *comatos*, præcipue *lethargo*, & *Apoplexia*, ^{Pulsus fortis sæpe decipit inexpectatos.} pulsus dum ex parvo fiebat magnus, & sensim in magnitudinem crescebat, ægrotantes brevi moriebantur; pulsus etenim in hoc affectu est ut plurimum fortis & plenus, quod multos decipit.

Art. 327. *Apoplexia* demortui ante triduum non sunt sepeliendi, quia omnes humores intra illud ^{Nota bene.} spatium moventur, & nonnulli ante illud tempus revixisse observati sunt. *Barbotte*. Linimentum sequens ut specificum in *lethargo* & *Apoplexia* habetur; ℞. ol. succin. spic. castor. ana ℥ij. flor. hyperic. succ. rut. express. ana ℥iij. m. illinatur cervix, &c. Idem summum & fere unicum remedium in *Apoplexia* sunt *cucurbitæ* capiti impositæ. *Riverius*, *Zacutus Lusitanus*, &c. Cum morbi vis maxima est, admoveatur *cauterium ætiale* inter primam & secundam nuchæ vertebram.

Art. 328. Remedia sequentia interdum pro re ^{Remedia varia.} nata in usum adduci possunt; *antimonium diaphoret.* *antihæcticum poterii*, *aurum fulminans*, *aurum Mosaicum*, *cataplasma suppedale*, *cataplasma de hælecibus*, *elaterium*, *elect. antiapoplecticum*, *emplastr. cephalicum*, *elixir. peon. mynsicht.* *enema acre*, *enema apoplecticum*, *ens veneris*, *flores salis armoniac. mantiati*, *gargarisma ad pituitam*, *infusum cephalicum*, *pil. volat. sternutatoria omnia* (flores *Bezoin.* aliis ptarmicis adjecti illa multo efficaciora reddunt) *pulv. ad guttetam*, *tinctura epileptica*, *vinum benedictum*, &c.

HEMIPLEGIA, PARAPLEGIA, SEU
Paraplexia.*Ettmulleri sententia.**Ratio nominum.*

Art. 329. Paraplegia seu paraplexia & apoplexia particularis, in altero tantum latere hemiplegia nominantur. Interdum afficitur totum corpus, excepto capite, ex obstructione spinalis medullæ; frequentius est morbus *secundarius*, interdum vero *primarius*; sensus vel motus vel alteruterque vel totaliter, abolentur, vel multum imminuuntur.

Paraplegia ab a. apoplexia differt.

Art. 330. Paraplegiæ, quæ *apoplexiam*, *epilepsiam*, aliosque morbos immediate sequuntur, vulgo *paralysis* vocantur, sed *paralysis* est longe alius affectus, ut infra manifestum erit. (332.)

Curatio.

Art. 331. Vomitus in omni paraplexia convenit & purgatio ad primarum viarum emundationem; *venæsectio* convenit in plethoricis; proximo loco *sudorifera* valde conducunt, cum specificis interspersis, decoctum *sassafr.* cum *rore marino* & *bacc. juniperi*; aliquando datur *aurum fulminans* ad gr. iij. vel iv. de reliquis internis medicamentis vide *apoplexiam* & *paralysin*; balnea ex *formicis* revera singulare quid obtinent in *paraplegiis* curandis.

PARALYSIS & PARESIS

*Ettmulleri sententia.**Paralysis & Paresis.*

Art. 332. Paralysis est gravior, & paresis levior affectus; paralysis proprie est resolutio & relaxatio ligamentorum & membranarum motui interservientium, non ab obstructis nervis proveniens, sed a mera membranacearum & nervearum partium resolutione, & sic a *paraplegia* distinguitur, quæ ab obstructione nervorum exoritur; hæc sequitur *apoplexiam*, *epilepsiam*, *convulsiones*, *ver-*
rigi-

rigines, &c. qui affectus in se mutuo sunt permutabiles, & plerumque desinunt in *paraplegiam*; Illa vero sequitur alios morbos longe diversos; viz. *scorbutum*, *malum hypochondriacum*, *colicam*, & frequentior est in regionibus ubi vino & spiritibus indulgent; aut oritur etiam subinde a causis externis, ex fumis metallicis, &c.

Art. 333. Paralysis cæteris paribus facilius curatur quam *paraplegia*, quæ plerumque omnem medici operam eludit; motus saltem amissus, superstitæ sensu restituitur; tremor superveniens est bonum signum recuperandi motum. „ Atrophia „ vero aut frigiditas pessime ominatur. „ *Curatio difficilis.*

Art. 334. Purgatio lenis tantum institui debet cum mercurio dulci & extracto hellebori, specie diatribæ cum rhabarbaro, pil. fœtid. &c. & postea sudorifera, remedia apoplectica, & epileptica, viperina, succinata, lumbricalia, ex milleped. & formicis parata, antimonialia, martialia, bezoardica, aurum diaphoreticum, antiscorbutica, & specifica in sero lactis cocta quando a dolore colico ortum ducit; & externe pro abdomine illinendo galbanetum Paracelsi. Galbanetum Sennerti est præstantius medicamentum. Vid. *Pharm. Batean.* In genere urticatio membri resoluti est maximi usus, expertus loquor. *Thermæ naturales*, balnea ex formicis parata, unguentum martiatum, nervinum, paralyticum, &c. *Curatio.*

Vuillisi sententia.

Art. 335. Paralysis est partium nervosarum a debita distentione resolutio, sive relaxatio; cujus ratione motus & sensus, nempe aut alter tantum, aut simul uterque, in toto corpore, vel in quibusdam partibus, debito more exerceri nequit. *Definitio, paralyseos.*

Art. 336. Mentis hebetudo, oblivio & stupiditas, frequenter in paralytin mutantur. Paralysis aliis affectibus frequentius supervenit, quales præ- *Unde proveniat.*

cipui sunt *carus*, *apoplexia*, *scorbutus*, *convulsio*, *colica*, *arthritis*, &c.

*Difficile
curatur.*

Art. 337. Paralysis ab apoplexia, caro, convulsione, colica, aliisque cerebri, aut systematis nervosi affectibus superveniens, si non brevi tempore in melius alteretur, aut medicamentis cedat, plerumque insanabilis perstat; hominibus provectæ ætatis, cacochymicis, valde scorbuticis, aut intemperatis accidens, etsi affectus haud immanis fuerit, difficile tamen curatur.

Curatio.

Art. 338. Phlebotomia passim non omnibus convenit; & si hanc vetamus, non tamen ob eandem cum veteribus rationem, supponendo paralylin esse morbum frigidum; præmissis universalibus, viz. vomitorio & catharsi, cerevisia medicata parari potest ex *salvia baton. stachad. lign. sassaf. cortic. V. vinter.* &c. Quidam paralytici sunt frigidi, alii calidiores ex constitutione, ideoque remedia debent esse diversi generis, ut in ipso scorbuto evenire solet. Remedia in hoc affectu insigniora sunt *viperina*; pulv. rad. serpent. virgin. gum. guaiac. tinct. succin. sp. C. C. succinat. pulv. ari comp. chalybeata, antiscorbutica omnia, præcipue succi antiscorbutici cum aqua raphan. aurantiis, &c. Externe forus, linimenta, cucurbitula, vesicatoria, urticationes, item immissio membri resoluti in grana hordei post cerevisiam subductam, vel intra ventrem vel thoracem bestie recens mactata, aut denique balneum artificiale vel naturale. His non succurrentibus proveniendum erit ad remedia magna, viz. diaphoretica, salivanta, vomitoria fortiora, &c. sudorifica usitatoria sunt decoctum guaiac. spiritus & oleum ejusdem, mistura simplex, flores & spiritus salis armoniac. aurum diaphoreticum, sal. viper. bezoar. min. tinct. antimon. &c. Nullum datur præstantius remedium quam *therme nostræ Bathonienses*; quosdam tamen deterius reddunt., Pro pauperibus &c., nimis procul a Bathonia degentibus *Thermæ ar-*
tifi.

„ *fificiales* ad imitationem naturalium ad hunc
 „ modum fieri possunt: ℞. *calc. viv. lbiv. sulph.*
 „ *viv. pulv. lbij. coq. paulisper in aq. commun.*
 „ *cong. xx. vel xxx. pro semicupio.*

Inter legendum & ex Observatione.

Art. 339. A spirituum inopia fit paralysis, ut in senectute valetudinaria, post immodica sanguinis, liquoris genitalis, &c. dispendia, e sanguine enim effocto pauci spiritus in cerebro procreantur.

*Causa
paraly-
seos.*

Art. 340. Credibile est papillas cutaneas esse tactus organum, ideoque hic ratio reddi potest, cur superstitite motu sensus potest aboleri, viz. quia motus per nervos fit, sensus per papillas hasce.

*Patibla
cutanea
tactus or-
ganum.*

Art. 341. Ad membra paralytica plurimum valent fomentationes quotidianæ ex formicis & earum cubilibus in aq. font. coct. interdum præsentaneam opem & firmum constansque robur partibus affectis afferunt; eodem tempore usurpetur oleum sequens, ℞. *sem. sinap. parum contus. q. v. sp. lavend. q. s. ut madesiat*; infunde frigide per horas 24. deinde oleum prelo exprimatur, cum quo inunge cervicis vertebrae & spinam dorsi & etiam partes affectas. Nihil potentius est in affectibus paralyticis (inquit *Chesneau* experientia teste) ad discutiendum humorem aliquem in vertebriis lumborum vel in musculis concretum, quam oleum philosophorum, & oleum terebinthinae, quod secundo exit post spiritum aureique est coloris. Si membrum paralyticum extenuetur, vix aut ne vix quidem restituitur.

*Remed-
ium ex
formicis
& ex se-
min. si-
nap.*

Art. 342. D. *Harris* in observationibus de morbis gravioribus asserit terebinthinam e Chio in hoc affectu vires plane admirandas obtinere; atque hunc in modum præscribit, ℞. *tereb. e Chio ℥iij. solve in vitel. ov. immiscendo syr. de stechad. ℥i. aq.*

*Vires te-
rebinthi-
nae e Chio*

lact. alex. ℥iv. m. f. haust. singulis auroris capiend. ad quartam vicem. Addit præterea se dississe *tereb. venet.* ℥vj. vel ℥j. in haust. similiter dissolut. non modo in *paralyfi*, verum & in *arthride*, & in *rheumatism.* cum optimo successu.

Paralyfis Laryngis, Art. 343. Larynx, pharynx, & gula quandoque Paralyfi patiuntur. Paralyfis *laryngis* prohibet deglutitionem liquidorum, non vero solidorum, quoniam epiglottis non perfecte claudet rimulam laryngis. Paralyfis *pharyngis* prohibet deglutitionem solidorum, non vero liquidorum. Paralyfis *gulæ* omnimodam deglutitionem tollit. Interdum deglutitio læditur ex contractura spasmodica gulæ, quod hypocondriacis & scorbuticis est familiare.

Curatio. Art. 344. Epispatica sunt applicanda; antispasmodica & antiparalytica interne & externe usurpanda sunt; gargarismata & linctus in loquela amissa convenientia hic locum habent; speciatim succus *salviæ cum nuc. moscat.* castoreo frequenter & diu in ore detentus. „ Cataplasmate ferquent. in praxi nostra quandoque usus sum; „ ℥. pulp. raparum coct. ℥iv. herb. rut. contus. „ m. ij. sem. sinap. ℥j. pulp. alb. græc. ephorb. „ ℥ij. sulph. viv. ℥ij. ol. succ. gr. 100. ung. nerv. „ vin. q. s. m. f. cataplasma gulæ applicandum.

Paralyfis linguae. Art. 345. In paralyfi linguæ solus succus *salviæ* obmutescentiam solvit; sequente gargarismate felici cum successu in praxi aliquando usus sum; ℥. Fol. *salviæ*, *rorismarin.* ana m. j. hyssop. puleg. ana m. ss. sem. *staphid. agr. sinap.* ana ℥ss. coq. in q. s. aq. font. ad ℥j. Colaturæ add. succ. *salviæ depurat.* ℥ij. oxymel. scillit. aq. reg. Hungar. ana ℥j. syr. *stacbad.* ℥ij. m. teneat coch. ij. in ore aliquamdiu & deinde expuat, idque fiat frequenter in die.

Farrago ſententiarum.

Art. 346. Solent, qui per omnia membra reſoluti ſunt, celeriter rapi; at ſi correpti non ſunt, diutius quidem vivunt, ſed raro tamen ad ſanitatem perveniunt, & plerumque miſerum ſpiritum trahunt, memoria quoque amiſſa. *Celſus.*

Art. 347. Cura huius mali a curatione *luis venereæ* non abludit multum, adeoque *mercurialia*, eſt, ut *sudorifera*, *decoct. e lign.* &c. profunt. Externe *inunſtiones*, *ſpirituosa* & *penetrantia* non in parte affecta, ſed ſpina dorſi; ut *unguentum nervinum*, *martiatum*, *ol. tereb. ſal. volat.* &c. Item maximo cum emolumento ſequens emplaſtrum ſpinæ dorſi admoveretur; ℥. *Empl. de ranis cum quadruplo mercurio*. ʒj. *camphor.* ʒſſ. malaxetur cum *ol. ſuccin.* & fiat emplaſt. *Vvaldschmid.*

Art. 348. Tinctura antiepileptica *Pitcarnii*, in *Tinctura cap. de epilepſia* (385.) tradita purgantibus orba *Pitcarnii* ab authore laudatur.

Art. 349. Virtutes & uſus remediorum ſequentium lector ipſe expendat. *Cataplaſma de rapis*, *cinnabaris antimonii*, *emplaſtrum de pyrethro*, *enema apoplectic.* *enema terebinth.* *fotus ſpirituosus*, *galbanetum Sennerti*, *guttæ Goddardiana*, *infuſum cephalicum*, *linimentum paralyticum*, *oleum lumbricorum* (per diſtillationem mira præſtat) *pulvis ad guttetam*, *ſpiritus ſanguinis*, *succi ſcorbutici*, *tinctura cantharidum*, *tinctura epileptica*, *unguentum ad atrophiam*, *unguentum ſatino-volatile.*

C A T A L E P S I S.

Art. 350. Catalepiſis ſeu catoche, Latinis & Arabibus congelatio dicta, eſt affectus in quo ægri manent rigidi in eodem ſtatu, quo prehenſi fuerunt: interdum tamen nonnihil audiunt, vident, recordantur, & poſt narrant; ſi quid ori ingeratur.

*Raro oc-
currit &
rarissime
curatur.*

tur deglutiunt, impulsus incedunt. Milites in ob-
sidione Metensi hastam in manibus tenuerunt, e-
quites turmam sequebantur, non minus quam
non congelati. Est morbus raro occurrens at sa-
tis acutus, intra 3. aut 4. ad summum dies ju-
gulans; quandoque fit metastasis in epilepsiam,
apoplexiam, vel melancholiam: in genere paucis-
simi restituuntur; nemo liberatur, cui secundo
catochus supervenit.

Ettmulleri sententia.

*Morbi de-
scriptio.*

Art. 351. Catalepsis seu catoche, est affectus ra-
rissimus, & summe mirabilis; in quo cessat omnis
sensus internus, & externus, & motus, ita ut
ægrorum membra rigida sint, & instar statuarum
in sua positura; impulsa tamen moventur, sed ta-
men denuo in ista per motum acquisita figura fixa
permanent. Vulgo pro *ecstaticis* habentur. „ In
„ hoc affectu (inquit *Dolæus*) alvi ac urinæ fit
„ suppressio; respiratio tamen integra & illæsa
„ manet, ut & sanguinis circulatio: ægri vero
„ immoti manent instar *Marpessie caute*.

Curatio.

Art. 352. „ Quoad curam, in genere ab omni-
„ bus practicis tam veteribus quam neotericis
„ hunc morbum ejusdem farinæ medicamentis,
„ quibus *apoplexiam* curari lectori patebit; unde
„ jure merito *apoplexia inversa* nuncupatur. Re-
„ media omnia prosunt, quæ viscidum quodcun-
„ que incidere vel attenuare, & pro ratione oc-
„ casionis evacuare valent; excellunt *salia volati-*
„ *lia*; conveniunt *vomitória antimonialia*, *epi-*
„ *pastica*, *antispasmodica*, *antiparalytica*, &c.

Boerhaavii sententia.

*Causa
proxima.*

Art. 353. Hujus morbi causa proxima est immo-
bilitas sensorii communis, prout primo momento
insultus se habebat. Ergo sanguinis cerebrosi, glan-
dula-

dularum cerebri, emissariorum ejus absoluta est quies, ut in initio. Omnes quidem in eo morbo functiones cerebri læduntur, & illæ, quæ independent; soli muscoli sic manent tensi, ut in initio erant; cæterum respiratio & pulsus supersunt, at plerumque leves. Dissecta cadavera demonstraverunt arterias venasque cerebri valde turgentes fortiter impacto denso cruore; in morte plerumque finitur.

Art. 354. Solvitur interdum *larga narium hæmorrhagia*; ideoque curatio tentatur hæmorrhagiæ ex naribus prolectu hæmorrhoidalis, menstruive fluxus prolectu; sternutatoriis, vomitivis; vesicatoriis; fonticulis (interscapularibus); setaceis; victu humectante. *Curatio*

STUPOR SEU TORPOR, & obdormitio membrorum.

Art. 355. „ Stupor vel torpor in genere est
„ sensus tactus vel motus, vel utriusque imbecil- *Stupor
seu Tor-*
„ litas, quæ quidem plerumque est aliqualis pa- *por.*
„ ralysis scorbutica inchoata; saltem istius morbi
„ plerumque est prodromus. Si plura simul oc-
„ cupet membra *hemiplegiam* aut *apoplexiam* mi-
„ natur. Stupor in facie *torturam oris* porten-
„ dit.

Art. 356. „ Huc quoque pertinet affectus a qui- *Obdormi-*
„ busdam *obdormitio* membri unius vel plurium *tio.*
„ vocatus. Hæc obdormitio videtur esse affectus
„ ex torpore & dolore aliquali simul mixtus,
„ qualis a causa externa plerumque excitatur,
„ compressione scilicet membri vel nervorum in
„ eo, unde influxus spirituum animalium inhibe-
„ tur, qui postea laxatis nervis copiose & subi-
„ to in illud recurrunt, & subitam alterationem
„ faciunt, quam dolor ille vel molestia sequi-
„ tur. „

Art. 357. „ Novi quendam fere sexagenarium, *Historia
singularis*
„ qui

„ qui *colica nervosa diuturna* laborasset, nimi-
 „ rum triginta plus minus annos per menses ali-
 „ quot illum quotannis affligente, in hunc affe-
 „ ctum tandem incidentem silente fere colica aut
 „ saltem leviter ac impotenter dolente, nempe
 „ in stuporem, torporem & obdormitionem bra-
 „ chiorum & crurum, precipueque manuum & tar-
 „ sorum, & musculorum ocularium. Huic impe-
 „ ravi *rhabarb. ℥j. vel ℥ss.* alternis vel tertiis die-
 „ bus hora aliqua antemeridiana masticare; opo-
 „ balsami purissimi. gr. xx. vel xxx. in *sacchar.*
 „ *crystal. instillat.* semel vel bis in die deglutire,
 „ cerevisiam & spiritus ardentis omnimodas pror-
 „ sus interdixi. Porro bis tantum in die victum
 „ capere consului; jentaculum scilicet & coenam
 „ idque ad intervallum novem ad minimum ho-
 „ rarum omisso prandio; Aquam Spadensem in-
 „ ter coenandum ad sitim potare loco cerevisiæ
 „ tenuis, vel aq. commun. atque ex hac me-
 „ thodo, dum hæc scribo, melius se habere vi-
 „ detur. Vires *Pisselæi Indici* nondum exper-
 „ tus est.

T R E M O R.

Ettmulleri sententia.

Tremor. Art. 358. Tremor est malum morbis convulsi-
 vis affine, in quo cum motu naturali & volun-
 tario simul aliquid convulsivi concurrit; est af-
 fectus seipsum oculis prodens. Tremor superve-
 nit animi passionibus gravioribus, speciatim ira-
 cundiæ, & crapulæ, sed hic est *accidentalis &*
transitorius; metalli fossores & metalli fabri su-
 binde tremunt; nimia Venus ad tremorem dis-
 ponit; senio confecti fere semper tremore plus
 minus afficiuntur.

Prognosis. Art. 359. Tremor interdum periculosus est quo-
 niam facile degenerat in alios graviores affectus
 nervinos, in *paralysin, apoplexiam, lethargum,*
spas-

spasmus, &c. in senibus est incurabilis. Tremor qui supervenit mulieribus post partum ex retentis quibuscunque in utero est periculosus affectus; subinde enim *epilepsias* lethales infert.

Art. 360. Tremori succurrunt omnia ea, quæ in *paralyticis apoplecticis & convulsivis* morbis conveniunt, & quæ *nervina* dicuntur, privatim *cerevisia salviata*, proximo loco *stachas Arabica*, *rosmarinus*, *melissa*, *majorana*, *radix* & *semen* *paon. bacc. juniperi*, *rob. ejusdem*, decoctum & *lignis*, *aromata*, *castoreum*, *stercus pavonis*, *cinnabarini*, &c. Quoad externa eadem sunt ac in *convulsione tonica*, quibus addi potest usus *thermarum* (*psychrolusia*.)

CONVULSIO.

Art. 361. Convulsio sive contractura est nervo *Convul-*
rum musculorumque versus suam originem, in- *sio, ejusq;*
voluntaria & perpetua retractio, & ita distingui- *divisio.*
tur a *motibus convulsivis*, qui suas habent inter-
polationes: Estque vel *universalis*, *tetanus* di-
ctus, qui dividitur in *emprosthotonum & episthoton-*
um; vel *particularis*, quæ membrum quoddam
vel articulum privatim respicit, hujus speciei est
spasmus cynicus.

Schmitzii sententia.

Art. 362. *Spasmus cynicus*, qui est distortio *Spasmus*
utrumque latus oris obsidens (sin vero alteru- *cynicus.*
trum tantum latus convellatur, *tortura oris* dici-
tur. *Etmuller.*) a rictus canum ira percitorum *Tortura*
& ad mordendum sese comparantium similitudi- *oris.*
ne appellatur. Ex se turpe est malum & diffici-
le curatu, exitialium morborum, ut *apoplexie*,
aut *epilepsie*, non raro est prodromus. *Ligatura*,
qua, tanquam capistro, facies ad figuram natu-
ralem reducatur. *Medicamenta antiparalytica & Curatio.*

antispasmodica sunt usurpanda. ;, Pro homine
 ;, quodam octogenario sequens linimentum præ-
 ;, scripsi ; non neglectis interim appropriatis in-
 ;, ternis , quorum nunc oblitus sum ; & præter
 ;, spem omnem curatus est. ℞. sapon. Venet. ℥ij.
 ;, camphor. ℥ij. ol. mac. per express. aq. regin. Hun-
 ;, gar. ana ℥ss. sp. sal. armoniac. gr. xxx. ol. ju-
 ;, nip. gr. xl. ol. castor. ℥ss. misce. ;,

Cælii Aureliani sententia.

*Aurelia-
 ni descri-
 ptio.*

Art. 363. Interdum buccas adducit in postero-
 rem partem tanquam ridentibus ; nunc palpebras
 & nares collum etiam atque humeros rapit , &
 ita patientes facit commoveri tanquam onus hu-
 meris bajulantes transferendi ponderis causa (sed
 hæc species videtur esse *emprosthotonus*.)

Aliunde.

Curatio.

Art. 364. ;, In hujusmodi spasmis particulari-
 ;, bus post *evacuationes* (si indicentur) factas ,
 ;, exhibenda sunt remedia *antiscorbutica*, & *an-*
 ;, *tispasmodica* : Inter hæc eminent expressiones
 ;, *millepedum*, *castoreum*, *elixir pæoniae* & deco-
 ;, ctum *guaiaci*, & ultimo ad *topica* deveniendum
 ;, est ; pars affecta, in artuum *contracturis*, si fie-
 ;, ri possit, in *intima bovis* aut *vervecis* recens cæ-
 ;, si immittatur, & ibi tamdiu detineatur, quam-
 ;, diu animal calet ; commendantur balnea præ-
 ;, cipue *sulphurea*, & *balsamum galbani terebin-*
 ;, *thinat. a Sennerto*.

Ettmulleri sententia.

*Convul-
 so tonica.*

Art. 365. *Convulsio tonica* est convulsio pro-
 prie dicta, viz. quando pars convulsa rigida ma-
 net, ac metus est ne omnino contracta perma-
 neat. In *India orientali* epidemicum malum est

varii generis convulsio, de quo eleganter scribit *Bontius*.

Art. 366. Inter universalia *clysmata* sunt val- *Curatio*,
de proficua; remedia interna sunt *carminativa*,
cephalica, *antiepilectica*, in pertinaciori malo de-
coctum e *lignis*: Externe *linimenta spiritosa* &
penetrantia, speciatim *lumbrici vivi* applicati, ol.
& *sp. lumbricorum camphorato* ol. *succin. cum pe-*
trrol. galbanetum Paracelsi cum ol. *euphorb.* ol. *te-*
rebinth.

Aliunde.

Art. 367. Spasmi sive motus convulsivi sunt *Spasmi sive*
contractiones musculorum non constantes, sed *ve motus*
cum interjecta aliqua quiete alternatim cessantes *convulsi-*
& celeriter redeunt ab involuntario & irregu- *vi.*
lari spirituum animalium influxu. Tales cernun-
tur in *epilepsia*, in *passionibus hystericis* & *hypo-*
chondriacis, aliquando in *scorbuto*, in *febris ma-*
lignis male judicatis, in *capitis vulneribus* & *con-*
tusionibus gravioribus, &c. sed hi affectus seorsim
tractantur. Motus convulsivi sive spasmi ab ata-
xia spirituum in summitatibus vel originibus ner-
vorum inordinate descendendum oriuntur. *Tensio*
convulsiva solidarum partium est una ex primariis
causis, quæ *aquilbrium* destruunt inter solidas &
fluidas. Jour. des Scav.

Art. 368. Lethalis evadit convulsio ex eo solum, *Unde le-*
quod suffocationem inducat convulsis musculis res- *thales.*
pirationi dicatis.

S I N G U L T U S.

Etmulleri sententia.

Art. 369. Singultus est motus diaphragmatis *Singultus*
convulsivus. *Sternutatio* singultui superveniens il-
lum solvit, quoniam est motus spasmodicus ei
contrarius. Interdum est malum diuturnum per
plures dies, menses, annos, affligens; aliquando
pe-

penitus incurabilis, in quo casu occultum quoddam conformationis vitium, os ventriculi aut diaphragma, aut nervos afficiens, fere subesse solet.

Cura.

Art. 370. Quoad curam (est morbus primarius vel secundarius, si posterior habenda est ratio morbi a quo pendet, in genere antispasmodica & stomachica sunt adhibenda) Laudanum cum cardiacis, zinzib. condit. stomachica, carminativa, præmissio vomitorio, vel purgatione cum calomel. &c. Externe cataplasma ad singultum Mynsicht. quod componitur ex fermento aceti cum pulv. ment. & aliis aromat. cum ol. castor. &c. malaxat. Quidam cum spongia aut pape calido applicant ventriculo fotum humidum factum ex aceto cum castoreo, pipere & sinapi cocto. Interne pelliculæ internæ ventriculi gallinæ exsiccatae & pulverisatæ. Ubi pertinacior perdurat (in morbo primario) ad septimanas aliquot in corpore robusto semper provocandus est vomitus.

*Spiritus
eruginis.*

Art. 371. Virgo hoc morbo laborans per longum tempus post permulta remedia incassum tentata, solo spiritu eruginis ab empirico exhibito curata fuit. Bonetus.

*Remedia
varia.*

Art. 372. Eruditus medicus usum remediorum sequentium probe calleat, aurum Mosaicum, cataplasma stomach. fotus spirituosus, fotus stomachicus. Et præ reliquis julap. moscatum, quo nondum hætenus novi præstantius remedium (inquit Fuller.) aliquando enim divinitus succurrit, & singultum superat. Hanc veritatem testatur praxis nostra. Diascordium larga dosi ad ℥ij. in febribus, Sydenham. (imo ad ℥iij. dari potest.)

STERNUTATIO.

Sternutatio.

Art. 373. Sternutatio est motus convulsivus musculorum expirationi inservientium & diaphragmatis; nobis invitis accidit plerumque ex acrimonia

nia humoris e glandulis narium sponte erumpente; vel ptarmicis excitatur; immo aliquando ab aere frigido vel radius solaribus.

Art. 374. Sternutatio nimia est morbus de genere *convulsivorum*; ideoque in genere eandem curam postulat; *lenientia & mucilaginosae* naribus attrahenda sunt; eandem fere curam admittit, ac singultus. (370.) *Cura.*

E P I L E P S I A.

Ermulleri sententia.

Art. 375. Paroxyismi epileptici sunt motus *convulsivi*, in quibus universum corpus, aut plura membra diversimode contrahuntur, vibrantur, aut agitantur. Tres sunt gradus hujus affectus; *Tres sunt gradus.* primus parum differt a tertio gradu *vertiginis* (303.) In secundo gradu adsunt agitationes & gesticulationes variae, sensibus externis ac internis perstantibus, aut in delirium abreptis, saltant, canunt, rident, flent, ridicula narrant, vociferant, pectora percutiunt; post paroxysmum interdum omnium recordantur, interdum nihil sciunt. In tertio gradu omnis tam sensus quam rationis usus perit, ad humum prosteruntur, dentibus strident, corpus insigniter attollunt, spuma per os ejicitur, labia & linguam mordent, &c. quibus remittentibus aegri tanquam sopore oppressi jacent, ad se redeuntēs nihil horum sciunt, tantum de torpore, & gravedine quadam capitis, & artuum lassitudine conqueruntur; qui secundo gradu laborant, vulgo *pro obsessis a demone* habentur. *Epilepsia.*

Art. 376. Imprimis *lunae motibus* auscultat epilepsia, maxime ea quae est *per essentiam*. Epilepsia *habitualis* interdum sine periculo vitae ad plures annos durat, utut saepius recurrens aegros plus minus paralyticos, delirantes, aut stupidos reddat. In junioribus aliquando circa pubertatem terminatur. *Prognosis.*

na-

natur, post 25um annum superveniens fere usque ad mortem durat, teste Hippocrate, sed hoc non est omnino verum. In junioribus spes est circa pubertatis tempus.

Curatio. Art. 377. Cura inchoanda est cum vomitorio, maxime si morbus sit per consensum, mercurius dulcis permiscendus est cum purgantibus, quæ etiam debent esse mitiora; laudantur absorbentia, martialia, acidula, decoct. e lignis, fonticuli; si venæsectio celebretur, sit in talo. Inter specifica antiepileptica numerantur sequentia, Radix pæon. mar. flor. lilior. convall. tiliæ, sem. rutæ, viscus quercinum, vel potius corylinum, lignum buxi, sp. cerasf. nigr. aq. epileptic. Langii sp. sang. human. secundin. human. cranium humanum, dens hippopotami, castoreum, stercus pavonis, camphora, & ol. succini.

Quid agendum in paroxysmo.

Art. 378. Ad excitandum ægrum e paroxysmo infletur fumus nicotianæ (vel avium pennarum) in faucibus; suffitus succini etiam multum confert; conveniunt ligaturæ communicationem spasmodicam inhibentes, si, scilicet, ab extremitatibus convulsiones inchoentur.

Vuillisi sententia.

Paroxysmi descriptio.

Art. 379. Insultus epilepticus universalis ac immanior tantum convulsio esse videtur, cujus accessio ut plurimum ex improvise aggreditur, ægroque nihil tale cogitantes opprimit, atque ictu oculi citius, sensu & intellectu orbos, in terram præcipitat; quippe non tam cadunt, quam cum impetu quodam prosternuntur; prostratis supervenit stridor dentium cum spuma oris, sæpe etiam capitis concussio; brachia & crura, necnon cervix & dorsum, aut statim rigida fiunt, aut variis flexionibus distorquentur; plerisque præcordia & hypochondria & venter intumescunt, post aliquod tempus ad se redeunt, superstiti dolore capitis & hebetudine.

Art.

Art. 380. Est morbus curationis difficillimæ, *Curatio* aliquando tamen medicamentorum ope profligatur, aliquando sua sponte terminatur, viz. circa pubertatis tempus, aliter in mortem desinit, vel in alium morbum commutatur, scilicet, *paraly- sin, stupiditatem, aut melancholiam* (incurabilia.) *Alphonsus Ferrius* plurimos epilepticos simplici *guaiac.* decocto bis in die ad ℥vj. vel viij. præscripto ejusque decocto secundo vice potus ordinarii (prout in *lue venerea* assolet) assumpto securasse affirmat: si tali decocto *radix pæon. alia- que specifica* addita fuerint, forsan efficacius esset remedium.

Chesneavii sententia.

Art. 381. Quod palpitatio est cordi, talis omnino est Epilepsia cerebro; nam cum in eodem *Nota bene.* usus habeat utrumque principium suam *systolem & diastolem*, harum ratione, ambo ab iisdem causis, simili symptomate affici par est. Ideo Epilepsia, sive tanquam morbus sive tanquam symptoma spectetur, dicenda est cerebri, aut alterius cujusque partis alteratio, quæ apta nata sit gignendæ materiæ, ichoris, aut vaporis simili, qualitatibus cerebro proprietate specifica infensis, cujus occursu totum concutitur motu *palpitationis* simili cum læsione functionum, nervosa in consensum trahens, quæ suo modo etiam *palpitant* (quemadmodum *arteriæ palpitante corde*) quousque cerebrum noxia excusserit.

Art. 382. Non possum probare, quod omnes *Coertio membro- rum.* fere consulunt, *membra scilicet coercenda esse tem- pore paroxysmi*, existimantes ex illa convulsivi motus cohibitione levare musculos; sed tantum abest: cum enim cohibitio hæc sit violenta, impediaturque musculi contractionem ad terminum suum pervenire: quo longius est ab illo, eo major fit fibrarum musculi contentio.

Barbetti sententia.

Ratio habenda est causa, unde oriatur *Art. 383.* Si Epilepsia oriatur ex cerebri *idiopathia* semper adest gravitas, & atrox dolor capitis, item sensuum debilitas, stupor, faciei pallor, & insomnia turbulenta; si ex *sympathia* ventriculi, ii in præcordiis & circa orificium ventriculi dolorem, corrosionem vel distentionem sentiunt, præsertim jejuni, & difficillime inediam tolerant; paroxysmum semper antecedunt nausea, dolor & palpitatio cordis animique deliquium; solvitur autem paroxysmus cum vomitu biliosorum aut pituitosorum acidorumve humorum: Si ex *utero*, circa lumbos & pubem dolores, & simul capitis acerbi cruciatus percipiuntur.

Curatio. *Art. 384.* In hoc morbo curando omnibus fere antecellunt *flores salis armoniaci & ejusdem spiritus*, qui est valde volatilis & penetrantissimus, item prodest *cinnab. nativ.* præmissis universalibus haustus sequens bis in die exhibitus puellam ab hoc malo liberavit; ℥. *Sapon. Hispan. albiss.* ʒss. coque ex lact. *vaccin.* ʒiij. bibatur tepide.

Pitcarnii sententia.

Pitcarnii tinctura. *Art. 385.* In Epilepsia vel paralyssi post vomitum repetitum & vesicantia, detur tinctura antiepileptica sequens (junioribus vero exhiberi debet *mercurius* & jusculum cum *lumbricis terrestribus*) ℥. *Rad. valerian. sylv. dictamn. alb. ana* ʒvj. *castor. sterc. columb. ana* ʒss. *visc. quercin.* ʒvj. *cinnam. sumit. rorismarin. ana* ʒss. *fol. sen.* ʒij. *jalap. turpeth. ana* ʒss. Infunde frigide per dies x. in vin. alb. Gallic. ℥viiij. colaturæ add. pulv. *cran. humani ungu. alcis ana* ʒij. *sacchar.* ʒiv. cui immisce rite ol. *succin.* ʒiv. & spir. *castor.* ʒij. dos. ʒiv. Expedit hanc tincturam purgantibus orbam exhibere in paralyticis declinante mor-

morbo; expedit etiam ægros, post membra affecta ad ignem liberaliter & strenue perfrieta, aquis frigidis immergere.

Harrisii sententia.

Art. 386. ℥. Lumbric. terrest. preparat. ℥j. *Pulvis*
 cran. human. preparat. ℥ij. cardamom. min. ℥ij. m. *specificus.*
 f. pulv. in chart. xij. distribuend. sumebat Epileptica unam bis in die in coch. julap. cephalic. sequent. superbibebatque ejusdem coch. iij. ℥. Aq. ceras. nigror. flor. tilia ana ℥ss. pæon. comp. ℥ij. tinctur. castor. ℥ij. syr. pæon. comp. ℥ij. m. f. julap. sed quia tantam pulveris nauseabundi quantitatem ventriculus fastidiebat, paulo post sing. doses elix. propriet. dulc. gutt. xxx. sacchar. tantillo instillat. insuper mox deglutiebat: atque hac methodo curata est puella Epileptica postquam plurima alia incassum tentata.

Farrago sententiarum.

Art. 387. Epilepticus, remediis aliis minus proficientibus, *super mare naviget ad nauseam & vomitum excitandum*, idque aliquoties repetat; & deinde deambulet, horis tribus quatuorve, quotidie, per integram septimanam, vel diutius, in *sulco immediate post aratrum humum versans*, in *agello annis aliquot feriato*. Dicit aliquis authorem pro certo insomniis ludificari; quanquam hoc credat, experiri licet, nec fortasse facti poeniteat.

Art. 388. Ultra omnia ad morbum caducum curandum, & penitus eradicandum valet *dieta lactea* ab aliis quibuscunque obsoniis & potulentis omnino abstinentibus; ut ex insigni historia *Medici, Noviomagi* non multo pridem degentis, isto modo curati docemur. Vid. *Cheynei Tractat. de Arthritide*, p. 103. &c.

Remedia
varia.

Alia me-
dicamen-
ta.

Viscus Ar-
borus.

Art. 389. Causa proxima omnis Epilepsiæ ex-
quisitæ semper est nimia cerebri in nervos moto-
rios, nulla in sentientes actio. *Boerhaave*. *Me-
lancholici* fiunt aliquando Epileptici & contra,
Epilepsia (inquit *Hippocrates*) pituitosis quidem
contingit, minime vero biliosis. *Crato cinnabarim
nativam* tanquam Epilepsiæ magnetem commen-
dat, hoc modo exhibitam; ℞. *Cinnab. nativ. opt.
subtilissime trit. ʒss. coral. rub. preparat. margar.
prepar. ana ʒij. croc. opt. ʒj. sol. auri No. xv. f.
pulv. subtilissimus, dos. ʒj. cum julap. cephalic.
succus rutæ* multum laudatur ad epilepsiam; id-
eoque ejusdem extractum iisdem pollet viribus,
& commodius sumi potest. Electuarium Peru-
vianum Epilepticum *Fulleri* est præstantissimum
& certissimum Anti-epilepticum, uti experientia
me docuit (inquit *Fuller.*) Post debitas evacua-
tiones adultis dosis sit ʒj. mane & vespere per 3.
vel 4. menses & postea per triduum vel quadri-
duum ante novilunium & plenilunium. Morbos
Epilepticos, hystericos, & choream sancti Viti pe-
nitus eradicat. In morbis hujusmodi convulsivis
ægroris prædictum electuarium frequenter exhibui
& (libenter agnosco) raro frustrata fuit spes
mea. Eximiae vires radicis *valerianæ sylvestris* a
Fabio Columna prædicatæ, & a *Riverio* memora-
tæ, experientia *M. Marchant* denuo confirmatæ
sunt. *Memoir. de l'Acad. Vol. x. p. 430.* Cortex
Peruvianus (inquit *Colebatch* in *Dissertatione de*
Visco) non certius feбри intermittenti, quam vi-
scus arboreus Epilepsiæ, choreæ Sancti Viti, &
morbis universis convulsivis, etiam asthmaticon-
vulsivo (& si huic, tussi convulsivæ) medetur.
Dosis in substantia adultis ad ʒss. vel ultra forma
boli sexta quaque hora superbibendo haust. infus.
fortis ejusdem plantæ. Si singulis unciiis pulveris
visci addatur drachma *asæ fetidæ*, medicamentum
efficacius evadet. „ Operæ pretium esset procul
„ dubio, vires humoris mucilaginosi baccharum in
„ his

his affectibus tentare: Valde enim probabile est vim eandem, si non superiorem eo inesse; & forsan esset medicamentum minus nauseabundum. Præter jam dicta medicamenta sequentia etiam quandoque præscribentis intentioni quadrare possunt, viz. *aurum fulminans, aurum Mosaic. pulvis ad guttetam, sp. C. C. succinat. elect. cephalic. elect. epileptic. tinctur. epileptic. & infusum cephalic. Fulleri. Elect. epileptic. & emulsio pæon. Batean. &c.*

CHOREA SANCTI VITI.

Art. 390. Chorea sancti Viti a sacello sancti Viti nomen accepit, quo loco verno tempore juvenes utriusque sexus saltandi gratia convenire solebant & saltare more enthusiastico; atque ibidem interdum hoc morbo correpti erant. *Chorea S. Viti.*

Sydenhami sententiâ.

Art. 391. Chorea sancti Viti est convulsionis quædam species; pueros puellasve a decimo ætatis anno ad pubertatem invadit, prodit se claudicatione, vel instabilitate alterutrius cruris, quod æger post se trahit fatuorum more; manum ejusdem lateris, vel pectori vel alii alicui parti applicatam nequit continere in eodem situ horæ momento, sed in alium situm & locum convulsione distorquebitur, quicquid æger contra nitatur. Antequam poculum ad os possit adducere, mille gesticationes, circulatorum instar, exhibebit: non enim recta linea ori admoveret, sed deducta a spasmo manu, huc illuc aliquamdiu versat, donec tandem forte fortuna labris propius apponens liquorem de repente in os injicit, & avide haurit, dedita tanquam opera, ut spectantibus risum moveret. *Ejusdem descriptio*

Art. 392. Ad curam rite instituendam vena est Cura.

Secunda, & posttridie exhibe *portionem purgativam communem*, & vesperti haust. *paregoric.* postea sanguis iterum extrahatur, & ad *catharsin*, uti prius, æger revertatur, & ad tertiam, quartamve vicem si vires ferant; diebus purgatione vacuis sequentia exhibeantur; ℞. *Conserv. absynth. Rom. flaved. aurant. ana ℥j. anthos ℥ss. theriac. Androm. vet. nuc. moscat. condit. ana ℥iij. zinzib. condit. ℥j. syr. e succo citr. q. s. f. elect. de quo capiat quant. NM.* mane & hora 5. pomerid. superbibendo vin. sequent. *coch. v. ℥. rad. peon. enul. campan. imperator. angelic. ana ℥j. fol. rut. salv. beton. chamædr. marrhub. alb. summit. centaaur. min. ana m. j. bacc. junip. ℥vj. cort. aurant. ij.* infunde frigide in vin. canarin. ℥vj. coletur usus tempore. ℞. *Aq. rut. ℥iv. epileptic. Langii, brion. comp. ana ℥j. syr. peon. ℥vj. m. f. julap. cap. coch. iv. sing. nocte hora decubitus instillando spiritus C. C. gr. viij. applicetur plantis pedum emplast. e caranna.*

Adrecidivam præcavendam

Art. 393. Ob recidivæ metum pertundenda est vena, & purgandus æger aliquoties ea ipsa anni sequentis tempestate (vel paulo ante) qua morbus invasit.

Curatio singularis

Art. 394. „ Ipse vidi puellas duas hoc morbo „ affectas diutius saltitantes, tanquam lyra agitata- „ tas, cum mentis quadam alienatione pro tem- „ pore; has curavi cum *expressione millepedum* & „ *cortice Peruviano*, præmissis *venæsectione* & *le- „ ni cathartico*. Exemplum hujus affectus singu- „ lare habet *Solenander, consil. med. p. 310. Ele- „ ctuarium Peru. epileptic. Fulleri* vim habet egre- „ giam ad hunc morbum domandum. Pater præ- „ dictarum puellarum, qui clericus erat, filias „ suas *incantamentis, vel veneficarum malis ar- „ tibus* revera affici persuasum habuit, nec ab ista „ opinione abduci potuit. Rem vero longe aliter „ se habere ex eventu luculenter patuit; antedi- „ cta enim remedia *obsessionem* istam protinus

com-

CAP. III. *Fascinatio, Hypochondriaca, &c.* 151
„ comminuerunt, quæ precibus & lacrymis res-
„ puerat obtemperare,

F A S C I N A T I O.

Art. 395. De Fascinatione in praxi mea nihil
„ experientia didici, quodcunque & quotcunque
„ de ea vulgo perhibentur; neque credo ullos mor-
„ bos a veneficiis suscitari: ideoque de medica-
„ mentis & curatione eorum sollicitum esse non
„ est necessarium. In prodigiosis vero quibusdam
„ morbis, symptomatum inusitatorum caterva sti-
„ patis, medicamenta *vermifuga*, item illa, quæ
„ *epilepsia vel suffocationi uteri* medentur, vel *fla-*
„ *rus discutientia*, utpote etiam quæ naturaliter
„ repugnant dispositionibus illis in corpore, qui-
„ bus diabolus ad præstigias suas abuti possit, (uti
„ credunt Theologi) semper locum habent,

*Fascina-
tio,*

Curatio.

HYPOCHONDRIACA & HYSTERICA affectio.

Sydenhami sententia.

Art. 396. Hypochondriaca & hysterica affectio
est morbus frequentissimus; paucissimæ quidem
fœminæ vel viri sedentarii ab illo penitus immu-
nes sunt; symptomata aliorum pæne omnium
morborum æmulatur; quamcunque enim corpo-
ris partem infederit, symptomata qualia ei par-
ti competunt, statim producit. In capite *apople-*
xiam facit, quæ similiter hemiplegia solvitur.
Spasmos horrendos gignit *epilepsia* similes, paro-
xysmum hystericum proprie dictum faciens, vul-
go *uteri strangulatum*. *Cephalalgiam* intolerabi-
lem excitat, *clavus hystericus* nominatur, dolo-
rem transverso pollice possis contegere. *Palpitatio-*
nem cordis præcipue *chlorosi* laborantibus conci-
tat. Aliquando (sed rarius) pulmones obsidet, &
tussim excitat fere continuam sine expectoratione.

*Hypo-
chondria-
ca & hy-
sterica af-
fectio.*

Dolores colicos & iliacam passionem nonnunquam æmulatur, & interdum *ictero* paroxysmus solvitur; hoc genus in foeminis laxiori corporis habitu præditis locum habet; de salute plerumque desperant. Paroxysmum *nephriticum* aliquando mentitur. In ventriculo vomitum, in intestinis diarrhæam efficit, sine dolore tamen. Partes externas non raro occupat dolore; præcipue in dorso, & aliquando tumore maxime in cruribus & tibiis; tumores ab *Hydropicis* discriminantur, in eo quod majores sint tempore matutino, & vestigium digiti impressi non retineant. *Dentes* etiam interdum afficit. Dolorem in dorso certo certius persentiscunt, quotquot hoc affectu tanguntur. Externarum partium refrigeratio his omnibus quasi viam sternit, & plerumque non nisi finito paroxysmo dispellitur. Adsunt in fere omnibus spirituum dejectiones & subsidentia, risus & lacrymæ sine ulla προφάσει. Et postremo (quod tristissimum est) magis animo ægrotant quam corpore hoc modo afflicti. Urina limpida & magna quantitate excernitur, quod signum est *pathognomonicum*. Ptyalismus nonnunquam eo gradu laborantes afficit, ut mercurio delibutos facile crederes. *Flatus nidorosos*, nunc *acidos* eructant, atrocissima *animi pathemata* in sinu foveant.

Causæ.

Art. 397. Causæ *procatarticae* sunt vel vehementiores corporis motus, vel etiam multo sæpius violentæ quædam *animi commotiones* a repentino aliquo sive iræ, sive doloris, & similium passionum insultu. Causa efficiens est *ἀραξία* spirituum animalium. „ Secundum mentem quorundam pathemata, vapores vulgo dicta alterutro, „ tanquam causa immediata, fundamento niti, „ viz. nimis titillante, vel molestiore quadam ineffabili sensatione præter modum partes illinc „ irritante, vel hinc vellicante; unde secretionem „ evadunt valde impares & male comparatæ. „

*Indicatio
curativa.*

Art. 398. Præcipua indicatio curativa sanguinis

nis corroboracionem indigitat; ideoque post debitas *evacuaciones* (ubi indicantur) *chalybeatis*, *amaris*, *corroborantibus* & *volatilibus* cura perficienda est. Chalybeata foeminis quandoque magnas tum animi tum corporis perturbationes inducunt; in hoc casu exhibe *laudan. liquid. guttas aliquot* sing. nocte in *aq. aliqua hysterica*. *Aquæ minerales* omnes chalybis præparationes longe superant. *Limaturæ ferri crudæ* in robustis corporibus cum majori fructu exhibentur, quam quævis præparatio. Aqua communis imprægnata *ferreis clavis* & *calceis equinis*, &c. medicamentosa evadit æque ac *aqua minerales*. Inter bibendum *aquas ferreas*, si aliquod symptoma gravius acciderit, quod potationi aquarum referri potest, tunc ab iis abstinendum, donec symptoma istud evanuerit: in earum usu ad sex septimanas ad minimum perseverandum est; *zingiber conditum*, & *semina carui saccharata* ad ventriculum calefaciendum sunt subinde sumenda, dum *aquas* bibunt. *Tberiaca Andromach.* & *vinum Hispanicum* multum laudantur. *Cortex Peruvianus* in hoc morbo eximias vires obtinet, præsertim foeminis, quæ spasmodicis afficiuntur, ut & *diata lactea* in *colica hysterica*. *Equitatio* usus est eximii. In paroxysmo ad foetida confugiendum est, quæ spiritus in ordines compellunt; quæcunque foetent huic intentioni inserviunt. In doloribus vehementioribus, vomitionibus, & diarrhœis ad laudanum tanquam ad sacram anchoram confugiendum est.

Vvillisii sententia.

Art. 399. Hystericæ affectionis signa sunt motus in imo ventre, ibidemque velut globi cujusdam ascensus, dein rugitus, aut vomendi nixus, hypochondriorum distentio & murmur cum flatuum eructatione, respiratio inæqualis ac ut plurimum impedita, præfocatio in gutture, vertigo,

Paroxysmi hysterici descriptio

go, oculorum inversio aut rotatio, sæpe risus aut fletus, fabulatio absurda, quandoque *ἀσωνία* & *ἀνιμωία* cum pulsu obscuro aut nullo & aspectu cada-veroso, interdum motus convulsivi in facie & artubus, & nonnunquam in toto corpore.

Sympto-
mata in
viris.

Art. 400. Symptomata hujus morbi in viris sunt, quæ sequuntur, cardialgia, flatuum ingens proventus, rugitus ac crebra vomitio, in sinistro hypochondrio distentio, ac subtus *ventriculum* pulsatio immanis sentitur, borborygmi & murmura. In *thorace* constrictio & angustia, respiratio difficilis, cordis tremor & palpitatio, spirituum deliquia. In *capite* dolores atrocissimi, scotomiæ, vertigines, vigiliæ pertinaces, cogitationum æstus & fluctuatio, animi incertitudo, phantasia perturbata, rei cujusque formido & suspicio, morborum, quibus immunes sunt, possessio imaginaria, melancholia & mania, dolores vagi, spasmi, stupores, sudores nocturni, febres erraticæ, &c. sputatio fere continua. *Highborus* supponit præcipuam hujus morbi causam esse in vitiosa ventriculi constitutione.

Curatio.

Art. 401. Ad therapiam quod attinet, quoniam quamplurima symptomata sunt *convulsiva*, ideo constat remedia *antispasmodica* potissimum indicari. In paroxysmo *fætida* interne atque externe valde profunt; nonnullis convenit in medio paroxysmo *aq. frigida* haustum, in qua *camphora* deflagavit, propinare. Extra paroxysmum *evacuationibus* necessariis factis, medicamenta vulgo *digestiva*, quæ ventriculi tonum ac fermentum spectant, locum habent; talia sunt *tinctura sacra*, *elixir propriet.* *pulv. ari comp.* *sal. absynth.* *cremor. tartar. vitriolat. vitriolum Martis*, &c.
,, Inter digestiva & chalybeata pro certo eminent
,, virtutes *entis Veneris*; utcunque tamen an sit
,, revera *anodynum*, ut a quibusdam perhibetur,
,, dubius hæreo; nondum enim satis compertum
,, habui. ,, Externe *fotus stomachici*; postremo
ex

ex medicamentis *chalybeatis* maximum juvamen sperandum est. Potus assiduus *coffee* aut *theæ* paratus nonnullis emolumento fuit; *acidula* fere semper cum fructu sumuntur. *Pil. nostr. hyster.* in paroxysmo & extra; ℞. *Fæcul. brion. asæ fætid. castor. ana* ℥j. *sal. coral. succin. Jovis ana* ℥ss. *galban. in aq. bryon. comp. solut. q. s. f. massa.*

Purcellii sententia.

Art. 402. *Hysterica passio* (inquit *Galenus*) *Hic affectus est morborum legic.* unum quidem est nomen, varia tamen & innumera accidentia sub se comprehendit. Inter alia symptomata hoc morbo occurrentia perquam notabilis est sensus *frigoris*, quem percipiunt ægræ per dorsum assurgentem & mox per universum corpus diffusum; sequitur *cephalalgia*, & nonnunquam cordis palpitatio, & animi deliquium, & deinde brevi sensim ad se redeunt: in aliis præterlapso frigore succedit insignis calor, qui pleraque symptomata antedicta cum aliquot novis accersit; interdum in initio paroxysmi frigus est vix perceptibile, & tunc symptomata graviora non nisi post accessum caloris tragœdiam agunt. Propter diaphragmatis & musculorum respiratori inservientium violentum ac perpetuum spasmus foeminæ hystericæ quandoque diutissime procumbunt instar mortuarum sine (sensibili) respiratione, immo interdum per integrum diem & diutius. Probe animadvertendum est hunc morbum ire & redire, & suos habere paroxysmos, etiamsi non certis ac statis periodis recurrentes, sicut febrium intermittentium.

Art. 403. Causa primaria hujus affectus sunt *Causæ.* *cruditates & coctiones vitiosæ*, quæ plerumque ante adventum paroxysmi in ventriculo gravedinem ac perturbationem, in intestinis murmura ac borborygmos pariunt, unde producitur spirituum

tuum *ἀταξία*, quæ est causa proxima reliquorum symptomatum; causæ remotiores ex errore aliquo circa sex res non naturales suboriuntur.

*Methodus
therapen-
tica.*

Art. 404. Ad theriapiam rite instituendam accurate distinguendum est medico de constitutione patientis, an sit sanguinea & biliosa, vel pituitosa ac melancholica, & etiam de cruditatis peculiari genio, utrum sanguinis crasin nimis viscidam & glutinosam reddit, aut nimis laxam & ebullitionibus proclivem. Affectionum Hystericarum cura huic fundamento maxime innititur: ex his etenim inter se plane discrepantibus oriuntur indicationes longe a se invicem diversæ. Sensatio frigoris in dorso, item pulsus debilis & tardus sanguinis lentorem arguunt: pulsus celerior, calor ingens frigus excipiens, odor moschi, zibeth, ambrae, paroxysmum accersens, &c. statum sanguinis esse laxiorem & fermentiscibilem indicant.

Curatio.

Art. 405. E paroxysmo excitandæ sunt, naribus volatilia & fætida admovendo, plantas pedum titillando (experimentum est *Dolæi*) & in graviore casu apoplectico scilicet, punctiõibus, scarificationibus, vesicantibus, ustionibus, sargine calefacta, &c. sunt suscitandæ. Iis, quarum sanguis est viscosus & nimis tenax, convenit venesectio, & postridie vel die sequenti emeticum, vel, si minus congruum judicatur, catharticum; his ita præmissis, ad attenuantia & aperitiva accedendum est; & hic apprime conducunt juscula ovin. vel gallin. cum radicibus & herbis aperitivis, & rubigine ferri (in nodul. ligat.) incoct. (vel, si ob ferrum incoctum ventriculus nauseat, forsan non erit minus efficax, si singulis auro-
ris post medicamentum aliquod chalybeatum assumptum superhauriatur catillus istiusmodi jusculi.) Potus quotidianus sit vinum Gallicum aqua dilutum cum gut. xxv. vel xxx. sp. sequent; ℞. Sal. volat. oleos. ℥iij. sp. lavend. ℥j. m. In hoc

*Juscula
chalybea-
na.*

affe-

affectu nullum remedium efficacius datur quam *radix hellebori* vel ejus *extractum*. Constat ex solo usu *elect. chalybeat. seq.* (*℥℥. Cort. Peruv. pulverisat. ℥ss. coral. rub. ocul. cancr. præp. ana ℥iij. ferr. rubiginos. ℥iijss. sal. absynth. ℥ij. cum q. s. syr. absynth. f. electuarius*) Foeminas quamplurimas *Hystericas* curatas esse. In altera crasi, ubi sanguis est nimis laxus & ebulliens, indicantur remedia calorem *temperantia*, *venesectio*, *emulsiones*, *cortex Peruvianus*, *aq. Tunbrigenes*, *Bathonienses*, *jusculum cancrorum fluviatilium*, &c. Accuratam sane horum affectuum historiam symptomatum ætiologiam nobis dedit laudatus auctor in tractatu suo eleganti *de hysteria*, idiomate vernaculo conscripto.

Ettmulleri sententia.

Art. 406. Malum Hypochondriacum est affectus ex multis symptomatibus diversimode complicatus, a cruditate acida plus minus viscida in primis viis natus; cujus eminentior gradus vocari solet *scorbutus*. Inter signa primaria sequentia sunt eminentiora, viz. cum adsunt pathemata stomachi non rite digerentis cum symptomatibus circa abdomen, cum torminibus & flatibus intestinorum, alvi obstructione, corporis perturbatione, &c. Sed non omnia in omnibus; ordinario motiones, & plus minus dolores, murmurationes, distentiones, & aliæ abdominis affectiones, cum præcordiorum angustia, & respirationis difficultate, flatibus & scoromatibus, vel vertiginosa affectione rationem formalem constituunt. Est affectus quidem complicatissimus; tres fere gradus paroxyimi statuuntur, viz. primo dum *respiratio est libera*. 2. Quando *hæc impedita*, & *pulsus fere cessat*. 3. Quando etiam *convulsiones* superveniunt.

Mali Hypochondriaci symptomata præcipua.

Art. 407. Emplastrum e galbano cum aliquot *Curatio.*
gra-

granis zibethi, umbilico apponi debet; zibethum enim umbilico illitum suffocationes Hystericas insigniter alleviat, modo non nares nimium feriat. Enemata conducunt ex carminantibus cum ol. succini & salibus volatilibus, item ex urina sani; ut & clysmata terebynthinata. Misturæ ex salibus volat. cum castor. & opiatibus optime paroxysmum sedant, conducunt etiam trochisci de myrrh. ster-
cus equinum maris est remedium nulli cedens, succus ejus cum vino, vel decoctum propinatum expectando sudorem est incomparabile in vel extra paroxysmum; fuligo furni splendens est medicamentum pro pauperibus, item flores sulph. cum N. M. & theriaca in vino solut. cum additione castor. In graviore malo exhibere soleo potionem seq. deterrimi quidem saporis, sed præsentanei effectus; ℞. Aq. menthe flor. sambuc. matricar. ana ℥j. essent. castor. ℥ss. ad ℥iij. sal. volat. C. B. gr. xij. succin. gr. viij. laudan. hyst. ℥ss. syr. e cort. aurant. ℥ss. m. capiatur expectando sudorem. In specie sclarea (horminum hortense) vel ejus decoctum est experimentum singulare paucis notum in suffocatione uterina.

Louveri sententia.

Boulimia

Art. 408. Melancholia Hypochondriaca affecti humore salino in ventriculo deposito magna boulimia sæpissime tentantur, & quamdiu appetitus iste durat, ab omni dolore corporis immunes sunt, humore vero isto acri & ferino, metastasi quasi facta, in alias corporis partes deposito, cruciatus & spasmiciuntur, interea etiam ut ventriculi appetitus omnis & digestio propter defectum ejus penitus flaccescat, quod Hypochondriacis fere omnibus solemne est, atque malæ sanguinis diathese, potius quam lienis vitio, proxime imputari debet. De corde p. (147.)

Farrago sententiarum.

Art. 409. Morbi longi, teste Platone in Timæo, Prudenti-
 blandissime tractari expectunt, non vehementio-
 ribus irritari. „ Mens ipsa ægroti frequentissime *est in me-
 dico.*
 „ adeo insigniter afficitur in hoc morbo, ut sæ-
 „ pius cogatur medicus aliquid admittere, quod
 „ jubent consuetudo, opinio vulgi, superstitio præ-
 „ iudiciaria, quod tamen sana ratio e contra ve-
 „ tat.

Art. 410. Mulieres hystericæ sensum quen- *Diagno-*
 dam frigoris in vertice capitis pati solent, est- *sticon. sin-*
 que hoc præcipuum hysteriæ diagnosticon. *Ba- gulare.*
glivius.

Art. 411. Bezoarticum Joviale est præstantissi- *Bezoarti-*
 mum remedium & infallibile in affectibus hyste- *cum Jo-*
 ricis, ut pluries mirati sumus. *Idem.* *viale.*

Art. 412. In affectionibus hypochondriacis vo- *Emerico-*
 mitus est ante omnia provocandus; sic enim fo- *rum effi-*
 mes subtrahitur morbo, & revera est basis curæ. *cacia.*
Pitcarn. in M. S. In hoc consentientem habemus
 doctissimum D. *Vvodvvard*, mihi amicissimum.

Art. 413. Remedia sequentia quamplurimis in- *Remedia*
 dicationibus satisfaciunt, si quis cognoverit uti. *varia.*
Aurum Mosaicum, cerevisia hysteric. Fulleri Cha-
lybs sine acid. Batean. Decoctum nigrum (Art. 48.
elect. hysteric. elect. Peruv. epileptic. & enem. hy-
stERIC. Fulleri. Ens Vener. flor. sal. armoniac. mar-
tiat. Infusum amarum sequens ℥. cort. Peruv. cras-
se pulv. ℥ij. tart. alb. ℥ij. serpent. virgin. ℥i℥. in-
fund. frigide in vin. rub. ℥ij. coletur usus tempo-
re. Infus. chalybeat. amar. (Art. 48.) Mistura
cephractica, julap. camphorat. mistura hysteric. spi-
rituos. & pil. hysteric. Fulleri. Pulvis ad gutte-
tam, pulv. hysteric. Bat. sal. Jovis tinctura asæ-
foetid. tinctur. epileptic. Fuller. sp. C. C. ℥. succi-
nat. tartarum vitriolatum, vitriolum Martis &c.

M E M O R I A L Æ S A.

*Memoria
ætiologia.*

Art. 414. Inter omnes animæ humanæ facultates ne una quidem tanta difficultate & molestia philosophorum animos exercuit ac *Memoria ætiologia*. Non pauci sunt, qui opinantur istam facultatem constitui ex repository variarum idearum, sensibus oblata occasione primitus collectarum & cerebro cum signaturis quibusdam ordinate depositarum, unde ad usus futuros tanquam ex promptuario ad libitum evocantur: sed duæ admodum graves obtrudunt difficultates, nimirum, in tanta rerum accumulatione quomodo fieri potest, ut aliæ aliis minus oblitterentur & confundantur; & quo artificio mens ipsa ex adeo grandi idearum multitudine illas præcise expergefaceret & compellere potest cæteris silentibus, quas singularis usque usus pro varia rerum exigentia exquisitè postulat. Exclamandum sit necesse est *Plasmatio nostra mira est, & mirabile opificium corporis nostri!* Prodigiøsæ fuerunt in omni ævo quorundam hominum *memoriæ*, v. g. *Senecæ*, *Portii Latronis*, *Cyri Regis*; *nostratium quoque Reynoldi Episcopi*, *Vvallisii &c.*

Sennerti sententia.

*Memoria
læsa.*

Art. 415. *Memoriæ læsæ exempla notabilia apud authores passim occurrunt. Christophorus a Vega refert Franciscanum quendam ex acuta febre ita memoriam amisisse, ut, etsi prius peritus esset theologus, postea nec literas agnosceret, & neque nomina rerum, quæ sibi assidue in usu erant, memoria teneret.*

*Intemperies cere-
bri.*

Art. 416. Si intemperies cerebri sit frigida & humida, somnus est longus sed & profundus; si humida tantum, est longus sed non profundus; si frigida tantum, moderate somnolenti sunt; si frigida

gida & sicca, non sunt somnolenti. Si absque causa externa memoria subito lædatur, imminentis apoplexiæ, epilepsiæ, aut paralyseos est indicium, si homini alias salvo id accadat. Difficulter curatur, quæ a malignis morbis, venenis, aut phlitis ortum habet.

Art. 417. Anacardium tanquam specificum decantatur, & revera interdum egregios edit effectus, sed ejus usus periculo haud vacat. (vid. locum, item Raii hist. plant.) Abstinentum est a carne porcina, anatina, anserina, & piscibus, præsertim mollioribus, lacte, caseo, leguminibus, brassica, lactuca, papavere, fructibus horæis, & quæ vaporosa sunt, crassæ substantiæ, & coctu difficilia; vinum moderate sumatur, aer sit tenuis, cerevisia pura, corpus exerceatur, moderatis laboribus, somnus non mox a cibis ineatur, vitetur diurnus, noctuque sit moderatus, fugiat mœstitiam & animi sollicitudinem, & ad lætitiâ disponatur, a venere abstineat. Hoc in casu in usum revocantur hæc & similia; Rad. pæon. mar. zedoar. valerian. maj. flores tiliæ, lilior. convul. primul. veris, rad. calam. aromat. sem. sinap. spec. diamb. sine odoratis, sp. lavendul. castor. ambra grisea, ol. cinnamomi, &c.

Curatio;

Etmulleri sententia.

Art. 418. Tantum saltem scimus, quantum memoria comprehendimus, & cum judicio ponderamus, & applicamus. Certum est cerebrum esse memoriæ subjectum radicale, quomodo autem fiat, nescio. Venus nimia memoriam debilitat, maxime in senibus.

Tantum
scimus
quantum
memoria
tenemus.

Art. 419. Cubebe No. iij. mane jejuno stomacho comestæ insigniter acuunt ingenium & memoriam; ambra est omnium optima medicina in firmandis viribus animalibus, & roboranda memoria, omnibusque mentis actionibus, adeo ut ni-

Curatio.

hil æque fulciat senes labascentes; elegantissima est tinctura cephalica ex granis *chermes* & *ambra cum spiritu lilior. conval.* &c. Sed notandum est quod ex crebriori usu, *ambra* plus nocet quam prodest præmaturam *stupiditatem* inferens; pro sunt *masticatoria*, & *capitis lotiones*, *thea*, *salvia*, *rosmarinus*, &c.

Vires radicis cassumuniar.

Art. 420. „ In praxi nostra tabellas sequentes, „ præmissis rite universalibus, hoc affectu laboranti cum fructu maximo, multis abhinc annis exhibui; ℥℥. *Rad. cassumuniar. subtilissime pulverisat.* ℥j. *spec. diamb. sine odoratis* ℥ij. „ *sacchar. albiss. duplo pondere f. tabellæ* frequenter in die maxime vesperi & mane comedend.

A N I M I M O R B I.

Animi morbi.

Art. 421. Qui laborant animi pathemate corripit potissimum solent morbis *ventriculi*, ut inter cæteros observare licet in mœrentibus, qui conqueruntur primo de languore ventriculi, mox vero de *inappetentia*, oris amaritie, & siti circa horas matutinas, cruditatibus acidis & nidorosis, flatibus & tensionibus hypochondriorum, aliisque læsæ chyloleos malis.

Morbus durante passione vix curabilis.

Art. 422. Si quis morbus durante animi passione ægrum corripuerit, solet interdum tamdiu durare quamdiu ipsa animi passio, & potius in alienæ speciei morbum mutabitur, quam ægotantem liberum relinquet.

Quomodo tractandi sunt.

Art. 423. Morbi ab animi pathemate pendentes blande ac leniter tractandi sunt, a nimia remediorum copia & vehementia quam maxime abstinendum.

Symptomata anomala ab animi passionibus.

Art. 424. Quando morbus aliquis remediis debite præscriptis cedere nolit, insolitisque quibusdam modis, atque a sui natura valde remotis progreditur, suspicandum erit de *occultis animi passionibus*. Inter solatia ægrotorum animo laboran-

CAP. III. *Mania & Melancholia.* 163
rantium magnam vim obtinet *musica* (inquit
Baglivius.)

MANIA & MELANCHOLIA.

Art. 425. „ Mania cum melancholia talem ha- *Mania &*
„ bet affinitatem, ut non raro mania in melan- *melan-*
„ choliā transeat, & initia melancholiæ fre- *cholia.*
„ quenter maniacum quid habent, ut observavit
„ *Dodonæus*; ideoque in eodem capite tractandi
„ sunt hi duo affectus.

Cœlii Aureliani sententia.

Art. 426. In melancholia adest animi anxietas *Melan-*
atque difficultas, mœstitia cum silentio & odio *cholia de-*
conviventium, nunc vivendi, nunc moriendi cu- *scriptio*
pido cum suspicionibus velut insidiarum sibi pa- *accurata*
ratarum; item inanes fletus, atque murmura va-
cua, & rursus hilaritas magis post cibum cum
inflatione præcordiorum, capitis gravedo, color
luridus cum nigrore, aut sublividus, corporis te-
nuitas, virium debilitas, indigestio cum ructa-
tionibus odoris tetri, intestinorum tormina, vo-
mitus humorum diversicolorum & similium per
podicem egestio. „ Qui gravius laborant, sese vel
„ pecudes esse vel testaceos, vel etiam vita de-
„ functos credunt; quare alii gallinacei cantum
„ voce imitantur, alii occurrentibus cedunt, ve-
„ riti ne (testacei cum sint) diffringantur, alii
„ cibum pertinacissime recusant, amissam esse vi-
„ tam rati.

Riverii sententia.

Art. 427. Melancholia est delirium sine febre *Mania &*
cum timore & mœstitia; & sic distinguitur a ma- *melan-*
nia, quæ est cum furore & audacia. Ex varia me- *cholia*
lancholici humoris dispositione maxima deliriorum *quomodo*
distin-
I. 2 *guuntur.*

varietas emergit; unde alii putant se esse reges, vates, alii grana tritici, alii vitreos, ceram, alii se esse canes, feles, gallos, &c. existimant, indeque voces horum animalium imitantur, &c.

Varia
sunt deli-
ria pro
varietate
constitu-
tionum.

Art. 428. Varia sunt deliria in variis ægrotantibus pro majori vel minori causæ vehementia: alii enim feroci iracundia rapiuntur, & obvios quosque invadunt, & proprias vestes dilacerant, sibi que ipsis interdum violentas manus inferunt. Alii vero mitiores & pacatiores sunt, nullamque astantibus noxam inferunt, sed tantum varios sermones & ridiculos proferunt; interdum canunt & rident, & symptomata patiuntur, quæ in melancholia & stultitia solent contingere. Melancholia errabunda mense Februario homines potissimum infestat; ægri ne horam in uno loco manere possunt, sed continuo vagantur, quo vadant nescientes.

Lycan-
thropia.

Art. 429. „Admirandam melancholiæ, vel manix speciem apud Oribasium, descriptam legimus, quam *γυγανθρωπία* vocat. Hujusmodi delirio affecti foras noctu vagantur, lupos quodammodo æmulantes, aspectu pallidi, luridi, os oculosque valde sicci, crura contusionum ac vulnerum plena; circa defunctorum monumenta ad instar *Dæmoniæ Evangelici*, plerumque versantur. Vide *Freind, Histor. Medic.* p. 18.

Difficile
curatur.

Art. 430. Humor melancholicus flagellum, crux aut opprobrium medicorum appellatur, quoniam vim remediorum eludit, solvitur interdum melancholia per fluxum hæmorrhoidum vel per scabiem, aliosve morbos cutaneos. Remedia in affectus hypochondriaci curatione proposita hic locum habent; ℞. Aq. nymph. ℥j. sal. prunel. ʒj. camphor. ʒj. misce, & cum linteis complicatis admoveatur tepide sincipiti in maniacis; utilissimum quoque est epithema ex sacchar. Saturn. & aq. spermat. ranarum.

Quibus
remediis
tentanda
est.

Vil-

Vvillisii sententia.

Art. 431. Melancholici in cogitando fere continuo occupantur, & inter cogitandum res pauciores quam antea solebant, animo comprehendunt; ita quidem ut sæpe dies & noctes idem objectum animo volutent, de rebus aliis, quæ interdum sunt longe majoris momenti, nihil solliciti; & etiam objecta fere omnia iis deformia & velut sub larva apparent.

Melancholici cogitabundi.

Art. 432. Hæc tria fere omnibus maniacis accidunt, viz. 1°. eorum *phantasia*, sive *imaginatio*nes cogitationum impetuosarum æstu perpetuo occupantur; ita ut varia sibi obmurmurent, aut clamando & ejulando proferant, 2°. *Notiones* sive *conceptus*, aut incongrui sunt, aut sub specie falsa sive erronea repræsentantur. 3°. Illorum delirio *audacia* & *furor* adjunguntur, contra ac in melancholicis.

Quomodo se habent maniaci.

Art. 433. Helleborus ab Hippocrate ita crebro præscribitur, quoniam tunc temporis alia cathartica saltem in frequenti usu, vix innotuere; jam vero longe præstat lenioribus & mitioribus humores subducere. Emetica sequentia sunt maxime utilia; ℞. Sulp. antimon. a gr. viij. ad x. crem. tart. ℞. m. ℞. Mercur. vitæ gr. vj. vel viij. tart. vitriolat. ℞. m. ℞. Extract. hellebor. nigr. calomel. ana ℞. f. pil. cathartic.

Curatio

Ettmulleri sententia.

Art. 434. Affectus Melancholicus seu Melancholia differt a delirio Melancholico; prior est quando homo est nonnihil mœstus & morosus, facile subinde irascitur, ipsi nihil arridet, cogitabundus est; ubi vero taliter affectis supervenit *phantasma* constituit *delirium Melancholicum*, in quo ægri sunt timidi, anxiosi, & quasi in angustiis constituti videntur, adeoque quæcunque vident vel audiunt, sibi pejo-

Differentiam melancholia a delirio melancholico.

ra & periculosa persuadent, & licet interdum rident, & læti videntur, quando putant se esse divites, &c. nihilominus non est revera hilaritas, non verum gaudium, sed potius apparens, & cum risu *Sardonico* conjunctum, transitorium, & facile succedit novus moeror, & præcordiorum anxietas, sine causa iterum rident, & parum aut nihil omnino dormiunt, sed cum terrore evigilant.

Funda-
mentum
melan-
cholia.

Art. 435. Mores animi sequuntur temperamen-
tum corporis. Fundamentum Melancholiæ semper
circa hypochondria consistet, utut remotior causa
interna subinde aliunde oriatur, in quo puncto lien
& uterus incusari solent.

Origo
mali ex-
piscanda
est.

Art. 436. In Melancholicis imprimis *acidum vi-
tiosum* in primis viis abundat, hinc frequenter sunt
voraces. Expiscanda est mali origo, an ex tristitia
& animi affectibus, vel ex sanguine Melancholico,
in priori casu *pulsus* est valde obscurus, inæqualis
& pene deficiens & vermicularis.

Curatio
melan-
cholia.

Art. 437. In vomitoriis consistit radix curæ Me-
lancholiæ, & *antimonialia vomitoria* exhibenda
sunt in larga dosi. Melancholici & Maniaci odio
suum habent medicum, etiam curati licet. Alvus
servanda est lubrica cum *extracto hellebori* &
mercurio dulci, quod est *alterativum* æque ac *la-
xativum*, ut etiam est *lapis lazuli*; in usum re-
vocanda sunt remedia *antiscorbutica*, *martiata*,
acidula; *saccharum Saturni* specificum habetur;
tinctura coral. confect. alkerm. ambra, *fumaria*,
anagallis, *hypericum*, *crocus*, *camphora*, *vinum*
generosum, &c. laudantur. Emplast. ex *tacama-
hac.* capiti raso applicetur. In delirio Melancho-
lico *opium* nullum sortitur effectum; licet dupla
aut tripla dosi propinetur, ægri *agrypni* manent,
& ferociiores fere evadunt.

Mania
definitio,
&c.

Art. 438. Mania sive insania est delirium sine fe-
bre cum insigni furore & audacia, exuta quasi o-
mni ratione; ægri pertinacissime vigilant, inter-
dum per aliquot menses. Tres circumstantiæ sun-

ma-

maxime notandæ, nempe, *furor insignis, robur stupendum, & frigoris tolerantia* plane mirabilis.

Art. 439. Radix curationis consistit in validis vomitoriis sæpe repetitis, convenit etiam venese-
ctio, præ reliquis radix hellebori albi est vomito-
rium maxime proficuum, sequenti modo præpa-
rata tuto propinari potest; *℞. rad. hellebor. alb. a*
ßß. ad ʒj. coque in vino donec mollescat, tunc
abjiciatur vinum istud, & radix in vinum aliud
injiciatur, & ita per noctem relinquatur in loco
calido sine coctione tamen, postea coletur expres-
sione levi vel forti, prout magis vel minus va-
lidum postuletur, vires sunt optimæ, nec unquam
fatis laudatæ; nitrum crudum & omnia nitrata
summe conveniunt, remedia pro cura melancho-
liæ hic quoque locum habent. Immersio subita-
nea in aqua frigida quandoque prodest.

Farrago sententiarum.

Art. 440. De horum affectuum origine, incre-
mento, & ætiologia videatur Boerhaave. In sectis
cadaveribus Mania demortuis (inquit D. Shavu)
nihil alienum a sanorum corporibus invenitur,
nisi forsan induratio meningis cerebri exterioris,
quæ probabiliter ejusdem oscillationes liberas plu-
rimum immutat, & interturbat, unde spirituum
animalium distributio valde enormis ac perturba-
ta evadit.

Art. 441. Cum melancholici plus justo lætentur,
indiciū est ac præludium instantis mania.

Art. 442. Succus hederæ terrestris intus sumptus
ad ʒij. vel iij. singulis diebus valde commendatur
ad hunc morbum vincendum, item linimentum ex
eodem succo confectum pro capite raso inungendo
curam promovere creditur. Specifica duo simplicia
adeo deprædicata sunt hypericon (*Fuga Demonum*)
dictum & anagallis. Angelus Sala pro arcano ha-
buit tincturam hyperici, & aliquando cum careret

tinctura, decoxit summitate ejusdem in vino Rheno-
nano & cerevisia tenui: atque utiliter propinavit.
Decoctum anagallidis flore purpureo (dos. ℥iv. ter
in die) præmisso plus semel vomitorio tanquam
specificum commendatur ab Ettmullero, Hartman-
no, Vvillifio, Sennerto, Quercetano, &c.

Alia.

Art. 443. Sequens emeticum, quod fortissimum
est, in hospitio mente captorum frequenter pro-
pinatur. ℥. succ. fol. asari ℥vj. vel ℥j. aq. card.
ben. ℥ij. oxymel. scillitic. ℥ss. m. f. potio. Pharm.
pauper.

Cerevisia melanagoga.

℥. Rad. hellebor. nigr. ℥ss. jalap. ℥vij. her-
modact. ℥ss. coq. in cerevis. nov. cong. xxiv. ad
cong. xviii. addendo sub finem coction. sen. ale-
xandr. ℥ij. rad. rhabarb. ℥vj. tart. alb. ℥iv. sem.
coriandr. ℥vj. rad. liquirit. limatur. chalyb. ana
℥iv. fol. cochlear. hortens. M. iv. colaturæ add.
fermentum.

Cerevisia ad Melancholiam.

℥. Fol. marrhub. alb. M. iv. coq. in cerevis.
nov. cong. vj. ad cong. iv. cola & in doliolo su-
spendatur saccul. seq. ℥. Rad. chin. nodos. pæon.
mar. ana ℥ij. polypod. ℥j. lapath. acut. ℥iiij. Ra-
phan. sylv. ℥x. fol. ling. cervin. M. iiij. summit.
hyperic. p. vj. cort. fraxin. ℥iv. bacc. junip. sem.
dauc. ana ℥j. rasur. stanni (in nodul.) ℥iv. ferri
rubiginos. ℥ij. includ. omnia in saccul. &c. Pil. de
lapide lazuli, flores salis armoniaci martiati, &c.
sunt remedia proficua. Nescio an vires campho-
ræ, Regiæ societati a Dre. Kenneir sesquianno
abhinc communicatæ, ad hos contumacissimos
affectus expugnandos ulterius tentatæ fuerunt,
necne. Dosis in his casibus est ad semidrachmam
omni nocte, præmissis universalibus, & aliis re-
me-

mediis cephalicis & alterantibus non penitus neglectis. Philosoph. transact. N. 400.

DELIRIUM RABIOSUM sive Hydrophobia.

Cælii Aureliani sententia.

Art. 444. Ex morfu animalis rabidi homines in delirium rabiosum sive hydrophobiam incidunt, quidam celerius, quidam tardius, post annum vel eo amplius, sed frequentius post dies quadraginta. Hydrophobia.

Art. 445. Signa præsagientia sunt anxietas quædam, iracundia, somnus suspensus & turbatus, stomachi gravedo, oscitatio, & extensio frequens membrorum, insueta querela de aere quamvis sereno, parva bibendi voluntas. Signum præsentis mali ad apicem proventi est omnium potulentorum timor & abhorrentia. Signa hydrophobiae præsagientia præsentis

Meadii sententia.

Art. 446. Morsus canis rabidi hoc habet in se singulare & stupendum, quod interdum malum non prius detegatur, quam memoria illius causa penitus oblitterata sit; vulnus enim est æque medicabile ad communes morsus sanorum animalium: Sed quandoque longe post dira symptomata exsurgunt, post duos vel sex menses, interdum post annum integrum vel diutius, vel frequentius post quadraginta dies sentiuntur dolores vagi per universum corpus, maxime circa partem læsam; æger evadit anxius ac tristis, & ad iracundiam proclivis; pulsus intermittit cum tremore aliquo & tendinum ac nervorum spasmis; adest insignis calor internus, & sitis, & postremo aquæ timor & abhorrentia (quod essentiam morbi constituit) adeo ut ne quidem conspectum potulentorum sine maxima consternatione ferre. Morbi progressus.

re possit, multo minus unam guttulam deglutire valeat; atque hoc est signum *pathognomonicum* morbi consummati, quod tamen non accidit nisi sub ejus finem & ultimam *catastrophem*, nempe diebus duobus vel tribus ante obitum, cum morbus sit prorsus insanabilis.

Quid faciendum est in recens vulnere.

Art. 447. Sicut in aliis moribus venenatis, ita speciatim hoc in casu *Galenus* prudenter admonuit vulnus amplificare per *incisionem circularem*, *cauterio* inurere, & ulcus *apertum* servare per dies 40. ad minimum: sin vero hæc methodus nimis dura & inhumana videatur, sufficere licet *cucurbitula* applicata virus extrahere, prægressa prius profunda scarificatione. Sola applicatione *unguenti Ægyptiaci* quam calidissimi recens vulneratum feliciter servatum novi.

Cura interna.

Art. 448. Si quando remedia externa omnino omittantur, vel saltem haud recte vel tempestive adhibeantur, cura internis magna ex parte tentanda est; *alexipharmaca* sunt propinanda, inter quæ præ reliquis omnibus *cineres cancrorum fluviatilium* veteres medici uno ore magnopere extollunt; *Galenus* ait neminem periisse, cui hoc remedium propinavit; sumendi sunt cineres ad quantitatem coch. i. vel ij. singulis diebus ad dies quadraginta, vel soli vel potius cum pulv. rad. gentian. & thur. in vino.

Immersio in aquam marinam

Art. 449. Frequens immersio demorsi in *aquam salsam marinam* optimum & certissimum omnium prophylacticorum merito perhibetur ad hydrophobiam præcavendam.

Etmulleri sententia.

Delirium rabiosum

Art. 450. Delirium rabiosum a morfu rabidorum animalium, in specie canis, oritur, unde hydrophobia; demorsi plane rabiosi redduntur, & omnino in mores brutales transmutari videntur, nihil fere humani apud se retinentes. Præter canes,

nes, etiam *feles*, *galli gallinacei*, *equi*, *muli*, *lupi*, *boves* & similia animalia fiunt rabida, & morsus eorum sunt venenati, ut & hominis irati. Notandum est, quod etiam morsus levissimus, immo tantillus salivæ contactus in homine, ab animali rabido receptus, suo tempore rabiem inferre possit, adeo penetrans & malignum est istud feminium. In decursu morbi hydrophobia est symptoma semper conjunctum. Extant exempla quædam, licet rariora hydrophobiæ, nullo morsu animalis rabiosi prægresso, sed dubium est an in talibus præcesserit aliqualis infectio, nec ne: contagium etenim subinde ad biennium, imo ad plures annos absconditum latet, antequam in actum erumpat.

Art. 451. Signa rabiei incipientis in demorso sunt anxietas præcordiorum, iracundia sine causa, querelæ de molestia aeris ambientis, de corporis gravitate, & ineptitudine ad motum; æger melancholicus evadit, lucem fugit, a potu abstinere, in parte olim vulnerata morificationem & titillationem, interdum dolorem sentit.

Signa rabiei incipientis.

Art. 452. In morbo perfecto ægri sunt anxii, spumant circa os, oculos horridos habent, quidam latrant instar canum, collum & fauces ringunt, liquida omnia abhorrent, insomnes permanent; in his extremis raro curantur, sed ut plurimum moriuntur inter triduum vel quatrimum post inceptam hydrophobiam.

Hydrophobici intra triduum vel quatrimum moriuntur.

Art. 453. Ex vulnere facto, quantocyus fieri potest, *malignum virus* extrahendum est, ideoque sanatio non cito perficienda est, sed vulnus potius ampliandum. Interne conducunt *cardiaca* & *alexipharmaca*, *tinctura bezoardica*, *spiritus theriacalis camphoratus*, &c. sed omnia dupla dosi danda sunt, & diutissime insistendum est his remediis; super locum morsum, *allium*, *ruta*, & *sal contusa* & *mista* apponenda sunt more cataplasmatum. Præ cæteris optima cura fit per improvisam

Intentiones curative.

in

in aqua frigida immersionem; convenit purgatio cum helleboro & mercurio dulci; diuretica profunt; vis cantharidum est quasi specifica. Post scarificationem vulneris applicetur *cepa* sub cineribus assata vel sequens; ʒ. *Cepam acrem* No. 1. *alliorum capita*. No. 5. *theriac*. ʒvj. *ferment*. ʒss. f. cataplasma: sunt qui addunt, *herb. rut. sem. sinap. ol. scorpion.* &c. verum promptissimum remedium est ustio loci affecti cum ferro candente: hæc omnem malignitatem destruit. Si sero advocatus sit medicus, applicanda est *cucurbitula* cum multa flamma; conducit etiam *fonticulus* prope locum affectum excitatus.

Listeri sententia.

Dolor in loco demorso diu post vulnus sanatum signum futura hydrophobia.

Art. 454. Præter signa ab aliis commemorata futuræ hydrophobiæ unum se (*Salium*), quod præcipuum & infallibile appellat, animadvertisse ait omnibus ignotum, viz. *dolor quidam in loco commorso*, licet ulcus antea per dies & menses integre fuerit sanatum, accedens, qui intensus esse non consuevit, nisi morsus partem nervosam petierit: hic dolor a loco jam commorso incipiens leviterque patientem affligens, per partem post partem spatio 3. aut 4. dierum plus minus ascendit ad cerebrum, ubi quasi *vertiginem* causat, & *confusionem*, indeque statim homo in *rabiem* deducitur.

Omnes hydrophobici moriuntur.

Virus in saliva maxime consistit.

Art. 166. Huic prognostico (nempe *neminem aquæ metu oppressum servatum esse*) consentiunt fere omnes antiqui.

Art. 455. Ex nostra observatione ipsam *salivam* præcipue vitari atque in ea unicum esse virus, experimentis credo: etenim hæc fere vulnera inficere solet, & etiam sine vulnere communicari potest malum. „ Huic conjecturæ adstipulatur historia duorum hominum hoc malo affectorum *solo saliva tactu* sine recepto vulnere, item: „ que

que duorum puerorum in *Hibernia sola tracta-*
tione vulneris in capite canis ab altero rabioso
demorſi pariter infectorum ; hiftoriæ proſtant
Actis philoſophicis. Plures canibus rabioſis de-
morſi curæ meæ commiſſi fuerunt , ſed ne u-
num quidem *Hydrophobia* laborantem mihi un-
quam contigit videre ; ſuppeditamur exemplis
in Gallic. Hiſt. Acad. Scient. quorundam cu-
ratorum , etiam ubi aquarum pavores aderant ,
maxime *phlebotomiis* uſque ad deliquia iteratis
vicibus celebratis ; *immerſionibus in aquas ſal-*
ſas tantum non mortem inferentibus , & *per-*
uſionibus earundem uſque ad extremas vitæ o-
ras provectis . „ Quidam medicus hydropho-
bici cujuſdam oculis mappam craſſam ſuperinje-
cit , manibuſque ligatis , potionem bibere invi-
tum aliquoties cogebat ; at prorſus ſiniſtro even-
tu ; nam ſtatim vehementer convulſus obiit. „
Qui plura velit adeat authorem Liſterum , qui
elegantiffimum tractatum de hoc affectu con-
ſcripſit. Admiranda proſecto eſt hiftoria *Jaco-*
bi Corton apud illum ab omnibus lectu digniſ-
ſima .

Louvthorp. Philoſ. Tranſact. Vol. III. pag. 283.

Art. 456. ℥. Rad. ſerpent. virgin. flor. hyperic. Reme-
ana p. æ. ſ. pulv. doſ. ℥ſs. vel ℥ij. in julap. ce- dium ſin-
phalic. ℥. Fol. rut. ℥vj. theriac. Ven. allii , ra- gulare ;
ment. Jovis ana ℥iv. infund. in vin. Canarienſ.
vel alb. digere in balneo per horas 4. coletur
cum expreſſione forti , doſis ℥ij. vel iij. ſingulis
auroris ad dies novem , maneatque æger jeju-
nus per tres horas ; *magma reſiduum* parti vul-
neratæ circumligetur & ſingulis diebus renove-
tur. Remedium hoc me nunquam ſefellit . *Ma-*
yerne.

Art. 457. Loco vulnerato quamprimum appli- Reme-
cetur anus galli veteris plumis prius divulſis ; & dium to-
ſi ca- picum .

si canis rabiosus esset, gallus statim intumescet, & mox morietur, & demorsus sanabitur; si vulnus sit exiguum, ampliari debet.

Alia methodus. Art. 458. Aliter, homo morsus in mare quamprimum novies immergatur, & locus vulneratus cum lixivio e cineribus quercinis & urina eluatur & applicetur cataplasma ex theriaca Londinensi, alliaria, ruta, & sale.

Electuarium. Art. 459. ℞. Fol. rut. sicc. scord. ana ℥ij. rad. serpent. virgin. ℥i℥. flor. hyperici ℥iij. theriac. Lond. ℥j. syr. e cort. limon. q. s. m. f. elect. pro dos. ix. una singulis auroris sumenda.

Lichen cinereus. Art. 460. Lichen cinereus terrestris (Raii p. 117.) cum æquali quantitate piperis est remedium infallibile ad rabiem præcavendam in homine ac jumento.

Decoctum ad morsum canis rabidi. Art. 461. „ Aliquando expertum vidimus decoctum ad morsum canis rabidi pharm. Bat. cum „ felici successu. Postremo quoniam hoc malum „ a morfu animalis (& ut plurimum canis) rabiosi omnino pendet, operæ pretium esse videtur, ut accurate animadvertamus, quænam sint „ signa diagnostica canis vere rabidi, ut futurum „ morbum, si fieri possit, præcaveamus. „ Sequentia itaque habemus apud Lommium; canis rabiosus esurit, sitit, nihil tamen cibi vel potio- „ nis sumit, oculos flammeos trucesque habet, auriculas demittit, linguam exerit, multum ore spumat, umbræ suæ oblatrat, sæpe sine omni latratu tristis atque anxius discurrit, crebro tanquam cursu fatigatus spirat, caudam gestat intortam, nullo discrimine in quosque obvios animantes impetu ac morfu fertur, præcipiti atque incerto oberrans cursu. Integri canes & conspectum & latratum ejus, qui furit, exhorrescunt, ac fugiunt. „ Primum symptoma rabiei in canibus est inusitatus tremor seu trepidatio. „

T A R A N T I S M U S.

Art. 462. Tarantismus est rabies eorum, qui a *Tarantismus.*
tarantulis sunt morfi. In *Apulia Italia* regione frequenter occurrit; apud nos nusquam invenitur. Spiritus animales primario afficiuntur. Cura per *musicam* peragitur. *Clarissimus Baglivius* de hoc affectu tractatum emisit; & de eodem etiam scripsit *celeberrimus noster D. Mead*, quibus remittendus est lector eruditus. Vid. etiam *Hist. de l'Acad.* Vol. VI. p. 20.

INCUBUS SIVE EPHIALTES.

Vvillisi sententia.

Art. 463. Incubi paroxysmus fere tantum inter dormiendum ingruit, & plerumque post stomachum cibis dyspeptis aggravatum, & decubitus in lecto supinum excitari solet: eo laborantes potissimum in pectore & circa præcordia noxam sentire videntur; nam respiratione plurimum impedita, se a pondere, thoraci graviter incumbente, opprimi putant, quod pondus nunc hac nunc illa *spectri* aut *larvæ* specie ipsorum imaginationes illudit, nec excutere possunt, nec corpus dimovere; verum post diutinam, ac interdum fere ad vitæ deliquium, in præcordiis luctam tandem evigilant, & moles imaginaria evanescit; superstitie vero ut plurimum cordis tremore, & non raro diaphragmatis vibratione celerrima & violenta. Hic affectus raro ex se periculosus est.

Art. 464. Præmissis universalibus *cephalicis* & *Curatio.*
antispasmodicis curatur.

Etmulleri sententia.

Art. 465. Raro hoc malo afficiuntur, qui laudabili utuntur diætâ, aut qui *sobriam* amant *ca-* *Quomodo*
nam; *præca-*
vetur.

nam ; si dormiatur in latere , elevato capite , præcavetur incubus . Ab Arabibus appellatur *epilepsia nocturna* , quia incubus habitualis & diurnus in *epilepsiam* eandem degenerare solet , & est ejusdem prodromus in junioribus , uti in senibus *apoplexia* .

Curatio . Art. 466. Incubus habitualis curandus est , præmissis præmittendis , *antiepilepticis* , *martialibus* &c. cum sobrietate conjuncta . *Lapis lazuli* laudatur .

Inter legendum .

Elegans morbi descriptio .

Quandoque lethalis est .

Art. 467. *Antonius Menjoitius* hunc affectum eleganter describit ; quod sit nocturna spirandi difficultas absurda superinjectæ molis opinione somniantem eludens . Pueros frequenter exercet , quia voraces plus comedunt , quam digerunt . Cum vehementior impresserit præfocatio , quosdam interfici testatur *Aurelianus* ; additque ex *Silimacho* contagiosum quoddam & epidemicum *Incubum* Romæ grassantem multos pestis instar jugulasse .

C A P. I V.

Sive Fasciculus Morborum quartus .

A F F E C T U S C A T A R R H A L E S .

Affectus Catarrhales .

Art. 468. Affectus Catarrhales, nimirum, Catarrhus, branchus, seu traucedo, & coryza, a se invicem juxta distichon antiquum distinguuntur.

Differentia .

Si fluit ad pectus dicatur rheuma Catarrhus. Ad fauces Branchus, ad nares esto Coryza.

C A.

C A T A R R H U S.

Etmulleri sententia.

Art. 469. Catarrhus proprie dictus est præternaturalis a sero plus minus vitiato in quacunque parte facta alteratio seu functionum læsio. *Catarrhus.*
In genere frequentius præcedunt Catarrhos capitis gravitas, sensuum & actionum torpor, artuum lassitudo; supervenit successive refrigeratio quædam in superficie corporis, horripilatio dorsi levis, in Catarrho graviori febricula lenta. Intensiora sunt omnia symptomata in *calido Catarrho*, adest ardor, dolor, corporis quasi phlogosis, materia excreta est tenuis & corrosiva; remissiora vero sunt omnia in *Catarrho frigido*, ubi lymphæ est mitis, & excernuntur mucosa viscida & crassa.

Art. 470. Conveniunt *diuretica*, & imprimis *Curatio*.
sudorifera ex salibus volatilibus, decoct. e lignis, speciatim *Jassafr. & junip. rosmarinus, succinum, serpillum, &c.* In *Catarrhis calidis*, ubi lymphæ est tenuis acris aut salsa, profunt *opiata cum aromaticis & volatilibus*. In *Catarrhis diuturnis* conveniunt *vesicatoria & fonticuli*. In affectibus catarrhalibus vix habetur par remedium *fumo tabaci*; omnibus enim satisfacit scopis. „ In frequen-
„ ti usu sunt *decoct. catechu & suffitus ad Ca-*
„ *tarrhum Fulleri.*

Art. 471. „ Ventum Borealem producendis Ca-
„ tarrhis aptissimum esse, præter *Hippocratis* te- *Ventus Borealis.*
„ stimonium, experientia communis suffragatur.
„ *Villis.* „

R A U C E D O.

Ettmulleri sententia.

*Raucedi-
nis sedes
& causa.*

Art. 472. Raucedo seu raucitas est vocis diminutio; pars affecta est aspera arteria ejusque larynx; larynx enim primari format vocem; causa proxima est nimia effusio lymphæ tenuis. Est affectus *catarrhalis* a lymphâ acriori, falsiori, aut acidiori.

Curatio.

Art. 473. In Raucedine contumacissima *sperm. ceti* est expertum remedium, item decoctum *raparum, rob. passularum*. In Raucedine inveterata, ubi mucus viscidus aut lymphâ crassa peccat, *incidentia & expectorantia* conveniunt, & præ cæteris *syrupus de erysimo, & oxymel scilliticum, & bals. sulph. venæsectio* vitanda, nam morbum diuturnum reddit.

Vermes.

Art. 474. „ Interdum *vermes in intestinis* (683.) „ sunt causæ *aphoniæ* vel Raucedinis, „ ut in praxi vidimus. „ *Extractum pectorale loboch. ad raucedinem. Loboch. vitellinum. Lac ebutyratum, &c.*

*Remedia
varia.*

C O R Y Z A.

Ettmulleri sententia.

*Coryza
descriptio
& causa.*

Art. 475. Coryza, sive narium catarrhus, est quando copiosa lymphâ tenuis & acris in principio per nares defluit, & postea materia crassa, tenax, varie colorata cum dolore capitis gravativo, ab aere inclementiore ut plurimum ducens originem, rarissime a causa interna. Frequentissime recurrens periculum est, ne *ozanam* vel *polypum* producat.

Curatio.

Art. 476. Coryzam inchoantem curant *naribus applicanda, in ore masticanda, suffitus, odoramenta, illinitio narium cum ol. anisi* ante excoriationem, item *oleum succin. vertici illitum, ol. garyo-*

ryophyl. cum *bombyce* naribus intrusum; *balsam. apoplecticum*, &c. quandoque in usum veniunt. Ad *Coryzam* præcavendam suffitus ex fumo *succini*, *mastic.* *oliban.* *gum. animi*, &c. multum juvant, sed hæc in principio; si morbus ulterius progrediatur, conducunt *sternutatoria* cum *ol. chym.* *cinnamom.* vel *garyoph.* vel *ol. majoranæ.*

Art. 477. Decoct. *catechu compositum* (in *catarrho* tenui præ aliis fere omnibus) decoct. *rosar. lo- hoch. japonicum*, *lohoch. vitellinum*, suffitus ad *catarrhum* (fumus, pallio similive tegumento capite prius recto, naribus attrahatur,) *tabellæ domesticæ*, &c. sunt remedia in *Coryza* usitata. *Remedia varia.*

AFFECTUS CATARRHALES. in genere.

Art. 478. „Cum fluxiones sunt pertinaces, aliis *Dietæ sudorifica.*
„ auxiliis haud cedentes, ad *dietam sudorificam*,
„ tanquam ad summum præsidium & raro fallax
„ accedendum est, eandemque 15. 20. vel 40.
„ dierum spatio imperandam, vivendo toto hoc
„ tempore pane biscocto, amygdalis torrefactis,
„ & carnibus assatis cum decocto *guajaci* in fri-
„ gidis & pituitosis, rusticeque viventibus; *Sar-*
„ *saparillæ* & *Chinæ* in mollioribus & delicatu-
„ lis. *Chesneau.*

CATARRHUS SUFFOCATIVUS.

Ettmulleri sententia.

Art. 479. Catarrhus suffocativus est affectus *la-* *Catarrhus suffocativus*
ryngis, in quo hæc & caput *asperæ arteriæ*, in
specie epiglottis, afficiuntur primario ab irritatio-
ne ibidem excitata arcturam & quasi stricturam
efficiente; certum est sedem mali esse in isto loco;
respirationem subito difficillimam reddit, & suf-
focationem minatur; incipit cum raucedine sub-
tanea, deinde irritatur *larynx*, stringitur *epiglot-*
tis,

tis, unde metus suffocationis; est quasi complicatio *tussis ferinae* & *raucedinis* gravioris: oritur a lymphæ acore vel falsedine.

Curatio.

Art. 480. Catarrhus suffocativus est morbus, siquis alius, plerumque revera peracutissimus hominem fere dicto citius jugulans; propterea omni arte properanda est cura, festinanter instituendo multiplicem humorum divaricationem, per venæsectionem, cucurbitulas cum scarificatione, enematum acrium injectionem, vesicantium applicationem, artuum fortem deligationem, *quam magni facio*, & sequens cataplasma plantis pedum apponendum suaderem; *℥. Herb. ranunculi flammei minoris contus. p. iij. fimi columbin. p. j. pulv. euphorb. p. ℥. sapor. nigr. q. s. acet. parum contundantur, &c.* Author noster *Ettmullerus* vomitoria & opiata proponit, sed in paroxysmi articulo ambo suspecta habeo. Usui interno conducunt medicamenta volatilia & nervina dicta, item oleosa & mucilaginosa, privatim albumen ovorum cum syrup. de althæa conquassatum & cum tantilla aqua nephrit. dilutum. Extra paroxysmum remedia antiasthmaticis, & ad catarrhum proprie dictum usitatis recidivatio præcavenda est.

Historia.

Art. 481. „ Medicus quidam juvenis, athleticus, oppido vicino degens, præeunte per biennium raucedine, in hunc morbum subito lapsus intra spatium 24. horarum mortuus est. Ipse & adstantes *angina* laborasse existimabant, etiamsi nullus tumor gutturis aderat, intus aut extrorsum, deglutitio neutiquam impedita, &c. Hora extrema implorabat meum auxilium, morbum fuisse *catarrhum suffocativum* admonui; statim ac locutus fueram, ægrotus ipse, qui adhuc mente constabat, agnovit morbum. Cucurbitulas illico affigendas imperavi; sed priusquam chirurgus officium inchoare poterat intra horæ quadrantem animam efflavit. Quatuor alios

„ hoc

„ hoc morbo exitiali tentatos novi, quorum duos
„ tantum servatos vidi.

Art. 482. Est etiam alia species catarrhi suffo- *Alia spe-*
cativi, ubi sanguis in pulmonibus stagnat, & mo- *cies.*
riuntur ægri ex syncope (est forsan *polypus cordis*
vel in vasis sanguineis majoribus) ejicitur spuma
ex ore; Catarrhus hic suffocativus cognoscitur ex
dolore pectoris gravativo, difficultate respiratio-
nis, & suffocationis metu, voce fere intercepta,
anxietate ægri, interdum tussi, non semper; screa-
tu non multum emittitur; appellatur etiam *syn-*
cope cardiaca. (575.)

Art. 483. Convenit *venesectio* quam ocissime, *Curatio*
sperm. cet. a ʒss. ad ʒj. in appropriato vehiculo in-
signe levamen adfert, *sal. succini, antimon. dia-*
phoret. & alia sudorifera, item *gum. ammoniac.*
croc. est summarum virium in hoc casu.

T U S S I S.

Ettmulleri sententia.

Art. 484. Probe distinguendum est, an tussis hu- *Tussis.*
mida sit ex *pectore*, an ex *stomacho*, an a *nervis.* *Distin-*
Percunctandum est, ubi ægri percipiunt tussendi *guendum*
stimulum; an in larynge seu aspera arteria, vel *est an sit*
pectore, vel inferius circa scrobiculum cordis, *a pectore*
nam posterior locus *tussim stomachalem*, priores *vel ven-*
triculo, *etc.*
pectoralem innuunt; jubeatur æger profundius re-
spirare; sic enim tussire incipiet, si vitium sit in
pulmonibus; secus si in stomacho. Sonus in tus-
siendo ex profundo quasi raucus pulmones affectos
indicat, superficialis asperam arteriam.

Art. 485. Nullus practlicorum aliquid habet de *Tussis sto-*
machalis
Tussi stomachali præter *Lindanum*; mihi (in-
quit) est compertum pluribus observationibus
plerumque Tussim esse ex ventriculo: ubi autem
materia latitet, & unde procedat, ex sono dice-
re possum, qui variatur pro materiæ & loci con-
ditionibus; si materia sit tenuis, & in ventricu-

lo delitescit, furibunda Tussis est, in qua vix aliquid egeritur, licet cum summo conatu tussiant (omnis Tussis in principio *sicca* progressu temporis evadit *humida*.)

Curatio. Art. 487. Ad expectorationem promovendam convenit succus *raphan.* recens expressus cum *pauco sacchar.* temperatus; Tussis humida stomachalis cum vomitoriis & stomachicis curatur; sancte testor, quod ex usu vomitoriorum ne minimum noxæ observaverim; *purgantia* non conducunt, *mercurius dulcis* vero primum obtinet. *Elixir proprietatis* & *bals. Peruv.* laudantur. Tussis sicca, nocturna, pectoralis, catarrhalis dicta, ex lymphæ vitio, & exinde irritatione, optime curatur per *volatilia sudorifera* & *opiata*, etiamsi febris conjuncta fuerit. *Flores benzoës*, *spermaceti*, decoctum *raparum*, succus *glycyrrhiz.* &c. laudantur. In Tussi sicca chronica *phthisi* minitante, ubi peccat lymphæ, egregium est decoctum *e lignis cum passulis*, &c. Decoctum *raparum* in omni Tussi sicca, vel catarrhali, vel pectorali vel stomachali est nobile remedium, quod aliis irritis vidi optimum.

Sydenhami sententia.

Tussis epidemica. Art. 487. Tusses aliquando sunt *epidemicæ* nemini fere parcentes; Hæ pendent plerumque a febre aliqua constitutionis prægressæ, tanquam a morbo primario; ideoque quando cum febre implicentur; respiciendum est ad istius morbi genus; cum vero tusses sine febre contingant, curandæ sunt sola a carnibus abstinencia, moderato exercitio, & *ptisana pectorali refrigerante*: quandoque vero tusses *epidemicæ* ad tussim puerorum convulsivam quam proxime accedere videntur, & tunc eandem fere postulant medelam, viz. *venæsectionem* & *catharsin*.

Curatio. Art. 488. Tussis recens (*phthisi* nondum confir-

firmata) sola abſtinentia a vino & carnibus , & uſu lohoch. ex ol. amygd. dulc. &c. & tab. domestic. ſeq. ordinario ſubigitur ; ℞. Sacchar. cand. ℞iſſ. coq. in q. ſ. aq. font. uſque dum adhæreſcat extre- mis digitorum , tum add. pulv. glycyrrhiz. enul. campan. ſem. anis. angel. ana ℥ſſ. pulv. ird. flo- rent. ſulph. ana ℥ij. ol. anis. chym. ℥ij. ſ. ſ. a. ta- bellæ. Sin vero , his tentatis , ſuperſtes maneat (præcipue ſi febrem comitem habeat , vel a peri- pneumonia vel pleuritide originem ducat) ineptum fuerit pectoralibus fidere ; ſed venæſectione & ca- tharſi debellanda eſt ; ſi autem denique huic me- thodo non ceſſerit , tum capiat æger balf. Peruv. gut. x. in coch. j. ſyr. heder. terreſt. ter in die ſu- perbibendo ℥iij. decoct. amar. ſine purgantibus ; ſed in tuffi diuturna vel phthiſi omnibus aliis præſi- diis equitatio (492.) palmam facile præripit .

Farrago ſententiarum.

Art. 489. Si Tuffis a catarrho oriatur , curatur ut catarrhus ; ℞. Terr. catechu. ℥iv. ſacchar. pe- nid. in aq. roſ. ſolut. (℥vi.) mucilag. gum. traga- canth. q. ſ. ſ. trochiſc. ſi ſub linguam teneantur , tuffim curant , (inquit Bonetus) viſcidam & tena- cem pituitam bene ſolvunt , eamque commode ex- pectorari reddunt , quare in his affectibus pulmo- niacis mihi in frequenti eſt uſu , ſemperque meo deſiderio reſpondet hoc remedium.

Terra ca-
techu, &
alia re-
media.

Remedia nonnulla alia melioris notæ ſunt , quæ ſequuntur , viz.

Syrupus ex allio ſequens ;

℞. Rad. enul. campan. inciſ. ℥iv. zinzib. ℥vi. rad. liquirit. ℥vj. coq. in aq. font. ℞vj. ad ℞iv. ſub finem ad lobul. allii tenuiter inciſ. ℥iv. ſem. anis. contuſ. ℥iſſ. colatur. ad ſacchar. q. ſ. ut ſ. ſ. a ſyr. Pharm. paup.

Thro-

Throchisci balsamic.

℞. Balsam. Tolutan. ℥ss. pulv. rad. irid. enul. campan. ana ℥ij. gum. Arab. trag. ana ℥j. flor. benzoin. ℥ij. sacchar. cand. ℔ss. omnibus in pulv. subtil. redactis cum q.s. mucilag. gum. tragacanth. f. s. a. trochisci.

Item . *Balsam. sulphuris anisat. & extractum pectorale, Lohoch. rub. & Lohoch. myrrhisat. præcipue Fulleri in recenti Tussi conveniunt.*

Admonitio.

Art. 490. Discant ægroti Tussi laborantes, tempore idoneo, & cum morbus altas nondum egit radices, validisque adhuc viribus, remedia adhibere.

*Principiis obsta, sero medicina paratur,
Cum mala per longas invaluere moras.*

P H T H I S I S P U L M O N A R I S.

Sydenhami sententia.

Phthisis Pulmonaris.

Art. 491. Phthisis pulmonaris a frigore hyemali plerumque ortum ducit, & gradatim crescit, viz. ab humore in pulmones delapso, unde catarrhi ritu eos ita jugiter irritat, ut tussis inde excitetur tantum non continua; & progressu temporis symptomata reliqua succedunt, & morbus frequenter evadit incurabilis.

Curatio.

Art. 492. Tentandum est tamen defluxionem in pulmones minuere venesectione & catharsi leni, tum pectoralibus ad varios morbi status accommodatis, scilicet incrassantibus, vel attenuantibus, & febrem hecticam temperantibus cum emulsionibus, lacte asinino, &c. & postremo ulcus sanantibus cum balsamicis, opobals. dos. gt. xx. sed hoc non est sumendum nisi prægressis evacuationibus debitis: sed palmarium hujusce morbi præsidium est, ut æger quotidie equo vehatur; & qui

Equitationis beneficium.

se

se huic corporis exercitio sanandum tradit, nullis jam diætæ legibus adstrictus, nullo cibi potusve genere privandus est; cum in hoc uno omnis rei cardo vertatur: hoc solummodo observando, ut si æger juvenilem ætatem prætergressus fuerit, plus temporis huic exercitio impendere debet, quam si puer aut juvenis esset, & sane haud multo certius *cortex Peruvianus* feбри intermittenti, quam in hac ætate *equitatio* phthisi medetur. Quibusdam eorum, qui ex hac methodo convaluere, tumor in collo exortus est non multum a *scrophulis* abludens.

Tumor in collo.

Art. 493. In Phthisi materia purulenta per tussim excreta in ignem coniecta tetrum spirat odorem, & immissa in vas aqua repletum fundum petit. Sudores nocturni, genæ livescences, faciei pallor, nares exacutæ, temporum collapsus, unguium incurvatio, capillorum defluxio, & alvi profluvium colliquativum, mortem statim subsequituram denuntiant. Inter chronicos Phthisis *duos fere trientes* jugulat. „ Nasus acutus, oculi concavi, collapsa tempora, aures frigida & contractæ, cutis circa frontem dura, intenta & resiccata, totiusque faciei color subviridis, niger aut lividus, lethale. Hæc est illa *facies Hippocratica* vulgo dicta, ob traditam ab Hippocrate descriptionem, quæ humidi calidique nativi consumptionem, adeoque mox futuram mortem indicat.

Prognosis.

Facies Hippocratica.

Mortoni sententia.

Art. 494. Phthisis pulmonaris pendet aliquando a mala conformatione pectoris, estque illa vel *naturalis*, quando pectus sit nimis angustum, cer- vix longior quam par est, omoplatæ tanquam alæ videntur; vel *accidentalis*, ubi curvitas vel pectoris distortio. Signum Phthiseos appropinquantis primum est *tussis arida*, quæ per menses aliquot

Phthiseos causa & diagnosi.

quot durat; catarrhus vero simplex est, humorosus & brevis. Vomitus vel vomendi dispositio post primum tussi prædicta concitata est signum Phthiseos certissimum. Signum secundum est *febris hectica* cum calore in volis manuum, & rubore genarum præcipue post primum. Tertium *extenuatio* partium solidarum in extremis digitorum maxime conspicua, unde incurvatio unguium; & postremo *febris putrida hectica* superveniens.

Phthiseos
signa pathogno-
monica.

Art. 495. Inter signa pathognomonica phthiseos confirmatæ, primum est *febris inflammatoria*, inflammationis pulmonum tuberculis, quæ febris tanquam febres aliæ inflammatoriæ tractanda est, viz. *victu tenui*, medicamentis *pectoralibus*, & *expectorantibus*, *linimentis*, & præcipue *venæsectione*, utcumque emaciatus sit æger (est enim *peripneumonia* cum pulsu serrato) *ol. lini* est remedium in hoc casu nunquam satis laudandum. Febrem hanc inflammatoriam sequitur *putrida intermittens*, quæ fit a suppuratione tuberculorum ob venæsectionem omissam, vel nimis parce celebratam, vel aliter; hoc autem est signum pulmonum corruptorum certissimum. *Cortice Peruviano* non profligatur, neque *antihæctic. Poterii*, aut ullo alio remedio, nisi ulcere prius curato; hanc autem comitantur insignes aliquot evacuationes, seu corporis colliquationes (& hoc est signum pathognomonicum secundum), expectoratio materiæ purulentæ (pus phthiseos confirmatæ est graveolens, & etiamsi sit spissum, non tamen glutinosum seu tenax, sed fluidum, variorum colorum, viz. flavi, viridis, sed frequentius cinerei). Sudores colliquativi, quos si arte obstruentur, insequuntur tumores hydropici in pectore vel cruribus, sive dysenteria vel diarrhoea. Signum ultimum est *salvatio*, unde calor gutturis præternaturalis, & aphthæ pertinaces, incurabiles, (mortem non procul abesse plerumque nunciantes.)

Curatio.

Art. 496. Ad therapiam quod attinet, in principio

cipio venesectione, lenis purgatio cum pil. stomach. Ruffi tinctura sacra. (calomel.) &c. conveniunt diuretica, millepedes vivi. & preparat. bals. sulph. terebinth. acidula. Diaphoretica, antimon. diaphoret. ceruss. antimon. privatim decoctum lignorum (in aq. calc.) si adsit catarrhus & calor hecticus cathartici opiata sunt admiscenda, reliquis antecellit pil. cynogloss. seu styrac. Radatur caput & aperiantur fonticuli. (Atque hæc est summa curæ rationalis & radicalis phthiseos pulmonaris. Inconfesso est phthisicos confirmatos rarissime curari; non tamen idcirco plane sunt deserendi; cum palliativa cura debeatur illis, qui non possunt curari perfecte.)

Art. 497. In diarrhœa decoctum album pro potu communi; sed opium est unicum præsidium, elect. ad diarrhœam seq. in praxi nostra maxime efficax expertus sum. ℞. Ocul. cancr. præp. ℥iij. coral. rub. præpar. matr. perlar. ana ℥ij. margar. præp. ℥ss. spec. confect. de hyacinth. ℥j. ol. cinnam. chym. gr. iv. mir. cydon. ℥j. laudan. Lond. sp. croc. solut. gr. vj. syr. balsamic. q. s. m. f. elect. Ad acrimoniam humorum obtundendam injiciatur quandoque enema ex jussulo ovin. cum diascord. ℥ss. opiata bene ferunt hoc in casu ob metathesin materiæ morbificæ a pulmonibus ad intestina; diarrhœa tamen non est temere aut nimis cito sistenda, ne gravius malum accideret, quod optime præcavetur expectorantia & lubricantia certis intervallis propinando, & diarrhœam moderando potius quam penitus vincendo.

Art. 498. Ad tussim importunam & vigilias per tinaces levamen vix procurandum est, nisi ab opio; cum cautela tamen exhibendum est, parce, & non sine maxima necessitate; ne languores, dyspnœam, extremorum frigus, &c. inferat, & mortem properet, & medico dedecus pariat. Hic in usum veniunt linctus, trochisci, &c.

Art. 499. Sudores colliquativi, nisi sunt valde im-

Sudores
colliqua-
tivo.

immodici, sunt tolerandi; sin vero sint maxime profusi, ita ut languores usque ad deliquium fere inducant, *astringentibus* & aliis propriis adminiculis moderari debent. Sequentē julap. uti soleo; ℥. Aq. tormentil. germ. querc. plantag. ana ℥iij. cinnam. ten. ℥iv. mirab. ℥. j. margar. præparat. coral. rub. præp. ana ℥ij. bol. ver. sang. dracon. ana ℥ss. ter. japon. ℥j. syr. myrt. ℥iss. sp. vi-
triol. (dulg.) q. s. ad gratam aciditatem. m. f. julap. sumat ℥ij. vel iij. omni bihorio vel trihorio phiala bene agitata.

Baynardi sententia:

Ad febrem hecticam. Art. 500. „ Si calor hecticus sit insignis, & phthisis celeri cursu progrediatur, convenit *dietæ lactea*, & *lac asininum* (si comparari possit) eligendum est; quoniam est minus crassum: huic vero *succedaneum* adinvenit, quod etiam valde commendat *clarissimus Baynard* in *appendice ad psychrolusiam*, nimirum *serum* sive *lac butyraceum*; quamplurimis (inquit) indicationibus satisfacit; refrigerat, humectat, nutrit, &c. & deinde inferius pergit laudatus author fidenter affirmans, & expertus loquens se compertum habuisse, quod plures ex continuato usu *hujusce lactis* a caloribus præternaturalibus & etiam hecticis liberati fuissent; iisque, quibus calor est ingens & fitis importuna leviter acidulum præberi debuisset, recens vero & dulce magis nutriat. „ Et revera hæc omnia merito dicta esse arbitror: Ego etenim plus semel *raucedinem* per-
tinacem & *catarrhum* mediante hoc remedio, utcunque vulgari, feliciter sustuli; & in febre *hectica* magno fuisse commodo pro certo deprehendi.

Ettmulleri sententia.

Art. 501. Phthisici dicuntur κατ' ἐξοχὴν ii, qui Phthises
varia. ulcere pulmonum laborant, & habent febrem hecticam conjunctam; eandem etiam habent ii, qui phthisi renali, jecorali, a vitio mesenterii, &c. laborant, tabidi evadunt. Tabes a glandularum mesenterii vitio solet habere abdomen inflatum ac tumidum cum dolore in ejus profundo obtuso, ac plus minus gravativo, itemque cum renitente hinc inde sparsa duritie circa umbilicum observabili.

Art. 502. Tussis phthisicorum non statim est pulmonalis, sed stomachalis, (485.) cui tandem acrioris lymphæ occasione per glandulas asperæ arteriæ, aut pulmonum excretæ tussis pulmonalis supervenit. Materia viscida in aquam exspuita supernatat, pus vero fundum petit. Materia pinguis phthisicorum urinæ innatat.

Art. 503. Vomitoria sunt optima in omni phthisi Curatio. incipiente, maxime si malum sit a vitio stomachi; purgantia sunt omnino vitanda; syrupi & saccharata omnia plus nocent, quam prosunt. Lindanus refert se curasse quendam domesticum atrophiam laborantem solo decocto ex radice hellenii cum passulis & glycyrrhiza, adjecta 10^{ma} parte vini Hispanici, nam & hoc nutrit egregie; laudatur rob. passularum.

Art. 504. Febris hecticæ hæc tria sunt quasi signa pathognomonica, 1^o. calor ipsi ægro fere occultus vix sensibilis, ab omni pasto post aliquot horas acutus. 2^o. Adest absumptio & extenuatio corporis successiva. 3. Pulsus celer, parvus, frequens, debilis & subinde durus, efflorescit plerumque facies colore plus minus rubicundo, & sudores nocturni infestant; accidit etiam frequenter capillorum defluvium, totius corporis lassitudo, frequens lipothymia; somnus horis matutinis est

rarus ; ægri conqueruntur de æstu interno . Hectica incipiens *difficillime* cognoscitur , *facillime* curatur ; confirmata e contra . In statu morbi urina in summitate pellem habet quasi oleaginosam , araneorum telis similem . In *saturno* singulare quid latet contra febrem hecticam , & internas viscerum exulcerationes & corruptelas . Laudantur *antimon. diaphoret. & antihæctic. Poterii* , & *decoct. e lignis* præ reliquis in lymphæ acrimonia , ut & *sperma ceti* . Ad ulcus pulmonum abstergendum , & sordes nimis hærentes eliminandas optima sunt ex *tabaco* remedia , utpote quæ præter vim expectorandi *vulnerariam* quoque possident . Potus ordinarius phthisicorum hecticorum commodissime conditus sit *fumo sulphuris* ad imitationem *Hellmontii* . Immo & *fumus sulphuris* cum aliis per os attractus singulares est experimentum cujusdam *medici Hiberni* , quo aliquot desperatos phthisicos curavit , uti refert *Boyle* .

Villisi sententia .

De virtutibus cespitis cremati & aliorum remediorum .

Art. 505. Communis observatio est , regiones istas , sive in *Anglia* , sive in *Belgia* , ubi cespitis ignes nutriuntur , & odorem valde sulphureum spirant , tabem rarius infestare ; quinimo loca ista phthisi obnoxia , aut ea laborantibus maxime salubria , & non raro sanativa existere ; cui accidit quod suffumigium ex *sulphure & arsenico* (quod sulphure copioso refertum est) pro curandis pulmonum ulceribus pene deploratis remedium licet ultimum , efficacissimum tamen habetur . Haud novi præstantius remedium in tussi quacunque , modo febris absit , quam tinct. *sulph.* (sine empyreumate) *dos.* a gr. vj. ad x. mane & vesperi in coch. syr. idonei .

Sylvii sententia.

Art. 506. Nullum hactenus reperi medicamentum, quod vel externe vel interne usurpatum citius citiusve non tantum mundaverit, sed insuper consolidaverit recentia ulcera, atque *sulphuris balsamum*; cæteris vero omnibus imprimis præfero istud cum *oleo anisi* paratum, modo lente paretur, ita enim longe gratior fiet, & convenientior, alias empyreuma redolet & acrior existit. Insuper pus ipsum tenuius fluidiusque reddit; adeoque ipsius excretionem promovet, ac faciliat. Ad mundati ulceris consolidationem quoque multum laudari solent *rosa rubra*, *conserva*; & aliis præparationibus præfero decoctum *rosarum rub.* cum forti expressione paucis *saccharo* edulcoratum.

Laus balsami sulphuris anisati.

Farrago sententiarum.

Art. 507. Tabes maxime fit ætatibus ab anno 18. usque ad 35. *Hippocr. aphor.* In aliis ætatibus evenire potest, at in isto vitæ stadio multo periculosior existit.

Quibus potissimum tabes accidere solet.

Art. 508. Phthisis est morbus *contagiosus*, per indusia, per vestes, per linthea, per lectos, phthisin communicatam fuisse mille docent exempla (inquit *Bonetus*). „ Extant quidem hujusce *contagii* nonnulla exempla, sed, pace viri, non „ sunt adeo frequentia.

Phthisis est morbus contagiosus.

Art. 509. Quamdiu tabes est in primo gradu, & probabile est sanguinem non esse extravasatum, ulcusve nondum factum, debet ante usum decocti *ex lignis*, & dum *purgantibus* utimur, adhiberi *mercurius dul.* non quidem cum purgantibus simul eodem die, sed sine purgantibus post aliquot dies. *Pitcarn. in MS.*

Usus mercurii dulcis.

Art. 510. Hoc constanter affirmo me contra omnium fere scriptorum practicorum sententiam

Acida in phthisi.

aci-

Coagu-
lum vitu-
linum.

acidis temperatis felicissime usum in curatione
pthiseos (in hoc convenit author cum Colebat-
ch.) *Barbette* . „ Atque hic liceat mihi obiter
„ tantum mentionem facere *coaguli vitulini*, quo
„ utuntur caseo conficiendo, tanquam fere uni-
„ ci acidi animalis, non solum in hoc morbo,
„ (maxime in *Hæmoptisi*) ; sed in nonnullis
„ aliis, de quibus hic non est dicendi locus,
„ opem ferentis. „

Elate-
rium.

Art. 511. Quæro cum in hydrope tussis vehe-
mens moveri soleat, & elaterio sedari, annon ea-
dem phthisis etiam elaterio, parce dato, tollatur?
Lister de hydrope, p. 20. Dubitatur,

Remedia
varia.

Art. 512. Remediorum sequentium vires & usus
lector ipse expendat. *Antibæcticum Poterii*. *Bals.*
sulph. anisat. nitrum saturnisat. Syrup. de peto. Sac-
char. saturni. Aqua balsamica. Aqua limac. scor-
but. aq. limac. pectoral. decoct. phthisic. express. mil-
leped. simplex. Jusculum galli. Jusculum cancrorum
fluviat. Jusculum consummatum. Lixivium de cal-
ce. Lohoc. myrrhisatum. (Phthisicis primo adhuc
stadio optatissimum est, præstantissimumque pro-
fecto remedium. *Fuller.*) *Tinctura antiphthisica.*
Decoctum flor. bellidis major. Specificum habetur.
Decoct. phthisicum, linimentum anodynum.

P H T H I S I S N E R V O S A.

Mortoni sententia.

Phthisis
nervosa.

Art. 513. Phthisis nervosa est absumptio corpo-
ris tabida sine febre, tussi, vel anhelatione insi-
gni, appetitu tamen dejecto, & concoctione de-
pravata, languent vires exhaustis carnibus & ro-
bore; aliquando *indigenis* accidit (immo nuperis
annis sæpissime, ratio in propatulo est, scilicet,
ex nimia spirituosorum liquorum indulgentia;)
sed frequentius huc revertentibus ab insulis nostris
in *India accidentali*. In principio habitus corpo-
ris oedematosus apparet, & quasi chylo spiritibus
desti-

lus fastidit omnia exceptis liquidis; urina est pauca, & plerumque rubicunda, aliquando tamen, ut in aliis nervosis affectibus, pallida & copiosa; nulla adest febris aut dyspnœa, nisi in ultimo morbi stadio. Constat luculenter genus nervosum affici (& primario ventriculum.)

Art. 514 Causæ *procatarticae* ut plurimum sunt graviores animi affectus, liquorum spirituosorum nimis libera ingurgitatio, aer insalubris, &c. (omnia etiam quæ cruditates, affectus *hypochoondriacos* & *scorbutum* parere solent.) *Causa procatartica.*

Art. 515. Est morbus revera *chronicus*, &, nisi in ipso principio, curatu difficillimus; terminare solet in tumore *hydropico* incurabili. *Curatu difficilis.*

Art. 516. Quod ad therapiam attinet in usum revocanda sunt medicamenta *stomachica* interna & externa, *chalybeata*, *antiscorbutica*, *cephalica* & *amara*. Instituitur purgatio cum *spec. hier. in aq. rut. cerus. nigr. & pœon. comp.* externe empl. *stomach. magistral.* cum *gt. aliquot cinam. & absynth. ventriculo.* In æstate *aq. minerales chalyb. dictæ*; inter chalybis præparationes *extractum myrsicht.* anteponendum est. *Curatio.*

Art. 517. „ Huic malo quoque affinis est iste, „ qui a Villisio *atrophia scorbutica* appellatur. *Atrophia scorbutica.* „ p. 116.

Art. 518. „ Mœror qui est animi dolor, & lucubratio nimia, quæ est ejusdem labor, ambo „ Phthisi plerumque viam sternunt, ast omnium „ quæ mihi hætenus nota sunt, nihil corpus adeo „ velociter absumit, ac *insanus amor*, quando „ *ambit & non exambit.* „ *Animi affectus sapissime hujus mali causa.*

Tabes reliquæ ab aliis morbis ortum ducentes, aut ab iis quodammodo pendentes.

Mortoni sententia.

Art. 519. In phthisi ab hæmorrhagia, hæmorrhagia suppressa, vescatur æger jascula & gelatinas, *Phthisis ab hæmorrhagia;*

tinias, & alios cibos bonum nutrimentum præbentes. Convenit *dieta lactea*; incidit plerumque æger in febrem hecticam, quæ *cort. Peruv.* profliganda est, ne in Phthisi pulmonari incurabili desinat.

Phthisis
a gonorrhœa vel
fluore albo.

Art. 520. Phthisis a gonorrhœa vel fluore albo exorsa, confirmata cum sit, est prorsus immedicabilis; si recens fuerit, fluxus est sistendus, & æger cum euchymis nutriendus, & calor hecticus, modo adsit, *dieta lactea*, aut *aq. chalybeata* extinguendus.

Phthisis
ab apostematibus
& ulceribus.

Art. 521. In Phthisi ab apostematibus & ulceribus, ulcus tempestive sanandum est ope externorum & internorum, *aq. calcis* seq. sit pro potu ordinario; ℞. *Rad. sarsaparil. incis. ʒvj. uvar. Corinth. ℥ss. infund. in aq. font. ℥xij. coq. ad dimid. in colatura extingue calcis viv. ℥ss.* per residuum depurat. sit pro usu. Nisi habitus sit jamjam hecticus *cathartica mercurialia* sunt usurpanda ad accelerandam ulceris curationem; immo excitare licet levem *ptyalismum* cum fructu; in usum veniunt *balsamica*, ut *syr. balsam. bals. Locatelli, Tolutan. &c.* suprema cura adhibenda est, ne Phthisis pulmonaris sequatur; quamobrem a curato ulcere fiant *fontanellæ*, continuetur usus *balsamicerum, dietæ lact. acidularum, &c.*

Phthisis a
lactatu.

Art. 522. Phthiseos a lactatu signa præsagientia sunt 1º. Appetitus diminutio; 2º. Spirituum languor & imbecillitas corporis 3º. Oppressio hypochondriorum. Tempestive ab lactandus est infans, & nutrix *diætæ lact.* committenda.

Phthisis a
diarrhœa
&c.

Art. 523. „ Phthises a diarrhœa vel dysenteria, „ a diabete, a salivatione, ab hydrope, & a sudore nimio nihil habent peculiare a morbis primariis & Phthisi in genere dicendum.

Phthisis
scrophularis.

Art. 524. Phthiseos scrophularis signa diagnostica sunt plerumque tumores scrophulares & crudi in externo corporis habitu, accomitantes vel præcedentes, ophthalmix, aut scabies, & similes affectus scrophulares. (1277.)

Art.

Art. 525. Vitanda est *dieta lactea*, utpote obstructiones pariens. *Radices scrophulariae, filipendulae, millepedes, &c.* cum *ingred. pulmonar. & balsamicis* conveniunt. *Opium* rarissime usurpandum est. („Animadversum est a *Sculteto* mesenterium

Curatio.

„hoc malo semper primo esse affectum, & frequenter tumoribus strumaticis obsideri, sanis adhuc partibus externis; & in hoc casu difficile est quidem; nisi conjectura sola, morbum invenire; priusquam ægrum pene interfecerit. „) Convenit *emplast. de sapone* toti abdomini, &c.

Art. 526. „Est aliquid singulare in decocto *fol. tussilaginis* ad hunc morbum curandum; „etiam in ægris maxime deploratis, & fere desperatis. *Fulleri medicina gymnastica.* (v. locum p. 92. &c.)

Decoct.
tussila.

Art. 527. Phthiseos scorbuticæ signa diagnostica præcipua sunt eruptio macularum hinc inde sparsarum per universam cutem, scretio fere perpetua puris viscidissimi a glandulis jugularibus præcipue tempore matutino, exulceratio & extenuatio maxillarum.

Phthisis
scorbutica.

Art. 528. Conveniunt *pectoralia incidentia* cum *antiscorbuticis*, ut *summit. pini, rad. oxylapach. authoris pil. balsamic. chalybeata, acidula, &c.* *opium* omnino vitandum est, ut & *dieta lactea*, & *immodica fumisuctio*.

Curatio.

Art. 529. Phthiseos asthmaticæ signa diagnostica sunt anhelatio, & spirandi difficultas; hæc autem Phthisis est valde chronica, & est Phthisis se-
nectutis.

Phthisis
asthmatica.

Art. 530. Omnia *incrassantia* sunt vitanda; pro sunt *medicamenta expectorantia, incidentia, &c.* ut *syrupus de erysimo, e 5. rad. millepedes, pil. balsam. nostr. &c. venæsectio* in paroxysmo, *oxymel. scillit. & aq. cinnam. fort. ana p. æ.*

Curatio.

Art. 531. Phthisis ab affectu hypochondriaco vel hysterico a cæteris distinguitur symptomatis his affectibus peculiaribus.

Phthisis
hypochondriaca.

Art. 532. Curatio est fere ejusmodi cum aliis (præcipue cum Phthisi scorbutica) conducunt *volatilia, chalybeata, &c.*

Harvei sententia.

Phthisis
ab hæmo-
ptoe.

Art. 533. In Phthisi ab hæmoptysi sanguis a pulmonibus ejectus sine dolore per tussim exantlatur; & si rupta fuerit vena, ut plurimum prima eruptione magna copia egeritur, & postea minori quantitate: in principio apparet tenuis, sincerus & floridus cum spuma flavescente; progressu temporis pallidior & aquosior evadit cum bullulis; & postremo cum pure commistus excernitur. Quia per *diapedesin* expectoratur, dilutior est, & minus copiosus cum humore seroso vel purulento confusus.

Etmulleri sententia.

Hæmo-
ptysis.

Art. 534. Hæmoptysis est quando sanguis ex pulmonibus per os tussiendo ejicitur, aliquando, sed rarius, sine tussi; sanguis rejicitur vel floridus vel semigrumosus, facile vel difficulter, cum vel sine dolore, spumofus vel non. Si ex pulmonibus provenit, sæpius *vomicam, empyema*, aut *peripneumoniam*, & hinc *Phthisin* post se trahit.

Curatio.

Art. 535. Convenit *venesectio*, *purgatio* vite-
tur; *diuretica* & *diaphoretica* locum habent; *opia-*
ia sunt perquam proficua, in specie semen *hyo-*
sciami est nobile specificum tam veteribus quam
modernis commendatum, cavendum est tamen
in ejus usu ob vim narcoticam ne exhibeatur in
nimia dosi, sed tutius est propinari repetitis vici-
bus; maniam etenim inducit nimis larga dosi.
Respicendum est ad acrimoniam sanguinis in hu-
jus mali cura, hoc facto, quæ in capite de hæ-
morrhagia tradita sunt, hic locum habent. *Hede-*
ra terrestris est plane mirabilis, item succus *urti-*
cæ, catechu, trochisc. de carabe, oleum lini co-
chlea.

chleatim sumptum mira præstat, ol. vitriol. succ. cydon. decoct. hord. cum passul. min.

Art. 536. „ Hæmoptysis est vel *accidentalis* vel *habitualis*; posterior est Phthiseos signum: cor-
tice Peruv. optime & tutissime curatur, astringentibus sistitur, ut bol. armen. sang. dracon. lapid. hematit. &c. Morton.

Art. 537. Mantissa. Elect. Boylean. elect. Peruv. astring. elect. styptic. emulsio styptic. haust. japon. loboch. japon. pulv. hæmoptoicus, stypticum regis. Syrupus Boylean. succus urtic. menth. sed præ reliquis *heder. terrest.* „ In hæmoptoe *accidentali* desperata, cæteris incassum tentatis, (sicut in aliis omnibus hæmorrhagiis) medici expectationem rarissime frustratur sequens remedium;
℞. Aq. plantag. vin. rub. astring. ana ℥ss. syr. papav. errat. ℥ij. ol. vitriol. quantum lingua ferre potest; f. iulap. suffitus ex calce viv. & acet. in extremis eximie confert.

Remedia varia:

Mortoni sententiâ.

Art. 538. In Phthisi a chlorosi vel mensium obstructione non nisi in principio *chalybeata* tentanda sunt; calorem enim hecticum adaugent, & sanguinem exagitant; sed potius *pulmonaria*, &c. sunt usurpanda.

Art. 539. Phthisis a pleuritide vel peripneumonia male tractata; iulapiis contemperantibus, expectorantibus, venæsectione, acidulis, &c. tractanda est, vel si sit empyema, *paracentesi*. Milipedes, decoct. sars. sal. succin. diuretica, &c. Historia prima hoc morbo laborantis est insignis & notatu dignissima, vide locum.

Art. 540. Phthisis ab ictero non curatur nisi sublato morbo primario; ideoque remediis *antitericis* oppugnanda est.

Phthisis ab ictero:

VOMICA PULMONIS.

Vuillisii sententia.

*Vomica
pulmonis.*

Art. 541. Rara est mentio hujus affectus apud authores. Vomica Pulmonis plerumque accidit sine febre aut phlegmone, immo sine tussi immixta, aut sputo, tacite ac velut improvise in pulmone generatur, & non raro non prius se prodit, quam patientem interimit. Latet (inquit *Tulpius*) inter initia ita clanculum, ut vix ulla sui proferat indicia, præter tussiculam, primo siccam, mox humidam, qua aliquandiu continuante, trahitur difficulter spiritus, deficit anima, & emarcescit paulatim corpus, licet interim nec sanguinem præ se ferunt sputa; sed si rumpatur nec opianti vomica, occiditur (dictum ac factum) homo. Ita interdum solet contingere; verum novi plures, qui ex Pulmonis Vomica sensim orta, maturata, & demum rupta, pus copiosum & foetidum expuissent; cumque tale sputum per multas hebdomadas, imo menses quotidie excernentes debiles adeo & velut tabidi evaserint, tandem medicamentorum ope, cum ulcus detergeretur & siccaretur, integre convaluisse. Ab abscessu in Pulmone exoritur, & pus sæpissime insigniter foetet, eoque differt a sputo, quod in peripneumonia & phthisi ejicitur. Causæ remotiores latent, neque per signa ulla *pathognomonica* dignosci valet hicce morbus, neque prognosis institui potest, antequam ictu ferali se prodit.

Curatio.

Art. 542. Post Vomica disruptam medendi methodus fere eadem est ac post sectionem *empyematis*, aut in *phthisi* incipiente; in hoc casu *lactasinum* sæpe prodest; observavi quoque *fontanellam* in latere excitatam non raro insigniter profuisse. Historias quasdam adducit author, de quibus consulendus est. p. 205.

Bagli-

Baglivii sententia.

Art. 543. Tuberculo Pulmonum laborantes de cætero bene se habentes; difficulter spirare incipiunt, inter spirandum non stertunt, & nihil expuunt, dolorem quoque in pectore sentiunt continuum, & dolentem in locum decumbere non possunt, sicca tussi laborant, tandem genæ rubent, febricula supervenit; & negotio ad suppurationem vergente alia suppurationis symptomata accedunt. Duo tamen tanquam *pathognomonica* crudi & adhuc incipientis tuberculi signa sunt, *tussis sicca*, & *dolor lenis* in alterutro pectoris loco; & quamdiu quidem tuberculum adhuc crudius fuerit, dolorem exilem & tussim siccam inducit. Qui tuberculo Pulmonum laborant, sæpissime derepente moriuntur; nam suppurato tuberculo pus erumpit in trachæam, & suffocat: hinc quo longius a trachæa, & Pulmonum centro distat, eo minus periclitantur de suffocatione; pus enim in cavitatem pectoris erumpet, aut per urinas eliminabitur.

Baglivius vomicam accurate describit.

Etmulleri sententia.

Art. 544. Vomica Pulmonum & phthisis in eo saltem differunt, quod Vomica sit *ulcus Pulmonum clausum* seu *abscessus*, phthisis *ulcus sordidum ex abscessu iam aperto*: nam in Vomica interdum pus est laudabile, quod suis membranis inclusum citra excretionem in Pulmonibus hæret, & etiam sine tussi aliquando existere queat. A tumoris intus ruptione exsolutio, vomitus, & animi deliquium fit. *Hippocratis Aphorism.*

Differentia inter vomicam & phthisin.

A S T H M A.

Floyeri sententia.

*Asthma-
tis defini-
tio.*

*Asthma-
tis conti-
nui causa*

Art. 545. Asthma est respiratio difficilis & laboriosa cum scapularum elevatione & sibilo, a compressione, coarctatione, vel obstructione vasorum pulmonalium. Estque vel *continuum* vel *periodicum*. Asthma *continuum* pendet a compressione venarum & vasorum bronchialium & vesicularum pulmonalium vel nervorum. 1°. Propter pectoris hydropem. 2°. Empyema, phlegmonam, abscessum vel tuberculum. 3°. Polypum in vasis sanguiferis, sanguinis ipsius coagulationem, varicem, plethoram, obstructions catameniorum, hæmorrhoidum, fonticulorum, ulcerum, pforæ, &c. 4°. Lapides in trachæa generatos. 5°. Obesitatem nimiam, vel intumescentiam thymi. 6°. Gibbam. 7°. Pulmonum adhæSIONem. 8°. Nimiam pulmonum intensionem a cursu (vociferatione,) &c. 9°. Hydropes, tumores visceris alicujus insignioris. 10°. Coli vel ventriculi inflationem. 11°. Paroxysmos apoplexiæ, vertiginis, lethargi, serum extravasatum nervos opprimens. 12°. Tumores pulmonum flatuosos, quemadmodum accidit in equis ilia ducentibus, vulgo *broken-winded Horses*.

*Periodici
causa.*

Art. 546. Asthma *periodicum* pendet a compressione vasorum & vesicularum bronchialium mediante halitu flatulento, & morbis sequentibus plerumque succedit; 1°. Febris intercurrentibus, variolis, peripneumoniis. 2°. Catarrho. 3°. Affectionibus hystericis. 4°. Ephemeræ, a sex non naturalibus, maxime aeris mutationibus subitaneis, pendentibus. 5°. Cacochymia glutinosæ, flatulentæ, in ventriculo prognatæ, ibique inflationes excitanti, & denique inflationem in pulmonum vesiculis producenti. Atque hoc est *verum Asthma flatulentum periodicum*.

Art.

Art. 547. Observandum est Asthmatis continui paroxysmos frequentes esse, a nimio corporis motu, vel errore in diæta inductos, vel noctu recurrentes; sed hi recursus non sunt adeo regulares ac in Asthmate periodico, ubi decimoquoque die redeunt paroxysmi. Circa horam 2^{am} vel 3^{am} pomeridianam a prandio asthmatici sentire solent coarctationem vel inflammationem circa scrobiculum cordis vel os ventriculi, quod tunc temporis flatibus distenditur, & ructus insipidos copiose emittit; atque hæc ventriculi inflatio est primam signum appropinquantis paroxysmi, hanc sequitur sanguinis effervescencia, & huic proxima spirituum in pulmonum nervis & membranis expansio seu rarefactio quippe rigidi & inflati sentiuntur.

Asthmatis periodici paroxysmi plerumque sunt regulares; continui non ita.

Art. 548. Hora prima vel secunda matutina paroxysmus sensim obrepit; respiratio evadit lenta, & mox angusta: si paroxysmus futurus sit brevis, nempe duarum vel trium horarum, & æger e lecto surgat, dyspnœa brevi facessit, & expuit crudam quandam & glutinosum scretum, instar albuminis ovi vel solutionis gum. tragacanth. tam in Asthmate humido quam in hysterico (sicco vel convulsivo); hæc autem materies lineis nigris seu filamentis discriminatur: si vero diuturnior futurus sit paroxysmus, viz. duarum, trium vel quatuor dierum, primis diebus parum aut nihil expectoratur, sed 3^o. vel 4^o. die materia purulenta, magis cocta, & non adeo glutinosa, coloris albicantis, viridescantis, vel flavescantis, & in morbo inveterato saporis dulcis, instar sanguinis aut glycyrrhizæ, vel etiam saporis putridi, falsi, aut acidi, & frequenter cum filamentis sanguineis. Intra spatium 3. 4. aut 5. dierum paroxysmus prorsus finitur, & exinde parum aut nihil expuitur ante novi paroxysmi exorsum.

Paroxysmi descriptio.

Art. 549. Plures & diuturniores occurrunt paroxysmi in æstate quam in hyeme; ego ipse viginti in æstate, & tantum sedecim in hyeme susti-

De paroxysmis observationes variae.

stinui; in *Augusto* severiores semper; quanto diuturniores paroxysmi, tanto majora intervalla, & vice versa: Intervalla breviora mecum fuerunt 2. 3. 4. 5. 6. vel 7. dierum; longiora 8. 9. 10. vel 14. dierum; calor lecti morbum exasperat; extremum frigus est tolerabile sine injuria. Magna pallidæ urinæ copia in paroxysmo excernitur, sed sub finem rubicundior evadit cum sedimento crassiore. Quanto parcior & tenuior sit victus in paroxysmo, maxime in principio, tanto melius; minor erit quantitas chyli ad pulmones missi, & materia purulenta citius coquetur & evacuabitur, carnes itaque sunt omnino prohibendæ. De victu convenienti & improprio *vide locum p. 90.*

*Indicatio
curativa
generalis.*

Art. 550. Ad unum scopum potissimum dirigenda est cura, nempe ad *temperandam effervescentiam*: malum etenim ipsum est quasi *catarrhus*, ideoque propinanda sunt remedia *incidentia minus calida*. *Venæsectio* quotiescunque repetita solummodo levamen præsentaneum affert, senibus asthmaticis maxime perniciosa est: ad *cachexiam* enim & *leucoplegmatiam* viam munit.

*Remedia
varia ab
authore
compro-
bata.*

Art. 551. *Acetum scilliticum* ad omnes flatulentias a *Galeno* valde commendatur; sensus acuit, respirationem facilem reddit, coctionem juvat, alvum laxat, urinam movet, flatus dissipat; & præ omnibus contra asthma egregia præstat. Sequens est syrupus asthmaticus declinante paroxysmo sumendus, dos. coch. j. mane & vesperi; 24. *Syr. de erysim. prass. balsam. ana ℥ij. oxymel. scillit. aq. brion. ana ℥j. bals. Peruv. ℥ss. m.* Cortex *Peruvianus* ad avertendum paroxysmum multum laudatur, *Aqua simplex* cum *pane tost.*, additis *pauco nitro* & *sal. ammoniaco*, copiose epota, & hor. decubitus *acet. scillit. ℥ij.* mecum frequentissime adventum paroxysmi eluserant. Et *oxymel. nostr. cum rad. zedoar. &c.* vid. *Pharm. Fulleri*. Eundem ad plures menses protelavit. *Hypnotica* ad compescendam inflationem multum valent (in
asth.

asthmate *convulsivo*) testibus Riverio & modernis plerisque, inter quos clarissimus Gibbons. Mihi in frequenti usu fuit haustus seq. ℞. Aq. papav. ℥iij. sal. prunel. ℥ss. syr. papav. ℥vj. m. In paroxysmo omnia calida sunt maxime perniciofa, acida blanda sunt magis proficua, ut mala aurantia, limonia, citria, fructus berber. acetum, ol. sulphuris per campan. &c. ℞. Conserv. acetos. cynosbat. rob. berber. ana ℥j. crem. tartari ℥iij. syr. limon. q. s. m. f. elect. pro pauperibus posca, gas sulph. (i. e. aqua fumo sulph. saturata), quod remedium est maxime efficax. Semel atque iterum exhibui medicamenta *mercurialia* in hoc morbo cum felici eventu, sed hoc fuit in *leprosis*. De virtutibus acet. vide locum p. 183.

Vvillisi sententia.

Art. 552. Observare licet graves asthmatis paroxysmos sine quavis notabili pulmonum labe accidisse, revera ut putaverim hunc morbum aliquando esse mere *convulsivum*: paroxysmo etenim finito, quin etiam priusquam incipitur, respiratio libera & æqualis satis recte ducitur, nullaque tussis, aut valetudinariæ pulmonum dispositionis signa apparent. Hujusce morbi varias adducit historias. Ad hujus generis asthma curandum medicamenta *antispasmodica*, potius quam *bechica* vel *pneumonica* adhibenda sunt. p. 92. *Millepedes* in hoc affectu egregia præstant.

Art. 553. Asthma inveteratum difficillime aut vix unquam curatur, magnum tamen a medicamentis juvamen accipit, in deterius vergens, aut *phthisin* aut *hydropem*, aut affectum quendam soporosum vel *convulsivum* minatur. Extra paroxysmum pectoralia cum *antispasmodicis* conjungantur. Laudantur spiritus gum. ammoniac. cum sal. ammoniaco distillat. dos. a gt. xv. ad xx. tinctur. sulph. &c. sed maxime sp. gum. ammoniac. vires

ex-

Asthma
convulsi-
vum.Prognosis
& Cura-
tio.

Ettmulleri sententia.

Asthma humidum & siccum Art. 554. Adest in omni Asthmate respiratio frequens laboriosa & difficilis cum anxietate circa præcordia; adest sæpe tussis, interdum crebra & molesta, interdum non, interdum adest stertor, interdum sine stertore *orthopnea* laborant. Asthma dividitur in *humidum & siccum*, sive in manifestum & occultum; prius expectorationem materiæ purulentæ conjunctam habet, alterum est *mere convulsivum*: verum interdum hi asthmatici, in fine paroxysmi, aliquid licet parum muci emittunt, quod non causa peccans est, sed ex conatu respirationis circa laryngem & fauces aliquid colligitur, quod evacuatur: causa materialis asthmatis *humidi* aut in pulmonibus est mucus viscidus, vel pus in vomica, empyema, phthisis, &c. vel serum pulmones copiosius inundans, vel sanguis in motu impeditus; aut in stomacho & primis viis ex cruditatibus, cachexia, &c.

Curatio. Art. 555. Probe observandum est an Asthma sit morbus *primarius* vel *secundarius*; si *posterior* respiciendum est ad morbum a quo pendet. In paroxysmo Asthmatis *humidi* optima omnium sunt *vomitiva*, nec est quod exinde metuatur suffocatio, dyspnœam insigniter tollunt; in Asthmate *siccò* quoque extra paroxysmum cum fructu propinantur *cathartica*, in paroxysmo neutiquam conveniunt; malum etenim exasperant. *Venæsectio* locum habet solummodo in Asthmate ex vitio sanguinis orto. *Opiata* in Asthmate *siccò* multum conferunt, in *humido* suspecta sunt. In Asthmate *humido*, præsertim in senibus laudatur *syr. nicotianæ*. Succus *raphani* est potentissimum expectorans. *Gum. ammoniacum* est optimum remedium. *Sperm. ceti* a ʒss. ad ʒj. in paroxysmo multum levamen adfert.

De-

Denique *millepedes* in utroque Asthmate est remedium omnem laudem exsuperans. Pro curando Asthmate *siccis* live *convulsivo* conducunt in genere *antiepileptica*, *antihysterica*, *antispasmodica* & *opiatas*, *cinnabarina*, *sal. succin. castor.* &c.

Farrago sententiarum,

Art. 556. Potio *coffee* omnium maxime certissimeque inflationem mirum in modum cicurat & compescit in ipso paroxysmo. *Musgrave.* *Coffee.*

Art. 557. „ In paroxysmo diuturniori & periculoso conveniunt *vesicatoria* præcipue *tibiis* „ applicata, ex *Hippocratis* præcepto. *Epispastica.*

Art. 458. Remedia sequentia iudicio prudentis medici permittuntur. *Flor. benzoin. dos. a gr. v. ad xij. nitrum saturnisatum. Serum sinapium. Sp. nitr. dulc. decoct. expectorans. Emulsio asthmatica. Emulsio Brunneri. Expressio asthmatic. expressio milleped. hydromel. Joelis (in Asthmate humido) loboch viride (in moribundis) mistura expectorans. Oxymel. asthmatic. Floyeri.* *Remedia varia.*

C A P. V.

Sive Fasciculus Morborum quintus.

M O R B I C O R D I S.

Art. 559. **C**OR variis Morbis gravioribus obnoxium esse, & revera affici ex defunctorum sectione fatis patet. In Historia Medica occurrunt exempla *vermium* in ipsis ventriculis latitantium, item *calculorum* ibidem reperorum. Tumores *schirrosi* & id genus alii Cor occuparunt; *apostemata*, *abscessus*, & exinde *sordida*. *Cordis Morbi.*

did *ulcera* ipsam Cordis substantiam & auriculas obsederunt. Omnes Cordis Morbos absolute lethales non statim existimandum est; contrarium etenim ex *Bartholomæi Cabrollii* observatione constat. Ipse ego (inquit) præsentè *Rondeletio* duo mirabilia satis in duobus cadaveribus exhibui, in uno in basi Cordis ad coronariam *cicatricem* duos latos digitos longam detexi; in altero *ulcus* in Corde latitudine folii myrtini sat profundum. *Observ. Anatom. 26.* In adolescentis cadavere (inquit. *Cheselden. Anat. p. 169.*) magnam vim puris in pericardio, & Cor ipsum exulceratum inveni. Et in homine tabide mortuo pericardium undiquaque Cordi adhærens, & portio ipsius Cordis ossifacta, fere unius digiti lata, reperta sunt.

Inflam-
matio
Cordis.

Art. 560. Verisimillimum est medicos interdum ballucinari inflammationem cordis cum peripneumonia confundentes: æquum est enim, ut supponamus; cor inflammatione tentari, secus vix credibile est suppurationes & ulcera ibidem existere nisi præeunte inflammatione. Dies melius docebit.

Art. 561. Quo circa quoties propria Cordis substantia constitutione aliqua præternaturali afficitur, æque solliciti debent esse medici ac in morbis hepatis cerebrive, neque negligenda sunt media, quæ aliarum partium Morbis similibus subvenire solent.

Remedia
ad Vermes

Art. 562. Vermiculos & in corde & in capsulis ejus gigni extra dubium est; & Morbus hic virginibus familiaris est. Noscitur ex puncturis & doloribus Cordis, & convulsio plerumque est signum diagnosticum. *Remedia mercurialia* hic præcæteris prosunt, immo *argentum vivum* in substantia exhibitum est maxime efficax. *Hartman.*

PALPITATIO CORDIS.

Vvillis.

Art. 563. Palpitatio Cordis est motus ejus (convulsivus) adeo vehemens & immanis, ut non solum tactu manifestius percipi, verum & oculis conspici, immo interdum ad distans quoddam audiri possit. Porro ab authoribus fide dignis narratur ipsas costas interdum effringi, aut in junioribus foras propelli, p. 102. &c. de hoc morbo egregie scripsit *Vvillisius*.

Palpitatio cordis est Morbus convulsivus.

Ettmulleri sententia.

Art. 564. Causæ sunt variæ, aliquando excrementiæ verrucales Cordi adnatæ, ossificatio arteriæ magnæ prope cor, vermes in ipso Corde, aut pericardio, abscessus in Corde, status sanguinis præternaturales, polyposæ concrementiæ, calculi, flatus, ataxia spirituum animalium affectum spasmodicum faciens, (chlorosis seu pallidi virginum morbi, catameniorum obstructio.)

Causa sunt varia.

Art. 565. Quæ a scorbuto aut affectione hysterica ortum ducit, est curabilis; quæ a reliquis causis ut plurimum incurabilis. Cavendum est ab opio, venæsectio in dubium vocatur, (Galenus vero, de locis affect. capitis, instat urgente paroxysmo venæsectionem omnibus remediis præferendam esse.) Cura aggredienda est martialibus, coralliatis, cinnabarinis, volatilibus, & succinatis. Ol. cinnam. laudatur a Lindano. Rosmarinus, crocus, camphora, ambra, moscus, sal. volat. viperin. (& alia viperina) castoreum, verbo uno antispasmodica. „ Si diutius protrahatur, periculum ostendit repentinæ mortis. Qui hoc morbo in juventute tentantur, nunquam senescunt ex observatione Galeni.

Curatio est difficilis.

Art. 566. Medicus peritus de usu sequentium „ quo.

Remedia varia.

„ quomodo & quando bene novit; „ aurum mosaic. cataplasma stomach. emplast. stomach. fofus spirituosus, jutap. mofebat. mistur. hyster. spirituos. saccul. stomach. tinctur. epileptica, hac ex Pharm. Fulleri. Item, Pulv. ad guttet. sp. C. C. succinat. sp. lavend. comp. &c. Vide etiam remedia ad singultum (372.)

TREMOR CORDIS.

Vvillifii sententia.

Tremoris Cordis descriptio. Art. 567. Tremor Cordis est carniū ejus convulsio spasmodica, seu potius trepidatio, qua fibræ motrices celerrime, ac tantum semicontractæ vices ocissimas, verum abruptas & quasi dimidia-
tas efficiunt.

Curatio. Art. 568. Ad curam quod attinet, tria remedium genera maxime proficua esse solent, viz. *testacea, chalybeata, & sale volatili prædita.*

Ettmulleri sententia.

*Cum pal-
pitatione
Cordis
frequen-
ter con-
funditur.* Art. 569. In tremore Cordis pulsus inæqualis est, & languidus, subinde virium ingens prostratio & imbecillitas juncta esse solet, & cor tremulo motu vibratur, adeo ut Tremor Cordis pertineat quodammodo ad *lipothemias*: pulsus aliquando est vermicularis, pauca apud authores prostant de hoc affectu seorsim, quoniam ordinario cum *palpitatione cordis* confunditur.

*Plerumq;
est mor-
bus secun-
darius.* Art. 570. „ Est potius plerumque *symptoma* al-
terius morbi, quam morbus *primarius*; ideo-
que causa exquirenda est diligenter, & mor-
bus *primarius* inveniendus, & cura pariter in-
stituenda.

L I P O T H Y M I A, S Y N C O P E,
& Asphixia.*Ettmulleri sententia.*

Art. 571. Hi affectus differunt saltem gradualiter non essentialiter. *Lipothymia* est (gravis languor) cum insigni spirituum defectione. *Syncope* est gravius animi deliquium, non multum ab *apoplexia* distans; atrociora adsunt symptomata, ægri inopinato concidunt, sensus & motus abolentur, respiratio vix ulla, aut pulsus, partes corporis frigent & pallent cum sudore frigido. In *asphixia* omnia hæc sunt adhuc graviora, itaut cum pulsu plane abolito, & aliquandiu ad sensum cessante, ægri instar mortuorum jaceant.

*Horum
affectuum
differen-
tia.*

Art. 572. Horum affectuum causæ reliquæ, præter evidentes, quales sunt evacuationes nimix, balneationes nimis longæ, potus frigidus post corporis incalescentiam, animi pathemata, &c. sunt ut plurimum obscurissimæ, ut sunt *cordis abscessus, polypi, vermes, &c.*

Causæ.

Art. 573. Indicantur *spirituosa, volatilia, & aromatica, ol. cinnam. ambra, præ omnibus sal. volat. viperarum, aq. cordial. citr. croc. castor. (spir. carmin. sylv.) externe sp. sal. ammoniac. ol. succini, fumus succini; aliquando confert venæsectio.*

*Indicatio-
nes cura-
tive.*

Art. 574. „ In syncope facies in colorem cadaverosum mutatur, dentes, os atque manus tam arcte clauduntur, ut vix recludi possint, pulsus fere nullus & vix ulla manifesta respiratio, sudor frigidus erumpit, & externa frigent: atque his signis diagnosticis in *apoplexia* facile distinguitur.

Syncope.

Art. 575. „ Frequenter ex *polypo Cordis* ortum ducit. *Vesperus* crurum fibrosorum ramos ulnæ longitudinem superantes extraxit a fœmina cardiaca *syncope* interempta: talem in juvene

Causæ.

„cavitatem venæ cavæ fere implentem reperit,
„& aliis quamplurimis.

*Quid
agendum
est.* Art. 576. „*Sternutatoria* naribus immittenda
„sunt, *cardiacis* & *volatilibus* imprimis incum-
„bendum est, *cucurbitulae* sunt affigendæ.

P O L Y P U S C O R D I S .

Malpighii sententia.

*Polypus
Cordis.*

*Ejusdem
accurata
descriptio*

Art. 577. Polypi nomen a substantiæ *piscis* simili-
tudine ortum, peculiari cuidam tumori in nari-
bus excitato adaptari cœpit, donec observata qua-
dam in præcordiis luxuriante materia, novus hic
Cordis & vasorum morbus jam nunc audit. Fi-
guram sortitur loci in quo generatur. Moles Po-
lypi major est ut plurimum in dextro Cordis ven-
triculo quam in sinistro; in dextro autem color
est subalbidus, laridi instar, seu excreti succi,
quem vulgo pituitam appellamus, & interdum
rubra quædam vel subnigra stigmata conspersa ha-
bet: in sinistro autem colorem plerumque atrum,
& densiorem obtinet substantiam. Morbosa hæc
excrecentia suam structuram habere videtur, ete-
nim præ se fert congeriem superpositarum exten-
sarumque pellicularum, quæ substantiæ modo ner-
volum corpus cum aliquali tamen mucositate re-
ferunt, & si eadem laceretur, solvi videtur in
oblonga & solida filamenta; hæc manifestiora red-
duntur in ejus appendicibus, quæ fasciculi instar
in fibras quasi nerveas resolvuntur. Ex tota con-
creti sanguinis mole, grumosa pars appellata, af-
fusa licet purpura, multiplicibus lotionibus aq.
com. factis rubicundæ illæ particulæ detergentur,
& sanguis concretus tractu temporis albescet, &
ejus contexturam plane fibrosam & reticularem
oculis certe armatis videre licet; & hæc est ma-
teria procul omni dubio, ex qua generantur Po-
lypi. *Malpighius de polypo Cordis, p. 158. &c. con-*
sulen-

fulendus est author, qui hujus morbi *ætiologiam* & descriptionem longe optimam litteris mandavit. „ De Polypis in auriculis & ventriculis Cordis hydropicorum repertis (vid. *Art.* 823.)

Art. 578. „ Concreſcentiæ polyposæ in *apoplexia* demortuis frequenter inveniuntur; & procul omni dubio plerumque sunt causæ plurimorum *symptomatum* atrocissimorum, necnon *mortis inopinatæ*; raro deprehenduntur antequam ægrum jugulent. *Causa est frequenter mortis repentina*



C A P. VI.

Sive Fasciculus Morborum sextus.

C R U D I T A S A C I D A
& Nidorosa.

Etmulleri sententia.

Art. 579. **M**Orbi plerique, præcipue chronici, a depravata coctione originem ducunt; *chylicationis læsæ*; duo sunt vitia insigniora, cruditates in coctione, viz. *cruditas acida* & *nidorosa*. *Chylificatio læsa*

Art. 580. *Cruditas acida* est, quando alimenta abeunt in liquamen acidum fixum plus minus viscidum, nec sufficienter attenuatum, & volatilatum fundamentum & origo morborum chronicorum. *Cruditas acida.*

Art. 581. *Cruditas acida* cognoscitur ex ploda, ructibus acidis & copiosioribus; quæ rejiciuntur per vomitum vel natura vel arte, sunt admodum crassa; viscida, ac pituitosa; alvus plerumque adstricta est. *Signa cruditatis acidæ.*

Art. 582. *Cruditas acida* corrigitur per absorbentia & acidum destruentia, ac aromatica volatilia, *Curatio.*

tilia, nucem moschatam, zinziber, sp. C. C. &c.
 Destructo in hunc modum acido purgantia de-
 mum adhibenda sunt : nisi enim hæc methodus
 observetur, nihil per purgantia evacuabitur sed
 tormina & motus convulsivi excitabuntur. Usus
cancrorum fluviatilium mire proficius est, ut &
Gelatina, C. C. &c.

*Cruditatis
 nidorosa.*

Art. 583. *Cruditatis Nidorosa* est, quando ali-
 menta corrumpuntur ita ut abeant in liquamen pu-
 trilaginosum horridi saporis & odoris, & omnino
 nutritioni ineptum, quod vocatur *Nidor*; exhalant
 ructus graveolentes *Nidorosi*. Appetitus est in-
 dex, qui loquitur, & monstrat quasi, quæ sunt
 assumenda; hinc nobis inculcat *Hippocrates in*
aphorism. quod appetita facilius longe digerantur,
 quam non appetita. Verum est proverbium; *quod*
sapit, nutrit.

*Diagnos
 cruditatis
 nidorosa.*

Art. 584. Ingestio variorum alimentorum ad
Cruditatem Nidorosam disponit. Masticationem
 qui negligit, *Arabibus* animam suam odisse dici-
 tur. Conqueruntur ægri de dolore gravativo sto-
 machi duabus horis post pastum, item de ructibus
 5. vel 6. hor. post alimentorum assumptionem, iis-
 que non acidis, sed nunc insipidis, nunc putridis,
 nunc sulphureis, nunc genuinum saporem & o-
 dorem assumptorum repræsentantibus; mox post
 pastum adest rubor faciei, quasi essent ebrii. (585.)

*Signa
 cruditatis
 nidorosa.*

Art. 585. *Cruditatis Nidorosa* ructus habet foeti-
 dos, aut saltem horridos instar ovorum frixorum,
 aut piscium putridorum; percipiunt imprimis ma-
 ne saporem peregrinum & abominabilem, quasi
 cinereum, seu ligni putridi, quem sufficienter ex-
 primere nequeunt. Subinde amaror cum *cardial-*
gia & aliquali *nausea* percipitur, ex ore & stoma-
 cho; quæ vomitu rejiciuntur, sunt liquida, fla-
 va, & omnino insipida, aut quodammodo amari-
 cantia, aut insipida dulcia, aut ex amarore dulce-
 scentia; præterea habent alvum sæpius plus solito
 apertam. „ *Cruditatis Nidorosa* juxta veterum prin-

„ ci-

„ *Intemperies ventriculi calida*, in qua *Intemperies ven-*
 „ omnia assumpta mutantur in bilem; signum hu- *triculi*
 „ jus est sapor tetricus in ore; incipiente vel per- *calida*.
 „ acta chylicatione.

Art. 586. Quoad curam convenit vomitus aut *Curatio*
 saltem evacuatio per *rhabarbarum* & *tamarindum*;
 post horum exhibitionem mire conducunt *julapia*
acidulata, *succus aurantiorum*, *citrorum*, *elixir*
proprietas acid. sp. salis dulcis, *vitriolata*, &c.

Art. 587. „ Probe notandum est (ut *therapia*
 „ rite instituat) ægroto incumbere non modo *Nota bene*
 „ remediorum sibi præscriptorum usui, ut decet;
 „ insistere, sed quoque cane & angue pejus fuge-
 „ re alimenta sibi noxia, fomitem causis morbifi-
 „ cis, & mala exacerbantia. Qualis erit diæta pe-
 „ tendum præcipue ex nocentibus & juvantibus, in
 „ quæ itaque diligenter diligere oportet medicum.

Art. 588. Flatus in stomacho & intestinis fiunt *Flatus*
 per fermentationem vitiosam ab acido præterna-
 turali in subjecto viscido excitatam. „ In curatio-
 „ ne omnem paginam absolvunt *digestiva* &
 „ *evacuantiæ* cum victu regulari.

Art. 589. „ Ventriculus corporis *culina* appel- *Apepsia*
 „ lari potest; ejus officium est alimenta recipere
 „ tanquam in promptuarium; eademque conco-
 „ quere est ejusdem actio primaria; unde *ape-*
 „ *psia*, sive *indigestio* est totius œconomia ruitu-
 „ ræ indubitata denuntiatio.

Art. 591. Digestio est opus simpliciter naturæ *Digestio*
 nec arte promoveri potest; opus naturæ saltem
 adjuvare possumus & fermentum ventriculi corri-
 gere ita ut in statum naturalem reducatur. Pro-
 pinanda sunt *vomitória*, *cathartica*, &c. postea
stomachicis & *corroborantibus* insistendum est. „ Mi-
 „ rum videatur in quibusdam somnum, in aliis
 „ exercitium, coctionem promptiorem ac facilio-
 „ rem reddere, quod tamen monet quotidiana
 „ experientia.

Art. 592. Remedia stomachica, & ventriculum *Remedia*
 robo- *stomachi-*
 ca.

roborantia insigniora sunt, quæ sequuntur. *Mentha*, *absynth.* utrumque, aromata, zedoaria, grana piperis integra deglutita (ad cruditates acidas) rad. *helenii*, calami arom. raphani rustici, *ari*, plebeia quidem, sed optima stomachica, succus cydon. (cum fumo sulphuris servatus,) tincturæ ex amaris & aromaticis (cum ol. sulph. ris per campan. extractæ) pulvis pepticus ex pelle interiore ventriculi gallinæ, & tinctura ejusdem, chalybeata, cortex Peruvianus, cortex aurant. citr. conditus, item zinziber, & allium conditum, tartarum vitriolatum, tinctura sacra, elixir proprietatis, aqua gentian. comp. absynth. comp. spiritus menth. syrupus cydoniorum, rob. & miva eorundem, species diambre, crusta panis vino generoso ebria & cum pulv. N. M. caryoph. &c. conspersa, & ita instar scuti stomacho tepide applicata, &c.

„ Stomachica alia celebriora & in praxi Londinensi usitatoria sunt Elixir magnum vitrioli, tinctura stomach. amar. Quincii ad imitationem Stoughtoni; vel sequens, quæ præstantior videtur.

„ ʒi. Cort. aurant. sicc. ʒj. rad. gent. ʒij. sem. cardamom. min. zedoar. ana ʒj. caryoph. croc. ana ʒj. cochinel. ʒss. sp. vin. Gallic. ʒij. f. tinctura s. a. vel infusum sequens.

„ ʒi. Rad. gent. ʒij. summit. absynth. Rom. p. ij. calam. arom. ʒijss. cubeb. ʒj. cort. aurant. ʒiij. infund. in aq. bullient. ʒxxx. colatur. add. aq. absynth. magis comp. ʒiij. misce; vel

„ ʒi. Rad. gent. zedoar. cassimunar. sem. cardamom. min. ana ʒj. cort. flav. aurant. sicc. ʒij. infund. in aq. bullient. ʒij. colatur. add. aq. gent. magis comp. ʒij. sp. lavend. comp. ʒss. misce.

„ In omnibus fere imbecillitatibus & morbis ventriculi masticatio rhabarbari conducit, præcipue in alvum habentibus adstrictiorem,

„ Item, Electuarium e zinzib. mistura stomach. & julap. stomach. Et pro usu externo Fodus

„ *Stomach. epithema, sputum, sacculus emplastr.*
 „ *roborans, ex Pharm. Fulleri, quandoque usur-*
 „ *pari possunt.*

Art. 593. „ *Stomachica debent esse temperata,*
 „ *ut recte annotavit Vualdschmidius) ne fortio-*
 „ *ribus remediis calorem nimium vel augeamus*
 „ *vel extinguamus, & ne fermentum reddamus*
 „ *acrius vel debilius, hinc præstat pauca dosi &*
 „ *per intervalla remedia stomachica exhibere, quam*
 „ *uno impetu ventriculum remediorum mole ob-*
 „ *ruere.*

Art. 594. *Nausea & vomitus. In genere vom-*
tus omnis, qui non est nimius, sicut plurimum est
salutaris. *Nausea*
& vom-
itus.

Art. 595. *In omni vomitu unice observetur,*
ut alvus, quantum fieri potest, teneatur aperta.
Ad vomitum sistendum conferunt cydoniata, syr.
& tinctur. coral. præ reliquis succus cydon. sp.
menth. sal. absynth. cum succ. limon. &c. Externe
decoct. absynthii, menth. cort. granator. flor. ros.
rub. &c. in vino rub. coct. sacculus croci ventri-
culo admotus egregie vomitum sistit, ut & cata-
plasmata ex fermento & pulv. aromaticis. In ge-
nere præmissis rite universalibus stomachica (592.)
sunt usurpanda; Decoct. fracastr. elect. zinzib.
julap. stomachicum, coral. mistur. stomach. „ In
 „ *vomitionibus ab emetico fortiori excitatis (te-*
 „ *ste Vualdschmidio) si detur coch. j. spiritus vi-*
 „ *ni, vomitum in momento compescet.* *Curatio.*

Art. 596. *Vomitus cruentus frequenter a pan-*
create oritur, quando, scilicet, vasculum ejus a
succo acriore corroditur, ex irritatione duodeni par-
tim sursum in ventriculum propellitur, partim in-
ferius deferitur, dolor gravativus & obtusus in supe-
riori lumborum regione, ubi situm est pancreas,
præcedere solet. Non raro decipiuntur medici, qui
vomitum materiæ nigricantis habent pro cruento. In
vomitu cruento Hæmorrhoidum fluxus est salutaris;
est enim evacuatio quasi vicaria. *Vomitus*
cruentus.

*Periculo-
sum ma-
lum.*

Art. 597. „ Ipse ventriculus quandoque gravis-
„ simis *Hæmorrhagiis* obnoxius est. Et revera vo-
„ mitus sanguinis a quacunque causa oriatur, pe-
„ riculo haud vacat. Nimia sanguinis ejusmodi
„ effusio intra ventriculi parietes vel extra cor-
„ pus ejectio mortem subitanæ interdum in-
„ fert; vel si sanguis in ventriculo extravasatus
„ restat, ibidem grumescere solet & corrumpi;
„ inde graves *Lipothymia* & *suffocationes* crean-
„ tur. „

*Remedia
ad vom-
itum cru-
entum.*

Art. 598. Remedia in hoc affectu sunt succus
urticæ, *sem. hyosciami*, *catechu*, *lap. hæmatit.* cum
blandis acidis, aut *succ. cydon.* Aliquando etiam
pus excernitur, & per vomitum rejicitur. Con-
venit *antimon.* *diaphoret.* *antihæct.* *Poterii*, *sac-*
char. saturni, *haustus japonicus Fulleri*, *tinctura*
antiphlogistica, &c.

*Anxietas
præcor-
diorum.*

Art. 599. *Anxietas præcordiorum* est insignis do-
lor circa scrobiculum cordis. Malum hoc oritur
semper ab affecto plus minus orificio ventriculi
sinistro.

*Cardial-
gia.*

Art. 600. *Cardialgia* est ventriculi orificii su-
perioris dolor admodum molestus & intensissimus;
oritur ex effervescentia succorum heterogeneorum,
maxime bilis, unde percipiuntur phlogoses, &
insignis ardor. Causæ hujus mali sunt variæ,
bilis vel succi pancreatici vitia, lumbrici, ulcus
orificii ventriculi, &c.

Curatio.

Art. 601. *Dosis theriac. Andromach.* egregium
est *anticardialgicum*. Cura ut plurimum inchoan-
da est cum vomitorio, & postea opiata cum pur-
gantibus admiscenda sunt. *Tinctur. sal. tartari* a
gutt. xl. ad l. item *pulv. testac.* cum *castor. oleum*
amygd. dulc. est maxime efficax; laudatur decoct.
fassæfr. externe linimenta, *empl. e tacamahac. carana*
& *balsam. Peruv.* „ *Pulvis interioris pellicula ven-*
„ *tricoli musculosi gallinæ* ad ℥j. in vehiculo ap-
„ propriato est efficacissimum remedium huic ma-
„ lo (inquit *Sharrv.*)

Art.

Art. 602. Anorexia sive inappetentia est, quan- *Anorexia*
do ægri destituuntur desiderio ad alimenta. Ra-
tio habenda est morbi alicujus tanquam causæ, un-
de *indicationes curativæ* petendæ sunt, & postea
stomachica (592.) sunt usurpanda, &c.

Art. 603. Malacia est appetitus nimius, unde *Malacia*
interdum plus, quam conducit, comeditur. Pica *& pica.*
est appetitus infuكتورum, ut crudæ animalium
carnis, carbonum, calcis vivæ, &c. „ In virgi-
„ nibus *chlorosis* Picam, vicissimque Pica chloro-
„ sin fovere solet. Pica est affectus chronicus, &
„ non infrequenter ad *hydropem*, *cachexiam*, vel
„ *marasmm* viam sternit. Non solum virgini-
„ bus accidere solet, sed plerumque gravidis quo-
„ que; iis vero non adeo perniciofa est. „ Hi
affectus oriuntur ex depravato stomachi fermen-
to; ideoque *evacuationibus* & *stomachicis* sunt cu-
randi.

Art. 604. Bulimus seu appetentia canina, est *Bulimus?*
voracitas nimia; ægri copiose deglutiunt alimen-
ta, sed non comminuunt; est affectus plerumque
ab extremo ambientis aeris algore progenitus, in
cibi fastidium brevi desinens. *Appetentia canina*
est semper cum vomitu vel diarrhæa. „ Præcipua
„ cura in diætâ est quærenda. Omnia pingua &
„ dulcia temperata illis profunt, ut & leniter pur-
„ gantia: „

A Surfeit.

Art. 605. „ Crapula, per quam intelligo id,
„ quod nostro idiomate vocamus a *Surfeit*, est *Crapula.*
„ mala corporis habitudo cum sensu gravitatis ad
„ ventriculum, & ægritudine; supervenire solent
„ plerumque *Eruptiones cutaneæ* & *febriculæ*. Cau-
„ sa usitatioꝝ hujus affectus est edilium vel potulen-
„ torum nimia voracitas; ingesta autem non mi-
„ nus qualitate quam quantitate peccabili læden-
„ tia esse possunt; aliæ quandoque etiam sunt cau-
„ sæ,

„ sæ, uti potio nimis larga frigida vel cerevisiæ
 „ tenuis æstivo tempore, exercitium nimis violentum,
 „ fervida ac sulphurea aeris constitutio,
 „ & similia. Eruptiones cutaneæ sunt de genere
 „ *Erysipelatofo*, quod ordinario appellamus
 „ *Rash*.

Curatio.

Art. 606. „ In omnibus hisce affectibus, &
 „ præcipue a Crapula proprie dicta originem ducentibus vomitorium quam primum est propinandum, & si febris nondum invaserit dosis tincturæ hier. die proximo exhibenda est. Si eruptiones in conspectu veniant, sustentandæ sunt cardiacis, & lenibus diaphoreticis; potus sit serum lact. vino Canariensi alteratum, & alias infusum salviæ. In habitu plethorico, ubi febris intensior fuerit, *phlebotomia* locum habere potest.

CHOLERA MORBUS.

Sydenhami sententia.

Cholera morbi descriptio.

Art. 607. Malum ex se cognoscitur: adsunt enim vomitus enormes, ac pravorum humorum cum maxima difficultate & angustia per alvum dejectio; ventris ac intestinorum dolor vehemens, inflatio & distentio, cardialgia, sitis, pulsus celer cum æstu & anxietate, nausea, artuum contractura, extremorum frigiditas, animi deliquium, &c. „ Bilis supra infraque magno impetu prorumpit, primum liquidior, pallida, & subflava; dein crassior, majoremque colorem exhibens, flavum scilicet, prasinum, cœruleum aut etiam nigrum.

Methodus medendi.

Art. 608. Pullus tenerior elixetur in aq. font. cong. circiter iij. *hujus decocti* cyathos plenos exhauriat æger, eodemque tempore injiciatur *enema* ejusdem liquoris semel atque iterum, vel ad 3^{am}, 4^{amve} vicem; his addi possit *syr. portulac. lactuc.*

violar. &c. Exantlato hoc eluvionis penso detur *paregoricum*. Si vires ægri exhaustæ fuerint, & valde debilitatæ ante adventum medici ita ut extremæ frigescent, raptò cursu ad *laudanum* confugiendum est. Vix ultra *Augusti* limites evagatur.

Ettmulleri sententia.

Art. 609. In genere qualiacunque symptomata *Prognosis.* fortem ac deleteriam antimoniam purgationem, aut helleborum album sequuntur, aliudve catharticum, ea similiter obvia sunt in cholera. Cholera, quæ sponte sua sine causa manifesta externa corripit ægros, ut plurimum est funesta, Est malum peracutum intra 24. horas, biduum, vel triduum, jugulans; periodum fere observat tertianariam, ita nempe ut de 3^{ro} in 3^{um} diem moveatur, seu plus minus exasperetur; quo magis excrementa a *statu naturali* recedunt, eo periculosior. Cholera aliquando est *epidemica* & valde *maligna* & *lethalis*.

Art. 610. „ Remedia petenda sunt ab *Art. de Remedia*
„ vomitu, de *diarrhœa*, &c. causa morbi, si in *qualia*.
„ veniri possit, bene pensitata. Vires decocti
„ *rad. ipecacoan.* tentari merentur. Vid. *dysente-*
„ *riam*.

ALVI RETENTIO.

Ettmulleri sententia.

Art. 611. Alvi retentio cum sit pertinacior, *Alvi re-*
frequentius est causa mille malorum, dolorum ab- *tentio*
dominis variorum; interdum nausæ & vomitus, *causa*
affectuum capitis, cephalalgia, vigilia, vertigi- *mille ma-*
nis, &c. „ Familiaris est spleneticis, nephriti- *lorum*.
„ cis, hystericis, arthriticis, literatis, scorbuti-
„ cis, &c.

Art.

Curatio :

Art. 612. Convenit *oleum amygd. dulc.* vel per se vel in juscule ad $\mathfrak{z}\text{ij}$. vel iiij . *decoct. tamarind.* in sero lactis; *gum. ammoniacum*. *Aurum fulminans* cum extracto *bellebor. nigr. sal. gem.* in clysteribus ad $\mathfrak{z}\text{ss}$. vel $\mathfrak{z}\text{ij}$. multum laudatur ad fæces induratas fluxiles reddendas; item clysmata oleosa ex *ol. lini*, *ol. raparum*, *ol. oliv.* &c. In alvo pertinaciter obstructa conducit balneum ex emollientibus & linimenta.

*Boerhaavii sententia:*Tartarus
crudus :

Art. 613. Vires tartari crudi in medicina optimæ sunt, cremoremque & crystallos superat viribus ad absterfionem primarum viarum; vix sua indole secundas vias ingreditur, ob crassitiem & indissolubilitatem, nec invenit tantum liquidi in illis, quantum ad sui solutionem requirit. Si autem humoribus alcalinis occurrit, solvitur penitus, non a liquido, sed a solo alcali occurrente, qui duo sales faciunt tunc optimum salem dissolventem; si vero dissolvitur ab aqua, est adeo crassus ut per pannum non transeat quid, quod transeat per lactea; & si forte solvitur a bile, aliove forsan liquore, non agit ut Tartarus, sed ut sal neuter, vel sapo: hinc multos morbos ex vitio pituitæ, & vitio primorum viscerum egregie tollit, debet vero dari ad drachmas sex ex juscule recenti. *Angelus Sala*, *chymicus candidissimus*, qui integrum tractatum, ubi sua arcana, cunctis medicis desiderata, revelat, de viribus tartari scripsit; laudat illum in colicis doloribus, diuturnis obstructionibus primarum viarum, hysteri-
cis, podagra, &c. Sed dabat ad unciam unam, unde purgabantur per duos aut tres dies; hoc continuabat optimo cum successu, nam non intrat sanguinem, sed pondere & stimulo optime agit; ergo reliquam massam sanguinis non turbat, sed saltem alvus diluitur, & emollitur fæx,
cum

cum alia purgantia post operationes suas relinquunt semper alvum adstrictam.

Art. 614. „ Novi plures ventri constipationi obnoxios curatos fuisse diluculo, & hora prius assueta citius lecto assurgendo: quantum enim a perspiratione solita adimitur, tantum ad alvum lubricandam additur. „ *Vvillis*. „ Qui alvum habent sicciorem (inquit *Vvaldschmidtus*) nunquam se mane studiis applicare debent, vel foras procedere, nisi alvum prius deposuerint; vult enim sæpius moveri alvus segnior.

Quomodo
præcaven-
da est.

Art. 615. „ Quibus, dum sunt juvenes, (inquit *Hippocrates*) alvi sunt humidæ, iis senescentibus siccantur: quibus vero, dum sunt juvenes, alvi sunt siccæ, his senescentibus humectantur. Melior est autem in juventute alvus fusior, in senectute adstrictior. Obstructo inferiore ventre (inquit *idem de flat.*) in universum corpus flatus discurrunt.

Aphorif-
mus.

Art. 616. „ In act. philosoph. N°. instantiam singularem habemus cujusdam hominis nomine *Phelips*, qui per plures annos non nisi semel in 19. vel 20. diebus alvum exonerabat, nihilominus, quoad cætera bene se habuit: obiit tamen vigesimum tertium agens annum.

Historia.

ALVI FLUXUS.

Art. 616. „ In genere quod ad alvi fluxum attinet, aliquando cibi nondum concocti aut imperfecte cocti per alvum dejiciuntur, & appellatur *lienteria* vel fluxus *lientericus*; aliquando chylus excernitur & dicitur *celiaca*, aliquando humores excrementitii, bilis, pituita, &c. excernuntur, & vocatur simpliciter *diarrhæa*; postremo quandoque dejectiones sunt sanguinolentæ cum vel sine intestinorum exulceratione, & appellatur *dysenteria*.

Alvi fluxus in genere.

DIAR-

D I A R R H O E A.

Definitio. Art. 618. „ Diarrhœa est frequens & copiosa
 „ per alvum materiæ tenuis, aquosæ, mucosæ,
 „ pituitosæ, spumosæ, adiposæ, biliosæ, nigri-
 „ cantis &c. excretio, ab intestinis provenien-
 „ tis, aliquando cum, aliquando sine excremen-
 „ tis, frequenter sed non semper torminibus sti-
 „ patur.

Etmulleri sententia.

Ventricu- Art. 619. In cura diarrhœæ ex quacunque cau-
lus præ o- sa stomachus est corroborandus, & sudorifera cum
mnibus acida absorbentibus sunt admiscenda. Diarrhœa
est corro- oleosa & pinguis (si non ex assumptis) ex col-
borandus liquefactione pinguedinis corporis oritur.

Curatio. Art. 620. In omni diarrhœa potus debet esse
 parcus. Ad ventriculum restituendum convenit
 vinum ustum cum aromatibus, vinum absynthii.
 & maxime cydoniata, & externe foci. Sisten-
 dus est effervescentium humorum impetus; hoc
 facto, cessat diarrhœa. Decoctum rad. tormen-
 til. egregium est in omni diarrhœa & dysente-
 ria, tam benigna quam maligna & omnibus aliis
 medicamentis præcellit. Fructus cydon. & spe-
 ciatim mespillorum eorumque miva maxime lau-
 dantur; gelatina C. C. in potu ordinario soluta
 est admodum specifica in diarrhœis epidemicis gra-
 vantibus, ut & gum. Arab. (in decoct. alb. so-
 lut.) ; si adsint tormina vehementiora & tenef-
 mus convenit enema ex lacte tepido & theriac.

Diarrhœa Androm. In diarrhœis habitualibus per longum
habitua- tempus durantibus conveniunt interne imprimis
lis. martialia & aromatica stomacho grata, imo ther-
 ma. Diarrhœa pertinax & diu durans radice Ip-
 pecacuannæ, quemadmodum Dysenteria, debi-
 tis intervallis aliquoties repetita curanda est,
 non

non neglectis interim aliis appropriatis remediis.

Baglivii sententia.

Art. 621. Mœror nihil aliud frequentius producit quam Diarrhœas, quæ, diu persistente mœroris causa, evadunt incurabiles; iisque demum superveniente febre erratica & atrophia, ægrotautes e medio tollunt. Ad iram pariter diarrhœa supervenit, & si hæc non superveniat, febris superveniet dummodo ingens fuerit ira. p. 129.

Farrago sententiarum.

Art. 622. Indusium laneum magnopere conducit ad curandam diarrhœam habitualement. *Vvainwright*. Ut & equitatio seu vestio in rheda. *Fulleri med. gymnast.* Observandum est, appetitu & concoctione salvis, vix unquam nocere diarrhœam.

Art. 623. Narrat D. *Vvalker* in obsidione *Derrie Londinensium* nupera milites eo redactos fuisse, ut compositionem quandam ex sebo & amylo liberaliter sumpserint, unde non modo nutrimentum, sed & medicamentum egregium habuerunt, nempe diarrhœæ curationem in his, prophylacticum in illis, idque miraculose & infallibiliter.

Art. 624. Opium (sagaciter observante *Cockburn*) parum aut nihil facit in cura Diarrhœæ serosæ; & revera res, si propius illam inspiciamus, & ad calculum accurate vocemus, ita se habere videtur. Opium plerumque dolorem sedat, & somnum conciliat, & dejectiones rariores reddit, sed tamen copiosiores sunt & æque tenues ac liquida, ut ante, & quod probe notandum est, magis foetentes.

Art. 625. Remedia sequentia quandoque prodesse possunt, *laudan. liquid. cydoniat. cataplasma. varia. stomach. epithem. stomach. fons astring. saccul. stomach.*

mach. decoct. catechu, comp. decoct. fracaſtor. decoct. ſiſtens, elect. corinth. enema de malicorio, expreſſio roſac. miſtur. coral. elect. ad diarrhœam.

LIENTERIA & COELIACA.

Lienteria & Coeliaca. Art. 626. Lienteria & Coeliaca videntur eſſe diarrhœa cum inſigni apepſia ſeu coctione ventriculi depravata conjunctæ; ideoque earum cura partim cum diarrhœa convenit, præcipue quoad evacuantia in principio propinanda: hic etenim ſuper alia quocunque radix ippecacuan. & rhabarb. locum habent, nec omitti debent.

Etmulleri ſententia.

Lienteria quid. Art. 627. Lienteria eſt alvi fluxus, in quo aſſumpta prout fuere ingeſta, aut parum immutata per alvum egeruntur. „ Dolor ventriculi eſt „ Lienteriæ comes indivulſus, & ægrotum poſt „ paſſum ſemper magis exeruciat, donec alvum „ exoneraverit. Urina eſt pauca & valde colorata. „ „ Lienteria ſcorbutica eſt malum periculolum curatu difficile, & facile recidivans; ad cachexiam & tabem diſponit.

Curatio. Art. 628. Imprimis ſtomachus præ omnibus eſt roborandus. Rhabarbarum propinari debet; corallata & cydoniata valde laudantur; in genere omnia in vomitu uſurpata hic conducunt. „ Stomachica ſimpliciora & paratu faciliora (inquit „ Vvaldſchmidius) ſæpius plus præſtant, quam „ compoſita: v. g. nux moſchata condita, zinziber „ conditum, vitellus ovi cum aceto coctus, vinum „ abſynthj ex maſtiche parata, &c.

Coeliaca quid. Art. 629. Coeliaca eſt alvi chyloſa excretio, quando aſſumpta digeruntur quidem in ſtomacho, ſed digeſta ſub forma chyloſa cum excrementis excernuntur; ventriculus ut plurimum eſt ſalvus, & appetitus, ſed hoc non ſemper; per alvum excreta

creta sunt albicantia vel grisea, aut saltem pallida. Est malum satis grave & periculosum.

Art. 630. *Aromatica blandiora & amara appri-* Curatio,
me conveniunt; *astringentia* malum exasperant.
„ *Deobstruentia* procul omni dubio indicantur &
„ *martialia* cum *amaris*. Præmissa *tinct. rha-*
„ *barb.* dosi una vel altera, elegantem puellam
„ ab hoc malo diutius laborantem liberavi cum
„ *tinctur. mart.* & vino amaro sequenti; ℞.
„ *Rad. zedoar. ℥j. gentian. ℥iiss. cort. aurant. ℥iij.*
„ *uvinteran. ℥ij. myrrh. pulv. ℥j. flor. cham. p. ij.*
„ *centaur. min. p. j. N. M. mac. ana ℥j.* Infund.
„ *frigide in vin. alb. Hispan. ℥iv.* coletur usus
„ tempore. „ *Forestus* valde commendat pulve-
rem *pelliculæ interioris ventriculi gallinæ* in Cœ-
liaca passione; ut etiam pulverem *integræ nucis*
moschatæ in vitello unius ovi exhibitum in Lien-
teria.

D Y S E N T E R I A.

Sydenhami sententia.

Art. 631. Dysenteria cum rigore & horrore ag- Dysente-
greditur, calor sequitur; & deinde ventris tormi- ria.
na cum dejectionibus mucosis, quibus progressu
temporis intertexuntur sanguinis lineamenta quæ-
dam cum dolore insigni; sanguine aliquando de-
stituuntur, & nihilominus (modo frequentes sint
dejectiones cum ventris torminibus & colluvie
mucosa) recte vocabitur Dysenteria. Si sanguis
sincerus evacuetur, vita ægri periclitatur.

Art. 632. *Venæsectio* quamprimum celebretur, Methodus
& exhibeatur haustus *paregor.* eadem nocte, de- medendi.
inde *catharticum* lene bis repetitum, & *paregor.*
hor. 4. vel 5. post sing. purgationes; potus or-
dinarius sit *lac coctum cum aq. tripl.* vel *decoct.*
alb. Si morbus præfractior sit, detur *laudanum*
8. quaque hora etiam in maiore dosi, & injicia-
tur enem. ex *lacte vaccin.* & *theriac.* *Androm. ℥ss.*
P ubi

ubi vires *venæsectionem* non patiuntur, detur singulis matutinis bolus ex *rhabarb. ʒss. cum q. ʒ. diascordii & paregoricum* hora somni.

Infantes eodem modo tractandi sunt diminuta dosium quantitate. Methodus in *cholera morbo* (608.) in hoc quoque laudatur, ut & *dieta lactea*.

Vvillisi sententia.

Dysenteria in cruenta. Art. 633. Quamvis dysenteria vocabulum communi acceptatione alvi fluxum cruentum, sicut diarrhoea humoralem denotat; tamen morbus *Londinensis* anno 1670. Dysenteria appellabatur, incruenta licet. Fuit affectus ille subitaneus & frequenter absque manifesta occasione invadens; laborantes cum vomitu immani & sedibus crebris & aquosis cito in maximam debilitatem inque spirituum horrenda deliquia & virium omnium prostrationes redigebat. Novi plures pridie satis sanos, & valde robustos, intra xij. horas morbi hujus tyrannide adeo dejectos, ut cum pulsu debili & exili, sudore frigido, &c. jamjam moribundi viderentur, & quidem non pauci ab eo cito interibant.

Curatio. Art. 634. Pro curatione hujus morbi nulla evacuatio juvabat; verum remedia tantum *cardiaca*, eaque calidissima commoda fuerunt, in tantum, ut *sp. vini* cum sacchar. parum deflagratus remedium popolare & quasi *epidemicum* fuerit, atque in tali Dysenteria fere semper proficuum: etsi in altera cruenta indifferenter usurpatum sæpe noxium deprehenderetur. Ego exhibui satis feliciter *theriac. androm. ʒiss. cum julap. cardiac.* & ventriculo placentam ex *pane tosto & theriac.* illinito vinoque generoso immersam applicari jussi, aut loco *theriac. Androm. pulv. seq. ʒl. Pul. e chel. cancr. comp. e contrayerv. serpent. virg. ana ʒj. cinnam. rad. tormentil. ana ʒss. croc. cochinel. ana ʒj. dos. ʒij.*

Art.

Art. 635. De descriptione dysenteriae vere cruenta Londinensis vide authorem, p. 49. laborantes haud cito interibant, quin plures septimanas, imo interdum menses sanguinem quotidie in magna copia excernebant, &c. In his dejectiones fuerunt liquidæ, & sanguine diluto tinctæ, instar loturæ carniū, in aliis crassiores cruore saturatæ, ac insuper muco albicante, & non raro membranarum frustis refertæ, &c. de remediorum formulis consulendus est author. p. 50. & 52.

Dysenteria cruenta.

Eitmulleri sententia.

Art. 636. Dysenteria est diarrhoea cruenta. Hujus morbi tres sunt differentiae. 1. Quando sine intestinorum vitio mero motu & impetu naturæ ex plethora sanguis bonus excernitur tanquam in fluxu hæmorrhoidali, scorbuticis familiaris est. 2. Quando sanguis tenuis & aquosus loturæ carniū similis excernitur, fluxus hepaticus dicitur, sed revera a vasis hæmorrhoid. internis provenit. 3. Tertia species dysenteriae est, quando ob vitium intestinorum spasmodicum cum insignibus torminibus, & cum muco albescente, hinc cum purulenta materia sanguis ejicitur, atque hæc κατ' ἐξοχὴν dysenteria appellatur, diarrhoea cruenta tormentosa, reliquæ species fere semper sunt absque torminibus. Est vel benigna sine febre & contagio, vel maligna cum febre & maxime contagiosa. In gradu acerbissimo caruncula, (si- Caruncula cum materia purulenta. gnum ut plurimum lethale) quæ excernuntur cum materia purulenta, quid sint explicatu obscurum est; non enim nisi in Dysenteria diuturniori fit intestinorum excoariatio, & forsan exulceratio aliqualis; adsunt aliquando aphibæ, & intestina ipsa gangræna afficiuntur, ex qua fere omnes, qui Dysenteria laborant, moriuntur. „ Omnes qui Dysenteria moriuntur, (teste Vvaldschmidio sphacelo pereunt, ipsis intestinis sphacelatis; quod

„ observatur triduo ante mortem, ubi sitis non
 „ magis urget, & extrema frigent.

Curatio.

Art. 637. Cura inchoanda est cum opiatīs & sudoriferis & absorbentibus, præmissa tamen dosi rhabarbari semper in Dysenteria benigna, in maligna vero eadem methodus observanda est, ac in aliis febribus continuis malignis; tinctura bezoardica laudatur. Astringentia in principio malum exasperant, in declinatione locum habent cum cautela. Venæsectio & clysteres non conveniunt. Summa habenda est ratio stomachi externis & internis, uti in quibusvis alvi fluxibus. Priapum cervi tanquam specificum extollitur. Semper propinetur gelatina C. C. pulv. cran. human. & usnea. Album græc. pro pauperibus est insigne remedium, item succus heder. terrest. & cydoniata, lac chalybeatum, in quorad. symphit. maj. coctum fuerit. gum. Arab. trag. &c. sed præ omnibus sacchar. saturni, & viperina (in Dysenteria maligna.) Balsam. Peruv. aut terebin. in clysteribus aliquando est proficuum. Oleum lini præsentaneam præstat operam. Accurate distinguendum est inter flux. dysenter. & hæmorrhoid. (1262.)

Remedia varia.

Art. 638. „ De viribus rad. ipecacoan. est res
 „ nota; sed præstat ejus decoctum propinare, quam
 „ radicem in substantia. In Dysenteria serum laticis fere specificum; Bagliv. 242. & alibi. Radix ipecacoanhæ præter vim vomitoriam, quam obtinet, sudores copiosos excitare solet. Atque in hoc (inquit D. D. Freind) quantum ego conjectura assequi possum, præcipue consistit egregia illa in Dysentericis affectibus virtus, quam sibi præ aliis vomendi instrumentis vendicat. Grassante Dysenteria (inquit Dolæus) hoc unico medicamento plus centum feliciter curavimus, oleo, scilicet, amygdalar. dulc. cum succo citri commixto, sæpius de die assumpto, præmisso tamen rhabarbaro tosto; diaphoretica semper interponi debent in hoc morbo curan-

„ do ,

do, inter quæ eminent *tinctura bezoardica* &
mistura simplex. *Nux moschata* est egregium
antidysentericum; profunt *gelatin. C. C. ol.*
rhabarbari, cydoniata, &c. Fungosa substantia
nuclei lobos intercedens & separans exsiccata
& pulverisata in vino exhibita modica quan-
titate exercitum *Anglicanum in Hibernia* gra-
vissima *Dysenteria* medicorum omnium soler-
tiam eludente laborantem feliciter liberavit.
Raii Hist. plant. J. Aubrey communicavit.
Repetitis experiētiis (inquit *Toune* in Tra-
ctatu de Morbis *Barbadae*) sequens electua-
rium in *Dysenteria* successu felicissimo exhi-
bui; ℞. *Conserv. ros. rub. Ziß. sperm. cet. 3j.*
cer. flav. 3iij. ol. amygd. dulc. 3ß. syr. e cort.
citr. q. s. m. f. elect.

Art. 639. Sequentia quandoque locum habent, *Alia non.*
cataplasma stomach. decoct. Fracastor. enema nulla.
balsamicum (expetitissimum plane remedium)
enema de malicorio; enema ad tormina; epi-
thema stomach. fots ad colicam; fots stoma-
ch. tinct. rhabarb. Sennertus de hoc morbo co-
piose & pulchre scripsit.

Art. 640. *Tenesmus* in genere est assidua cupi-
ditas per alvum egerendi; parum mucosum, aut
viscosum, aut cruentum aut purulentum, aut
nihil omnino excernitur; pars affecta est intesti-
num rectum aut sphincter musculus. *Tenesmus*
producitur a *Dysenteria, hæmorrhoid. verm. as-*
carid. calculo in vesica, &c. *Fots lactis tepid.*
(cum flor. sambuci incoct.) *tenesnum* lenit. *E-*
nem. emol. cum lumbric. terrest. &c. incoct. (est
exoptatissimum remedium) item *enema ex jure*
carn. vervecin. &c.

Art. 641. *Fluxus hepaticus* veterum est merum *Fluxus*
non ens, est enim *fluxus hæmorrhoidalis e venis hepaticis*
hæmorrhoid. vide Dysenteriam.

Art. 642. Conveniunt remedia *hæmorrhagias* *Remedia*
supprimentia, imprimis *martialia. Decoct. e li-*

230 *Colica Biliosa.* CAP. VI.
gnis (cum aq. calcis) gelatina C. C. item passu-
lae majores, &c.

COLICA BILIOSA.

Sydenhami sententia.

Colica bi-
liosa.

Art. 643. Colica Biliosa est intestinorum dolor atrocissimus præ cæteris omnibus; intestina nonnunquam quasi injecta fascia constringit; nunc in punctum contractus quasi terebello perforat; subinde remittitur dolor, mox recrudescebat paroxysmus, quem æger præsentiens vultu miserabili atque ejulatu ceu præsentem exhorret & averfatur. Sub initio hujus morbi non ita certo ad unum aliquod punctum determinatur dolor, atque in ejusdem progressu, neque tam crebra est vomitatio, neque alvus ita pertinaciter cathartico- rum vim eludit; quo autem magis augetur dolor, eo obstinatus in puncto figitur, vomitatio succedit frequentior, & major alvi adstrictio, donec tandem ab ineluctabili horum symptoma- tum vi totalis peristaltici intestinorum motus in- versio (nisi maturius quis tulerit suppetias) at- que *iliaca passio* procuratur. Quæ hoc morbo ex- cernitur materia, sincera si fuerit atque *αμυγής*, viridis aliquando, aliquando etiam flava aut inso- liti cujusdam coloris spectatur.

Quomodo
a nephri-
tide di-
stinguitur

Art. 644. A *nephritide* sic distinguitur. 1. Do- lor nephriticus fixus in rene est, & ab eo ad testem exporrigitur secundum longitudinem ureteris. Colicus vero vagus est & cinguli instar medium ventrem affligit. 2. A *passu* Colicus dolor auge- tur, nephriticus potius imminuitur. 3. In Colico dolore ab excretionem per alvum & vomitum ma- jus levamen emergit, quam in nephritico. 4. In dolore nephritico urina primum clara & tenuis, postea aliquid subsidet, & tandem arenulæ aut lapilli excernuntur: in Colica urinæ in initio cras- siores existunt.

Art.

Art. 645. Ad curam rite instituendam *sanguis e Methodus*
brachio paulo liberius quamprimum educatur, & medendi.
 post horas iij. vel iv. *anodynum* exhibeatur: po-
 stero die *catharticum lenitivum* & interposito die
 uno ad tertiam vicem propinetur. *Aq. epidem.*
mirab. vel quæcunque alia *cardiaca*, postquam
 longo morbo vires plurimum exhaustæ fuerint,
 aliquando mirum in modum juvant. Equitatio,
 quemadmodum in pluribus morbis chronicis quod
 maximum est præstat, hic quoque cæteris non
 proficientibus curationem nonnunquam absolvit.
 „ Aliud exercitii genus in hoc affectu equitatio-
 „ ne longe efficacius in *Barbada* habemus (in-
 „ quit *Touune*) viz. *navigatio circa insulam*. Vi-
 „ di quosdam in deploratissimo infirmitatis statu,
 „ cum aliam qualemcunque gestationem ferre non
 „ potuerunt, hac ratione, ultra quam quod cre-
 „ dibile est, restitutos.

Purcellii sententia.

Art. 646. Colica est dolor ventris atrocissimus, *Morbi de-*
 quandoque totum abdomen occupans, aliquando *scriptio.*
 ad unum punctum determinatur cum cruciatu
 quasi terebrante, interdum de loco in locum im-
 mutatur, nonnunquam videtur sensatio tamquam
 viscerum cum funibus simul correptorum; intum-
 mescit aliquando totus venter ita, ut quasi dis-
 ruptus esset; alvus ut plurimum clausa est, urina
 pauca redditur; atque hæc sunt symptomata usi-
 tatoria; accidunt etiam aliquando graviora, fe-
 bris, in ore sapor acidus vel amarus, vomitus,
 ructus, urinæ ardor aut suppressio, icterus, pul-
 satio magna in abdomine, sensus frigoris in eo-
 dem, umbilici intus retractio, vel protrusio ejus-
 dem extrinsecus, materia flava vel viridis per al-
 vum ejecta sine levamine, excrementa alvina le-
 vissima & ventosa, instar stercoreis bovini, urinæ
 supernatantia. Colica frequenter in *paralyfi, epi-*

leptia, arthritide, hydrope, rheumatismo, aut t d
be terminatur. Dolores Colici sunt aliquando in
peritonio, qui frequenter lethales evadunt, ut et-
iam in pancreate; vide locum p. 27. & 30. Spi-
gelius affirmat se nullum unquam dissecuisse ex Co-
lica mortuum sine intestinorum inflammatione.

Causa
varia.

Art. 647. Causæ colicæ frequentiores sunt cru-
ditates, flatus, alvi adstrictio, humores acidi in
sanguine, bilis acrimonia, herniæ, abscessus in-
terni & latentes, ulcera, canceri, &c. concretio-
nes lapidosæ in pancreate, hepate, liene, intesti-
nis vel ventriculo, insertio ductus cholidochi in
ipsum ventriculum (vel pilorum,) luxatio car-
tilaginis xiphoidis, constitutio aeris maligna, un-
dē Colica epidemica, affectiones nephriticæ, &
postremo obstructions & tumores strumosi in glan-
dulis intestinorum (& mesenterii) Colicam pro-
ducunt; hi dolores sunt magis fixi, diuturni, nec
adeo acuti; cathartica & enemata minus prosunt.
De structura & situ coli vide locum p. 66.

Curatio.

Art. 648. Curatio inchoanda est cum venæse-
ctione, si adsit calor insignis vel inflammatio, vel
febris vel ingens humorum affluxus. ℞. Decoct.
capit. ovin. vel pedum vitulin. vel intestin. verve-
tin. ℥x. ol. oliv. ℥iij. m. f. enema. In frigidiori-
bus enema ex ol. oliv. vel lini & vino Canarin.
item cum ol. rut. cham. junip. &c. cum fructu
injiciuntur. Si hæc alvum non subducunt, ad
fortiora deveniendum est. N. B. Sed notatu di-
gnum est, experientia abunde testante, quod im-
mediate post venæsectionem clysmata vel lenissima
promptius operabuntur, quam fortissima ante san-
guinis missionem. In acerbissimis torminibus cum
vomitibus, &c. Laudan. gr. iv. vel v. in clystere do-
lorem in instanti leniunt, quum idem remedium
per os nullum omnino afferat auxilium. In Coli-
ca habituali pannus laneus mollis & subtilis im-
mediate supra cutem ventris continuo gestandus
a Galeno & aliis multum laudatur, tanquam fo-
men-

Nota be-
ne.

Colica
habitua-
lis.

mentatio perpetua . . . Virtutes *aquarum sulph.*
Bathoniens. (extra paroxysmum) *equitationis*,
 &c. sunt satis notæ. Commendatur jusculum
cancrorum fluviatilium: & radix *allii* pro pau-
 peribus. Interdum exhibeo *oleum seminum a-*
nisi larga quantitate viz. a gr. 40. ad 100. in
 paucis saccharo vel aliter cum magno levami-
 ne, præcipue in Colica a causa frigida oriun-
 da. Semen anisi vocatur ab Helmontio *Sola-*
men intestinorum.

Baglivii sententia.

Art. 649. In Colica Biliosa succedit frequenter *De apho-*
aphonia & vox rauca, & per totum fere morbi *nias & pa-*
 decursum durat. In Colica pertinaci si sudor co- *ralysis ex*
 piosus & universalis superveniat labefactis & re- *colica*.
 solutis viribus, brevi *paralysin* expectato; cave
 igitur ne *opiata* copiosius in ea exhibeas.

Art. 650. Antidotum Colicæ est *chamamelum*, *Remedia*
 a quacunque causa oriatur. Quando *opiatis* ute- *nonnulla*
 ris, semper adde *castoreum*, nam & opii narcotin
 corrigit & doloribus medetur. In pertinaci malo
 conducit iter aliquod ut corpus plurimum dierum
equitatione excitetur, fibræque mesenterii longo
 dolore laxatæ pristinas resumant oscillationes ad
 morbosas impuritates e mesenterii sinu eradicand-
 as expellendasque. Valde prodest *semicupium* in
 graviore casu, & in ipso ileo.

Vvillisii sententia.

Art. 651. Pars primario affecta in Colica vide- *In colica*
 tur esse *mesenterium*, quod est valde sensile, & *mesente-*
 humorum nervosi generis affluxionibus plurimum *rium pri-*
 obnoxium, & hinc dolores lumbares atrocissi- *maxio af-*
 mi, in quantum scilicet nervi quidam insignes *ficitur*.
 lumbares mesenterii plexum nerveum maximum
 ingrediuntur. Transitus a Colica ad *paralysin*
 indi-

indicio est materiem morbificam non per arterias sed nervos deferri, ejusque sedem non esse intestinorum tunicas, sed mesenterii plexus nerveos.

Curatio

Art. 652. 24. Fol. malv. utriusque mercurial. parietar. ana m. iv. flor. sambuc. cham. melilot. ana m. ij. caput vervecin. discissum; coquantur in q. s. aq. font. colatura usurpetur pro fotu cum stuphis laneis calidissime intinctis & expressis atque vicissim applicatis repetendo quoties dolores intensius urgebunt. Omentum agnium aliave brutorum viscera calentia abdomini imposita & subinde mutata dolores interdum mire sedant, Præ aliis quibuscunque remediis aquæ acidulæ minerales ferratæ, æstivo tempore per mensem epotæ, juvamen maximum conferre solent, & reliqua alterantia longe superant. Tinctur. antimon. & succini locum habent.

COLICA HYSTERICA.

Sydenhami sententia.

Colica
Hysterica
Morbi de-
scriptio.

Art. 653. „ De Colica Hysterica apud nullum authorem uspiam legimus audivimusve ante ac-
„ curatissimum Sydenhamum. „ Imprimis caven-
dum est, ne symptomata foeminis hystericis fami-
liaria ab aliis, quos sæpe æmulantur, morbis dia-
gnosi errante putentur oriri. Colica hysterica bi-
liosam nonnunquam mentitur, comitem habet
dolorem circa cordis scrobiculum, regionem ven-
triculi & paulo inferiorem, sequuntur humorum
viridi aut flavo colore per vomitum ejectiones
& animi dejectiones maximæ; post diem unum
vel alterum facessit dolor, a levissima vero ani-
mi commotione revocatur.

Curatio
longe di-
versa quàm
colica bi-
liosa.

Art. 654. Cura radicalis a cap. de hystericâ pas-
sione petenda est. Nec venæsectio nec catharsis lo-
cum habent; nam malum exasperant, immo no-
civa sunt ipsa enemata lenissima; quippe hic mor-
bus

bus a spirituum *ataxia* potius quam vitio humorum nasci videtur: Ideoque præmissis aliquot haustibus *liquoris possetici*, iisque per vomitum reiectis, statim ad *laudanum* confugiendum est, & in usu ejus persistendum. Aliquando tamen in foemineis sanguineis humorumque copia oppressis vel phlebotomia vel catharsi vel utraque *anodyno* via aperienda est. In *icterum* interdum transit, qui plerumque sponte sua sensim facessit; sin longas moras neſtat, remediis *ictericis* fugandus est; observandum solummodo occurrit, quod e catharticis *rhabarbaro* solo utendum.

Art. 655. Colica *Pictorum* est species quædam, *Colica Pictorum.* quæ degenerare solet in *Paralysin*, & motus omnimodam manuum ac pedum depravationem, quam hoc nomine *Riverius* in cap. de Colica indigitat; & apud *insulas Caribum* notissima est, utpote quæ magnam vim hominum infestat. Hunc dolorem atrocissimum sanat *balsamum Peruvianum* *Balsamum Peruvianum.* frequenter ac magna dosi exhibitum, viz. gr. xx. xxx. vel xl. sacchar. albo instillatum bis vel ter in die: at *paralysis* huic remedio haud cedit, *Galbanetum* pro usu externo.

Touneii sententia.

Art. 656. Colica nervosa seu convulsiva est affectus adeo frequens in *Insulis Caribiensibus*, ut in numero morborum *Endemicorum* jure merito habenda sit. In medicorum scriptis *Colica Pictorum* nuncupatur, quia *Pictavi* est frequentissimus; in insula vero *Barbada* vulgo audit *the dry Bellyach*. Inter universas calamitates humanum genus affligentes, ne una quidem tanta acerbitate homines excruciat, ac hæc Colica. Frequenter malum inchoare solet in uno puncto ventris, indeque latius diffunditur, ita tamen, ut omnia viscera, a pyloro ad anum usque, ad istum locum, tanquam ad miseriarum commune centrum miro

Colica nervosa.
cru.

cruciamine contrahi videantur. Omnimodi sentiuntur dolores, urentes, lancinantes, mordentes, pungentes, &c. Multifariæ hujusmodi torturæ ægrum exercent, ad dies fortasse 8. 10. vel 14. alvus interim pertinaciter constipata est, urina pauca, vires fere exhaustæ, extrema frigida; ad-sunt etiam sudores gelidi, præcordiorum anxietates, animi deliquia, angores, desperationes, & similia, donec tandem dolorum atque ægritudinum oneri succumbit.

Causæ.

Art. 657. Causæ præcipuæ hunc morbum atrocem producentes sunt acerborum ac immaturorum fructuum comestatio, nimia liquoris perniciosissimi ingurgitatio, quem vocant *Rum-Punch*, ex spiritu sacchari ardentissimo & succo limonum sylvestrium, &c. compositum (vid. *Tractat. de Venenis Art. 1633.*) & inclementia aeris nocturni itinerantibus si ante crapulam edormiverint, &c. Cessante aliquanto doloris vehementia ægrotus perturbationem quandam per spinalem medullam sentit, qua brachiorum ac crurum nervis propagata, imbecillitate statim sensim afficiuntur, indies crescente, donec brevi in *paralysin confirmatam* desinit. „ Unde *Vvillsius* conjecturam fecit „ transitum a Colica ad paralysin indicio esse materiam morbificam non per arterias, sed nervos „ deferri, ejusque sedem non esse intestinorum „ tunicas, sed *mesenterii plexus nerveos*. (651.)

Curatio.

Art. 658. Methodus medendi hunc morbum gravissimum & paralysin præcavendi a catharsi primario incipienda est ad pertinacem alvi adstrictionem subigendam. In hunc finem cathartica leniora forma liquida frequenter repetita optime conducunt, fortiora spasmos adaugere solent, & *Ilei* periculum intentare. Verum propter affectiones intestinorum spasmodicas consultum erit imprimis *Paregoricum* propinare. Opiata paralysin accelerare nonnulli opinantur, sed longe errant; indubitata experientia doctus larga manu illa non

tho-

modo innocue sed semper cum fausto successu exhibui. Sequenti methodo cum prospero eventu frequentissime processi: ℞. *Pil. Matth.* gr. viij. vel x. *castor.* gr. iv. *opobalsam.* q. s. f. *pil.* statim capiend. deinde elapsa semihora, ℞. *Mannæ opt.* ℥ss. *crem. tart.* ℥ij. *syr. rosar. solutiv.* ℥j. f. *mistura* in haustul. tepid. juscul. avenac. sumenda & 3. horis repetenda, donec alvus soluta fuerit; in intervallis *pil. Matth.* gr. iv. exhibere soleo, vel, si vomitus vehementius urgeat, sequentem haustum ℞. *sal. absynth.* ℥j. *opii purissim.* gr. j. vel gr. iß. *aq. menth. fort.* ℥j. *syr. limon.* ℥ss. m. Enema quoque cum balsamicis 4. quaque hora injiciendum est; sequens etiam fons abdomini usui esse potest; ℞. *Fol. cham.* ℥iiij. *bacch. junip. laur. ana* ℥j. coq. in aq. font. ℔v. ad ℔iiij. sub finem addendo sem. carui, fœnic. anis. ana ℥ss. colatur. add. *opii* ℥j. *sp. sacchar.* ℔j. m. *Semicupium* doloribus mitigandis quandoque nonnihil prodesse observatum fuit. Morbi vehementia in hunc modum subacta ad purgantia efficaciora, *mercurialia* scilicet, deveniendum est; ℞. *Calomel. pil. coch. min. ana* ℥j. *opobals.* q. s. f. *pil.* mane sumend. & quotidie repetend. donec dolor penitus remiserit, & alvus satis solubilis evadat. Deinceps *balsamum Peruvianum* ad ℥ij. vel ultra 6. quaque hora *sacchar. crystal.* instillatum vel aliter exhibeo, & rarissime spem meam fefellit. Est & aliud insigne medicamentum apud nos divini numinis favore in hac insula sponte productum, nempe *Pisselaum Indicum*, huic malo valde proficuum, prædicto balsamo adhuc efficacius, nisi quod quibusdam stomacho non adeo gratum sit; dosis ℥ij. ter in die per longum tempus, donec morbus penitus subigatur. Nec datur præstantius remedium pro usu externo quam dictum *Pisselaum*, cum æquali vel dupla quantitate *sp. sacchari* commistum, pro vertebriis dorsi & artubus illinendis, quandocunque paralyseos sit levissima suspicio: hæc vero cum

Pisselaum Indicum.

cum formata sit & confirmata, nulli remedio, quod scio, cedit; nisi forsan *aqua Bathonienses in Anglia* tanto malo succurrere valeant. „ Immo „ in hoc ipso casu valere novi.

Etmulleri sententia.

Colica biliosa, &c.

Art. 659. Dolor punctorius & terebrans acerbissimus sentitur in hypochondrio sinistro, aliquando sed rarius in dextro; in utroque colon facit angulum satis acutum in curvatura; dolor contortionis, lacerationis, & vagæ lancinationis oritur ex spasmodica intestinorum contractione, & plerumque adest in Colica nephritica; dolor rodens & vellicans vermes indicat, dolor pulsans intestinorum inflammationem. Mulieres interdum sub difficili mensium fluxu patiuntur tormina gravia abdominis, quædam post partum (& ante etiam aliquando) dolore Colico laborant, in utroque casu plerumque ex abdominis & intestinorum convulsione.

Ad causam antecedentem respiciendum est.

Art. 660. In omnibus intestinorum torminibus tam humorosis quam convulsivis habitualibus, quoad causam antecedentem, respiciendum est imprimis ad *acre acidum* plus minus *austum*, plus minus *viscidum*, vel ex stomacho ad intestina delatum, adeoque ab assumptis vel vitiosis, vel vitiose digestis eo distributum, vel in plexibus nerveis mesenterii vicinisque locis membranosis pertinaciter hærens, & a quacunque causa externa excitatum.

Semper attendendum est ad speciem Colicæ.

Art. 661. In Colica hysterica sensus globi, in abdomine moti, quem mulierculæ & medici ignorantes pro uteri habent motu, est *plexus centralis mesenterii maxime convulsus*, in viris quandoque accidens. Attendendum est præ omnibus, an Colica sit *humorosa*, an *convulsiva*, an sit *accidentalis* vel *habitualis*, an sit *scorbutica*, *hysterica*, vel *alia*. Clysmata terebinthinata in Colica convulsiva sunt optima.

Art.

Art. 662. In Colica humorosa, ubi pertinaciter Curatio hærent stercora, convenit enema ex ol. sem. lini & raparum & sal gemmæ ad ℥j. vel ij. alias enema emolliens & carmin. ex urina pueri in affectibus intestinorum flatulentis etiam cum terebinth. aliquando. Si dolor Colicus sit nimis acerbus prius est mitigandus, quam purgantibus proritetur alvus. Ol. amygd. dulc. & sperma ceti in Colica convulsiva est remedium proficuum, & gum. ammoniacum in humorosa. Succus expressus sterco-
ris equini est præsentaneum remedium contra Colicam, p. 1061. (vide locum) speciatim in Colica convulsiva. Decoctum flor. cham. in quacunque Colica maxime laudatur, tanquam specificum, & pene infallibile remedium; sacchar. saturni est remedium singulare. Pro usu externo ol. cham. succini junip. ol. petra, galbanum, empl. fofus, &c. vid. locum p. 181.

Art. 663. In Colica, si urina sit tenuis & aquo-
sa, morbus est ut plurimum nephriticus (aliquan-
do hystericus;) si valde colorata, scorbuticus; si
respiratio sit difficilis & præcordia perturbentur,
hystericus. In graviore casu clystma ex fumo nico-
tiane est remedium dolorem mitigans & alvum
laxans.

Diagnosis
ex urina,
&c.

Foresti sententia.

Art. 664. In Colica stercoracea aut a pituita vi-
scidiore nunquam obliviscatur medicus sal. gem-
ma: nam hoc est expertissimum ad resolvenda ster-
cora & mucilagines crassas; Forest. l. xxj. vid. et-
iam mess. med. spargyr. sub tit. sal. gem.

Vires sal.
gemma.

Art. 665. „ Consulendus est Boerhaave in his
„ affectibus (uti in fere omnibus) tanquam ora-
„ culum. ℥l. Flor. cham. mis. coq. paulisper in
„ aq. brion. comp. ℥iv. in colatura dissolv. ol. mac.
„ per express. ℥ss syr. de mecon. ℥ss m. f. haustus
„ calide sumend. ad dolores leniendos in praxi no-
„ stra

Remedia
varia.

„stra frequentissime. Decoct. fol. malva pro pau-
 „peribus præcipue in colica neuphritic. Vvaldsch-
 „midii experientia constat avenas calidas in sac-
 „culo regioni ventriculi impositas vim habere dif-
 „solvendi ac discutiendi. Allium condit. zinzib.
 „condit. (in frigidioribus) empl. e bacc. laur. e
 „Cymín. &c. Pharm. Lond. Enema colic. enem.
 „hyster. enem. tereb. fatus ad colic. fatus spirituo-
 „sus, mistura hyster. spirituos. „ sunt remedia usu
 comprobata.

ILIACA PASSIO.

Etmulleri sententia.

*Iliaca
Passio.*

Art. 666. Ileus sive Iliaca Passio est motus pe-
 ristalticus intestinorum inversus cum dolore cir-
 ca umbilicum intensissimo; excrementa alvina
 motu retrogrado per os ejiciuntur ex obstructione
 alvi contumaciori. Appellatur *Convolutus* &
Chordapson. Quoties in sequiori sexu morbum I-
 liacum observare contigit, *Herniam* adesse tuto
 fere prædicere possumus, quamvis ob exilitatem
 ipsæ patientes non observare soleant. Opinio de
 convolutione intestinorum est falsa; ingressus ve-
 ro superioris intestini in inferius, & contra, est
 satis frequens. Dubium est an inflammatio inte-
 stini sit causa obstructionis ejusdem vel contra.
 Morbus gradatim progreditur, in principio nil de-
 scendit per inferiora, abdomen sensim durefcit &
 tumet; ægri nauseant & vomunt primo ingesta,
 deinde excrementa flavescentia (& pituitosa) &
 tandem excrementa alvina. Adsunt lipothymia &
 anxietates inexplicabiles, sudores frigidi (extre-
 morum frigus) urinæ suppressio; vires languē-
 scunt, singultus supervenit, qui prodromus est
 convulsionis, & epilepsiæ, & ipsius mortis. Plu-
 res intereunt, quam convalescunt. Si dolor sit
 acutissimus, & subito sine causa manifesta deficiat,
 signum est gangrænæ.

Art.

Art. 667. Venæsectio celebranda est in initio, si *Curatio*.
 adsit febris vel insignis calor. *Cathartica* sunt fu-
 gienda, quoniam vomitoria evadunt; non prius
 securitas promittenda est, quam sequitur alvi pro-
 fluvium sponte vel arte provocatum. *Ægri ana-*
leptici & cardiaci sunt sustentandi. *Ol. amygd.*
dulc. cum jusculo pingui, item *Sperma Ceti* in
 decocto *raparum*. Deglutitio *globulorum* aut *ar-*
genti vivi nil prodest, sed potius malum exaspe-
 rat, ubi adest intestini inflammatio, gangræna,
 vel hernia, vel ingressus intestini superioris in in-
 ferius. *Dos. argenti vivi* est ℥iij. vel iv. ad ℥ss.
 & amplius, & exitus ejus per clysteres omni stu-
 dio promovendus est; aliquando non ante aliquot
 dies redditur, interdum *salivationem* movet.
 „ Exemplum affert alicujus mercurii ℥ij. per octi-
 „ dum in corpore habentis & convalescentis, sed
 „ non sine salivatione excitata. Mulieri in sectio-
 „ ne de Lumbricis memoratæ (*Art. 691.*) gra-
 „ vissima passione iliaca correptæ enema lacteum
 „ statim injiciendum præscripsi, & elapsis duabus
 „ horis haustum hypnoticum capiendum; & de-
 „ inceps post duas alias horas largam dosin pil. ex
 „ duobus cum calomel. ℥ss. hæc nihil proficiebant;
 „ die proximo excrementa alvina per vomitum eje-
 „ cta sunt; largam quantitatem olei amygd. dulc. in
 „ brodio tenui potandum jussi, & linimentum ven-
 „ tre illinendo usurpandum, & sub noctem enema
 „ cum vin. benedict. ℥iv. injiciendum; nihilominus
 „ nihil per inferiora descenderat, sed jugiter sur-
 „ sum omnia. Die 4. sudores frigidi supervenie-
 „ bant, viribus fere exhaustis; itaque argenti vi-
 „ vi ℥iij. propinavi & trihorio post tres alias un-
 „ cias; elapsa deinde hora una vel altera *ingen-*
 „ *tem lumbricum* evomebat & bis per inferiora pur-
 „ gata est, & in futurum alvus satis soluta mane-
 „ bat; argentum vero vivum (quod mirum vide-
 „ tur) non ante finem 7. vel 8. dierum redditum
 „ est; nihil tamen mali mulieri exinde obve-

„ niebat : hæc enim etiam nunc post quatuordecim
 „ annos vegeta vivit . „ Omentum ovis recens
 maſtate calide in abdomen impositum mirum in
 modum dolorem lenit ; laudatur etiam cataplas-
 ma ex pomis putridis *Borsdorffianis* cum tantillo
 croco , vel ex stercore ovillo cum lacte cocto ; p. 120.

Sennerti sententia.

*Miserere
 mei.*

Art. 668. Barbari superioribus sæculis Iliacam
 Passionem *miserere mei* vocabant , quoniam ma-
 lum est commiseratione dignum : in hoc morbo
 clysteres , imo & glandes vomitu rejiciuntur ob
 motum intestinorum inversum , ideoque aliquan-
 do intestinorum viæ in ileo non penitus præclu-
 duntur . Signum hujus morbi proprium est , quod
 nihil descendit per inferiora ; accidit plerumque
 vomitus bilis & pituitæ , frigiditas totius corpo-
 ris , dolor plurimus , spirandi difficultas , &c. &
 morituris sudor frigidus . Omnis Ileus periculo-
 sus ; rarissime convalescunt , qui sterco per os
 ejiciunt .

Curatio.

Art. 669. Venter foveri debet decoct. emol. &
 linimentis inungi . Oleum amygd. dalc. & juscu-
 la pinguis ore sumenda sunt , & quamvis semel
 atque iterum talia vomitu rejiciantur , continuan-
 dus tamen est eorum usus ad fibras relaxandas .

*De causis
 consulta-
 tur au-
 thor .*

A tribus potissimum causis exoritur , ab inflam-
 matione , ab aliis tumoribus & exulceratione ,
 & denique a fæcibus induratis , & de quibus sin-
 gulatim consulendus est author p. 429.

Barbetii sententia.

*Causa
 proxima.*

Art. 670. *Fabricius Hildanus* observavit prin-
 cipium & originem hujus affectus fuisse circa In-
 testinum Cæcum ; ego vero existimo valvulam in
 principio coli primum ex intestini cæci inflamma-
 tione adeo contrahi & constringi , ut plane nihil
 per-

permeare possit. In omnibus fere hoc affectu extinctis dissectis accuratiores invenerunt, vel intestini gangrænam, vel tenuis intestini coarctati ingressum in partem proximam flatu prius turgidulam. Si gangræna jam aderit, cognoscitur ex eo, quod dolor statim cesset. *Omentum* & etiam *ipsa intestina* ex vivo animali quam calidissime abdomini applicari possunt multo cum levamine. Convenit *venæsectio* in initio, si malum ab inflammatione oriatur; Immo in corporibus robustis nunquam omitti debet.

Art. 671. Plures ab ileo defunctos aperui, & intestini cujusdam inflammationem & sphacelum fere in omnibus, & morbi & mortis causam fuisse deprehendi. *Villis*. Sæpius in hoc morbo defunctis (inquit *Dolæus*) intestina plane vacua invenimus; unde manifestum est sæpius spiritus animales peccare.

Gangræna morbi causa.

Sydenhami sententia.

Art. 672. Venter primo loco præ omnibus corroborandus est, & vomitus, si fieri possit, sistendus; ideoque *sal. absynth.* cum succo *limon.* præscribo (subinde) sumend. intermediis vero temporibus exhibeo coch. aliquot *aq. menth. stillat.* sine alio quovis additamento. Dum hæc fiunt *catulum viventem* nudo ventri indefinenter accumbere jubeo, dolore hoc modo profligato, exhibeo *Pil. coch. maj.* ℥j. in *aq. menth.* dissolut. quam etiam *aquam* (quo certius vomitus recursum prævertam) toto catharseos tempore injungo. Victus sit tenuis per totum morbi decursum, & decumbat æger in lecto, donec convalescat. Usus *argenti vivi* & *globulorum* author minus probat.

Methodus medendi.

Art. 673. In hoc affectu quotcunque cathartica propinaveris, ea statim emetica fiunt; ideoque *vena brachii* tundenda est & *fumus nicotianæ* (de

Curatio.

hoc vid. *Fulleri enema oleos. amar.*) in intestina inflandus est quam validissime (omnium enematum, quæ mihi innotescunt, hætenus efficacissimum esse duco) idem quoque post moram aliquam reiterari potest. Hoc successu carente, necesse est *catharticum fortissimum* exhibere, sed præstat hora una aut altera *paregoricum* propinare, ut sub *laudani* tutela *catharticum* retineatur, & suo munere defungatur. Sched. mon. p. 48. De usu foliis, &c. vide *enema oleosum amarum Fulleri*. *Fotus ad colicam, forus spirituosus, mistura corallata*, omnia ad colicam quandoque in usum veniunt. Demulcendis doloribus convenit *femicupium*. In *Ileo stercore vacæ* quam recentissimo universa ventris regio emplastretur; hoc etenim remedio, aliis nihil proficientibus, viam intestinorum aperui (*inquit Zacutus Lusitan. in praxi admiranda*)

Historia.

Art. 674. „ Infans vix semestris a nativitate
 „ perfecte valens & vegetus subito in gravissima
 „ ventris tormina lapsus est; subsecutæ sunt vomitiones enormes, nihil omnino per inferiora
 „ descendente, præter exiguum sanguinem. Ad infantulum succurrendum omnem operam ac studium navavi, sed frustra; nam triduo expiravit. Abdomine aperto intestina omnia usque ad
 „ inferiorem Ilei partem flatibus valde distenta invenimus, & jejunum leviter inflammatum:
 „ jamque paulo inferius morbi sedes in conspectum venit: portio etenim Ilei, *sex digitos longa*, (quod prodigiosum erat in subiecto tam parvulo) in *coli* cavum, cum *mesenterio* adjuncto, collapsa est; pars affecta in tumorem attollitur tunicis intestinorum incrassatis, nigricantibus, gangrænohis, & quibusdam in locis sphacelatis per totius involutionis tractum, unde intestinorum *oppilatio insuperabilis*, quæ instar *Polypi* visa est. En luculentum exemplar
 „ *Passionis Iliacæ* perfectissimam morbi ideam

„ com-

„ complectens in infante nondum semianniculo ;
 „ quod rarissimum esse credo .

L U M B R I C I .

Sennerti sententia .

Art. 675. Lumbricorum tres sunt species fre- *Vermium*
 quentiores . viz. *teretes* sive *rotundi*, *lati*, & *as-* *species*
carides (ex ovis insectorum oriuntur) ; aliquan- *varia.*
 do sed rarius vermes anomali ejiciuntur , cornu-
 ti scilicet , hirsuti , quadrupedes , multipedes , bi-
 cipites , tricipites , cauda bifurcata præditi , &c.
 „ Præter vermes intestinales , sunt & alii , om- *Vermes*
 „ nes fere corporis partes incolentes , uti vermes *in variis*
 „ *dentales*, *gingivales*, *rhinarii*, *pulmonarii*, *car-* *corporis*
 „ *diaci*, *sanguinarii*, *urinarii*, *cutanei*, *umbili-* *partibus.*
 „ *cales*, *elcophagi*, vermes in *hepate*, in *saliva*,
 „ &c. Sed hi omnes non nisi in statu morbido
 „ inveniuntur.

Art. 676. „ Lumbrici *teretes* sunt frequentissi- *Teretes.*
 „ mi & satis noti , Lumbricis terrestribus similes,
 „ nisi aliquanto albidiores sint .

Art. 677. Lumbricus *latus*, *tænia* a *Plinio*, *Pla-* *Lumbrici*
 „ *tero*, &c. appellatus , est instar fasciæ duarum *lati de*
 „ vel trium ulnarum , aliquando longior , genicu- *scriptio.*
 „ lis transversis per totum divisus. *Nicolaus An-*
 „ *dry* affirmat unum esse tantum in corpore ,
 „ unde *solum* appellatur . Ast Mr. *Hageunot* *tæ-*
 „ *niam* in ventriculo felis aliamque in duodeno
 „ reperit . *Memoir. de l'Acad. Vol. xvii. p. 484.*
 „ Et Mr. *Geoffroy* *tæniam* in tinca pisce duos pe-
 „ des & amplius longam observavit . *Hist. de l'*
 „ *Acad. Vol. xiv. p. 50.* hunc Lumbricum in ca-
 „ ne ipse vidi tres circiter pedes longum ; ideo-
 „ que in aliis animantibus præter hominibus ge-
 „ nerantur .

Art. 678. *Latos Lumbricos* qui habent , appe- *Latus*
 tentia cibi nimia laborant , ac nisi cibo offera- *Lumbrici*
 tur , dolor & morsus in ventre percipiuntur , &c. *cus.*

Certissimum vero signum est, quod cum alvi excrementis corpuscula quædam *cucurbitæ* seminibus similia excernuntur. Hi difficulter necantur; commendatur *rad. filicis* ad ℥ij. & decoctum *corticis rad. mori*.

Remedia
ad Lum-
bricum
latum.

Art. 679. „ Ad *latos Lumbricos* educendos adhiberi debet *vomit* ex *oleo*, non ex *radicibus*, & alia die *clystere* utendum admixta *nitri* parte vel *salis*; danda etiam *aqua salsa* potui, aut *glycyrrhizæ radice* decoctio aut similiter incocta *glycyrrhiza*.

Ascarides

Art. 680. „ *Ascarides* sunt *tenuēs Lumbrici*, filorum particulas referentes, qui in parte inferiori crassorum intestinorum, & juxta sphincterem musculum residere solent.

Remedium
singulare.

Art. 681. „ Signum pathognomonicum *ascari-* dum est *pruritus* in ano vix tolerabilis; ægro- tantes aliquando *syncopen* patiuntur, & frequen- tissime *tenesmus*. Ad *ascarides* facit experimen- tum *Aetii*, suppositorium scilicet formatum, & carne *veteri salita*, pinguedine *derasa*.

Fulleri sententia.

Ascaridum
Cura-
tio.

Art. 682. *Ascarides* sunt quidem gens pusilla, sed expugnatu difficillima; namque licet omnes ad unam enematis vim exterminarentur, nova tamen & numerosa proles ab ovulis in recto depositis mox nascetur. Ideoque non tanti erit parentes solos proscriptisse; nisi insuper & nati, & femina etiam ipsa radicitus extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, si postquam *ascarides* jam disparuerunt, non statim a remediis abistamus; sed tertiis quartisque diebus per aliquot vices, ac deinde semel in hebdomade hujusmodi deturban- tia enemata repetamus; quod nemo authorum ha- tenus notavit. Ideo minime dubitandum est ene- ma amarum seq. ℥. *Rad. serpent. virg. contus.* ℥j. *pulp. colocynth.* (in nodulo ligat.) ℥j. *herb. tana-*

Enema
amarum.

cet. summit. sabin. ana Mß. coq. in aq. font. q. s.
ad ʒvj. colatur. add. ol. hyperic. ʒß. ol. chym. ʒß.
spec. hier. picr. ʒß. m. singulis noviluniis injectum,
& per aliquot menses repetitum, ascarides inter-
,, empturum, exterminaturum, & funditus dele-
,, turum esse.

Art. 683. ,, A Lumbricis vomitus, cardialgia, Sympto-
,, syncope, singultus, vocis privatio, tormina in- mata a
,, testinorum, capitis dolores, sopor gravis, de- lumbrici.
,, liria, mœror, tristitia, febres, angina, pleu-
,, ritis, & alia innumera gravia symptomata.

Art. 684. ,, In genere amara fere omnia sunt Remedia
,, vermifuga. Privatim pulv. cort. aurant. mercu- vermifu-
,, ritalia, Æthiop. min. mercur. dulc. &c. muscus ga varia.
,, corallin. ens veneris, semen Sanctonici in vino
,, clareto est anthelminthicum insigne, Floyer.
,, Decrescente luna vermes sunt aggrediendi. Pulv.
,, colocynthid. cum felle bovin. subact. cum gut,
,, aliquot ol. absynthii umbilico applicatus, Lum-
,, bricos pellit. Ad ascarides necandos enemata
,, cum colocynthid. incoct. mercurialia, &c.

Baglivii sententia.

Art. 685. Quod ut plurimum homines ex im- Vermes
proviso, & sine ulla causa manifesta, & signis anomala
alios morbos comitantibus, in subitum vitæ disci- in soli-
men incidunt, & cadunt veluti apoplectici cum ta sym-
extremitatibus frigidis, pulsu exilissimo (qui fere ptomata
semper signum est vermium latentium uti & sin- sepe pa-
gultus) aphonia, quandoque improvise mania, riunt.
tunc de vermibus dubitandum, in tali casu nil
potentius est, quam statim dare cum brodio gr.
xij. merc. dulc. & gr. v. scamon. sulphurat. in adul-
tis. In pueris vero minoretur dosis, vel potius
detur mercurius crudus ad magnitudinem pisi cum
brodio, nam erit ad miraculum. Chesneau.

Art. 686. ,, Probe notandum est, quod nullum Nota be-
,, tam peregrinum sit symptoma, tamque ne.

„ *μαγόν*, quod vermes excitare non possint. Hor-
 „ renda quidem symptomata quandoque a vermi-
 „ bus exoriuntur, ut non raro ex incantatione
 „ produci vulgo credantur. Periti medici multa
 „ adstantium admiratione cacodæmonia non raro
 „ ejiciunt.

Ex ver-
 mibus e-
 pilepsia
 mania,
 moria.

Art. 687. „ In praxi quotidiana horrenda hu-
 „ jusmodi symptomata a vermibus excitata vidi-
 „ mus. Homo quinquagenarius subito in gravif-
 „ simam *Epilepsiam* lapsus est, & intra decem
 „ dies sex vel octo violentissimos insultus cum
 „ horrendis spasms passus est; deinde in *maniam*
 „ incidit per diem unam aut alteram, & postre-
 „ mo in *moriam* & fere omnium rerum *oblivio-*
 „ *nem*. Die 16. Lumbricum mortuum excrevit,
 „ & sensim pristinam sanitatem nactus est, nisi
 „ quod *memoriam* nunc biennio post nondum in-
 „ tegre recuperavit.

Cacitas

Art. 688. „ Adolescentula quædam febre vermi-
 „ nosa laborans stupendis motibus convulsivis cor-
 „ repta est, unde *visum* penitus amisit, & luce
 „ orbata ad quatrimum mansit, interim a spasms
 „ fere libera; die 5. alius paroxysmus convulsivus
 „ supervenit, & acies oculorum restituitur. Ex-
 „ hibita erant medicamenta antispasmodica, &
 „ præcipue anthelminthica, *Æthiop. mineral.* &
 „ calomel. &c. Vermes comminuti & contriti
 „ excreti fuerunt & puella convalescebat.

Obmure-
 scencia.

Art. 688. „ Alia puella ex Lumbricis intestina
 „ incolentibus primo raucescit, & febre acutissi-
 „ ma laborabat; post paucos dies vocem penitus
 „ amisit, & ad dies aliquot muta remansit; &
 „ cum omnia symptomata mortem in propinquo
 „ esse monstrabant, aliis vermifugis minus suc-
 „ currentibus, exhibui *decoctum foliorum helle-*
 „ *bori nigri* fere in ipso articulo mortis; vermes
 „ quamplurimos excrevit, & convaluit. Eiusdem
 „ remedii ope plures qui in extremo vitæ disci-
 „ mine fuerunt versati, restitutos vidi; & longa

„ ex-

„ experientia didici helleborum nigrum optimum
 „ esse & certissimum vermifugum in tota phar-
 „ macorum familia.

Art. 690. Ex Historia Medica abunde constat *Lumbricus*
Lumbricos nonnunquam ventriculum, intestina, *umbilica-*
 hypochondria atque inguina perforare & foras pro-*lis.*
 repere. Plusquam viginti abhinc annis ex umbi-
 lico pueri octennis exulcerato *Lumbricum teretem*
 6. vel 7. digitos longum propriis manibus avulsi;
 post *Lumbricum* cochl. j. vel ij. *puris flavi* efflu-
 xerunt, quod excrementa alvina non olebat. Ul-
 cus non temere sanandum esse judicavi; ideoque
 foramini turundam adaptari jussi, ut materia pu-
 rulenta quotidie evacuetur; per septimanam &
 diutius pus ubertim effluebat, sed indies minori
 quantitate; deinde post triginta dies sine ullo in-
 commodo ulcus exsiccatum est, & puer integre
 restitutus, utcumque tamen proximo anno in *asci-*
tem lapsus est, a qua causa nescio; ex hoc etiam
 morbo remediis appropriatis illum feliciter libera-
 vi, & etiamnum sanus ac vegetus vivit.

Art. 691. Fœmina quadraginta quinque annos *Lumbrici*
 nata, robusta, & laboribus assueta, dolore coli- *ex ingui-*
 co quandoque obnoxia, alias sana, circa quatuor- *ne prode-*
 decim abhinc annis tumorem habuit *in inguine si-*
nistro, ovum gallinæ æquantem, quem *herniam*
 esse ipsa credebat; durabat enim integrum annum
 ante disruptionem. Interea circa dictam perio-
 dum fœmina *ileo* correpta est, de quo alibi (*Art.*
667.) a cujus morbi cruciatibus ac immani vomi-
 tione, &c. ruptus est *tumor in inguine*, & efflu-
 xit tenuis humor flavescens, turpethi mineralis
 colorem æmulans: advocatus est chirurgus, qui
 stylo immisso largam cavitatem detexit; foramen
 sensim spongia præparata dilatatum est, & ma-
 gna vis prædicti humoris indies evacuetur; die
 10. in foramine apparuit *Lumbricus vivus*, quem
 chirurgus coram astantibus detraxit, figura, co-
 lore, & magnitudine *Lumbricis intestinalibus o-*
mni-

mnino similem. Post duas vel tres septimanas e-
ductus est *alius Lumbricus* priori non dissimilis,
nisi quod aliquanto rubicundior esset. Vermifuga
interne propinabantur, & *decocta anthelminthica*
ex fol. hellebor. nigr. aloe, sem. sanctonic. &c. in
ulcus sinuosum injecta fuerunt. Tribus circiter
mensibus sanatum ulcus, & mulier, adhuc vi-
va, ex illo tempore bene se habuit.

Art. 692. Si quis de *Lumbricis umbilicalibus &*
inguinalibus plura velit, *Schenckium* adeat, *Ob-*
serv. p. 408. 409. item *Bonetum, p. 631.* Ingui-
nalia recentiora exempla habemus apud *D.*
Morton. Hist. Natural. Northamptoniae, p. 467.



C A P. V I I.

Sive Fasciculus Morborum septimus.

D I A B E T E S.

Listeri sententia.

*Diabetis
historia.*

Art. 693. **D**luturna est hujus morbi creatio, &
longo tempore parturitur. In prin-
cipio os humore privatur, saliva albida est ac spu-
mans, paulo plus lotii, quam moris erat, effun-
ditur; sitis adest, sed nondum vehemens, cale-
factio parva quidem, sed mordax, visceribus in-
hærens exoritur; habitus corporis gracilis evadit,
& homo anxius & animi dubius existit; progres-
su temporis sitis insigniter augetur, & velox est
carnium & membrorum in urinam colliquatio;
neque enim cum intermissione lotium reddit, sed,
perinde atque canales laxati sint, indefinens est
profusio; sitis intolerabilis est, potus copiosus,
multitudini tamen lotii non respondens; si par-
vum tempus a meiando abstinuerit, intumescunt

lumi-

lumbi, testes & ilia, postremo cum dolore meit & festina mors adventura est. Urinæ quidem gustus lenis, & minime, quantum memini, dulcis, paulatim tamen dulcescere in confesso est, quod primum aquosior seri pars effunditur, & postea ipsa seri pars chylosior: hinc autem rei fidem facit, nempe *phthisicorum* plurimorum ultimis mensibus insignis sputi dulcedo, ad nauseam usque molesta (lac etiam muliebre, a chylo paululum discrepans, dulcescit.)

Art. 694. Conveniunt *amygdalata* & *lacticia*. *Curatio.*
 „ Affert exemplum cujusdam ex hoc affectu suo
 „ consilio curati bibendo *vinum* cum *zinzibere*
 „ coctum quantum & quoties pro viribus potuit,
 „ concesso interim haustulo ex *aq. lactis* ad sitim
 „ leniter temperandam.

Ettmulleri sententia.

Art. 695. In Diabete urina quantitate nimis copiosa excernitur, cum siti intensa, debilitate virium, macie, febre continua lenta, ardore circa regionem lumbarem, verbo, symptomatis *hecticæ confirmatæ*; interdum cum urina pingue aliquid excernitur, & tandem ut plurimum mors subsequi solet. Sed hæc est *Diabetes notha*. *Morbi descriptio.*

Art. 696. Diabetes vera est immutata ingestorum potulentorum per urinam excretio, *celiacæ vera* & *lientericæ* similis: In hac specie potulenta redduntur parum mutata quoad colorem, odorem, saporem, &c. sic vinum rubrum mingitur, &c. Exemplum hujus sunt rariora. *Diabetes vera.*

Art. 697. Est & alia species Diabetis, quæ *celiaca urinalis* appellari potest, nempe quando *cbylus* cum urina aut loco urinæ prodit. *Alia species.*

Art. 698. Urina vulgo Diabete laborantium admodum dulcescit; est periculosum malum, & sæpe lethale; post immodicum laborem, nimiam venerem, chronicas febres, plerumque incurabile; *Prognosis.*

le, „ ut etiam quando a prava & diuturna con-
 „ suetudine liquorum spirituosorum ingurgitatio-
 „ nis originem duxerit.

Curatio.

Art. 699. Quoad curam temperanda est sangui-
 nis acrimonia; in plurimis convenit cum cura fe-
 bris *hectica*; inchoanda est cura cum vomitorio,
 deinde exhiberi potest *antihæctic.* *Poterii*, *lapis*
bamatit. *sacchar.* *saturn.* *croc.* *mart.* *aluminata*,
trochisc. *de carabe*, *terr.* *sigillat.* *opiatum* hor. so-
 mni; præ reliquis *aq. calc.* *lac chalybeatum*, *e-*
mulsiones, &c. Ad Diabetem veram *astringentia*,
martialia, privatim decoctum *cort. aurant.*

Vuillisi sententia.

Morbus
apud an-
tiquos ra-
rissimus.

Art. 700. Diabetes apud antiquos fuit morbus
 rarissimus, at nunc dierum magis familiaris; ha-
 bet sitim continuam, atque febrem lentam & qua-
 si *hecticam* semper conjunctam. Novi quendam
 vino Rhenano pro potu ordinario per viginti dies
 usum Diabetem incurabilem contraxisse.

Curatio.

Art. 701. Pauci aut nulli ab *astringentibus* cu-
 rantur. Sæpius in hoc morbo *tincturam antimonii*
 cum bono successu præscripsi, atque *aq. solutionis*
calcis viv. cum sassafr. sem. anisi, *passulis*, *li-*
quirit. &c. Ego, D. *Michelthuvait* & *Vitherly*
 pro quodam Comite sic præscripsimus; ℞. *Sum-*
mit. arboris cypress. M. viij. *alb. ovor.* ℞ij. *cinnam.*
 ℞ss. *lact.* ℞viij. distillantur, &c. bibat æger ℞vj.
 ter. in die. ℞. *Gum. Arab. tragacanth. ana* ℞vj.
sacchar. penid. ℞j. f. *pulv.* dos. ℞j. vel ℞ss. bis in
 die cum *aqua distillat.* haustum *paregoricum* omni
 nocte; dietam fere tantum ex *lacte*. Horum usu
 indies melius habuit, & intra mensem sanatus est.

Diabetes
 & *saliva-*
tiō.

Art. 702. „ Fœmina quinquagenaria plenioris
 „ temperamenti *Diabete* & *salivatione*, nunc
 „ hac, nunc illa, utroque morbo alternatim in-
 „ vadente, tamdiu laborabat, donec vires fere
 „ exhaustæ fuerunt. Infusum *rhabarbari* in vino

„ Ca-

„ Canariensi quotidie capiendum jussi , & post
 „ paucos dies dosis decoct. catechu composuit.
 „ Fulleri, omni nocte propinata fuit, & pro po-
 „ tu ordinario *vinum Florentinum cum aqua Bri-*
 „ *stolensi dilutum* potavit, atque ita duobus vel
 „ tribus septimanis ab utroque malo penitus li-
 „ berata est, & plures annos incolumis vixit.

Sydenhami sententia.

Art. 703. Succi sanguini illati per vias urina-
 rias crudi & incocti exitum sibi quærunt; un-
 de sensim labefactantur vires, colliquescit corpus
 & quasi substantia ejus per hanc cloacam exina-
 nitur, cum siti, ardore viscerum, lumborum co-
 xarumque intumescencia, & salivæ spumosæ ex-
 spuitione crebra.

*Morbus
adum-
bratus.*

Art. 704. Eadem præscribenda sunt, quæ in
fluore albo, omissis solummodo *venesectione* &
catharsi: nam utrobique *indicationes curativæ* sunt
 eædem, quantumcunque inter se hi duo morbi
 dissidere videantur.

Curatio.

Harrisii sententia.

Art. 705. Cogitationi clarissimi authoris subiit
diarrhœam esse quasi *diabetem alvi*, & *diabetem*
renum diarrhœam; ideoque felici cum successu
 pro diabete laboranti hunc in modum præscri-
 psit. ℞. *Rhei elect.* ʒss. *santal. alb. citr. ana* ʒj.
cardamom. minor. ʒss. infunde lento igne vase clau-
 so in *vin. Canarien.* ℞j. sumpsit æger hujus vini
 colati coch. vj. hora 6^{ta} matutin. atque tantun-
 dem repetebat hora 10^{ma} ante merid. ab illo me-
 ridie usque ad 10^{ma} verspertinam Diabetes peni-
 tus sistebatur, sitis desinit, &c. (sed hujus rei hoc
 unicum habet exemplum.)

*Curatio
singularis*

Farrago sententiarum.

Græcis incognita fuit.

Art. 706. Rara est mentio hujus morbi apud veteres scriptores; *Græcis* fere incognitus fuit; *Galenus* profitetur se bis tantummodo ipsum vidisse; *de locis affectis* lib. vi. cap. 3.

Remedia varia.

Art. 707. Præter jam dicta interdum ad curam aliquid faciunt remedia sequentia, decoct. catechu comp. decoct. incrassans, ichthyocola, gelatina C. C. oryza, tinct. coralli, trochisci Gordonii, & præ omnibus juxta praxin modernam aquæ calidæ *Bristolenses*. Sequens decoctum cum maximo fructu propinari potest; ℥. Cort. Peruv. ℥j. tinctur. rosar. ℥ss. coq. ad ℥j. lento igne, colatur. add. vin. rub. auster. ℥ss. syr. Cydon. ℥ij. misce; dos. ℥iij. bis vel ter in die.

N E P H R I T I S.

Boerhaavii sententia.

Inflammatio renum.

Art. 708. Certum est renes vera inflammatione tentari ex dolore ardente, pungente, magno; ex febre acuta, continua comitante; ex urina pauca, admodum rubra, & flammea, vel in summo malo aquosa; stupore cruris vicini; dolore inguinis, testisque vicini: dolore iliaco: vomitu bilis: ructu assiduo.

Causa.

Art. 709. Hanc inflammationem producere possunt omnes causæ generales inflammationem parientes, privatim quicquid urinæ transcolationem & transitum in meatibus urinariis impedit. Si summa inflammatio hæc vascula occupat, ita sæpe stringuntur, ut nihil reddatur lotii, aliquando ut valde parvum, tenue, aquosum, quod pessimum. Infinitæ sunt Nephritidis species, causæque; & inter eas una a calculo; omnium tamen est ferme eadem curatio.

Art.

Art. 710. Sanatur per remedia generalia omni *Curatio* inflammationi sanandæ propria, viz. *venæsectionem, avulsionem, dilutionem*; per *decosta lenia, emollientia, antiphlogistica* magna copia ingesta; per *clysmata, fomenta, balnea* ex iisdem constantia; *victu humido, leni, quiete, vitatione lecti calidi, & decubitus* in dorso. Si nimia symptomata doloris, vel convulsionis urgent, *opiata* profunt, vomitum autem nimium sæpe ingestu tepidæ mellitæ juvare prodest. Atque hac sola methodo tuto curatur ipsa *Nephritis* a calculo renibus, ureteribusve impactio orta.

Art. 711. Si causæ *Nephritidis* magnæ, nec *ma-* *Abcessus* lum resolvitur, nec sanatur, se excurrit ultra septimum diem, *abcessus* metuendus; quem fieri docet, remissio doloris, ejus in pulsationem mutatio, horror sæpe recurrens, gravitas stuporque partis; jam factum esse docet prægressus priorum, tum pulsus, ardor, tensio in loco, urina purulenta, foetida, instar urinæ falsæ putrefactæ: simulac *abcessus* ille factus scitur, utendum valde *maturantibus* primo & *emollientibus*, dein purulenta apparente urina, *diureticis puris ex aquis medicatis, sero lactis, similibusque, usurpatis simul balsamicis.*

Art. 712. Si vero suppuratio dicta diu durat, *Affectus* tutus ren exesus saccum format nulli usui servientem: tumque frequenter *tabes renalis* insequitur. *Suppurat* Si scirrhum hic format, paralyxis vel *claudicatio* cruris suppositi oritur, immedicabile malum: unde sæpe lenta *tabes, hydrops, &c.* Si autem parva copia materiæ inflammatæ coagulata in folliculo urinæ minimo hæserit, basin format, cui apposita sabuli in urina materies crustatim accrescens calculum renalem creat, sicque eundem auget, de quo alibi. Quinetiam aliquando in gangrænam transit, quod docet vehementia causæ & symptomatum, & subita doloris remissio sine causa manifesta, cum sudore frigido, pulsu debili *inter-*

Affectus
Suppurat
ionis &
prognosis.

256 *Inflammatio & exulceratio, &c.* CAP. VII.
termittente, singultu, urina vel nulla, vel livida,
nigra capillosa, foetente, carunculis fuscis, ni-
grisve foeda, defectu virium subito, ubi nihil ju-
vat, imo nec ipsa medicina.

INFLAMMATIO & EXULCERATIO Vesicæ.

Etmulleri sententia.

Signa in-
flamma-
tionis re-
num, &
quomodo
differt a
calculo. *Art. 713.* Renum inflammatio & exulceratio,
nephritis quandoque dicitur. Signa sunt ardor u-
rinæ, stranguria, urinæ interdum suppressio, cor-
poris inflexibilitas, febris, stupor cruris, vom-
itus biliosus, alvi suppressio, &c. Ut rite distin-
guatur a calculo, observandum est quod hic sem-
per adest febris continua, in calculo non ita; do-
lor etiam est magis continuus & pulsatilis, in cal-
culo interpolatus & periodicus; ischuria in hac,
raro in calculo. „ In inflammatione renum urina
„ in principio valde rubescit, morbo autem ad
„ summum provento aquosa & limpida evadit; in
„ affectu calculoso contrarium prorsus accidit.

Curatio. *Art. 714.* Quoad curam cum reliquis inflamma-
tionibus convenit, cum externis secundum curam
anginae procedendum est, cum internis secundum
pleuritidis; hirudines venis hæmorrhoidalibus ap-
plicatæ prosunt. Diuretica in principio sunt no-
civa; conducunt nitrata, saturnina, papaverina,
succus cancerorum fluviatilium, & externe cam-
phora.

Suppuratio, inde
ulcus re-
num. *Art. 715.* Suppuratio aliquando expectanda est;
rupto abscessu mictus fit purulentus, hinc ulcus
renum; dolor morficans & rodens in lumbis fen-
titur a fero acri, quod in transitu irritat & ro-
dit cum caloris sensu; periculosum est malum,
& sæpius lethale.

Ejusdem
curatio. *Art. 716.* Quoad curam mundificantia & hinc
consolidantia utramque faciunt paginam; vomitus
a plu-

a pluribus laudatur, mercurius dulcis cum terebinthina & balsamicis; præmissis mundificantibus decoctum hederæ terrestris, & e lignis, succus cancrorum fluviatilium, trochisci alkekengi (trochisci Gordonii, lac asininum) acidula, aq. spadan. &c.

Art. 717. In inflammatione & exulceratione vesicæ pathemata sunt tensio, durities, ardor, tumor, ac dolor in regione pubis, febris plus minus acuta; ægri ut plurimum moriuntur quarto vel septimo die, vel sequitur *ulcus* curatu difficilimum; interne quoad curam cum aliis inflammationibus convenit; externe danda est opera ut inflammatio *discutiatur*, aliter expectanda est *exulceratio*.

Inflam-
matio &
exulcera-
tio vesti-
cæ.

ULCUS RENUM & VESICÆ.

Art. 718. In ulcere vesicæ adest dolor gravis in pectine & pube, quoties ægri mingunt, urinæ difficultas accidit, sæpius & tenesmus, & membri virilis erectio. Si in pene vitium sit, inter meiendum dolor percipitur, quod in vesicæ ulceribus non accidit, nisi juxta ejus collum ulcus consistat. Malum ut plurimum est incurabile. Quomodo distinguantur ulcera renum & vesicæ.

Inter renum & vesicæ ulcera sic distinguitur (inquit Lommius) renibus exulceratis non æque difficulter urina redditur, & quod ex his deditur, rubet, seu tenues trahuntur carunculae, seu filamenta capillis similia; minor etiam incidit dolor, sæpiusque cruor urinæ permixtus, At vero exulcerata vesica, major est urinæ tum cupiditas tum difficultas; quicquid decedit, album est; dolores magis urgent, minus sanguinis excernitur; si meatus urinarius sive urethra exulceretur, urina subcrassa est, particeps modici cruoris, vel certe puris. Ulcera renum promptius quam vesicæ sanescunt.

Ulcus
Vesicæ
signa.

R

Art.

Curatio.

Art. 719. Eadem sunt indicationes curativæ ac in ulcere Renum; *trochisci Gordonii* specificè laudantur; *thermæ*. Pro injectione convenit *aq. calcis cum trochis. alb. rhasis (sacchar. Saturni.)*

Riverii sententia.

Causa &
signa,
&c.

Art. 720. Ulcus Renum vel Vesicæ a tribus excitatur causis; abscessu rupto post inflammationem, humorum acrimonia, (qualis est ea, quæ mictum cruentum efficit), aut a calculo aspero dictas partes erodente; postrema hæc frequentior est, ac fere ordinaria. Mictio purulenta est signum diagnosticum. In ulcere Vesicæ, aut illius cervicis perpetua adest dysuria & continuus dolor partem istam infestans, in ulcere Renum non ita; raro curantur in junioribus, in senibus nunquam.

Curatio.

Art. 721. Purgantia debent esse leniora, ut *castia, rhabarbarum, &c. mercurius* eximiam habere vim omnia ulcera interna & externa mundificandi & consolidandi, ut etiam *terebinthina* cum pulv. *liquiritiæ* exhibit. ad ℥ss. post debitas evacuationes & revulsiones ad detergentia progrediendum est; inter illa *serum lactis, hydromel tenue, lac asinum, &c.* post horum usum, ubi ulcus satis mundificatum fuerit (quod cognoscitur quando pus minore quantitate excernitur, idque album æquale ac minime foetidum) glutinantia & consolidantia exhibenda sunt, inter quæ *trochisci Gordonii* instar omnium habentur, qui dolorem leniunt & ardorem urinæ contemperant; dos. ℥ij. vel iij. in hydromellite, vel dec. hord. præ cæteris *lac vaccinum* cum *bol. armen.* ℥ss. haustum singulis matutinis testatur *Forestus* maxime conferre ad ulcus expurgandum & consolidandum; *lac tepens* recens mulctum frequenter injectum præstantissimum est *anodynum* in quo si *trochisci Gordonii* dissolvantur omnes scopi tum doloris sedandi tum ulceris curandi adimpleri possunt.

Far-

Farrago sententiarum.

Art. 722. Renum affectiones (inquit *Hippocrates*) non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. Si quis sanguinem & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat. *Hippocr. aphorism.* *Prognosis.*

Art. 723. *Rhabarbarum* in parva dosi & diu exhibitum est remedium singulare ad ulcera renum & vesicæ curanda. *Hamilton.* *Remedium singulare.*

Art. 724. Nescio an virtutes *Pareira Bravae* e. radice vitis sylvestris *Brasilensium* satis tentatæ fuerunt, necne; de qua *M. Geoffroy* hæc habet; exhibui felici cum successu hanc radicem *Ulceribus Renum & Vesicæ laborantibus*, quorum urinæ tanto pure refertæ erant, ut meiendi impedimento fuerit; ex usu hujus remedii statim urinam libere reddebant pure propemodum immunem, & progressu temporis adhibito paulo balsam. Capiunt ad ulcera detergenda, ex his deploratissimis affectibus omnino sani evaserunt. In dolore etiam colico & nephritico mira præstat. Dosis in substantia a gr. xij. ad xvij. in decoct. ad ℥ij. *Hist. de l'Acad. Vol. xiv. p. 75.* De virtutibus etiam hujus radice vid. *Transact. Philos. N. 365.* Ex propria experientia *D. Cheyne* in tractatu suo de Arthritide p. 50. testatur *Æthiopem* mineralem larga dosi bis in die sumptum, diuque continuatum remedium esse certum ad ulcus Vesicæ curandum. *Pareira Brava.*

Art. 725. *Ulcus Vesicæ*, quod a calculo fit, non curatur, nisi prius extrahatur calculus. *Ulcera Vesicæ* sunt fere semper incurabilia; *Ulcera Renum* non sunt adeo periculosa. *Æthiops mineral.*

Art. 726. Remedia sequentia quandoque suo loco utilia; aqua calcis, decoctum balsamicum, decoctum incrassans, enema terebinth. mistura balsamica nephritica, tinctura antiphthisica, tinctura cantharidum. *Prognosis.*

CALCULUS RENUM & VESICÆ.

Art. 727. „ Calculus definiri potest corpus durum ex materia lenta aut terrestri, vi insita lapidescente, concretionem generatum, loco, quo detinetur, dolorem obstructionem aliaque symptomata ut plurimum pariens.

Greenfieldi sententia.

Art. 728. Signa præcipua diagnostica *Calculi Renum* sunt quæ sequuntur: 1. in regione lumborum dolor fixus, continuus, gravativus, instar ponderis in renis substantia cum sensu obtuso; lapillo vero e pelvi in ureterem exeunte incipit dolor dilacerans, & omnium acerbissimus. 2. inflexibilitas spinæ dorsalis extensione & compressione nervorum. 3. lumborum ardor. 4. stupor cruris ejusdem lateris ex pathemate nervorum. 5. retractio testiculi ex eadem causa. 6. urina vel cruenta vel tenuis & limpida & pauca quantitate; at vero post calculi in vesicam delapsam urina statim redditur admodum crassa, turbida, subnigra, & copiosa.

Art. 729. „ Ut accurate distinguatur hic morbus a colica (vid. *Art. 644.*)

Differentia a colica.

Art. 730. Signa diagnostica *Calculi in Vesica* sunt sensus gravitatis in perinæo & regione inguinali, perpetuum meiendi desiderium insequente dolore atroci præcipue in penis summitate cum egerendi conatu molestissimo & frequentissimo, unde prolapsus ani; „ Pruritus molestissimus ad caput penis, ejusdem frequens ac involuntaria erectio, urina post motum vehementiorem cruenta, nullum levamen ex remediis ad stranguariam adhibitis, &c. sunt etiam signa *Calculi in Vesica*; „ sed signum omnium maxime indubitatum est, quod certissime tactu deprehenditur a digito in anum indito; vel cathetere, de quibus consulatur auctor.

Art.

Art. 731. Interdum in *Vesica* inveniuntur ex-
crefcentiae carnosae scirrhosae vel fungosae calculi sym-
 ptomata ad amissim mentientes, exempla duo aut
 tria adducuntur. Ejusmodi scirrhum bis in ca-
 „ daveribus vidimus, inquit *Baglivius*. Ex testi-
 „ monio *Lithotomorum* constat Calculum in Vesi-
 „ ca semper esse liberum, parietibus ejusdem nun-
 „ quam adhærentem, neque membrana unquam
 „ involutum, prout a quibusdam falsò perhibe-
 „ tur. *Vide Lithot. Douglas. p. 6.* Utcunque ta-
 „ men verissimum est Calculum quandoque inter
 „ descendendum a renibus inter tunicas ipsius Ve-
 „ sicæ in transitu hæerere, ibique hospitari, & in
 „ molem grandiore accrescere, capsulaque inter
 „ ipsas tunicas formata, tandem aliquando ulcus
 „ deploratissimum ibidem creare. „ *Vid. Hist. de*
l'Acad. Sci. Vol. vi. p. 29. Memoir. p. 34.

Excre-
 scentia
 carnosae
 Calculi
 mentientes.

Art. 732. Calculus grandior in Rene una cum
 ejusdem ulcere est casus desperatus; aliquando ve-
 ro natura, dictu mirabile, ultra spem omnem ab-
 scessum efficiens per ipsos spinales musculos viam
 patefecit ad Calculum ejiciendum, & tandem Ul-
 cus consolidatum fuit. „ Atque hinc quasi charta
 „ provocatoria, natura monstrante viam, ad ali-
 „ quid tentandum ars nostra laceßitur. Audax
 „ omnia perpeti gens humana. Operationem *Li-*
 „ *thotomiae Vesicalis* omni ævo chirurgi exercita-
 „ runt; sed de *Lithotomia Renali*, quod scio,
 „ nusquam omnino audivimus ante celebrem *Do-*
 „ *minicum Marchetti Petaviensem*, qui e rene
 „ *Consulis Hobson* calculum sectione eduxit, æ-
 „ grumque ad integram sanitatem restituit. *Tran-*
 „ *sact. Philos. N. 223.* Unam adhuc aliam *nephro-*
 „ *tomiae* instantiam pari successu ex historia Gal-
 „ licana affert *D. Freind Hist. med. Vol. 2. p. 185.*
 „ Sed, ut cum sagaci *D. Ruty* loquamur (in ele-
 „ ganti suo tractatu de *ductibus urinariis*) ex confi-
 „ deratione partium secundarum est saltem pura
 „ puta *possibilitas*, ut hæc operatio feliciter suc-

Calculus
 grandis
 in rene.

262 *Calculus Renam & Vesicae. CAP. VII.*

cedat, probabilitas vero vix aut ne vix quidem.
Nullum lithontri- Art. 733. Quod ad *lithiasin* attinet, *Galenus*
pticum. scribit nullum remedium suo tempore fuisse in-
 ventum praesidii Calculum Vesicae frangentis,
 sed sola chirurgia seu incisione curari posse.
 Idem alii recentiores, & praestantissimi medici
 libere fatentur. De *lithotomia* operatione, item
 de extractione Calculorum in sexu sequiori vi-
 deatur auctor, qui egregie scripsit; item con-
 sulantur *Celsus*, *Hildanus*, *Douglafs*, *Chesel-*
den, &c.

Plura tamen vulgo cre-
 dita. Art. 734. Sunt tamen remedia nonnulla pluri-
 mum decantata, *lithontriptica* appellata (quam-
 vis in rerum natura talia non dari admodum pro-
 babile sit) inter quae nuper aliquando celebriora
 fuerunt *elixir Daffeanum*, nunc satis vulgatum,
pulvis Rogeri, nihil aliud quam *testae mytulorum*
calcinata, *liquor Tipping*, (apud authorem, p.
 234. descriptus;) cum his & aliis quam pluri-
 mis ejusdem commatis; si mundus vult decipi de-
 cipiatur: interim nulla est de specificis *lithontri-*
pticis haecenus vera fides.

Curatio. Art. 735. Homo sexaginta annos natus solo usu
ol. amygdal. dulc. cum gr. aliquot *bals. Peruv.* in-
 tra dies decem 65. calculos excrevit; mihi in
 frequenti usu est *enema emolliens* seq. ℞. *Rad. al-*
th. ℥j. *herb. malv. parietar. mercurial. ana* Mj. *sem.*
lin. ℥ss. *coq. in q. s. aq. font. ad* ℥viii. *colatur. add.*
zereb. vnel. ov. salut. ℥ss. *ol. lin.* ℥ij. *elect. linitiv.*
 ℥j. *m. f. enema. & fatus sequens.*

℞. *Rad. alth.* ℥iv. *malv. parietar. charesol. flor.*
cham. melilot. ana Miv. *sem. lin.* ℥j. *malv. petrosel-*
lin. ana ℥iiij. *coq. in q. s. aq. font. ad* ℥iiij. *pro fo-*
tu. Quando diuretica indicantur, pulvis sequens
 diureticus cum apozemate subsequente vel cum
 fero lactis vel vin. alb. vel *Rhenan.* exhibitus
 multum valet.

℞. *Sal. prunel.* ℥ss. *cochin. ocul. cancror. test.*
ovor. calcinat. sal. sambucin. vel sal. stipit. fabar.
 ana

CAP. VII. *Calculus Renum & Vesicae.* 263

ana ℥j. croc. opt. gr. xv. ol. junip. gt. vj. m. f. pulv. pro chart. iij.

℥℥. Rad. anonid. fœnic. petroselin. liquirit. ana Lithon-
 ℥ss. sem. alth. malv. cicer. rub. ana ℥ss. sem. 4. fri- triptica
 gid. maj. ℥j. ficuum ping. N. v. sebesten. N. iij. hord. alia de-
 mund. ℥j. gran. alkekeng. N. vij. cog. in aq. plu- cantata.
 vial. q. s. ℥ij. Ex observatione liquet diuretica
 multo melius operari cum illis, qui seipsos ae-
 ri frigido exponunt, & leviter se exercent.

Inter lithontriptica dicta virga aurea multum lau-
 datur a Matthiolo, Dodoneo, &c. item tinctura
 pil. Matth. pulv. milleped. lignum nephriticum,
 sanguis hirci, sp. nitri, &c. Hæc sunt remedia in
 suo genere valde proficua, sed si quis existimet il-
 la revera esse calculum frangentia, sciat illa esse
 mere nugamenta, & res nullius pretii. „ Despe-
 „ randum non est (inquit Boerhaave) de invenien-
 „ do aliquo menstruo contra calculum vesicæ, quod
 „ tamen tam blandum & molle sit, ut non lædat
 „ vesicam, & solvat tamen calculum in vesica.
 „ Habui menstruum, quod solvebat omnia saxa
 „ durissima in manu, manu interim illæsa; con-
 „ ficitur autem hoc ex pane Secalino. Sic illud
 „ menstruum quod distillatur ex ovo nullum in ocu-
 „ lo dolorem jacet, & tamen dissolvit myrrham,
 „ quæ per magnum & validum ignem dissolvi ne-
 „ quit; ideo procul dubio tale quid per industriam
 „ humanam inveniri potest contra calculum.

Listeri sententia.

Art. 736. Calculi inveniuntur sub lingua (1245.) Calculi
 in palpebris, 1001.) in ductibus pituitariis, in in omni-
 cerebro, in hepate, in pulmone, in Vesiculis se- bus fere
 minalibus, in utero, in ventriculo, in intestinis, corporis
 in articulis, tum manuum tum pedum, at multo partibus,
 frequentius in Renibus & Vesica. Calculus est Causa,
 quid vere lapideum a sale lapideque Calcario, &
 interdum a ferro metallo humoribusque quibus-
 libet corporis concretum. Calculi materiam ab

264 *Calculus Renum & Vesicæ*. CAP. VII.
 esculentis & potulentis, quæ hujusmodi salibus
 lapideisque particulis abundant, provenire con-
 stat: si corpus bene se habeat, foras ejiciuntur,
 neque in Renibus aut Vesica retinentur; si Re-
 nes imbecilli fuerint & Vesica labefactetur, in la-
 pidem coire apta sunt. Profecto robur inæquale
 partium est Calculorum præcipua ratio; ita Re-
 num alter Calculos parit altero fano. Nisi vitien-
 tur tonus & vigor Renis expulsivus, Calculi vix
 nascuntur, nec supra modum arenularum concre-
 scit materia lapidea.

*Curatio
 difficilis.*

Art. 737. Calculus *hereditarius* est incurabi-
 lis: facilius est enim uterum a pariendo prohi-
 bere, quam Calculosos Renes Calculis vacuare.
Trochisci alkekengi somnum conciliant & Cal-
 culum pellunt. Dos. ʒj. „ Fœminæ rarius quam
 „ masculi Vesicæ Calculo laborant propter *vi-*
 „ *patientiam ac brevitatem*. Calculi Vesicæ do-
 „ lores licet intolerabiles, in longum tamen tra-
 „ hunt, per multos scilicet annos: fractis de-
 „ mum viribus, & Vesica magnitudine & aspe-
 „ ritate lapidis attrita, mors sequitur, ni urinæ
 „ facta suppressione maturius tollantur ægrotan-
 „ tes.

Etmulleri sententia.

*Calculo-
 rum di-
 versitas.*

Art. 738. Calculus in se non est morbus, sed
 productum morbosum; morbus proprie dicitur *li-*
thiasis, quæ est dispositio Renum vel Vesicæ ad
 Calculum generandum. Triplex ut plurimum est
 diversitas Calculorum, alborum, rubrorum, vel
 flavorum, qui ultimi sunt frequentiores. Calculi
 insigniores interdum in Renibus latent quieti sine
 ullo præternaturali symptomate; cum vero in mo-
 tu sint, varia & gravia symptomata producant,
 & paroxysmum *nephriticum* faciunt.

*Morbi hi-
 storia.*

Art. 739. In principio motus oritur dolor au-
 ctus, modo intensior modo remissior in regione
 lumbari, minus tamen pungens, dolor est grava-
 tivus

rivus & obtusus; ubi vero Calculus movetur ex pelvi in ureteres, tunc dolor lancinans, pungens, & tensivus excitatur, nec ante cessans, quam Calculus ad *Vesicam* descenderit, aut in *Renem* remeaverit. Sub paroxysmo ingruente urinæ sunt paucae, aquosæ, acres tamen & stimulant. In paroxysmo ægri non possunt se erigere, nec corpus incurvare; stupor adest cruris frequenter in primo paroxysmo, sed non ita in assuetis & hoc morbo fractis; testiculus etiam aliquando aliter sursum dolorose spasmò retrahitur, interdum adest tenesmus, & præterea nausea & vomitus, & non raro difficilis respiratio, quasi cingulo constringuntur costæ inferiores, item tormina, colica acerbissima spasmodica ex consensu nervorum. Omnia hæc symptomata in omnibus promiscue haud reperiuntur.

Art. 740. Quoad curam *diuretica* imprimis fortiora in principio fugiantur, dum urgent dolores & spasmi, quoniam malum exasperant, *mitiora* sunt exhibenda cum *opiat*, ut & *alvum laxantia*, & *emulsiones*, *clysteres emollientes*; aut cum *terebinthina*, minori quantitate injiciendi, & diu retinendi; *balnea* usurpari possunt & *inunctiones emollientes* ex *ol. cham. scorpion. junip. petrol. camphor. sem. hyoscyam. opio*, *unguent. dialth. nervin. &c.* Decoctum *florum cham.* singulariter excellit in paroxysmo *nephritico*, item *sal. volat. succin. persicaria* & *semen dauci lithonriptica* audiunt, item *millepedes*, & *finus columbinus* bene præparatus, & quod præstat *sal ejus volatile*.

Art. 741. Inest plerumque *nucleus lapideus* in Calculo *Vesicæ*; qui in initio ex *Renibus* descendit, & exinde augmentum lamellatim acquirens. Sentiunt imprimis ægri obstaculum, quod se opponit meatui urinario inter meiendum ita ut interdum *urina* in medio sui cursu supprimatur, unde assiduum meiendi desiderium, summa difficultas, & *urinæ stillicidium*, anus quoque in con-

Curat

Calculi
vesicae hi-
storia &
signa.

266 *Calculus Renum & Vesicæ. CAP.VII.*
 sensum trahitur, & tenesmo affligitur, quod est
 unum ex potissimis signis; obtusus est dolor in
 Vesicæ collo, &, si grandior sit Calculus, pon-
 dus in perinæo, dolor & pruritus in glande pe-
 nis, & frequens erectio. Calculus aliquando *Ve-*
sicæ adnascitur, & tanquam in capsula contine-
 tur, quo in casu difficillimus est cognitu. In ma-
 lo diuturno materia mucilaginosæ, necnon luto-
 sæ ac argillo sæ cum urina excernitur, quæ tan-
 quam productum morbi agnoscenda est ex nutri-
 mento lætæ Vesicæ.

Curatio. Art. 742. Cura eadem fere est, ac calculi re-
nis diffi- num; prodest aq. vel decoctum persicariæ, betulæ,
cultas. dauci, &c. urina hirci & tauri, millepedes in vi-
 no Rhenan. longo usu mirabilia præstant; pro usu
 externo petroleum, ol. scorpion. &c. ut & enema
 sequens, ℥. Ol. lin. amygd. dulc. ana ℥iv. scor-
 pion. ℥j. cereb. ℥ss. m. f. enema. (Si calculus sit
 prægrandior curam non recipit nisi ex sectione.)

Baglivii sententia.

Signum Art. 743. In calculo vesicæ adest dolor in glan-
pathogno- de penis, pruritus, & irritatio continua, quod
monicum. inter pathognomonica ac certissima calculi vesicæ
 signa est. „ Sectione defunctorum plane constat
Calculi „ calculos interdum per longum tempus silere si-
in rene „ ne insigni dolore; immo quandoque per an-
interdum „ nos aliquot non est dubitandum. Heurnius re-
diu sunt „ fert se reperiisse in uno rene defuncti calculos
sine dolo- „ 80. & in altero 70. nihilominus homo dum vi-
re. „ xit dolores nephriticos neutiquam sentiebat.
 „ Antonius Pozzis de calculis oculis in reni-
 „ bus ait se invenisse in hominis alterutro re-
 „ ne calculum non minus quam sex uncias pen-
 „ dentem sine ullo tamen calculoso affectu. Et
 „ in quotidiana praxi observamus calculos in-
 „ genti mole excerni diutius in renibus prius
 „ commoratos, quam ad istud incrementum as-
 „ surgere potuissent; excretos tamen nullo præ-
 „ cunte

„ eunte dolore excepto in exclusionis paroxysmo vi-
 „ dimus.

Art. 744. Existente calculo in renibus, motu, *Cura ra-*
 quem facit descendendo per ureteres, irritatis, *tionalis*,
 crispatisque vicinarum partium fibris, sæcum &
 urinæ secretiones sistuntur: tota igitur curatio di-
 rigenda est ac impendenda in tollenda morbosa ir-
 ritatione & crispatura renum per *balnea, oleosa,*
anodyna, & laxantia remedia; nam ea ablata im-
 peditæ tollantur liquidorum secretiones. Quin-
 imo sæpe observavimus, quod si calculus post x.
 vel xv. dies non descenderit ad vesicam, impru-
 denti *diureticorum* usu & nimia remedium præ-
 scriptione, ut vulgo faciunt medici, aucta in do-
 lente renum loco majori oscillatione magis ma-
 gisque figitur ibidem calculus, & multo difficilius
 educitur, quo in casu, crede mihi, lector, uni-
 cum remedium est *abstinere a remediis,* nam sola
 quiete calculus tandem profiliet.

Deckersii sententia.

Art. 745. Nitrum pulverizatum & calculo af-
 fusum ignique moderato impositum ipsum consu-
 mit, primo quidem in viscidam mutat materiam, *Nitrum*
 dein aquosam; ast, proh dolor! ab externis ad *neque spi-*
 interna non valet consequentia; saltem expecta- *ritus il-*
 tioni non satisfacit *verus nitri spiritus.* In omni- *lius cal-*
 moda urinæ suppressione *testæ ovorum calcinata* *culum*
 ad ℥ij. vel ℥j. assumptæ omnia reliqua medica- *frangit.*
 menta præcedunt. *Cochinel* in vino *Rhenano* ad
 ℥j. assumpt. est mite & suave medicamentum, sed
 magnæ efficacix. Omnibus commendamus *spir.*
sal. armoniaci tanquam specificum *cum vino Rhe-*
nan. spirituve diuretico ad præservationem, ut
 & curationem ipsam. „ Curationis scopus prima- *Alia re-*
 „ rius est *dolorem lenire,* alter *vias reddere patu-* *media.*
 „ *las* tum urinæ tum sæcum. Optabilius est, ut
natura expellat calculum, quam *medicus.*

Farrago sententiarum.

*Arenula
sine cal-
culo.*

Art. 746. Arenas multi mingunt, & tamen non sunt calculosi; quoniam illæ non coguntur in lapidem, nisi viscido aliquo & crudo humore superveniente, ad quod itidem & tempore opus est. *Hollerius.* Symptoma illud scorbuticum mendaci specie calculum præ se ferens (de quo *Draviscius*) non solum scorbuticis, sed hypocondriacis familiare est. Tartarus sub specie sabuli rutilantis ut plurimum in urinæ subsidentia se prodit, quandoque in atomis adeo subtiliter divisus, ut visum fere effugiat, lateribus vero matulæ firmiter adherere solet; tormina *nephriticis* æmula concitat, & his comitem se adjungit stranguria fere continua. Parum levaminis a calidioribus diureticis expectandum est, malum enim exasperant. *Spiritus salis communis* strenuum hic se præstat averruncum, ut & *spiritus lumbricorum terrestrium*, *essentia item nephritica e ligno nephritico cum spiritu salis extracta.* vid. *Art. 906.*

*Observa-
tio D. Cy-
priani.*

Art. 747. D. Cyprianus lithotomus celeberrimus inter 1400. quibus operationem celebravit, oinopolas quam plures, se ne unum quidem *zythopolam* calculosum invenit. *Cerevisiam blandam ac mitem*, & quo recentiore eo meliorem, omnibus calculosis in potum ordinarium commendavit. *Catherwood.*

*Virtus ol.
lini, &c.*

Art. 748. Oleum *seminum lini* intus sumptum per aliquot septimanas calculos fere indolenter ejicit. *Hamilton.* (Multum etiam laudatur infusum *seminum lini* more Theæ diutius epotum.) *Oleum sem. sinap. per expressionem* (inquit *Boerhaave*) ut maximum remedium commendatur in *nephritide*, & *calculo vesicae & renum.*

*Aqua
persica-
ria.*

Art. 749. Aq. *persicaria* valde commendatur a *D. Boyle.* Julap. sequente quandoque in praxi usus sum; ʒi. Aq. *persicar. vin. Rhenan. ana* ʒvj. sp. *carmin. sylv. ʒij. test. ovar. preparat. ʒij. syr. de alb.*

*Semina
pium.*

CAP.VII. *Calculus Renum & Vesicæ.* 269

alb. Ziſſ. m. fofus five balneum tepidum, emol-
liens & laxans ad calculum ureteribus hærentem
movendum & expediendum maximum adjumen-
tum præſtat; uſum ejus ſuo calculo ipſe *Hippocra-*
tes comprobavit, lib. de affect. intern. ſec. 15. Ex-
perientia enim evincitur a blando ac leni medi-
camento in *femicupio* ſedenti exhibito plus auxilii
provenire quam ex mille lithontripticis vana o-
ſtentatione propinatis. Vires ſupereminentes *A-*
quarum Bristoliensium circa medium ſuperioris ſæ-
culi innotuiſſe ex memorabilibus D. *Maplet. M.*
D. litteris *Decano Vvellenſi* anno 1665. datis ſa-
tis liquet. „ Ad *Rupem Vincentianam* tibi con-
„ fugiendum eſſe arbitror, e qua proſiliunt aquæ
„ renibus & veſicæ calculoſis ſive exulceratis ſuc-
„ currere, nec non ſanguinis maſſam contempe-
„ rare, & ab illa ſegredandam urinam lenire &
„ edulcorare aptæ natæ. „ *Aq. flor. ſpin. alb.* in
frequenti uſu fuit apud D. *Radcliff*, unde forſan
aqua nephritica Pharm. Londinenſ. Vires huiusce
remedii a multitudine inſectorum verno tempore
iſtos flores incolentium oriri videntur.

*Aqua
Bristo-
liens.*

Art. 750. Ad prophylaxin huius affectus magna
habenda eſt ratio ventriculi; quoniam ex illius
cruditatibus materia generandis calculis ſuppedi-
tatur: ideoque poſt debitas evacuationes reme-
diis appropriatis roborandus eſt ventriculus; &
frequenter potandæ ſunt *aquæ minerales acidulæ
ac ſulphuræ*; potus ordinarius ſit vinum tenue
cum decocto *rad. eringii marini*, quod commen-
datur a *Cratone*.

*Prophyla-
xis.*

Art. 751. Præter jam dicta, ſunt & alia non-
nulla remedia, quæ pro ſymptomatum horum af-
fectuum diverſitate ſaltem opem aliqualem ægris
afferre poſſunt. *Aqua omnium florum, cereviſia
de dauco, decoctum nephriticum, emulſio cum in-
fuſ. vel decoct. fol. theæ facta, enema e quatuor
oleis, enema terebinth. miſtura baſamica nephri-
tica, nitrum ſaturniſatum, pil. Matth. pil. teſtac.*

*Remedia
varia.*

ſp. ju-

270 *Ischuria Renalis & Vesicalis.* CAP. VII.
sp. juniperi, sp. nitri dulcis, semicupium Hilda-
ni, &c.

ISCHURIA RENALIS & Vesicalis.

Ettmulleri sententia.

Ischuria
quid.

Causa &
sympto-
mata.

Art. 752. Ischuria & urinæ suppressio totalis differunt saltem gradu; quandoque in ipso sanguine hæret causa, sed frequentius accidit ob renum vel vesicæ vitium: ob prius quando nulla urina sit in vesica, nullus tumor circa regionem pubis, nulla gravitas perinæi, ubi immisso cathetere urina nulla extrahi possit. Causæ sunt vel calculi vel renum atonia, symptomata sunt angustia præcordiorum, & anxietates, aliquando sudor foetidus & urinosus, torpor sensuum, vomitus, &c. Fere ad 10^{um} vel 11^{um} diem suppressi potest ante mortem, aliquando die 14. moriuntur, raro ad 20^{um} vivunt; si tamen adsit sudor copiosus, interdum diutius supervivunt; quæ ab atonia, vel resolutione renum fit, fere semper lethalis evadit.

Curatio.

Art. 753. In hoc affectu laudantur succus rad. raphan. & succus limonum (sp. cochlear. vel succ. ejusdem) item succus parietariæ in antiquis parietibus nascentis, præ omnibus sal. succini; si malum sit spasmodicum cinnab. animon. millepedes, cantharides in substantia & tinctura, infusum fimi equini in vin. Rhenan. egregium remedium, ut etiam stercoris columbini. Pro usu externo linimentum sequens, ℞. Unguent. dialth. ol. scorpi. ana ℥ss. petrol. ℥ij. tereb. (junip. ana) gt. xxx. m. f. liniment. pro regione lumborum.

Ischuria
vesicalis.

Art. 754. Ischuria vesicalis a vitio vesicæ provenit, & a variis causis pendet; ut plurimum die 11. necat; pessimum est signum, quando nullum sentiant dolorem.

Curatio.

Art. 755. Si adsint causæ impediens transitum urinæ, hæ sunt imprimis removendæ; si casus sit para-

CAP. VII. *Ischuria Renalis & Vesicalis.* 271
paralyticus, usurpanda sunt nervina interne, &
externe, laudatur oleum succini, clysteres terebin-
th. cataplasma ex parietaria cepis sub cineribus coct.
& ol. scorpion. convenit etiam semicupium ex e-
mollientibus & nervinis exhibendo paulo ante in-
cesum blanda diuretica. Immersio subitanea pe-
dum ægri in aqua frigida urinam provocat.

Fulleri sententia.

Art. 756. Suppressio urinæ totalis, quæ fit, non
a renibus, ductibusve urinariis lapide, sabulo, *Ischuria*
mucove obstructis; sed a sanguine ipso confuso, *ex san-*
nimis stricto, & adeo obserato, ut laticem aquo- *guinis dis-*
sum intimius permixtum e sinu suo ægre demit- *crasia.*
tat: cujusmodi casus retulerunt *Riverius, Villi-*
sus, Sylvius, atque inter medicinam faciendam
ipsemet etiam aliquoties observavi; exindeque
eum agnovi, quod nullus dolor vel lumborum vel *Ejusdema*
pubis præcesserat; & vesica (teste cathetere) uri- *curatio.*
næ omnino vacua fuisset: hæcce inquam notabi-
lis & (nisi tempestive & rite tractetur) lethalis
urinæ suppressio curatur (D. *Baynard.* monstrante
viam) per spiritum vitrioli nitri in vehiculo i-
doneo liberaliter propinatum: atque eo certius,
ut opinor, si venæsectio præmittatur. Hujusce in-
stantias apud *Philos. Transact. N. 215.* lectu &
observatu dignissimas videre licet. „ Sæpius in pra- *Senes*
„ xi experimur) inquit *Vvaldschmidius*), quod *huic mor-*
„ senes urinæ suppressione corripiantur, quando- *bo sunt*
„ que cum alio graviore morbo, quandoque si- *proclives.*
„ ne eo, & talis urinæ suppressio plerumque fo-
„ let esse lethalis; oritur enim a deficiente secre-
„ tione tum spirituum in cerebro, tum ferment-
„ torum in visceribus, ut & feri in renibus, ut
„ recte totalem viscerum obstructionem & lym-
„ phæ coagulationem hic accusamus: si enim ef-
„ fet a calculo, tum dolor lumborum adesset, &
„ reliqua calculi symptomata.

Far-

Farrago sententiarum.

Diem xvij. non supervi- vunt. Art. 757. Nullus hoc morbo laborans supervi- xit diem xvij. uti hoc in mea praxi observavi. *Greenfiteld.*

Reme- dium sin- gulare. Art. 758. In ancipiti casu & moribundo ex *ischu- ria* plurium dierum, aliis medicis dimissis, homi- nem sic restitui, ℥. Succ. limon. recens express. ℥vj. succ. cochlear. hortens. ℥iv. hepatic. plantag. ana ℥ij. syr. violar. ℥ij. m. hujus ℥iv. tertiis qui- busque horis siccavit, & postridie urinam copio- se reddidit. *Lister.*

Pulvis apum. Art. 759. Apes siccatae in pulverem redactae pro- pinentur vino albo, urinam paulo post provocant, N. iij. sufficiunt ut plurimum. In seipso Ischuria laborante sæpius expertus est *Hiberniae primarius Armaghanus. Mayerne.*

Remedia alia. Art. 760. Bals. capiv. ad ℥j. vel ultra, decoct. incrassans, haust. diuretic. acid. & pil. diuret. Ful- leri usui esse possunt, item expressio diuretic. seq. *Vvillisii.* ℥. Milleped. viv. tinct. sal. tart. ana ℥ij. contunde & fortiter exprime Dos. gt. xl. vel l.

STRANGURIA.

Ettmulleri sententia.

Strangu- ria quid. Art. 761. Stranguria, Latinis urinæ stillicidium, est quando urina guttatim excernitur cum acerbis dolore & continua stimulatione ex acore urinæ; ulcus vesicæ interdum pedetentim sequitur.

Curatio. Art. 762. Exhibendum est emeticum cujus vires magnæ sunt in affectibus urinariis, item laxantia cum mercurio dulci, rad. liquiritiæ cum fol. malv. in jure pulli, decoctum cort. aurant. opiata. Pro euporisto decoctum raparum remedium sine pari, decoctum sem. cannab. ol. amygd. dulc. syr. de al- bh.) succus cancrorum fluviat. decoctum bacc. alke- kengi cum passulis. Conveniunt clysteres emollien- tes,

CAP.VIII. *Dysuria, Urinæ Incontinentia.* 273
tes, injectiones in vesicam ex lacte cum ol. amygd.
duls. &c. Thermae etiam profunt.

D Y S U R I A.

Ettmulleri sententia.

Art. 763. Dysuria est excretio urinæ cum co- *Dysuria*
natu & dolore, & ardoris sensu; ut plurimum *quid.*
fit, ab abrasione mucis naturalis ductuum urina-
riorum, quos isto munimine orbatos urinæ a-
crimonia irritat, & vehementer lædit; quan-
doque causatur ab excoriatione vel exulceratione
vesicæ colli vel urethræ; excernitur materia cras-
sa vel mucilaginosæ, nutrimentum partium læsa-
rum; malum est perquam molestum, non tamen
per se lethale, interdum diuturnum, unde peri-
culum est, ne exulceretur tandem vesica, aut
urinæ incontinentia superveniat.

Art. 764. Remedia ad stranguriam hic conve- *Remedia*
niunt, ut *ol. amygd. duls. decoct. malvæ, terebin-* *nonnulla*
thinata & balsamica, antimon. diaphor. cum te-
reb. in forma pil. clysteres emollientes, injectiones,
de quibus vide locum, p. 738. „ Sequens mucila-
go valde commendatur, ℞. *Gum. Arabic. ℥ij.*
tragacanth. ℥j. aq. cinnam. ten. ℥x. syr. de al-
th. ℥ij. f. Mucilago cochleatim sumenda.

U R I N Æ I N C O N T I N E N T I A.

Ettmulleri sententia.

Art. 765. Involuntarii urinæ profluvii causa est *Inconti-*
deficiens sphincteris vesicæ constrictio a paraly- *nencia u-*
si, contusione, diuturniori mora in aqua frigida, *rina cau-*
partu difficili quandoque in ultimis gestationis *sa.*
mensibus. (*Lectimingi* plerumque sunt vel infan-
tes vel senes sub cura medica haud cadentes.)
Affectus est difficilis curatu, qui vigilantibus con-
tingit; in senibus immedicabilis, nisi interdum
iis *thermae* succurrunt, in morbis acutis male omi-
natur.

*Curatio
difficilis.*

Art. 766. Pro scopo curativo in genere conveniunt *astringentia*, *nervina* & *antiparalytica*; speciatim decoctum e *lignis sudoriferis*, *calamintha* & *mentha*, *pulv. mastich. thus*, *gum. Arab. castor.* &c. laudantur; specificum audit *guttur gallitostum* ad ℥j. in vino rub. propinatum, item *pulv. tunic. stomach. gallin. pudendum seu vulva suis* quocunque modo præparat. in vigilantium ac dormientium affectibus singulare experimentum, *mures exsiccati vel in butyro elixati.*

M I C T U S C R U E N T U S.

Ettmulleri sententia.

*Mictus
cruenti
causa va-
ria.*

Art. 767. Sanguis, qui tingit urinam, frequenter a renibus effluit, interdum ex ureteribus, interdum ex vesica, aut ex arteriolis penis; est hæmorrhagiæ species, præcedere solet dolor gravativus & tensivus in loco affecto; aliquando est *crizicus*; a diureticis fortioribus interdum causatur, item a nimia venere, a contusione, vel casu ab alto, equitatione, saltatione, &c. *urina sanguinolenta* semper est opaca, turbida, & crassiuscula plus minus, prout plus minus sanguinis est permistum, ex opaco nigrescit, ita ut linteum immersum suo rubore sanguineo inficiat; si aliquandiu steterit, crassamentum deponere solet nigrescens sanguinem grumosum exacte referens.

*Indica-
tiones cu-
rative.*

Art. 768. In genere tollenda est sanguinis acrimonia: remedia ad *hamoptysin* dicata conducunt; *venæsectio* interdum locum habet; *cathartica* non conveniunt excepto *rhabarbato*; semen *hyoscyami*, sicut in aliis hæmorrhagiis, vim singularem obtinet.

Mayernii sententia.

*Intentio-
nes.*

Art. 769. In mictu cruento intentiones sunt, ut humorum acrimonia, si adsit, obtundatur, aut impetus minuatur; inflammatio si adsit, tollatur, & vasa consolidentur & constringantur.

Art.

Art. 770. Vidi quendam, annorum circiter 40. *Curatio singularis* qui a retentricis renum imbecillitate & vasorum laxitate tantum cruoris fundebat cum urina, ut corpus macilentum, exangue & pene tabidum evaserit, pulsum habens languidum ac febrilem. Eo usque res devenerat, ut refrigerata urina, in-concoctus sanguis in ea concrederet albicans, & gelatinæ potius quam sanguinis affinis. Vano labore assumptis & adhibitis omnibus remediis, tandem intra tres quatuorve dies convaluit, hausto quotidie mane lacte vaccini recens mulcto supra ramum menthæ rubræ, eoque calente ex animali dulcorato satis syrupo cydon. & cinnamoni. plures annos supervixit.

Farrago sententiarum.

Art. 771. Interdum aucto corporis motu cruentum lotium absque labe renis vel calculi præsentis suspitione potest accidere. *Boerhaave.*

Art. 772. Lac ovillum maxime laudatur a Foresto; sæpe, inquit, sanguinis mictum solo lacte ovillo, nempe sumendo lactis ℥iv. & bol. armen. ver. ʒj. curavi. Idem etiam laudant Hollerius & Duretus ex Hippocr. & Avicenna.

Art. 773. Constat mictionem cruentam statis periodis recurrentem ob hæmorrhoides suppressas quibusdam sine sanitatis detrimento accidere: hinc verum est illud Hippocr. quando ait, quod sanguinem mingere raro quidem, & sine febre ac dolore nihil mali significet, sed lassitudinum solutio fiat.

Art. 774. Remedia ad hunc affectum curandum a capite de hæmorrhagia petenda sunt. Stercus porcinum apud rusticos est remedium certissimum pro jumentis sanguinem mingentibus. Radix symphyre. in lacte chalybeato coct. quibusdam profuit. Ele-ctuarium Boyleanum, decoct. catechu, decoct. in-crassans, haustus japonicus, nitrum saturnisatum, trochisci Gordonii, &c.

Quando.
q; accidit
nullo exi-
stente cal-
culo.
Lac ovil-
lum.

Sanis
quandoq;
accidit.

Remedia
varia.

D E U R I N I S.

Inter legendum & ex observatione.

Urinarum
compositio &
diversitas

Art. 775. Urina præcipue ex aqua, sale, & terra conflatur; & quo plus salis respectu aquæ in se continet, eo rubicundior est; & quo minus, eo pallidior; & quo plus terræ, eo magis contentis saturatur, & contra; si itaque terra & sale multo abundet, dicitur urina crassa, si parvo, tenuis: atque hinc quidem oriuntur maximæ urinarum diversitates, ex quibus deducuntur judicia, scilicet, a *consistentia, colore, & contentis*; adeo ut quicquid de urina aliqua particulari pronunciari potest, huc tantum redit; scilicet hanc urinam plurimum salis continere & terræ parum; secundam multo salis & terræ abundare, tertiam ex modico sale & terra & plurima aqua conflare, & sic de reliquis.

Colores
varii.
Urina alba.

Art. 776. Colores urinarum sunt albus, fulvus, flavus, rubeus & niger. *Albus* est vel *tenuis lymphida & aquosa*, vel *crassior & subalbicans*, quæ juri carniū semicoctarum assimilatur; & hujusmodi lotium plerumque reddunt pueri, dum febricitant, & etiam ii, quorum viscera lumbricis scatent, & non solum hi, sed etiam pueri sæpissime, qui optima valetudine fruuntur, adulti quoque nonnunquam, ut taceamus fluore albo vel gonorrhœa laborantes, in apparatu variolarum, ut ipse sæpissime observavi, excernunt *albicantem* urinam. *Alba remissior*, ut *lacteæ*, & *glauca*, incipientibus, & incrementibus febribus reddita, copiam materiæ putridæ, naturæque laborem demonstrat; quod si autem diutius fertur, longi frigidi-que indicium morbi præbet.

Tenuis &
aquosa.

Art. 777. Urina *tenuis & aquosa* in plurimis morbis occurrit; talis redditur in affectibus ventriculi, & indigestiones ac cruditates plerumque denotat; item in chlorosi, cachexia, hypochondria-

driaticis & hysteriis affectibus ; hujusmodi urina tenuis & aquosa copiosa quantitate non raro est signum animi perturbationum , & sæpissime paroxysmorum hysteriis vel affectuum quorundam spasmodicorum prodromus , unde conjicere licet hos affectus a salibus urinosis provenire , vel saltem iisdem foveri . Tenuis urina quoque conspicitur in diabete , hydrope , aliquando in apparatu variolarum , & frequentius in declinatione . In nephriticis paulo ante paroxysmum , denique a computatione aquarum mineralium aliorumque liquorum tenuium , spirituosorum , diureticorum , &c. In febribus male ominatur ; a turbida & crassa in tenuem & aquosam mutata est signum imminantis phrenitidis , scilicet , per materiæ febrilis in cerebrum metathesin .

Art. 778. Fulvus sive citrinus color in urina statum naturalem ut plurimum denotat . Et quoad quantitatem urina debet esse in proportionem aliquanto minori (forsitan subtriplo) liquidorum assumptorum ; ab hac norma vero non raro defleat , nunc superabundans , nunc deficiens . *Citrinus.*

Art. 779. Urinæ flava sive aurea duo sunt gradus , viz. *flammea* , quæ in febribus tertianis , ut etiam in variolosis , & non raro in benevalentibus cernitur : Et *crocea* , quæ ictericis , scorbuticis , hypochondriacis , ut etiam iis , qui rhabarb. crocum , folia sennæ , &c. comederunt plerumque cernitur . *Flava sive aurea.*

Art. 780. Urina rubicunda est signum febricitantium , sed non proprium ; nam in scorbuto diuturno urina tam intense rubescit , ut non magis in febre ardente , in arthritide quoque urinæ intensa rubedine saturantur . *Rubicunda.*

Art. 781. Urina viridis ac nigricans est signum plerumque morbi cujusdam virulenti aut venenati , aliquando in febribus quartanis conspicitur , ut etiam in puerperis , & iis , quæ menses habent obstructos (teste Galeno) , in calculosis etiam post calculum foras eliminatum , in melancholicis pur- *Viridis ac nigricans.*

gatio non operans urinam facit nigram; cassia & alia quædam pharmaca intus sumpta lotium atrum reddunt.

*Urinarum
contenta.*

Art. 782. Contenta urinarum respectu locorum in matula tria nomina sortiuntur, viz. in summitate *nubeculam*, in media *eneorema*, in ima parte *hypostasim* vocamus.

Art. 783. Nubecula in urina in morbis tam chronicis quam acutis est signum redeuntis in stomachum fermenti, & recuperatæ plus minus digestionis.

*Bullæ &
spuma.*

Art. 784. In summitate urinae interdum conspiciuntur *bullæ* & *spuma*; talem urinam vidi in mania laborante, in qua spuma & bullæ per integram nycthemeram manserunt, & eadem urina hypostasim valde nigricantem deponebat. *Cremor innatans* in urina phthisicorum plerumque cernitur, sed frequentius in hypochondriacorum. Urina in summitate *caudam* pavonis repræsentans ut plurimum est signum scorbuti. *Pinguedo* aliqualis & *guttula* quædam *oleosa* frequenter apparent in urinis febre ardente, colliquativa, aut etiam hectica, ulceribus tenum, & similibus afflictorum.

Eneorema.

Art. 785. *Eneorema* in praxi quandoque occurrit, sed nihil peculiare, quod scio, indicat; nisi quod in febribus plenioris concoctionis appropinquantis indicium sit.

*Sedimenta
varia.*

Art. 786. *Hypostases* sive *sedimenta* in Urinis sunt vel alba, vel nigra, vel rubra, aut saltem his vicina: *album sedimentum* in benevalentibus occurrit, *nigrum* in Urinis nigris, de quibus antea. *Rubrum* & *crassum* sedimentum ad instar pulveris laterum in febribus intermittentibus, & remittentibus, & etiam in scorbuto, & colica frequentissime occurrit. Quibus febricitantibus, in Urinis subsidentia sunt crassiori farinae similes, longam infirmitatem significant (inquit Hippocrates in Aphorif.)

*Contenta
præter
alia.*

Art. 787. Sunt & alia in Urinis contenta, quæ præ-

præternaturalia & quasi accidentalia dicta sunt ; talia sunt arenæ , calculi , pus , sedimenta furfuracea , sanguis , &c. *Arenæ* in scorbuticis ; *carunculae* & sedimenta *furfuracea* in Urinis calculo laborantium , necnon in vesica & renum ulceribus excernuntur *furfuracea* ; sedimenta aliquando etiam in morbis cutaneis , ut pruritu , scabie , &c. occurrunt . Materia *purulenta* non tantum a renibus , verum aliquando a vesica & meatu Urinario ulcere affectis in lotio deponitur ; quandoque e vasis & locis genitalibus sanies , semen corruptum , & fluor albus Urinis suffunduntur , & subsidentias purulentas efformant ; postremo sedimenta purulenta in Urinis peripneumonia aut empyemate laborantium reperiuntur , quæ etiam morbum solvunt . Urina *cruenta* non tantum in calculosis occurrit , sed etiam in plerisque scorbuticis multo cum levamine modo limites non excedat , nec defuerunt quædam fœminæ , quæ sua catamenia per vias urinarias inter lotium per multos annos innocue emisserunt , huiusmodi historiam habemus apud *Hollerum* , &c.

Art. 788. Post omnia vero quotquot dicta fuerunt (ut proverbiali utar dicto) , *urina est meretrix & mendax* ; nihilominus urinarum inspectio in praxi medica est usus eximii , modo cum reliquis symptomatis diligenter pensitatis conjungatur , tum ad judicandum ægritudines earumque statum , tum etiam ad curandos morbos . Ideoque periti & fidelis est medici operam dare , ut , quod artis est de Urinis , haud temere negligat , neque artis suæ limites transiliat .

Corollarium.

C A P. V I I I.

Sive Fasciculus Morborum octavus.

C O R P U L E N T I A N I M I A.

*Etmulleri sententia.**Corpulentia sive obesitas.*

Art. 789.

Corpulentia nimia sive obesitas nimia, est, quando corpus totum tam venter quam artus in tantum augentur, ut actiones, imprimis motus ac respiratio, aut omnino impediuntur, aut insigniter vitientur. *Sennertus* refert mulierem 450lb. item virum 600lb. pendentem. Prostant exempla apud *Schenckium* corpulentorum obesorum suffocatorum. „ Obesitas nimia corpus reddit variis morbis obnoxium, speciatim, apoplexiæ, asthmati, hæmorrhoidibus, calculo, ulceribus crurum, hydropi, &c.

Difficile tollitur.

Art. 790. Ad obesitatem tollendam non datur præstantius remedium quam *acetum scilliticum* jeuno stomacho haustum. Semen *fraxini* seu *lingue avis* ad ℥j. mane in haust. vini propinatum insigniter commendatur ad evacuandam urinam, ratione cujus & hydropicos curat & crassos emaciat.

Valde obesi quandoque subito moriuntur.

Art. 791. „ *Borellus* commendat masticationem „ *fol. tabaci*, sed in omnibus minus convenit, ne „ ad *tabem* disponat. Qui natura sunt valde crassi „ si magis subito moriuntur, quam graciles; „ *Hippocratis Aphorism.*

C A C H E X I A.

Cachexia causa.

Art. 792. „ Cachexia ita dicitur a corporis malo habitu; nascitur plerumque ex intemperan-

„ tia

„tia ægrotantis, vel alicujus morbi prægressi ma-
 „la curatione; a tumore scirrholo jecoris vel
 „lienis, vel a fluxu hæmorrhoidum nimis longo
 „& profuso, vel aliis hæmorrhagiis; ex febribus
 „continuis diuturnis, vel intermittentibus male
 „curatis; ex crapula, vel nimia spirituosorum
 „liquorum ingurgitatione; ex chlorosi, cata-
 „meniorum obstructione vel fluxu nimio; & ex
 „innumeris aliis causis.

Art. 793. „Signa diagnostica sunt pallor subal-
 „bidus, aliquando etiam plumbeus color; debi-
 „litas ac piger corporis motus cum inflatione
 „aliquali, in quibusdam ventris fluor cum feбри-
 „cula vesperi recurrente, pulsus creber ac densus
 „cibi fastidium, & vini magis appetentia, urina
 „biliosa, interdum vero rubicundissima, frequen-
 „ter autem cruda & pallida.

Signa
diagnosti-
ca.

Ettmulleri sententia.

Art. 794. Cachexia est affectus in quo natus *Cachexia*
 & floridus cutis color, ac imprimis faciei nitor, *descriptio*
 perit, mutaturque in pallidum, lividum, luteum,
 virescentem, intense rubicundum, &c. frequen-
 ter cum corporis habitu subtumido, lassitudine,
 &c. adest sæpe febris lenta, ægro vix sensibilis.

Art. 795. Principium curæ a vomitu faciendum *Curatio-*
 est: attamen ante vomitorium consultum erit, ut *nis me-*
digestiva salina præmittantur cruditates solventia, *thodus.*
 ut crem. tartar. tartarum vitriolatum, sal digesti-
 vum hypochondriacum, dos. a ℥j. ad ℥ss. bis in die;
 sal. absynth. tinctura sal. tartar. &c. item pulveres
 absorbentes dicti, antimon. diaphoret. antihectic.
 Poterii; & tunc propinandum est vomitorium, vel,
 si minus conveniat, catharticum; deinde his ita
 præmissis fit accessus ad *martialia*.

Art. 796. „In tota republica medica vix datur *Reme-*
 „præstantius remedium quam *mistura ecphracti-* *dium sin-*
 „*ca Fulleri.* *gulare.*

LEUCOPHLEGMATIA
& Anasarca.*Ettmulleri sententia.**Leucophle-
gmata
unde.**Art. 797.* „ Quoties in toto habitu pinguedinis
„ subcutaneæ lymphæ stagnat, vel effunditur, hy-
„ drops oritur ἀνά σάρβα, ἀπὸ σάρκα, λευκοφλεγ-
ματία, qui & circa abdomen & circa scrotum. „*Eiusdem
signa.**Boerhaave.* Signa Leucophlegmatiae sunt totius
corporis tumor albus, mollis, laxus, revera œ-
dematosus in pedibus ac cruribus potissimum &
manibus, bibendi desiderium, urinæ tenues,
albæ, &c. „ Incipiente cachexia (inquit *Lom-
„ mius*) vitatur cibi concoctio, incolumi et-
„ iam appetentia; progressu vero temporis hæc
„ quoque offenditur; spiratio debilis ac rara, al-
„ vus varia ac inæqualis est; atque huiusmodi
„ cachexia cruda seu pituitosa nominatur, quæ
„ hydropis speciem antecedit, venturamque præ-
„ nunciat, quam λευκοφλεγματίαν *Græci* nomina-
„ verunt.*Curatio.**Art. 798.* Præter purgantia, & martialia, &c.
in cura cachexiæ superius laudata, hic conveniunt
sudorifera & diuretica, speciatim decoctum ligni
guaiac. &c. Lixivium ex ciner. absynth. genist. &c.
post martialia, amara (& stomachica utramque
faciunt paginam. In *Anasarca* conveniunt folia
virid. bardanæ plantis pedum & juncturis appli-
cata: nam mirum est quantam fuliginem extra-
hant cum ægrorum levamine.*Vvillisi sententia.**Anasar-
ca.**Art. 799.* Anasarca est totius corporis exte-
ris, aut quorundam ejus partium, tumor albus,
mollis, tactui cedens, & foveam a compressionem
reliquens.*Curatio.**Art. 800.* In curanda anasarca lixivialia cæte-
ris diureticis longe præstant. ℞. Ciner. genist. ad
albe-

CAP. VIII. *albedinem calcinat. & cribrat. ℥iv. ponantur in i-
gena vitrea cum vin. alb. ℥ij. digerantur claufe &
calide per hor. iij. vel iv. dein coletur vinum dof.
coch. vj. vel viij. bis in die. 2℥. Ciner. genift. alb.
& mundat. ℥ij. rafur. lign. faffafr. ℥iij. rad. ga-
lang. ℥j. bacc. junip. fem. dauc. ana ℥iſſ. f. ſaccul. pro
cong. iv. cereviſ. poſt 7. vel 8. dies hauriri inci-
piatur. Chalybeata in hoc morbo ſæpenumero e-
gregie profunt, & aliis præſtant præparata, quæ
ſulphure non ſpoliantur; 2℥. Rafur. lign. ſanct.
faffafr. ana ℥iv. rad. irid. florent. calam. aromat.
galang. minor. enul. campan. ana ℥iſſ. bacc. junip.
laur. ana ℥ij. fem. anis. carui, ſænic. dulc. corian-
dr. aneth. ana ℥iſſ. piper. long. cubeb. ana ℥iſſ.
caryoph. N. M. zinzib. ana ℥iſſ. piper. Jamaic. ℥ij.
fol. ſicc. ſalv. ſcordon. calamenth. agrimon. ana m℥.
liquirit. ℥iij. inciſ. & contuſ. coq. in aq. font. cong.
iv. ad mediet. colatura ſervetur in lagenis vitreis
ad uſum: hujus potu conſtanti plures Anaſarca
fere deplorata laborantes convaluiſſe novi, p. 254.
Medicamentum ſequens fuit præſcriptum Rad-
cliffeanum; 2℥. Cort. interior. ſambuci m℥. ſum-
mit. abſynth. Roman. m℥. rad. gentian. ℥iſſ. fem.
ſinap. dauc. ſylv. ana ℥iij. infund. in vin. alb.
Gallic. ℥ij. Bibat. hauſtul. ter in die.*

H Y D R O P S.

Sydenhami sententia.

Art. 801. Foveæ a digitorum impressione in su-
rarum parte inferiori, sub noctem imprimis con-
spiciuæ & mane evanescentes, primum hujusce
morbi indicium præbent, maxime si adsit dysp-
noea. Paulatim crescit morbus, & abdomen quo-
que intumescit, & reliquæ corporis partes ema-
ciantur. Tria hunc morbum stipant symptomata,
dyspnœa, urinae paucitas, & sitis intensa. Causa
hujus mali in genere est debilitas sanguinis.

*Hydropis
historia.*

Art. 802. Indicationes curativæ sunt tantum
duæ, indicatio-
nes cura-
tiva.

Quæ, viz. *aquæ evacuatio* & sanguinei roboris *in-*
stauratio. Magni interest, an æger facile vel dif-
 ficulter purgetur. *Cathartica fortiora*, & quæ ce-
 leriter operantur mitioribus & segnioribus sunt
 præferenda, & repetenda sunt, quoties ægri vi-
 res ferre queant. Duo sunt medicamenta palma-
 ria, nempe *elaterium*, & *infusio croci metallorum*.
 Quinam sint meatus isti, per quos aquæ ex ab-
 dominis cavitate in intestina deducuntur, incer-
 tum est; experientia vero constat a dicto emeti-
 co sursum ac deorsum potenter evacuari, & qua-
 si ruptis repagulis pleno alveo effundi. Est et-
 iam aliud medicamentum, quod hunc morbum
 expugnat, vomitionem ac catharsin ciens pariter
 ac *crocus metallorum*; viz. ℥. *Cort. interior. sam-*
buc. miiij. coq. in aq. & lact. ana ℥j. ad dimid. co-
 laturæ capiat ægrotus dimidiam vesperi & reli-
 quam mane, repetatque quotidie, donec conva-
 lescat.

*Sanguis
 ac visce-
 ra corro-
 boranda
 sunt.*

*Diureti-
 ca usur-
 panda.*

Art. 803. Fatendum est tamen quod in quibus-
 dam casibus *emetica* & *cathartica* malum non tol-
 lant, sed potius augeant; rebus itaque sic se ha-
 bentibus totus curationis cardo in sanguine ac vi-
 sceribus omni ope *corroborandis firmandisque* om-
 nino vertitur; ad hoc autem magnopere condu-
 cunt *aeris mutatio* atque *exercitium*. Ii quorum
 crases sunt debiliores, quam ut purgantibus feren-
 dis pares sint, *diureticis* evacuandi sunt; illa opti-
 ma sunt, quæ e salibus *lixivialibus* fiunt, nec
 quicquam refert e quorum vegetabilium genere
 cineres petantur: sequente infusione uti soleo;
 ℥. *Ciner. genist.* ℥j. *fol. absynth.* mj. vel ij. *vin.*
Rhenan. ℥iv. infunde frigide; dos. ℥iv. mane hora
 4^{ta} pomerid. & sero.

*Stoma-
 chica &
 amara.*

Art. 804. Aquis his modis eductis ad *corrobo-*
rantia deveniendum est; in hunc finem ægrotus
 bibat vinum & liquores generosiores, item ca-
 piat *invigorantia, stomachica* & *amara*; primum
 locum obtinet *chalybs*, *allium* quoque multum
 con-

confert. Semper recordandum est, quum sanguinis corroborationi navatur opera, quod tota res in eo solum cardine vertatur, & æger nullo modo expurgandus sit. Morbus ad supremum gradum proventus artis subsidia spernit.

Ettmulleri sententia.

Art. 805. Hydrops *primarius* per se incipiens *Methodus* plerumque vitio læsæ in primis viis digestionis *medendi.* ortum debet; *secundarius* ex variis causis oriri potest, ut hæmorrhagia, febre intermittente, &c. Hydrops superveniens morbis chronicis, & ætate gravescentibus rarius curatur. Sudor in *ascite* plus nocet quam prodest; evacuationes per alvum & urinam sunt magis proficuæ. In initio Hydrops tanquam *cachexia* curatur. Recte dicit *Lindanus*, qui vult curare Hydropem, raro debet purgare, dare tamen tunc debet ea quæ certo ac vehementer purgant, sed raro; intermedio tempore appropriatis & aperientibus, ac massæ sanguineæ vitia ex cruditatibus orta, ac reliquorum humorum corrigentibus, & in naturalem crasin reducentibus, debet insistere. Instituantur purgationes decrescente luna. „ Qui *cachexia* laborant inveterata (inquit *Dolæus*) & qui sunt quasi eviscerati, iis non conducunt *cathartica* nec *diaphoretica*, aut alia ulla remediorum genera aquis exhauriendis accommodata, sed solis corroborantibus utendum. Hujusmodi itaque in casibus sero nimis accersito medico aliud nil quicquam restat faciendum, nisi ut prudenter præmisso permagni illius, in quo ægroti versantur, discriminis prognostico, experimentum faciat, quantum auxilii sit sperandum ex usu *cardiacorum martialium*. Et si scorbuti labes simul adsit, cum *antiscorbuticis* commixtis res peragenda est.

Art. 806. In Hydrope curando *diuretica* sunt omnium optima, sed semper præmitti debent univers-

Diuretica & purgantia.

versalia *attenuantia*, *aperientia* & *laxantia*, alias non tuto ad *diuretica* acceditur. *Purgantia* sunt *cort. sambuci*, *ebuli*, *rad. irid. resin. jalap. gum. gutt.* præ omnibus *elaterium* teste etiam *Lindano*, denique *colocynthis*; inter mineralia, *pil. lunares*, *mercurialia*, &c. cæterum his purgantibus semper interponenda sunt *stomachica*, inter quæ eminet *absynthium*, *marrubium*, &c. proximo loco *diuretica* in usum revocanda sunt, *radix allii* multum laudatur (in quibusdam vero intolerabilem capitis dolorem excitat (item *bacc. juniperi*; sed præ reliquis omnibus succus *herbæ kali* ad ʒss. bis in die in haustul. vin. tribus tantum diebus singulis septimanis usurpetur, alias nimis urinam pellit; item eodem modo cineres *busonum* ad ℥j. vel ultra. „ Hoc remedio *Romæ* sanatus „ fuit *Hydropicus* diu decumbens, cui ejus uxor, sumptuum pertæsa, de eo dederat, veneno tollere cogitans, unde copiosum reddidit lotium, iterumque dato pulvere, ut mortem præcipitaret; sed multo uberius reddita *urina* præter spem sanatus est vir ejus, ut habetur in lib. *Wieri de Lamiis*. *Helleborus niger* (monente *Avicenna*) urinam potenter movet. *Hujusce remedii* (inquit *D. Freind Hist. Med. p. 105. vol. 2.*) vires frequenter expertus sum, & in *Hydrope*, confiteor, effectus plus admirandos observavi, quam ex alio qualicunque diuretico.

Vvillisi sententia.

Ascites,

Art. 807. *Ascites anasarcae* superveniens est facilioris curationis, quam morbus iste *solitarius* propter tumores circa viscera, vel propter vasa lymphatica, aut lactea disrupta eveniens. Si quando in *Ascite*, a cathartico exhibito, aqua copiose cum *Scopis* per sedem evacuator, indeque abdominis intumescencia quidpiam minuitur, de curatione non desperandum erit; si vero venter plus intum-

intumescat, & velut *tympaniticus* evadat, morbi eventum non nisi funestum expectare licet.

Art. 808. Fœmina ascite gravissima, ac, uti *Curatio.* mihi videbatur, deplorata laborans, medicamine seq. per vj. dies continuos assumpto, multo melius se habuit, & brevi postea integre convaluit;
℞. Gum. gutt. Gamb. gr. xij. ol. cinnam. gt. j. conserv. ros. rub. q. s. f. bolus; dosis indies augeatur ad gr. xx. *jalapium* & *elaterium* potentissima *hydragoga* habentur. *Diuretica* quoque in hoc morbo conveniunt; & si cum *tympanite* complicatur, applicari potest *empl. diasaponis*, & injici enema ex *urina jani*, &c. infra descript. (829.)

Boerhaavii sententia.

Art. 809. Hydrops in genere producitur ab omni causa, quæ valet 1. liquidum serosum ita coercere, ut stagnare faciat in vasis, vel 2. ipsa vasa rumpat ita, ut intra membranulas effundatur, vel 3. vasa reducentia a cavitatibus ita obstruat, ut liquida non exhalent, nec resorbeantur. Causæ hæ sunt variæ, aliquando morbi acuti, tumores scirrhusi alicujus visceris insignioris, evacuationes quæcunque nimix, præsertim hæmorrhagiæ, &c. *Causa hydropis in genere.* Signa sunt tumores, primo pedum ac crurum, & postea abdominis indies crescentis, hujus extensi sonus in *tympanite*, si percutiatur, in *ascite* strepitus fluctuantis aquæ; at in *ascite* ab aquis clausis in suis cistis, fallit. Adest insuper dyspnœa, sitis, gravitas, torpor, alvus dura, urina pauca, febricula lenta, sudor nullus, macies, vultus livor, &c. *Signa.*

Art. 810. Ad curationem primo fluor conciliandus est lymphæ cardiacis, roborantibus & stimulantibus, quæ, si sitis valida non urgeat, petuntur ex aromaticis, salinis, oleosis, & calidis sub variis formis, inter quas eminet vinum medicatum & infusum nostrum. Si vero morbus erit calidior, & sitis vehementer urgeat, adhibenda sunt *car-* *Intentiones curativæ.*

cardiaca reficientia, acida grata, & leniter aromatica, videantur remedia. (In hoc casu *tartarus vitriolatus* est proficuum, item *aqua Spadana, Tunbrigenses, &c.* cum vin. Rhenan.) Secundo liquidi nimia tenacitas (si adsit) tollenda est *salibus alcalinis, volatilibus & fixis*, item remediis *mercurialibus, antimoniatibus, & e cupro præparatis*. Tertio aquæ in cavitates congestæ educuntur, interdum *Paracentesi*, de qua operatione vid. locum, *emissariis arte factis, causticis, lanceolis, &c.* (sed huic praxi adversatur *aphorismus Hippocratis*; *Hydropicis ulcera in corpore orta non facile sanantur.*) *Diureticis; vomitoriis*, quæ mirabiliter in hoc morbo profunt; *catharticis; dissipatione, calore foci, hypocausti, furni, arena, solis, salis, fimi, &c.* tum maxime pertinaci abstinencia a potu, victu panis biscocti cum paucosale ex pauxillo vini oleosi. Labes viscerum debilitatorum emendatur *chalybeatis & roborantibus, victu sicco, vino veteri meraco, & exercitio*. Egregium est vinum chalybeatum stomachicum nostrum. *℞. Limatur. chalyb. cort. Peruv. crasse pulv. ana ℥ij. rad. rhei pulv. ℥ss. vin. hocomorens. ℔ij. infunde frigide; dos. ℥ij. vel iij. ter in die.*

Mayeri sententia.

*Laus
mercurii
dulcis.*

Nitri.

Art. 811. Mercurius dulcis cæteris intactis quasvis causas morbificas aggreditur, & si superari possint, prostermit: sed dandus est iste athleta in debita dosi: scio aliquando huic succedere ptyalissimum, qui præcavebitur addito cathartico satis activo; sed si nihilominus moveatur sputum, nihil est periculi, imo salivatio in Hydrope, quamvis semper sit molesta, attamen sæpissime est salutaris. Nihil majus dat Hydropicis levamen, quam larga urinarum profusio, idque cum minima virium dejectione. Sales omnes sunt diuretici, verum nitrum omnibus præfero, quod sitim, intolerabile in hoc morbo flagellum, extinguit,
& c.

& calorem præternaturalem visceribus in hac mu-
ria mersis impressum egregie temperat. *Ova for-* *Ovorum*
micarum in lacte ebutyrato cocta copiose urinam *formica-*
movent. ℞. *Ovor. formicar. coch. j.* coq. in lacte *rum.*
ebutytrato, exprime & dulcora pauco sacchar. de-
tur mane superambulando hor. 4. ante prandium
per octiduum. Mulier Hydropica, cui hæc ova
præscripsi, mire commendavit, dixitque movisse
ingentem flatuum copiam, & prolixos crepitus
magno cum levamine; dixit etiam frequens pri-
mo ortum meiendi desiderium, tandem se fudisse
copiosas urinas, ita ut una vice totam replevit
matulam sæpius.

Listeri sententia.

Art. 812. Quædam Hydropica ab omni potio- *Abstinen-*
ne ex toto abstinuit per mensem; ad sitim au- *tia a po-*
tem fallendam sic fecit, tenuem ac parvam par- *tu.*
ticulam panis tosti cum *spiritu vini* intincti super
linguam detinuit ad salivam potenter moven-
dam, & convaleuit.

Art. 813. „ Pharmacopola quidam, habitus o- *Abstinen-*
„ besioris, vir equidem haud mediocris ingenii, *tia a po-*
„ neque inhonestæ existimationis, in Hydropem *tu.*
„ incidebat; valde intumuerunt crura, & venter
„ quoque turgescere incepit. Hic ex lectione præ-
„ cedentis sectionis animum obfirmavit, & secum
„ decrevit ab omni potu per 30. dies abstinere, &
„ abstinuit; unde a morbo gravissimo liberatus
„ est. Idem vir probus (ut nuper aliquis mihi re-
„ tulit) in eundem morbus lapsus *eidem experi-*
„ mento spem omnem sanitatis recuperandæ ite-
„ rum crediturus est. Huic affinis est Historia Sa-
„ muelis Ongly Equitis aurati opulentissimi, civi-
„ bus Londinensibus, dum vixit, satis noti. Hic,
„ cum septuagenarius, esset, in Hydropem incidit
„ deploratissimum, medicis celeberrimis (quibus
„ fretus) prorsus incurabilem. In hoc rerum sta-
„ tu animo secum statuit *se a potulentis quibuscun-*
„ que ex toto abstinere: statim vix tolerabilem for-

„ti animo aliquot menses sustinuit, ac convaluit;
 „ & vixit sex vel septem annos ab isto morbo im-
 „munis, & non nisi biennium circiter abhinc,
 „dum hæc scribo, mortuus est. Atque hic reti-
 „cere nequeo (*utcunque me forsitan ludibrio sibi*
 „*quis habuerit*) experimentum, paucis credo ad-
 „huc notum, curandi intumescenciam crurum
 „equorum mediante nimirum potus eorum decur-
 „tatione. Hic morbus Hippiatrīs vulgo *The Grea-*
 „*se* appellatur: equi hoc malo affecti decumbere
 „omnino respuunt, unde intumescencia valde
 „augetur, & insuperabilis quandoque evadit.
 „Methodus medendi breviter sic se habet. Qui
 „curam equi attendit, *duas tantum aquæ libras*
 „ad potandum equo præbere solet, mane & ves-
 „peri, ad dies 6. vel 8. quo tempore curatio ef-
 „ficatur; crura detument, & equus ad dormien-
 „dum procumbit, &c.

Taus elat-
erii.

„*Art. 814.* Quod ptarmica faciunt in naribus,
 „idem elaterium aut euphorbium in intestinis effice-
 „re videtur, pituitam vehementer movendo. Il-
 „lud notandum est, elaterium (quæ istius medica-
 „menti summa est commendatio) dejectiones mo-
 „vere, *authore Dioscoride*, citra stomachi injuriam,
 „exhiberi potest ad gr. x. ℥. Elater. gr. x. sal. gemm.
 „℥j. miv. cydon. q. s. f. bolus. In casu ancipiti &
 „moribundo ex dysuria plurium dierum, aliis me-
 „dicis dimissis, sic hominem restitui; ℥. Succ. li-
 „mon. recenter express. ℥vj. cochlear. hortens. ℥iv.
 „hepatic. plantag. syr. violar. ana ℥ij. m. hujus ℥iv.
 „omni trihorio siccavit, postridie urinam copiose
 „reddidit, & postea modicis hydragogis detumuit
 „venter, & convaluit. Hydrope siccato aq. absyn-
 „thii stillat. in qua rhabarbarum maceratum est,
 „est usus eximii ad confirmanda viscera. (Virtu-
 „tes elaterii per totam exercitationem summopere
 „extollit author, & revera laudem omnem exsupe-
 „rat.) Hoc remedium equidem successu vix cre-
 „dibili aliquoties exhibui. Anno proxime ela-

„ pfo,

„ pſo, verno tempore, ſeni aſthmaticæ, diuturnitate morbi contritæ, cui pedes, crura & femora valde intumebant, quod moribundis fere ſemper evenire ſolet, elaterii doſin unam & alteram atque tertiam, interpoſitis debitis intervallis, effectu plane admirando propinavi. Prima vice humoris ſeroſi per ſedem evacuata ſunt duodecim pondo, ſecunda purgatione decem, & tertia demum vice ſolummodo duo vel tria. Atque ita a tumoribus Hydropicis omnino liberata eſt, & valetudine mediocri vixit uſque ad initium hyemis, cum, ingraveſcente aſthmate, colica vel illiaca paſſione correpta eſt, ex qua, poſtquam ultra hominis ætatem vixiſſet, tandem naturæ ſatiſfecit.

HYDROPS VESICALIS.

Art. 815. Hydrops abdominis Vesicalis eſt *ascitis quædam ſpecies*, in qua quidem inclufa aqua tumorem abdominis facit, non vero in ejus cavo fluctuans, ſed in veſiculis ſive hydatidibus innumeris variæ magnitudinis contenta; quæ hydatides nihil aliud ſunt, quam portiones vaſorum lymphaticorum alicujus viſceris, in quibus motus lymphæ eſt impeditus; unde ſpatiola inter valvulas, liquore prædicto diſtenta, in figuras oblongoſphæroidales efformantur, & totam cavitatem adimplent; ita ut poſt abdominis apertionem quandoque nihil aut parum aquæ extravafaſcæ effluerit. Hic morbus in brutis animantibus frequentius occurrit, præcipue in ovibus. In corporibus humanis exempla proſtant apud *Sennertum*, *Tulpium*, *Bartolinum*, &c. Valde curioſum eſt iſtud in *Collectaneis Gallicanis Acad. Scien. Memoir.* p. 215. anno 1722.

Hydrops Vesicalis.

Art. 816. Sexennium abhinc hiftoriam mihi communicavit D. *Richardus Blinck pharmacopola Bidifordensis*, juvenis cujuſdam nautici, qui ex febre ardente, in qua permagnam frigida copiam potaſſet, in ingentem abdominis intumeſcentiam

Hiftoria

incidebat. Applicata erant emplastra, & cataplasmata, ex quibus parum utilitatis: demum loco prominenti ad latus sinistrum umbilici caustico imposito apertum est foramen, ex quo *hydatides* *quamplurimæ* prodierunt, alix ova gallinæ æquantes, nonnullæ grandiores, plurimæ minores, omnes numero ad minimum octoginta. Homo convaluit, & adhuc vivit ab omni morbo immunis.

Alia.

In Transactionibus Philosophicis N. 370. extat historia cujusdam hominis hujusmodi Hydrope laborantis, e cujus abdomine facta paracentesi exivit ingens hydatidum copia, figura & magnitudine diversarum N. septem vel octo millium; una cum his etiam evacuata erat magna quantitas materiæ gelatinosæ, coloris grisei & lutei, albumine ovorum aliquanto spissioris. Vid. locum.

HYDROPS PERITONÆI.

*Hydrops
Perito-
næi.*

Art. 817. Hydrops Peritonæi est collectio aquæ inter abdominis musculos & Peritonæum, maxime inter hoc & tendines musculorum transversalium, unde ex errore quidam auctores, anatomix ignari, hunc morbum *Hydropem duplicaturæ peritonæi* falso nominarunt. Tumor abdominis aliorum æquabilis circa umbilicum minus prominet, ob strictam ibidem tendinum muscularium peritonæo adhæSIONem; atque hoc *propriam morbi hujusce diagnosin* constituit. Aqua sive lymphæ eo loci comprehensa, ibidemque moram ducens, carnem muscularem corrumpit, & hinc ulcus sordidissimum internum progressu temporis procreatur. Hic Hydrops *tempestiva paracentesi* forsan sanari potest. D. *Cheselden* vero aliter sentire videtur, Anat. p. 126.

*Paracen-
tesis.*

Art. 818. Operatio Paracenteseos cum historia ipsius medicinæ est cœtanea, ab *Hippocrate* memorata, & ab *Albucasi* æque accurate descripta ac in nostra ætate. Experientia recentiori docemur aquas una vice ad siccitatem tuto depromi pos-

posse, quod praxi in nostris nosocomiis & Lute-
tiæ Parisiorum confirmatur.

Art. 819. Memorabilis est historia apud D. *Che-
selden Anat.* p. 187. &c. cujusdam ascite laboran-
tis, qui novies vigesiesque in uno anno paracen-
sin subivit, & deprompti fuerunt plusquam se-
ptuaginta aquarum congñ. Tribus ultimis septi-
manis ante obitum *rheumatismo* laborabat, & fre-
quenti *narium hæmorrhagia*, quæ immediatæ ratio-
nes vel causæ mortis ejus videbantur; aperto ca-
davere jecur repertum est sanum.

Art. 820. Operatio paracenteseos non molien-
da est in corporibus valde macilentis, vel senio
vel tabe confectis, nec (nisi in Hydrope subito
exorto) in ægris, qui non respirandi difficultate
laborant, & quorum partes nobiliores adhuc fere
sanæ & integræ sunt. De operatione, & ejusdem
difficultatibus, vide *Barbette* & alios scriptores
chirurgicos.

Farrago sententiarum.

Art. 821. Qui ex morbo jecore oritur hy-
drops, vehementissimam, sed inanem tussim con-
junctam habet, quæ in aliis hydropum speciebus
vix aut raro apparet. *Baglivius.*

*Tussis in
Hydrope.*

Art. 822. Hydrops (inquit *Hippocrat. in Coac.*)
qui medicinæ concedit & revenit, desperatus est.
Hydrops omnis (inquit idem) qui ex acutis mor-
bis oritur, malus & lethalis. Hydrope detentus
(addit) curari potest, si robustis sit visceribus, si
bene concoquat & spiret, sine dolore sit, & ex-
trema colliquefacta non habeat. Omnes fere Hy-
dropici circa plenilunium moriuntur. *Tycho Bray-
be* „ Diarrhæa in Hydrope, quæ non juvat, est
„ pessima; pravam enim in visceribus diathesin
„ ostendit.

*Prognos-
tica va-
ria ex
Hippo-
crates.*

Art. 823. In Hydropicorum cadaveribus (in-
quit *Cheselden*) semper observavi cor solito ma-
jus, fibrasque ejusdem valde laxatas, & vasa san-
guifera plurimum distenta, & præterea concretio-

nes polyposas, interdum in ambobus articulis & ventriculis, sed frequentius in dextris.

Infusum
theæ.

Succus
rad. brion-
iæ.

Art. 824. Stomacho & visceribus rite emundatis *infusum theæ viridis* in vino Rhenano evadit medicamentum laudabile, non modo diureticum & stomachicum, sed etiam sanguinem exagitans, & ejus motum adaugens. *Vvaineuvright*. Ex vegetabilium classe (inquit *Dolæus*) pro arcano in hoc morbo revelo succum *brionie* sequenti modo collectum; luna crescente, tempore imprimis verno, radicem *brionie* terræ adhuc commissam excava, & semper iterum impone operculum ex superioris radicis parte abscissa paratum, & singulis mane invenies coch. ij. vel iij. istius succi, quem exhibe singulis matutinis horis Hydropico a coch. j. ad ij. vel iij. quo solo vili mendicamine plures, Deo adjuvante, curavi. Deploratissimum Hydropicum curatum vidit Dr. *Beeston* medicus *Bathoniensis* celebris, nuper defunctus, ut mihi retulit, per radicem *brionie* circumforaneo quodam exhibente, cum ex aliis remediis quocunque a peritis medicis exhibitis nullum juvamen acceperat. Sequens infusum diureticum fuit præscriptum celeberrimi Lovveri & in sua praxi frequenter usurpatum: ℞. Rad. lapathi acut. ℥ij. taraxac. ℥j. flor. sambus. mʒ. summit. abiet. sol. cochlear. becabung. nasturt. aquat. ana mʒ. raphan. sylv. ℥ij. sem. sinap. ℥j. infund. in vin. alb. ℔ij. clauso & calide per hor. 4. coletur pro usu, dos. coch. iv. vel v. bis vel ter in die.

Remedia
varia.

Art. 825. Inter remedia reliqua melioris notæ recensentur pil. hydropicæ Bontii; ℞. Aloes opt. ℥iiss. gum. gut. gam. ℥iiss. diagrid. ℥j. gum. ammoniac. ℥iiss. tart. vitriolat. ℥ss. syr. ros. solut. q. s. f. massa pil. dos. a ℥ss. ad ℥j. Electuar. hydragogum Sylvii; ℞. Bacc. junip. in aq. coct. express. & ad pulpæ consistentiam redact. pulp. tamarind. ana ℥iv. rad. jalap. ℥iiss. scammon. elect. ℥j. cinnam. acut. sem. fœnic. dulc. ana ℥ij. sacchar. clarific. ℥x. m. f. ele-

electuarium ; dosis in adultis a ℥ij. ad ℥ss. Potio
 hydragoga Listeri ; ℥. Decoct. sennæ Gereon. ℥iij.
 syr. e spin. cervin. ℥ss. succ. limon. ℥ss. elater. gr.
 iv. m. f. potio . Tinctura allii vino absynth. ex-
 tract. tinctura cochlear. compos. cataplasma Hydro-
 picum , pil. hydragoga , cerevisia Hydropic. cerevi-
 sia purgans Hydrop. haustus hydragogus , lixivium
 de calce , vinum Hydropicum . Sapo Castiliensis ,
 express. diuretic.

T Y M P A N I T E S.

Boerhaavii sententia.

Art. 826. Tympanites iisdem mediis , & eadem *Tympanites*
 methodo , tollitur , ac anasarca & ascites , si or-
 tum duxit a rarefacto vapore humoris extravasa-
 ti , & putrefacti ; tum enim , causa ablata , tolli-
 tur : Si vero ortum duxit ex aere per membra-
 nas intestinorum putrefactorum perforatas in ca-
 va delapso , retroire non potente , sed calore cor-
 poris rarefcente , tum cuncta cito putrescunt ae-
 re juvante , malumque ex posita causa est fere
 semper insanabile : unde hydrops siccus humido lon-
 ge magis immedicabilis habetur : punctura sæpe
 solatio , raro sanationi , sufficit ; fasciæ post pun-
 cturam locum habent.

Vvillisi sententia.

Art. 827. De hujus morbi ætiologia præ reli-
 quis audiendus est Vvillisius. Tympanites est tu-
 mor ventris ; sed quæ sit materies morbifica tu-
 morem istum inducens , quomodo in ventre aut
 progignatur , aut aliunde illuc adveniat , plane
 nescitur . In ascitem degenerare solet . Non a fla-
 tibus intra vel extra intestinorum cavitates conclu-
 sis excitatur , verum exoritur (quantum conjectura
 assequi possumus) quatenus in imo ventre spiri-
 tus animales ad viscera membranacea spectantes ,
 ab incongruo quodam in arætiæ adacti , fibras
 ubique nerveas tumultuarie irruunt instantque ,
 nec statim denuo ab iis recedunt : hinc perito-
 næum extumescit , intestina ampliata & distenta ve-

Quomodo
genera-
tur.

lur inflantur, mesenterium, aliaque viscera membranacea spiritu impetuoso turgida, velut in molem attolluntur; porro dum hæc fiunt, ut vacuitates a viscerum concavorum extumescentiis factæ impleantur, humoris statim cujusvis intus contenti portio in vapores rarefacta, illico in flatus spatia isthæc inania oberrantes cedit.

Quinam
huic mor-
bo sunt
obnoxii.

Art. 828. Spiritus animales potius quam flatus ejusmodi ventris intumescencias, saltem breves & transitorias, quales in paroxysmis colicis & hysteriis contingunt, excitant. atque hinc evenit, quod, qui affectibus *hypochondriacis*, *colicis* aliisque imi ventris *spasmodicis* diu obnoxii fuerunt, demum *tympanitici* fiant.

Curatio.

Art. 829. Hic affectus raro per se interficit, quin longo tempore protractus, quo demum certius jugulet, sibi met *ascitem* lethi prænunciam adsciscit. A *catharticis*, præsertim fortioribus fere semper exacerbatur hic morbus, saltem non alleviatur. *Enemata* crebro injecta eximii sunt usus, & hoc præ cæteris; ℞. *Urin. sani* ℥j. *sal. prunel.* ℥j. *tereb. Venet. cum vitel. ovi solut.* ℥ij. *m. f. enema.* Applicetur *empl. de sapon.* toti abdomini. Ad sitim intolerabilem in hoc morbo; ℞. *Conserv. lujus. per setaceum trahet.* ℥ij. *pulp. tamarind.* ℥ij. *sal. prunel.* ℥j. *syr. e succ. lujus. q. s. f.* Eclegma molle, de quo sæpius lambat æger.

Vix differt ab *ascite*.

Art. 830. „ Tympanites est flatuosa abdominis
„ moles, rugitu strepens, dumque percutitur, in-
„ star *tympani* resonans. Vix differt ab *ascite*; ra-
„ to enim flatus absque aqua reperiuntur, nisi in
„ ipsis morbi primordiis. Experientia didici hoc
„ malum tractari debuisse remediis *anthistericis*,
„ *antiscorbuticis*, & *corroborantibus*, priusquam
„ in *ascitem* demigraverit. Sequens est remedium
„ *empiricum* valde decantatum; ℞. *Succ. solior.*
„ *porri & sambuci ana p. x.* analvtice misceantur,
„ capiat æger coch. iij. vel iv. bis vel ter in die;
„ hoc valet aliquando in extremis post alia omnia
„ incas-

Remedium *empiricum*.

„ incassum tentata. *Anthysterica*, *chalybeata*,
 „ *empl. de cicuta cum ammoniaco*, *fotus ad tym-*
 „ *paniten*, &c. sunt valde proficua.

M. L I T T R E.

Art. 831. Scriptoribus de Tympanite inter se minus convenit, quippe qui neque causam morbi neque sedem designarunt. Ex cadaverum Tympanite mortuorum sectionibus patet ventriculum & intestina, præ reliquis crassa, mirum in modum distendi, ac ingenti mole vix sane credibili ampliari. Frequenter (*souvent*) observavi *cæcum & colon semur humanum crassitie æquantia*; reliquorum viscerum in abdomine contentorum dimensionem ultra naturalem nusquam inveni. In recentibus Tympaniticis humiditatem tantum aliqualem in abdominis cavo reperi, & in inveteratis non nisi duas vel tres libras aquæ; quantitas adeo exigua neutiquam pro morbi causa haberi potest: ideoque *inflationi ventriculi & intestinorum* monstruosa ista ventris moles soli debetur. Ventriculus & intestina quasi musculus cavatus spectari possunt, cui aer inclusus est antagonista. Parietes intestinorum & aer internus sunt tanquam duo *ἐλασπæ* se mutuo indefinenter impellentia. Quamdiu hæ duæ potestates æquipollent, ventriculus & intestina alternatim se contrahunt & dilatant, salva dimensione naturali, suntque officiis suis obeundis paria, manente scilicet æquilibrio: si autem laterum ventriculi & intestinorum systole vim elasticam aeris inclusi superat, fistula intestinalis supra modum coarctabitur: e contra si quando fibrarum, intestinalium vires elasticæ quoquo modo immi- nuantur, aer inclusus canalem plus justo dilatat, & quo debilior est intestinorum elasticitas, eo major evadit eorum capacitas, unde Tympanites ortum ducit; qui affectus ut plurimum est incurabilis ob amissam aut valde diminutam istorum viscerum elasticitatem; fibræ nimis laxatæ sese contrahere rursus nequeunt, aut saltem admodum debili-

Essentia
morbi
tandem
detegitur.

biliter : & proinde ventriculus & intestina non nisi imperfecte admodum officia sua peragunt, in quantum præcipua eorundem energia & operatio a contractione, dilatatione, & motu peristaltico magnopere pendent. *Memoir. de l'Acad. Vol. 17. P. 314.*

H Y D R O C E P H A L U S.

Schenckii sententia.

Hydrocephalus.

Art. 832. Hydrocephalus est morbus adultis raro accidens, infantes vero sunt magis obnoxii, & frequenter fit a violenta obstetricatione. Est tumor capitis aquosus; colligitur autem humor vel inter cutem & cranium, aut inter cranium & cerebri membranas; *Aetius* addit inter membranas & cerebrum; (*Boerhaave* addit inter cerebri plicas, & in cavitatibus; sed hæc posteriores species sunt incurabiles; externa & evidens causa est plaga aut contusio in puerperio. (Ex tumore intus sub cranio neminem convaluisse vidi; sed ab externo tumore facile sanescunt.)) „Caput in tantam molem turgescit, ut quandoque integrum corpus præponderet. Insignis historia habetur in *Transac. Philos.* p. 207. Infantis biennis hoc malo mortui, e cujus capite sectione patefacto, exivere aquarum decem pondo; humor erat tenuis, pallidus, & insipidus, in interstitiis meningum & cerebri ventriculis reconditus; de reliquis circumstantiis vid. locum.

Methodus curandi.

Art. 833. Oppugnandus est hic affectus primo resolvantibus; sed si id fieri nequeat, facienda est incisio vitato temporum musculo, & humor exprimendus est, (*Ambr. Paræus*) ℞. Ol. cham. ℥iv. sulph. ℥j. m. f. s. a. ungt. in hoc affectu magnarum virium. „Hydrocephalus secundum *Boerhaave* levi inustione, terebratione, punctura, prudenter, lente, adhibitis, simulque hydragogis & roborantibus internis curatur; vel externis discutientibus dissipatur excepta ista specie incurabili, quæ in cerebri cavitatibus formatur.

Art.

Art. 834. „ Inter cætera ad hunc morbum op- *Remedia*
 „ pugnandum *pseucrolousiam* emolumento fuisse a- *varia.*
 „ nimadverti. Inter evacuantia & corroborantia
 „ eadem sunt ac *in ascite*. Pro usu externo lixi-
 „ vium calcis vivæ egregium admodum est in di-
 „ scutiendo Hydrocephalo *teste Aquapendente*, &
 „ linimentum sequens a *Foresto* commendatur ;
 „ ℞. Ol. cham. ℥iv. flor. sulph. ℥j. digere s. a. Hy-
 „ drocephali curatio (inquit *Barbette*) omni tem-
 „ pore experientissimis medicis insignem creavit
 „ molestiam. Purgantia, sudorifera vel diuretica
 „ raro aliquid conferunt: cauteria, vesicatoria,
 „ fonticuli, setacea, immo plerumque ad incisio-
 „ nem vel ustionem impellimur, quæ tamen me-
 „ dia quosdam in vita conservarunt.

M. P E T I T.

Art. 835. Hydrocephalus est tumor capitis aquo-
 fus adultis raro accidens ; infantes vero in pri- *Accurata*
 mis annis a nativitate, immo interdum ante na- *morbi de-*
 tivitatem occupat ; & caput infantuli ex utero *scriptio.*
 nondum educti tam grande existit, ut *puncturam*
vel sectionem capitis facere ad partum facilitan-
 dum chirurgus incumbat. Aqua secundum autho-
 res colligitur, vel externe inter cutem & cra-
 nium, vel interne 1. inter cranium & duram ma-
 trem, 2. inter duram & piam matrem, 3. in ven-
 triculis ipsius cerebri ; atque hanc ultimam spe-
 ciem solam in praxi vel in cadaverum sectionibus
 unquam observare potui ; credo itaque reliquas ra-
 rissime occurrere. Hoc morbo affecti sunt langu-
 di, tristes, & pallidi, oculi illorum luridi & pro-
 minentes pupillis dilatis ; ossa cranii tenuia & mol-
 lia evadunt, & figuras irregulares induunt, nasus
 depressus, frons valde elatus, capitis magnitudo
 plane monstruosa, & gravitatis non sustentandæ,
 non raro crepat & disrumpitur, & mors non mul-
 to post insequitur. In cadaverum sectionibus no-
 tavi duram meningem plus solito cranio adhæren-
 tem, crasin cranii valde prolatam, & quasi ubi-
 que

que contractam, ossium margines membranis e longinquo connexos, cerebrum minime corruptum, ventriculos cerebri adeo inimmensum distentos, ut substantia ejus corticalis & medullaris extrorsum detrusa digiti vix duas lineas crassitie æquabat, & multis in locis a protrusione aquarum penitus divisa aquis usque ad meninges perringentibus, vasa sanguifera prolongata & crassa, in pluribus glandulam pituitariam schirrosam, quod inter causas hujus morbi locum habere videtur. Paracentesi quod attinet, tam diu procrastinari solet, ut vix ullum ista operatione servatum vidi; intra 4. vel 5. horas plerumque moriuntur, si una vice aquas ad siccitatem deprimant; sin vero tardius progrediantur, non ultra quadraginta horas supervivere solent.

HYDROPS PECTORIS.

Sponii sententia.

*Hydropis
pectoris
signa dia-
gnostica.*

Art. 836. Si Hydrops in pulmone accidat, juxta Hippocratem, febris & tussis vexant, æger confertim respirant, pedes intumescunt, ungues incurvantur, & velut empyicus efficitur, sed remissius & diutius. Hæc signa diagnostica Hydropis pectoris apprime sunt scitu necessaria; est enim morbus satis frequens, nec tamen satis cognitus; sed qui ista ad unguem renebit, hunc morbum ab aliis facile distinguet. Plurima habet cum empyemate signa communia; ea tamen symptomata sunt remissiora, quia serum sive aqua minus impedi-menti in pulmonum bronchiis & pectore afferunt quam plus ipsum; at diutius durat affectus, quia sero non ita corrumpitur aut opprimitur pulmo, ac purulenta ibidem collecta materia. *Sponii Aphor. p. 145. &c.*

Etmulleri sententia.

*Sympto-
mata.*

Art. 837. In Hydrope pectoris præter pectoris tumorem & sensum fluctuationis, adest tussis sicca, difficilis respiratio, orthopnoea, palpitatio cordis, febricula. Ex ruptis vasis lymphaticis oritur,

CAP. VIII. *Hydrops Pectoris.* 301
tur, & curatur ut aliæ Hydropis species. De pa-
racentesi vid. locum, p. 766.

Vvillisi sententia.

Art. 838. In Hydrope Pectoris lymphæ in com-
pagem pulmonarem restagnante sæpenumero ac-
cidit vesiculas hydatidas dictas, in extima hujus
visceris superficie excitari, quæ postea disruptæ
ascitem in thorace producant. Hujusmodi affectio
in ovibus, quando ob tempestatem humidiores,
& pascua aquosa ab Hydrope gregatim intereunt,
passim cernitur. Morbus dignoscitur ex aquarum
fluctuatione. Auctor historiam producit Hydro-
pis Pectoris per paracentesin curati; & aliud af-
fert exemplum cuiusdam juvenis curati per cathar-
tica & diuretica.

*Hic affe-
ctus in o.
vibus
valde
frequens.*

Art. 839. De Hydrope ovarii, Hydrope uteri-
no, & uteri inflatu alibi in morbis mulierum di-
ctum est.

I C T E R U S.

Inter legendum & ex observatione.

Art. 840. Signa hujus morbi & symptomata
præcipua sunt lassitudines totius corporis, anxie-
tas præcordiorum, difficilis respiratio, virium de-
jectiones, faciei pallor, pulsus debilis & lentus,
urinæ tenues, aut crassæ, coloris flavi ad rubrum
vergentis, croceo colore pannum immersum tin-
gentes; interdum adsunt vomitus biliosus, deje-
ctiones albæ, pruritus totius corporis, & aridi-
tas, & veluti exustione solis aspera cutis superfi-
cies, flavedo per universam cutem, maxime in
oculorum albis, quo quidem colore interdum ob-
jecta omnia apparent tincta.

*Icteri si-
gna dia-
gnostica.*

Sydenhami sententia.

Art. 841. Icterus interdum est proles colica. In
tali casu solo rhabarbaro purgandum est, &
morbus plerumque sponte sua sensim facessit; sin-
vero non nisi ægre discedere videatur, convenit
sequens apozema; ℞. Rad. rub. tinctorum curcum.
ana ℥j. chelidon. maj. cum toto, summit. centaur.
min.

*Icterus ex
colica.*

*Ejusdem
curatio.*

min. ana mj. coq. in p. a. aq. font. & vin. Rhenan. ad ℥ij. colatur. add. syr. e quinque rad. ℥ij. m. f. apozem. capiat ℥ss. calide mane & sero usque dum convaluerit

*Curatio
in genere.*

Art. 842. At ubi icterus per se invadit, colica neutiquam prægressa, *cholagoga*, quæ per alvum bilem subducunt, ægro sunt exhibenda, & alia *antiicterica* usurpanda. His denique morbum non subigentibus ad *aquas ferreas*, quales sunt *Tunbrigenses*, adeundum, quæ ex ipso fonte sunt bibendæ.

Ettmulleri sententia.

*Sympto.
mata.*

Art. 843. Icterus est totius corporis *cachexia* flavedinem inducens, ut plurimum cum cardialgia, hypocondriorum dolore, præcipue dextri, alvi segnitie, lassitudine, &c. Si flavedo ad viriditatem, vel ad cœrulitatem, vel ad obscurum livorem inclinet, Icterus niger vocari solet; febris interdum conjuncta est, interdum abest. Tristitia aliquando inducit Icterum. Icterus *flavus* diuturnior semper in *nigrum* degenerat, unde *essentialiter* non differunt. Anxietas in præcordiis, dolor præcordiorum compressivus, virium dejectiones, lipothymia, &c. ante eruptionem Icteri frequentissime occurrunt. Urina ictericorum succulsa spumam flavam ostendit, & linteum tingit colore croceo, sed non semper, sedimentum croceum dimittit; fœces alvinæ sunt plerumque albicantes, vel cineritii coloris, & hoc postremum ut plurimum est signum *calculi in vesica fellea*. Urina crassa turbida & nigerrima est signum solutionis morbi.

Prognosis.

Quo magis flavus existit Icterus, eo facilior est curatu, quo vero magis niger, eo difficilior. Cum *hydrope* conjunctus raro curatur. „ Si sudor erumpat (inquit *Sylvius*) citior plerumque curatio expectanda erit, sin vero urinis plus „ deponatur materiæ rubentis & paulo post subsidentis, segnior erit expectanda.

Curatio.

Art. 844. Quoad curam vomitoria, *martialia*, & hinc

& hinc *amara*, totam absolvunt paginam. Præmissis universalibus usurpentur *stomachica*, *mar-
tialia* (*limatura cruda* in Ictero nigro) *rhabarba-
rum*, *lumbricalia*, *viperina*, *alkalina*, *volatilia*,
amara, *aqua acidula*, *gum. ammoniacum*. *Vena-
sectio* & *catharsis* vix locum habent. Specifica sunt
(omnium optimum) *chelidonium majus*, *marrhu-
bium*, *flor. hyperici*, *crocus*, *genista*, *absinthium*,
sem. cannab. in lacte coctum, *rad. curcum. rub.*
tingtor. urine potus, *stercora* fere omnium *avium*
& *animalium*, *pediculi*, *lapis in folliculo fellis*
tauri. In genere moneo in curando Ictero infi-
stendum esse ad tempus medicamentis *antiicteri-
cis*, quia morbus est chronicus & contumax: &
quidem quamdiu *urina* mingitur tenuis & splen-
dida, tamdiu illis insistendum, donec signa coctio-
nis apparent, usque dum *urina* sit crassa, & tur-
bida, & cum sedimento repleta; his tamen ap-
parentibus spes est salutis. Cura peracta, ad abi-
gendum cutis flavum colorem conveniunt *frictio-
nes* & *balneatio*.

Vvillisi sententia.

Art. 845. Curatio Icteri inchoanda est cum vo-
mitorio; ℞. Fol. asari N. 9. incis. & contus. as-
fund. vin. alb. ℥iij. exprimatur succus & detur cum
regim. Remedium vulgare & empiricum apud no-
strates est, ut ix *pediculi vivi* sumantur mane, per
5. vel 6. dies, quo remedio (cum alia minus ef-
ficerent) plures sanatos audiivi. *Chalybeata* ut in
aliis *cachexia* affectibus, ita in hoc juvamen præ-
stant, atque hinc est quod *acidula* frequenter post
omnia prosunt., Cum apozemate sequente (inquit
Dolæus) semper initium curationis facere soleo;
℞. Rad. tarax. chelidon. maj. ana ℥j. herb. cichor.
fragar. ana mis. marrhub. alb. mis. tartar. alb.
fol. senn. ana ℥iij. infund. in vin. alb. & aq.
font. ana p. æ. coq. ab ℥ij. cola, &c.

Vel-

Vomito-
rium &
alia re-
media.

Velschii sententia.

*Est affe-
ctus in
prægnan-
tibus sa-
pius fre-
quens.*

Art. 846. Mulieres sæpe gestationis tempore fiunt *Ictericæ*, præsertim in ultimis mensibus; an quod bilis tunc temporis viscosior evadat, & ita in glandulis hepaticis non fecernatur; an quod uterus tumen comprimendo intestina in causa est, quod ductus choledochus nimis compressus bilem in intestina non transmittat: notandum est, quod hic morbus in prægnantibus post partum statim evanescat.

Sampsonii sententia.

Art. 847. *Saponis Castellensis* ℥℥. in haustul. *vin. alb. solut.* valet ad urinas provocandas in *Ictero* & *Hydrope* experimento domus *Bedfordiensis*, ubi pro magno secreto habetur. *Sylvius* hoc idem medicamentum laudat, sed in lacte solutum ob sale fixum & oleosam ejus substantiam. Ego quoque in nonnullis *Ictericis* expertus sum, in his cum fructu, in illis aliter. Ubi acidi humores vel in *Ictericis* vel in *Hydropicis* abundant, credo hoc medicamentum valere, quoniam ab acri sale fixo temperantur, subiguntur, & per vias urinarias expelluntur: & e contra ubi acres humores dominio potiuntur, acre medicamentum nihil valet, metuo, ut noceat.

Farrago sententiarum.

*Dubita-
tio.*

Art. 848. Dubitatur, an *Icterus* semper oriatur ab obstructione bilis; quoniam neque in sanguine vel urina *ictericorum* ulla est amarities: *Icterus* etiam generari potest sine hepatis obstructione, teste *Sylvio*, & obstructiones in hepate non semper pariunt *Icterus*, authore *Ettmullero*. Aliquando oritur ex animalium quorundam morfu. *Ictericorum* alvus & aperta & fæces flavo colore tinctæ (interdum) conspiciuntur. *D. Gaillard. in Thesi apud Catabrigienses.*

*In hepatis
scirrho.*

Art. 849. Si sit suspicio hepatis scirrhi, appri-
me conveniant fofus & empl. seq. ℥℥. *Fol. malv.
alb. absynth. flor. melilot. chamæm. ana m℥. fol.
meliss. chamæpit. ana m℥. sem. fœnogr. ℥℥. coq. ex
aq. tbv.*

aq. ℥v. sub finem add. vin. alb. ℥iij. &c. cum pannis laneis foveatur latus, deinde superimponatur emp. de cicuta cum ammoniac. vel de ranis cum mercurio. *Pitcarnus in MS.* Si vero jectur durum sit, i. e. scirrhum, res est desperata. *Hippocr. Aphor.* Si morbus diu duret, hydro-
pem minatur.

Art. 850. Candidum ex avium fimo est earum *Avium* *stercora:* *urina*, ideo confert Ictero, qui morbus *inflatio* est: album in *anserino* *stercore* diligenter abrasum siccatumque privatim ad icterum facit. *Listerus.*

Art. 851. In Ictero pertinaci, medicamentis usitatis minus cedente, ex repetitis experienciis omnibus commendo *Æthiopem mineralem* *tanquam remedium in hoc affectu potentissimum.* Icterus in ultimo stadio sanguinem fundens per sedem, per urinas, per ipsam cutem, per sputum, vel stillicidium ex naso, &c. vix unquam curatur.

Art. 852. Instar omnium religiose consulendus *Boerhaave* est præclarissimus *Boerhaave*, qui de Ictero *mul-* *ve.* *tiplici*, & de hepatite egregie scripsit. p. 201.

Art. 853. Stercus ovinum in cerevisia infusum *Remedia* *varia.* pro pauperibus est laudabile medicamentum. Decoctum sem. cannabin. sapo Venet. flores sal. ammoniaci martiati, ens veneris, &c. sunt remedia optatissima; ut etiam sequentia, cerevisia icterica, decoct. berber. decoct. icteric. expressio milleped. icteric. haust. saponac. pil. icteric. (probatissimum medicamentum) vinum chalybeatum.

C A P. I X.

Sive Fasciculus Morborum novus.

R H E U M A T I S M U S.

*Sydenhami sententia.**Rheuma-
rismi hi-
storia.*

Art. 854.

NULLO non tempore, maxime au-
tumno, cum rigore & horrore &
cæteris febrium symptomatis adoritur, elapso uno
vel altero die (citiusve) dolor adest atrox nunc
in hoc nunc in illo artu, in carpis, humeris, &
genubus præsertim; vicissim hos relinquens & il-
los occupans, frequentius cum rubore & tumo-
re. Febris sensim evanescit, manente dolore: est
morbus diuturnior, aliquando per menses aliquot
durans, & annos, non continuo, sed paroxys-
mis repetitis. In *lumbagine Rheumatica* immanis
dolor adest circa lumborum regionem fixus, *ne-
phritin* mentiens, nisi quod æger non vomitu-
riat. In Rheumatismo sanguis pleuriticorum simi-
lis est.

*Lumbago
Rheuma-
tica.*

Curatio.

Art. 855. Sanguis mittendus est ad tertiam quar-
tamve vicem, habita ratione virium, alternis vel
tertiis diebus. *Victus* admodum *tenuis* præbendus
est; æger quotidie e lecto ad horas aliquot exfur-
gat. Potus ordinarius sit cerevisia tenuis vel po-
tius ptisana ex *hordeo rad. liquirit. acetos. &c.* vel
emulsio; parti dolenti applicari potest cataplasma
ex *pane albo* in lacte coct. cum tantillo *croc.* die-
bus a venæsectione liberis injiciendum est *enema*
ex lacte saccharato, vel ex decocto communi pro
clystere, &c.

*Alia me-
diendi me-
thodi.*

Art. 856. Si imbecillitas ægri *phlebotomie* repe-
titionem non ferat, tum post secundam vel ter-
tiam venæsectionem curatio alia methodo tentan-
da est, viz. capiat alternis diebus potionem *purga-
tivam*

vivam communem, donec convaluerit, & iisdem noctibus *paregoricum* ex *syrupo de mecon.* his minus ad votum conducentibus, *antiscorbuticis* morbi reliquæ fugandæ sunt. In juvenibus, atque iis, qui temperate vixerunt, vino non plus æquo dediti, Rheumatismus *dieta simplici* admodum refrigerante, & mediocriter nutriente, æque feliciter, ac repetitis *venæsectionibus* profligari potest, nempe *dieta ex solo sero lactis.*

Schmitzii sententia.

Art. 857. Per Rheumatismum vulgo intelliguntur dolores erratici externum corporis habitum occupantes; crebri quandoque ac leviusculi horrores adsunt; febris si quæ adsit, mitis, noctu plerumque recrudesceat. Sed, nocturna exacerbatione & contumacia *luis venereæ* cruciamina æmulatur. Lubricus est Rheumatismi in *arthritin* transitus; nam communis est utriusque morbi materia, hinc *arthritidis universalis* nonnullis appellatur.

Rheumatismus est quodammodo arthritidis universalis.

Art. 858. Commodius sudoribus solvitur. *Venæsectio* semper in hoc affectu curando est necessaria; est enim remedium *ὑπερμονιχόν*, neque sine magna sanguinis jactura & virium ruina domari potest; post *venæsectionem* *emetica* fortiora sunt propinanda, hinc *purgantia* leniora, ut pulv. *Comitiss. Vvarvicens.* &c. Partes affectæ foveantur tepide cum lapide medicamento in aq. pluviali solut.

Indicatio nes curativa.

Musgraviæ sententia.

Art. 859. In Rheumatismo ab acri sale alcalico, quam ab acido, lentorem fieri longe probabilius, *Baynardi* experimento liquet, viz. ex Rheumaticorum urina, salis alcalici ejus, quem habent sani bonaque utentes valetudine, pars quasi trigesima, nec quidem supra, distillando elicitur: unde conjicitur salem istum in sanguine retentum puita (foran adjuvante oleo, veluti in *sapæ* compositione) irretiri involvique, & ad viscidum in Rheumatismo faciendum, ad dolores & tumores

Lentor in sanguine a sale alcalico provenit.

inferendos opere quidem maximo contribuere. Serum quoque sanguinis Rheumatismo laborantium syrupo violarum admixtum viridescit, & cum mercurio sublimato albissimum deponit concretum.

Vomito-
riorum
præstan-
tia.

Art. 860. De magna efficacia vomitorii aliquoties repetiti in hoc morbo debellando dignus est, ut consulatur auctor, p. 26. Balsamo sulphuris terebinthinato artus motu privati bis die superillinantur, vel etiam vernice terebinthinat. oleum terebinthinæ & camphora sunt remedia interne & externe proficua.

Ettmulleri sententia.

Rheuma-
tismus
cum ar-
thritide
convenit.

Art. 861. Arthritis vaga scorbutica seu Rheumatismus revera cum arthritide vera convenit, accidentibus saltem variat, terminatur nunc per sudorem aut urinam aut per eruptionem cutaneam instar purpuræ relicta cutis asperitate: adfunt interdum gravissimæ præcordiorum anxietates, stis clangosa, sudores, dolores lancinantes & pungentes; imbecillitas ad motum, locorum dolentium tumores, &c. fundamentum hujus morbi est sal scorbuticum fibras vellicans.

Curatio.

Art. 862. Vomitus in principio convenit; venæsectio in principio & incremento; volatilia non debent exhiberi in principio, sed alcalica & testacea, ut etiam antimonium diaphoretic. cinnabaris antimonii, speciatim arcanum duplicatum Mynsichti; postmodum fiat accessus ad volatilia cum antiscorbuticis mixta; lumbrici terrestres sunt remedium sine pari in vino infusi, vel in fero lactis cocti, vel pulverisati, millepedes etiam commendantur. Declinante morbo conveniunt remedia ex pino vel abiete (seobs abietis in fero lactis coct.) rob. bacc. junip. sambuc. decoct. e lignis. Decoct. strobilorum pini curam fere absolvit. Externe locis dolentibus applicandi sunt lumbrici terrestres donec moriantur.

Far-

Farrago sententiarum.

Art. 863. Miasma rheumaticum quandoque cerebrum, pulmones & viscera obsidet cum dolore & ægritudine excrucians. *Boerhaave.* Partes nobiliores quandoq; obsidet.

Art. 864. Dedi nonnunquam *terebinth. Venet.* Vires terebinthi- na. $\mathfrak{z}\text{vj}$. vel $\mathfrak{z}\text{j}$. (& tantam ejus quantitatem veteres vulgo adhibebant) cum vitello ovi solut. in haustu quodam, non modo in *paralyfi*, verum in *arthriticis* & *rheumaticis* affectibus cum optimo successu, sed in hoc postremo affectu *venæsectio* debet anteire, & si opus fuerit, repeti. *Harris.*

Art. 865. Infusio *stercoris equi masculi* in vino tenui vel liquore posset. facta, ad $\mathfrak{z}\text{iv}$. vel vj . bis in die propinata est medicina in hoc affectu minime contemnenda. *Vuillis.* „ Et nunc quoniam „ de medicamentis sordidis sermo agitur, præter- „ eunda non est *urina vaccae* apud *Parisienses*, „ & etiam non ita pridem *Londinenses*, per- „ quam celebrata, non modo in rheumatismo, „ sed etiam *arthritide*, *hydrope*, *asthmate*, *ictu* „ *ro*, &c. curandis, *Memoir. de l'Academ. Vol.* „ *XI. p. 41.* Stercoris equi.

Art. 866. *Linii sylvestris* cathartici herba integra cum caulibus & capitulis vino albo leni calore infusa satis valide purgat ferrosos humores, indeque in *Rheumatismo* valde prodest; sed non nisi robustis propinanda est, quorum plurimos, ruri degentes, solo usu istius remedii curatos vidi. Non novi præstantius remedium quam *rhabarbarum* diu continuatum ad hunc morbum contumacem oppugnandum. Et si malum sit habituale, ejusdem *massicatio* non modo morbum tollit, sed etiam *recidivationem* præcavet. In corporibus languidis & emaciatis, hujus morbi diuturnitate, nec non medicamentorum farragine, fractis & dekritis, *lac asininum* cum pulveribus testaceis, vel saltem *dieta lactea* plerumque felici adjumento esse potest. Linum sylvestre. Rhabarbarum. Lac Asininum.

Art. 867. Ad rheumaticos lumborum dolores Infus. theæ lacteæ.

potum lactis cocti cum aqua decoctionis theæ & mane sumptum ad ℥j. circiter, felicissime sum expertus. *Baglivius.*

Remedia varia.

Art. 868. Remedia antiarthritica & antiscorbutica fere omnia hic conferunt, præcipue declinante morbo & in intervallis. Pil. volatil. epithema japonaceum, unguent. salino volatile, &c.

S C O R B U T U S.

Barbetti & Deckerzii sententia.

Scorbutus qualis morbus.

*Art. 869. Scorbutus est aliqualis cachexiæ species ab humore melancholico peculiariter corrupto ortus; in calidum & frigidum plerumque distinguitur; sed revera omnis provenit ab unica causa, nempe lymphæ vel pituitæ crassæ; unde tot symptomata pro temperamentorum & locorum diversitate, ex variis obstructionibus & humorum stagnationibus: Quadraginta novem diversa enumerat *Eugalenus* in suo tractatu de scorbuto; sed illa omnia nunquam concurrunt in uno eodem-*

Symptomata varia.

que corpore. Conqueruntur de dolore interdum pectoris, plerumque gravativo capitis, de cordis palpitatione, angustia, inflatione ventriculi, tensione ventris; tussunt, putant se interdum suffocari, difficulter respirant, vomunt, febricitant; appetitus prostermitur; singultu, ructibus, flatibus, convulsionibus vexantur; tremunt, lassi sunt artus, maculis rubris vel purpureis aspersi, (quæ tamen non sunt multi faciendæ, nisi degeneraverint in ulcera, vel elevatæ sint) adest plerumque oris pruritus, gingivarum erosio, cum sanguinis effusione, denarium vacillatione ac nigredine, halitus gravis, immo cum teterrimo aliquando odore; salivatio adest multa, urina cruda & tenuis, jam vero crassa & rubra, immo fere nigra; pulsus semper inæqualis, ac ut plurimum debilis; dolores vagi, imprimis crurum, præcipue noctu ingravescentes; ulcera maligna, tumores varii generis plerumque œdematosi, sudores copiosi, ipsa

sa atrophiam, viriumque defectu, caries, & sopor profundus.

Art. 870. His regionibus adeo familiaris est ut nullus fere reperiat morbus, cui non aliquid scorbuti subfit; vere & autumnus maxime infestat, in adultis & senibus gravior est; inveteratus & hæreditarius difficillime curatur; solvitur aliquando per alvum, per hæmorrhoides, vel per urinam; aliquando in alios morbos degenerat, scilicet, hydropem, atrophiam, apoplexiam, epilepsiam, stuporem, aut convulsionem; interdum Scorbutici subito moriuntur; dysenteria rarissime laborant; plerumque diarrhæa vel lienteria, quæ difficulter curantur, longo temporis tractu ægros necant hydropicos vel tabidos; respiratio difficilis non adeo periculolum est malum quam vulgo putatur. „ Scorbutus fixam habens sedem (inquit „ Vvaldschmidius) raro curatur, nisi quandoque „ palliative: impossibile enim est sanguinem totaliter corruptum ad statum naturalem reducere. „ Dieta in hoc malo est optima medicina, de qua videatur Sennertus in praxi.

Est morbus frequentissimus & diuturnus, & difficilis curationis.

Art. 871. Exactissima dieta medicamentis præstat, sine qua Scorbutus sensim fit incurabilis; venæsectio non prodest; purgantia fortiora nocent; sufficiunt suo tempore leniora; præparandi sunt humores incidentibus, inter quæ salia volatilia quæcunque primarium obtinent locum. Antiscorbutica simplicia primaria sunt, radix raphan. sylv. oxylapath. petasitid. scorzner. taraxici, zedoar. angel. polypod. helenii, lignum guaiac. sassafr. sem. sinap. fol. cochlear. becabung. nasturt. aquat. trifol. paludos. aceros. persicar. mala aurant. acidor. pom. citri, bacc. junip. sem. dauci, gum. ammoniac. lacc. crem. tart. tartar. vitriolat. chalybs, &c. Saccharum & saccharata omnia Scorbuticis nocent. „ Omnem Scorbutum (inquit Doleus) fœliciter intra xij. dies, diis faventibus, tollam „ per mercur. dulc. & revera dulcificatur singula

Curatio.

Vires mercurii dulcis.

ri & peculiari motu sublimatum, ut duntaxat
 sudorem moveat, & nullam efficiat salivatio-
 nem, cujus ope omnes scorbuti humores intra
 prædictum tempus consumuntur & educuntur,
 sed durante hac cura nihil bibendum, nisi de-
 coctum appropriatum, & ab acidis & carne
 suilla abstinendum.

Art. 872. Singulorum symptomatum curam pe-
 culiarem videre licet apud *Eugalenum*, cujus hæc
 summa est; quod omnibus *specificis* parti affectæ
Dyspnæa. dicatis admiscenda sint *antiscorbutica*. In difficili
 respiratione *sp. salis armoniac. cum tinctura croci*
& aq. cochlear. specificè prodest. (875.)

*Gingiva-
rum laxi-
tas.*

In gingivarum laxitate & putrefactione *tinctu-
ra gum. lacc. sp. cochlear. &c.* pro lotionè, item
 mistura sequens. *℥. Pulv. rad. ireos florent. gum.
lacc. ana ʒj. alum. ust. ʒj. mel. ros. q. s. sp. salis
parum pro grato acore, m.* (883. 892.)

*Dolores
vagi.*

In doloribus vagis crurum, &c. inter externa
 topica *epithema saponaceum Fulleri* maxime com-
 mendatur. (884. 894.)

*Tormina
ventris.*

In torminibus ventris convenit *sp. sal. armo-
niac. cortic. aurant. infus. cumque sp. junip. vel
sem. anisi mixtus: externe fofus, & linimentum
sp. ʒ. Ol. lumbricor. terrest. chamæm. sp. cochlear.
ana p. æ.* (877.)

Convulsio

In convulsione & contractione interne conve-
 nit *sp. sal. armoniac. cortic. aurant. salv. & rore-
marino affusus, item ol. hyperic. & cochlear. pro
inunctione tendinum.* (878. 901.)

*Erysipe-
las.*

In erysipelate (1157.) præter externa exhibean-
 tur *sudorifera*, ut *rob. sambuci, sp. ejusdem, be-
zoar. mineral. sp. sal. armoniac. cochlear. &c.*

Atrophia

In atrophia non datur præstantius remedium
 quam *lac caprillum spiritu aliquo antiscorbutico
prius ipsi instillato.* (879.)

*Scorbuti
causæ in-
signiores.*

Charletoni sententia.

Art. 873. Scorbutus in his regionibus septen-
 trio-

trionalibus est morbus *endemicus*, & maxime frequens in locis Boreæ patentibus, uliginosis, palustribus & maritimis; huc faciunt quoque insalubres ædium calce recens obductarum expirationes; & in carcerum, fornicum, speluncarumque angustiis conclusus, nec solutus syderum luce aer. Scorbuto præ aliis maxime tentantur ii, quibus alimenta sale ac fumo indurata, crassa, viscida, terrestria, nautica, atque id genus alia, quæ nec facile digeri, nec ad statum summæ fluxilitatis cito perducuntur, diutino in usu sunt; item quibus vina olygophora & spiritus ardentes sunt in deliciis, utpote ex quibus confertim scaturientes particulæ salinæ & sulphuræ sanguinem succumque nutrimentum foeda ranciditate inficiunt; adjice & illos, qui oxigari, omphacii, acetariorum, acetii, &c. ejusdem commatis condimentorum languenti per luxum stomacho male consulunt; acida quippe omnia strenue faciunt ad productionem *melancholiæ hypochondriacæ*, quæ scorbuto adeo affinis est, ut non nisi gradibus quibusdam ab eo differre videatur; sub eodem censu cadunt insalubres potus, aquæ nimirum corruptæ, crassæ, fæculentæ, graves, subsalæ, cerevisiæ, & vina vitiosa. Qui delicate vivunt magis Scorbuto obnoxii sunt, quam qui laboriose, fœminæ viris, urbani agricolis, studiosi obtusis, &c. Plures sibi Scorbutum *contagio*, quam ex aliis ullis causis forinsecus advenientibus contrahunt. „ Causa Scorbuti (inquit *Doleus*) est sal fixum acre in massâ sanguinea, in qua latent multæ particulæ vel acidæ vel muriaticæ; *acidæ* quando sanguis crassior & nigricantior apparet, *muriaticæ* vero ubi consistentia amissa tota diffluit; certum est ut-
 „ cunque Scorbutum non semper ab una aliqua
 „ singulari & simplici causa proxima ortum suum
 „ habere ac dependere, sed sæpe a multiplici: tot
 „ enim Scorbuti species seu differentiæ dici possunt, quot sunt vitiosæ sanguinis tincturæ e sa-
 „ li-

*Causa
 scorbuti
 secundum
 Doleum.*

„libus diversis (quæ propemodum infinitæ sunt)
 „ & horum diversimoda combinatione ortæ.

Remedia

ad Scor-
butum a-
cidum.

Art. 874. Acido scorbutico affectis nullum (spon-
 demus) sive præsentius, sive certius adhibueris re-
 medium, quam *lactis emulsionum ex amygd. dulc.*
decocti chinae, iusculorum consummatorum & cæ-
ter. antiacidorum & analepticorum usum ad plures
 septimanas productum.

Dyspnaa.

Art. 875. Difficilis respiratio oritur plerumque
 vel a sanguine grumescente vel ab irritatione spas-
 modica a salium stimulis; in priore casu conve-
 niunt *incidentia, spiritus & salia volatilia, vi-*
perina, finus equinus, &c. aliquando *venesectio*
 est necessaria; in posteriori casu *antispasmodica,*
spiritus castorei, lavendulae, interdum opiata.
 (872. 890.)

Diarrhaea

Art. 876. In diarrhoea Scorbutica pluribus indi-
 cationibus satisfacit rhabarbarum modice tostum,
 quo præmisso, cæteris omnibus merito præfertur
crocus martis astringens cum conserva ros. rub.
 (882.)

Tormina
ventris.

Art. 877. In torminibus ventris *lac asininum,*
caprillum, aut serum lactis vaccin. adhuc a coa-
 gulo tepidum, sunt remedia proficua: his enim
 mitigata post tormina primarumque viarum purga-
 tionem propinatis, non alvina tantum regio, sed
 totum etiam corpus perfectum *neoterisimum* con-
 sequetur; sed omnium instar sunt *aquæ minerales*
catharticae, ut Ebshamienses, harum virtus est pla-
ne admirabilis (nec minores sunt vires aquarum
Bathoniensium.) (782.)

Paraly-
sis, stupor,
&c.

Art. 878. In paralyfi, stupore, tremore, &c.
 conveniunt remedia *invigorandis corroborandisque*
cerebro & nervis appropriata cum antiscorbuticis
generosioribus conjuncta, item Balneatio in ther-
mis sulphureis (& earundem aquarum potatio.)
 (872.)

Atrophia

Art. 879. Atrophia Scorbutica partium nutrien-
 darum crimine contingit. Inter *deobstruentia* haud
 scio

scio an quicquam utilius datum sit *acidulis*, quæ facile in adyta mesenterii & glandularum sese penetrantes vias chyliferas omni ab infarctu liberant, nec tamen ullum interim relinquunt sive caloris sive acrimoniæ vestigium; locum etiam habent *lac asininum*, *caprillum*, *juscula instaurantia* ex *limacum*, *cancrorum* *astacorumve* *fluviliatilium* *carnibus*, &c, (872. 901.)

In atrophia scorbutica interdum contingunt dejectiones unguinosæ, quasi adipe vel oleo persusæ, nimirum solidarum partium colliquationes sunt: ægroti *hecticorum* more sunt tractandi, advocatis simul in subsidium *antis scorbuticis* *temperatioribus*.

Dejectiones unguinosæ.

Vuillisi sententia.

Art. 880. Scorbutus non est affectio simplex, sed potius morborum legio; secundum vulgares appellationes dicitur *biliosus* sive *calidior* exanthematis aliisque symptomatis apertioribus se prodens, vel *melantholicus*, cujus virus quasi sub cineribus latet. Dolor ventris Scorbuto adeo familiaris est, ut juxta *idioma Germanicum Scheurbuyck* exinde nomen acceperit; hoc symptoma nonnullos, in mitiori licet gradu fere continuo affligit; in quibusdam vero dolores valde acuti sunt, & tanquam affectiones *colicæ* frequenter eveniunt; paroxysmo autem diutius persistente cruciatus sæpenumero in lumbos & dorsum propagantur, cujusmodi affectioni non raro *paralypsis* succedit; ratio est, quoniam nervi lumbares, & mesenterii intime communicant, ac pluribus in locis inosculantur. Dolores etiam alibi frequenter sentiuntur, ut in capite, pectore, cruribus &c. Novi plures Scorbuticos dolore molestissimo subter *sternum* excitato perquam diu vexatos, ut in quibusdam nihil minus quam *abscessum* in mediastino latentem suspicarer. Cephalalgia sunt frequentissima & intolerabiles, & tibiæ dolores atrocissimi.

Scorbutus est morborum legio.

Art. 881. Si ægrotantis constitutio sit calidior, *Catharica & digestiva.*

aloe-

aloetica & diagridiata vitentur, & temperatiora ex *senna*, *rhabarb.* &c. exhibeantur pro cathar-
si. Inter medicamenta *digestiva* merito recensentur *crem. tartari*, *tartar. vitriolat. tinct. salis tart. elix. propriet. mixtura simplex*, &c. Tincturae cum menstruo frequenti melius ac facilius conficiuntur, quam vulgari modo; ℞. *vitriol. rectificat. ℥vj. sp. vin. alchalisat. ℥xvj. m.* & distilla in retorta vitrea cum ternis cohibitiis.

Diarrhoea.

Art. 882. Præter scorbuti curam radicalem medicus symptomatis gravioribus sublevandis subinde operam navare debet. In Diarrhœa inveterata a methodo sequenti sæpe bono cum successu usus sum; imprimis purgatio cum infuso *rhabarbari*, *aromaticis astringentibus adjectis*, instituat, & aliquoties iterata intervallo trium & quatuor dierum: cæteris diebus sumatur dosis elect. seq. bis in die. ℞. *Conserv. absynth. vulgar. ℥vj. spec. diarrhod. abbat. ℥ij. santal. alb. rub. ana ℥j. croc. mart. opt. ℥ß. syr. chalyb. q. s. m. f. elect. (876.)*

Oris vitia.

Art. 883. Quoad oris vitia, quando caro gingivarum intumescit & fungosa evadit, valet gargarisma *scorbuticum nostrum*; quando gingivæ putrescunt & corrumpuntur, medicamenta fortiora adhibeantur, imprimis infusio *lapidis medicamentosi*, & *astringentia* in dentium vacillatione. (872. 892.)

Artuum dolores.

Art. 884. In artuum doloribus sudorifera cum julap. ex *aq. cochlear.* & *sp. lumbricorum*, & *diuretica*, item *lumbrici terrestres* quocunque modo usurpati frequenter juvamen præstant; aliquando tamen *phlebotomia* convenit. „ Infusum *stercoris equi masculi*, decoct. e *lignis*, *gum. guaiac.* &c. hic locum habent. „ (872. 894.)

Scorbuti essentia.

Art. 885. Crepitus ossium medelam vix admittit. „ Nec mirandum; nam ex eadaverum sectionibus patet *epiphyses ab ossium extremitatibus se-
„ jungi & penitus separari*; unde sonum crepitantis inter movendunt edunt. *Memoir. de l'Acad. Vol. III. p. 238.*

Pirca.

Pitcairni sententia.

Art. 886. Scorbutus est congeries plurium morborum natura diversorum. Ut febris est vitium sanguinis, sive omnium *excernendorum*, intra arterias dum fluunt, ita Scorbutus est vitium omnium aut multorum simul *excretorum*, dum per excretoria fluunt sua; vel est defectus aut augmentum in excretoriis canalibus. Pulsus in omnibus Scorbuticis est tardus (inter signa *pathognomonica*) ideoque generaliter *nasturtia* & *antiscurbutica* dicta profunt; quia talia remedia pulsui frequentiam conciliant.

*Scorbuti
Essentia.*

Art. 887. Scorbuti cura optime eruitur resolvendo ipsum in symptomata, quibus constat, quorum remedia sunt nota.

Curatio.

Art. 888. Pro maculis in Scorbuto exhibe *anti-icterica*; nam maculae istae sunt lividae & fere nigrae, ut in ictero nigrae. (893.)

Maculae

Etmulleri sententia.

Art. 889. Prae aliis *Belgae* & *Angli* Scorbuto sunt obnoxii, urina plerumque est nimis flammea, vel cum arenulis istis rufis impregnata, in summitate vari-colorata instar caudae pavonis; jejuno stomacho frequens est ptyalismus. Sequentia ceu signa primaria Scorbuti recenset *Lindanus*, colorem purpureum semilunarem sub concavo oculorum apparentem, cruentationem gingivarum, foetorem oris, maculas in femoribus & tibiis, vacillationem genuum, phlogosin & exastuationem per totum corpus.

*Signa
Scorbuti
primaria.*

Art. 890. Maxime observatu dignum est prognosticon *Sennerti* de Scorbuto: Respirationis (inquit) difficultas & pectoris angustia periculosum est malum, ob quam si medicus & adstantes suum officium non faciant, saepe aegri *syncope* praeter expectationem intereunt; sin vero fortior natura morbum diutius tolerare possit, plerumque in *hydro-*

*Respira-
tio diffici-
lis.*

dropem incidunt, præcipue ii, qui purgantibus fortioribus subinde uti solent. Scorbutus calidus difficilioris est curationis quam frigidus; imprimis Scorbutus cum diarrhœa est periculosissimus, inquit *Eugalenus*. 872. 875.)

Curatio.

Art. 891. Basis curandi mali hypocondriaci & Scorbuti est vomitus in majori dosi; purgantia fortiora nocent, laxantia conveniunt; alvus enim, semper servanda est aperta: de usu *martialium* notabilis est cautela *Tachenii*; in iis, quibus viscera tumida & infarcta jam ad schirrhosam naturam degenerant, minus proficua. *Acetum* est nocivum, non tamen succi acidi vegetabilium & fructuum. *Lac* & omnia lacticia in Scorbuto, præmissis universalibus, quamdiu stomachus adhuc dirigendo aliquid valet, sunt optima. *Mercurialia* sunt vitanda ob metum salivationis, *antimonialia* potius sunt eligenda. Ad curam conducunt *martialia* omnia, præmissis digestivis & vomitoriis, ut *sal digestivum hypochondriacum* (i. e. caput mortuum *sp. salis armoniac.* per solutionem, chrystalifactionem &c. factum) *tartarus vitriolatus*, *sal. absynthii* (*pulv. hyster. Batean.*) *antihelic.* *Poterii*, *bezoar. min.* *elixir. proprietat.* &c. Præmissis ita digestivis, propinandum est vomitorium, inter quæ eminent *antimonialia*, *tart. emetic.* dos. a gr. iv. ad vi. & postea per alvum laxantia, inter quæ *gum. ammoniacum*, *extract. bellebor. nigr. rhabarbarum*, *mercur. dulcis* (sed parce.) Demum accessus fiat ad *martialia* & acidulas naturales, amara, & stomachica, arcanum duplicatum *Mynsicht*. *Antiscorbutica* specifica sunt, *cochlearia*, *nasturt. flammul. Jovis*, *trifolium palustre*, *radix raphani*, *oxylapath. bardan. ari.*, *sem. sinap. abies*, *junip. chin. chin. sarsaparilla*, *sasaffr. cort. Vinteran. citri*, *aurant. sp. cochlear. rob. sambuci juniperi*, *sp. sal. armoniac.* & *sal. volat. ejusdem.*

Specificæ.

Gingivarum laxitas.

Art. 892. In gingivarum pathematis succus *salvia*, *cochlearia*, *rorismarini*, *gam. laec. myrrh. alum.*

alum. utramque faciunt paginam, cui addi potest *cremor aquæ calcis supernatans.* (872. 883.)

Art. 893. Maculæ cutaneæ sunt semper bonum *Macula* signum malæ causæ foras erumpentis; interne conveniunt *diaphoretica, antihectic.* *Poterii, cinnab. antimon. tinct. coral. &c.* item *decoctum summit. pini* expectando sudorem.

Art. 894. Ad dolores crurum interne *sudorifera decoct. e lignis, &c.* Externe *sp. junip. camphorat. item sal. armoniac. in sp. lumbricorum solut. Balneum quoque ex formicis earumque cubile est egregium.* 872. 884.) *Dolores crurum.*

Art. 895. „ Est & colica quædam Scorbutica „ (inquit *Vvaldschmidius*) ubi ægri queruntur de „ intenso dolore circa lumbos, & non in intesti- *Colica scorbutica.* „ nis, sed in musculis abdominis; ibi mesenterium „ afficitur, & causa morbifica hæret in plexibus „ nervorum succo nutritio depravato, sæpe ter- „ minatur in paralyfin, & cessante paralyfi redit „ dolor consuetus. Conveniunt *antiscorbutica & Colica & nephritis.* „ *nervina, diuretica, sudorifera, &c.* „ Ad colicam & nephritin. notham *ol. amygd. dulc. in jussculo gallinaceo, item spermaceti, & opiata cum catharticis, clysmata terebinth. stomachica & carminativa.* } 906.) De arthritide vaga Scorbutica vide infra.

Art. 900. Ad cephalalgiam *sal volatile succini, cinnab. antimonii, & usus lactis.*

Art. 901. Paralysis Scorbutica, ut & convulsiones & contracturæ curantur *vomitariis, anti-paralypticis, & antispasmodicis cum antiscorbuticis permistis.* (872. 878.) *Capitis dolor. Paralysis. &c.*

Art. 902. Febris Scorbuticæ signa sunt omnia ea, quæ per se Scorbutum significant; palmarium interim notetur signum, quod in febre hac adsint notabilia circa appetitum vitia, v. g. adest nimius, ut plurimum autem cum vomitu, aut depravatus, ut ad omnis generis falsa appetitus feratur, obstructions alvi contumaces, &c. *Febris scorbutica.*

Art.

Curatio : *Art. 903.* Febres hæ curantur, ut aliæ, adhibitis etiam *antiscorbuticis*, *arcanum duplicatum* est optimum remedium, & *sp. sal. armoniac.*

Farrago sententiarum.

Sydenhami sententia de scorbuto. *Art. 904.* Scorbutus non ita frequens est morbus, ac vulgo putatur; nam multi ex iis affectibus, qui Scorbutici audiunt, sunt vel effecta morborum fientium, vel reliquie nondum perfecte devictorum, quod facile probatur exemplo *arthritidis*, *podagræ*, atque *hydropis*: rebus ita se habentibus, methodus medendi non adulterinis illis symptomatis, sed ipso morbo, qualisnam is demum fuerit, ceu perfecte formato, jamque actu existenti accommodanda est. *Sydenham.* videatur locus *m. p. 307.*

Vires limonum & aurant.

Art. 905. Succus limonum aurantiumve sunt *antiscorbutica* nunquam satis laudanda. „ Peritissimi, inquit *Piso*, nonnulli *Indiæ* medicastri plus „ præsidii in limonibus ponunt, quam in *lapid. bezoart.* aut *theriaca* contra malignos morbos, „ & pestilenciales febres atque ipsa venena: Ego „ autem sine jactantia affirmo, me ex nullo alio „ aliquo remedio simplici tot felices effectus in „ tota praxi mea observasse, quam ex limonibus. *Lister.*

Stranguria.

Art. 906. Sabulum rutilum tartareum in urinis Scorbuticorum excerni solitum nephritidem spuriam sæpius inducit, quatenus angulis acutis ejusdem atomi gaudent (quod patet ex adhæensione ejus tam firma matulæ lateribus, ut non nisi vi inde ablui possit) quibus partes nervosas vellicant, & tormenta ipsis nephriticis graviora excitant, unde quoque sæpius in Stranguriam inducunt, in quo casu omnia *diuretica* calidiora malum exasperant, *sp. salis dulcis* tamen hic multum præstat. *Ephem. German. Anno 30. obs. 44. (895.)*

Remedia varia.

Art. 907. Usus remediorum sequentium peritus non ignorat. *Æthiops mineral.* *aqua limacum* *Scorbut.* *aq. omnium florum*, *aq. raphan. comp.* *aq. scelo-*

scelotyrbica, cerevisia Scorbatica, cerevisia Scorbatica attemperans, epithema de calce, expressio Scorbatica calida, expressio Scorbatica temperata, fons podagricus, fons spirituosus, galbanetum Sennetti, gargarisma contra fœtorem, gargarism. myrrhyssatum 1. 2. Gargarisma prunellorum, mistura ecephratica, pil. cathartic. Scorbatic. serum sinapi-num, succi antiscorbatici 1. 2. tinctura cantharid. 1. 2. tinctur. gum. lacca, tinctura antimonii, tinct. virginiana, pulv. ari comp. vinum viperinum, vitriolum Martis.

A R T H R I T I S.

Sydenhami sententia.

*Art. 908. Podagra, exeunte Januario aut incipiente Februario, derepente & nulla fere præsensione antecedente ingruit, nisi quod ventriculi cruditate, aut aepsia ad septimanas aliquot æger laboraverit; corporis interim intumescencia quasi ventosa & gravitate; quæ indies augetur donec tandem detonet paroxysmus; quem paucis diebus præit torpor & quasi flatuum descensus per femorum carnes cum affectione *αρασμοειδῆ*, tum etiam pridie paroxysmi appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanus lecto somnoque committitur, hora vero secunda post mediam noctem excitatur a dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque vero calcaneum, suram aut talum: hic dolor eum refert, qui ossium dictorum dislocationem comitatur, cum sensu quasi aquæ tantum non frigida partis affectæ membranæ affusæ. Mox sequitur rigor cum horrore & febricitatione aliquali. Dolor autem hic primo remissior gradatim intenditur (pari passu rigor & horror recedunt) idque in singulis horis donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad varietatem ossiculorum *tarsi* & *metatarsi*, quorum ligamenta obsidet, perbelle accommodans; nunc tensionem violentam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc morsum canis rodentis quan-*

*Podagre
historia
accurata.*

doque pressuram & coarctationem exprimens: ad hæc, ita vivum exquisitumque habet sensum pars affecta, ut nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubiculi a fortiori ambulatione concussionem ferre valeat; hinc mille conamina, situs tum ipsius corporis, tum membri affecti mutatione assidua, doloris sedationem incassum exambit; quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam (decurso scilicet *nycthemeri* spatio a primo appulsu paroxysmi); quo tempore æger post materiæ peccantis modicam digestionem & diffusionem aliqualem, subito a dolore respirat. Jam leni madore perfusus somno concedit, a quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam tumore recenter occupatam cernit. Intra paucos dies alter pes eodem dolore torquetur, easdemque excitat tragoedias; nonnunquam etiam ambos pedes in initio occupat; postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi abnormes sunt, tum quoad tempus invasionis, tum etiam quoad durationem; hoc tamen ubique servant, quod dolor noctu recrudescat, mane vero remittatur; atque ex serie horum paroxysmulorum constat paroxysmus, qui dicitur podagræ, diuturnior breviorve pro ægri ætate, &c. quod in vegetioribus, & iis, quos podagra rarius invisit, diebus sæpe quatuordecim fit; in senioribus, atque iis, quos sæpius afflixit, duobus mensibus; iis vero qui aliquot annis podagrici fuerunt, non prius valedicit, quam ætas adultior eam fugaverit.

Paroxysmi progressus & terminatio.

Art. 909. Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, quæ post separationem sedimentum rubrum, & quasi arenulis refertum deponit; nec æger ut plurimum nisi tertiam potulentorum quæ assumpsit partem per vesicam reddit, alvus item ad dictos fere primos dies constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, partium etiam non affectarum gravitas

vitas & molesta sensatio integrum paroxysmum comitantur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritus vix ferendus, maxime inter digitos, unde decidunt furfures, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur.

Art. 910. Atque hoc modo se habet podagra regularis, cum vero vel indebita medicatione turbetur, vel diuturnior invaserit, jam per annos aliquot, phænomena sunt multum diversa a jam descriptis; jam manus, carpos, cubitos, aliasque regiones occupat; quandoque digitos distorquens, motu paulatim privans, tandemque concretiones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam vel oculos cancrorum æmulantes; nonnunquam in cubitis tumorem subalbum ciet, fere ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur; nonnunquam femur occupans, sensum exhibet, quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili; at genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger fere undequaque contractos & impeditos, ita ut claudicet, & permolle prorepat.

Symptoma
morbi post
annos aliquot
insestantis.

Art. 911. Animadvertendum est, quod ubi quis ad multos annos podagra laboraverit, dolor singulis paroxysmis gradatim imminuitur, tandemque ægritudine potius afficitur, quam dolore; dolor & ægritudo quasi alternatim laceffit; DOLOR IN HOC MORBO EST AMARISSIMUM NATURÆ PHARMACUM, qui, quo vehementior est, eo citius præterlabitur paroxysmus, atque insuper & longior erit intermissio, & magis perfecta, & vice versa.

In morbo
inveterato
minuitur
dolor &
auctur
ægritudo.

Art. 912. In podagricis quamvis qui educitur sanguis pleuritico & rheumatismo laborantium sanguinem ut plurimum referat; attamen venæsectio haud minus insigniter in hoc morbo officere ægro, quam in duobus prædictis prodesse cernitur; catharsis etiam iustissimis de causis damnatur. Tam in hoc, quam in aliis morbis quibus-

Neque
venæsectio
neque
catharsis
nec
prodest.

cunque, dempta sola peste, sudores prolicere non tam medici quam naturæ provincia est; ideoque curatio medicamentis *diaphoreticis* incassum tentatur.

Unde difficilis est curatu.

Art. 913. In hoc morbo curando duæ sunt causæ principales præcipue spectandæ, prima est *causa antecedens*, viz. humorum indigestio a caloris & spirituum defectu orta, altera est *causa continens*. viz. humorum calor & exæstuatio; hæ duæ toto cœlo discrepant, atque hinc quæ huic profint remedia alteri obfint, unde hic affectus tam difficilis est curatu.

Præcipua indicatio curativa.

Art. 914. Quæ *ventriculum roborant & concoctionem* adjuvant, medicamenta *digestiva* appellata, intentioni adimplendæ conferunt; hujusmodi sunt *radix anglic. enul. campan. & antiscorbutica*, e medicamentis vulgo cognitis *theriaca Andromachi* concoctionibus roborandis præ cæteris confert. Inter simplicia *cortex Peruvianus* primas obtinet, cum sanguinem corroboret vegetumque reddat, si ejus grana aliquot mane & sero assumantur. Medicamenta *digestiva* modo laudata præcipue in paroxysmorum intervallis, idque longissime a paroxysmo insecuturo in usum revocanda sunt majori cum fructu. Liquor sequens, utpote qui gustu ac colore jucundo est, authori maxime arridet; ℞. *Rad. sarsaparil. ℥vj. chin. lign. sassafr. ras. C. C. ana ℥ii. glycyrrhiz. ℥j.* coq. in aq. font. cong. ij. per hor. dimid. deinde stent clausæ super ciner. calid. per hor. 12. postea ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, cum primum ab igne amoveantur, infund. *sem. anis. ℥ss.* post hor. ij. coletur liquor & per residentiam depuretur, &c.

Tophi.

Art. 915. Tollere nodosam nescit medicina podagram; exercitatio tamen *tophorum* generationem præscindit, & etiam generatos & induratos solvit: si cuivis innotesceret medicamentum, quod & celare vellet, æque efficax in hoc morbo, ut

chro.

chronicis plerisque, ac est *equitatio* constans & assidua, opes ille exinde amplissimas facile accumulare posset. (931.)

Art. 916. In debilitate & languore ventriculi aut ventris torminibus neque *vinum gallicum rubrum* vel *theriaca Andromachi*, neque aliud quodlibet e *cardiacis* mihi hactenus notis pares habet vires, ac *vinum Canariensis* haustulus subinde deglutitus languore atque ægritudine urgentibus. Languores.

Art. 917. Sin autem gravius aliquod symptoma ex retrocessu materiæ podagricæ subito ingruat, & mortem ægro minitetur, neque vino neque exercitio supra laudatis fidendum est, verum modo non caput, at partes vel naturales vel vitales ejusmodi malum impetat, ad *laudanum* cum *cardiacis* permistis statim confugiendum. Signum *retrocessionis* materiæ Arthriticæ, est ægritudo ingens cum vomitione & aliqualis ventris colore; in hoc casu congium unum *liquoris* posset. vel alicujus istiusmodi devoro, & cum totum per vomitionem rejecerim, tum ebibo haustum *vin. Canarin.* cum *laudan. liquid.* gt. xviii. in lecto ad quietem me componens. *Schedul. monit. p.* (120. 934.) Arthritis retrocessio.

Art. 918. Ad diarrhœam, si *laudano* non obtemperet, unicum remedium est, ut *sudor* provocetur methodo & medicamentis huic destinatis; quod si fiat ad biduum triduumve per duas tresve horas continuas, sistetur ut plurimum diarrhœa, & morbi fomes magna vi in artus detonabit. (937.) Diarrhœa.

Art. 919. Metastasis materiæ peccantis in pulmonum lobos pari modo tractanda est, quo peripneumonia absoluta, viz. *venesectione*, &c. (941.) Peripneumonia.

Art. 920. Si podagricis superveniat *nephritis* (quod sæpissime accidit) posthabitis aliis bibat æger magna copia *liquor. posset.* cui *radix* (& *fol. alth. & malv.*) incoct. sunt. Et injiciatur *enema*, & postremo exhibeatur *laudani* dosis grandior. (938.) Nephritis.

*Therapia
radicalis
adhuc de-
sideratur.*

Art. 921. *Therapia radicalis* podagræ adhuc in *Democriti* puteo latet: neque temere curanda est arthritis; quid enim est nisi naturæ providentia ad depurandum senum sanguinem, atque expurgandum corporis profundum? ut cum *Hippocrate* loquamur.

Listeri sententia.

Arthritidis causa.

Art. 922. Ductus humori pituitoso in artubus excernendo dicati, aliquo modo labefactati, i. e. vel laxati ab improbo aliquo exercitio, maxime a cibo, ex nimia Venere, a qua tot motus articulorum convulsivi, ex frequenti usu vini, &c. quibus iidem ductus vehementer resolvuntur; vel ex naturali quadam imbecillitate, qua contractioni impares sunt; vel obstructi ex aliqua longa hæmorrhagia; ex crapula & otio, humor ille ex crudo jam & lento sero confectus, in ductibus articulorum excretoriis, moram trahendo, facile putredinem & acrimoniam concipit, & ichorosus tandem fit; ipsa denique ossa rodendo, illa in tophos dissolvere potis est; quod satis constat ex ossibus cariosis vermiculato quodam opere profunde insculptis. Unde primum atrox dolor, nempe a continua distensione & dilatatione ductuum, a corrumpente humore, ex nativa autem partium istarum conformatione dolor acerbior evadit: atque hinc illi sensus strictionis infinitæ, compressionis, ponderis, caloris urentis, lancinationis, punitionum, rosionum, ut humor putrescens in angustis & vix dilatabilibus ductibus impactus viam sibi faciat.

Ad dolorem & sitim in arthritide laborantibus.

Art. 923. Ad dolorem mitigandum (923.) sequens cataplasma præscripti; ℞. *Mic. panis sili-ginei ex lacte coct. ℥ij. croci ℥ss. aloes succotrin. ad pulv. sicc. & friabilem ustulat. ℥iij. ol. lilior. q. s. m. f. cataplasma. &c.* alio paroxysmo atroci *Em-plast. viride glyconis* apud *Scribonium Largum* descriptum adhibui non minori cum successu; ℞. *Æris ust. ærugin. ana ℥vj. sal. gem. gum. ammoniac.*

niac. thur. ana ℥ss. aristol. rotund. ℥j. alum. ℥ss. myrrh. galban. aloë. ana ℥j. ceræ ℥ij. terebinth. chie ℥iss. ol. ℥bj. m. f. s. a. empl. Decursu morbi ad sitim leniendam convenit hujusmodi *aq. limac. ad ℥vj. ter in die; 24. Cochlear. hortens. NM. ℥j. lact. recent. ℥xij. caute distillantur evitando empyreuma ad medias. Sing. ℥bj. adde succ. limon. matur. ℥ss. sacchar. cand. q. s.*

Art. 924. Unica illa aurea regula de abstinentia mihi certe maxime arridet; nempe ut iis, quibus aut integra sanitas, aut longiora valetudinis bonæ intervalla cordi sunt, **PARVA CIBATIO SUMMÆ CURÆ SIT:** atque hoc omnibus hominibus, quocunque statu & conditione sint cum ipsius quoque **EXERCITII** loco esse potest, etiam *pedibus ex toto captis.*

Ettmulleri sententia.

Art. 925. Arthritis fere per paroxysmos affligere solet, extra quos, nisi in inveterato malo, satis commode habent ægri; quoties imminet paroxysmus, alvus fere segnior evadit, ægri molestiam quandam haud bene explicabilem circa præcordia sentiunt, consuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur, & circa articulos tensio percipitur, hinc dolor pungens, lacerans & pulsans, interdum ardens in Arthritide *calida* dicta, in hac symptomata sunt acriora, sed breviores sunt paroxysmi; in *frigida* tumor plus minus oedematofus, nec nisi post longum tempus evanescebat; in incremento paroxysmi conqueruntur ægri de æstu circa regionem stomachi, hinc sitis, & appetitus prostratus. Hæc fere ipsa symptomata in dolore *ischiadico* occurrunt; si crebrius redeant paroxysmi, & vehementius affligant, insigniter debilitantur articuli. *Bacchus dicitur pater, Venus mater, & Ira obsterix Arthritidis.*

Art. 930. Ingruente podagra convenit vomitus, & forsan blanda purgatio, quæ omnino vitanda est in statu morbi. *Opiata* nunquam fere

Quantum valet abstinentia.

Signa arthritidis appropinquantis & Symptomata præsentis.

Qualia remedia utiliter usurpantur.

sunt proficua, malum contumacius reddunt, & motum naturæ impediunt. Optime conducunt *fixa acida absorbentia, volatilia, &c.* *Venæsectio* minus convenit, nisi in *ischiadico* dolore, in principio paroxysmi, decoctum *e lignis*. *Spiritus cochlear. trifolium palustre, &c.* laudantur. *Topica*, non nisi præmissis universalibus, locum habent, *narcotica* fugienda sunt; symptomata adiuncta sunt considerata, ardor, dolor, tumor, &c. *Topica* non nisi in statu morbi sunt applicanda; laudantur *sp. lumbricorum cum camphora, sale armoniaco, &c. sp. theriacalis camphorat. misturæ ex calce viv. & sal. armoniac. affundatur sp. vini, & huic distillato adde camphoram, & sic optimum habetur specificum in inflammationibus podagræ* *Flores sambuci* in lacte cocti dolorem leniunt. *Caro bubula* sine pinguedine mane & sero mutata dolorem compescit, & omnibus præfertur; item *stercus bubulum cum urina humana putrefacta*, in qua *calx viva* extincta est; *sapo Venetus in spiritu vini solutus* cum additione *olei juniperi & petrolei* insigne facit unguentum.

Ischias.

Art. 931. Vesicatoria in malo *ischiadico* multum conducunt. Ad tophos (912.) *caseus vetus & putridus* cum decoct. *suilla* est proficuus. In malo *ischiadico* omnibus encomiis dignum est *Poterii emplastr. de pice sulphuratum; ℥ss. Pic. naval. ℥iv. terebinth. ven. ℥ss. mastich. succin. ana ℥ij. sulphur. commun. ℥ss. m. f. empl.*

Pitcairni sententia.

*Pitcair-
nii me-
thodus.*

Art. 932. In Arthritide nihil ages urgendo *pharmaca purgantia; vomitoria* profunt, post illa *mercurius* sensim datus. Parti dolenti (923.) applicare licet *balsamum Guidonis*, aut lintea liquore sequenti madentia; ℥ss. *Aq. font. fervent. ℔viiij. arsenic. alb. vel flav. ℥ij. calcis viv. ℥vj. digere per hor. 24. lento igne.* (Sed de ejus usu incidit mihi suspicio.) Si dolor accedat in ventriculo, utere *N.M. condit. pulv. rad. sarsparil. cort. Peruv. cl.*

cinna-

cinnamom. zinzib. condit. &c. Proderit etiam in podagra decoct. sequens ℥. *Vin. alb. vel cerevis. ℥viii. lact. fervent. ℥iv. ablato coagulo immitte bacc. oxyacanth. ℥j. coq. per hor. dimid. bibat æger ℥j. mane & vesperi.*

Musgravii sententia.

Art. 933. Sedes Arthritidis propria & exoptatissima est in artubus, non in trunco corporis; posteriori autem casu, non priori mortem minatur: „ quid agendum sit, brevi comprehenditur „ in divini *Hippocratis* effato, nimirum, revelanda ea, quæ quo non oportet, repunt: sin autem, quo convenit, iis viam sternere oportet, ut singula eo vergant. „ Quando recessus fiat miasmatis Arthritici in partem aliquam internam, morbum istius partis adeo exquisite imitatur, ut de existentia ipsius minime constaret, nisi Arthritis regularis præcesserit.

Sedes arthritidis propria in artubus

Art. 934. Medendi indicatio generalis est, ut Arthritide anomala pars affecta quam citissime, quam tutissime levetur; accurate itaque perpenso morbi genio, juxta partem, quam occupat, & factis necessariis *evacuationibus*, optime felicissimeque curatio perficitur per materiæ in artus translationem; hoc enim est ipsum naturæ propositum. Medicamenta huic intentioni inservientia interna, expellentia dicta, plerumque *cardiaca*, quæ satis nota sunt; ad extrudendam autem Arthritidem nihil potentius aut efficacius invenitur quam *chalybs nutritus* (præparationem vide sis apud auctorem.) Topica, quæ Arthritidem artubus invitant, sunt emplastra ex *gum. caran. vel oxycroc. vel cephalic. cum pice Burgund. dimidio vel triente*, vel *ceratum viride vulgo Hatcase*, & si vires ægri ferant, & res in dubio versetur, *Phœnigmus* seq. ℥. *Ferment. vet. partes ij. sem. sinap. rad. raphan. sylv. allii, cacumin. rut. sim. columbin. ana part. j. contunde cum aceto vin. alb. q. s. Oredige ad spissitudinem cataplasmat. (917.)*

Indicatio generalis in arthritide anomala.

Art. 935. Si Arthritis ventriculum occupet, ibiq;

Arthritis

com-

*in ventri-
culo.*

commoretur, indicatur lene emeticum ex decocto fol. theæ viridis, vel cardui benedicti, vel ex sale vi-
trioli; & finita operatione, paregoricum; convenit
etiam interdum catharsis, & demum Arthritis in
artus omni vi depellenda est, ut ante ostensum est.

*Colica ar-
thritica.*

*Nota be-
ne.*

Art. 936. In colica Arthritica propinari debet ca-
tharticum huic morbo idoneum, & tunc podagram
expellentibus, una cum anticolicis, utendum est; fo-
tus etiam & linimenta suum habent locum; sed (quod
maximi est momenti) probe animadvertendum est,
& recordandum, quod vana & frustra arthritidis
regularis in artubus excitanda sit spes omnis, quam-
diu intestina fuerint immunda, fecibusque onerata.

*Diarr-
hæa.*

Art. 937. In diarrhœa vel dysenteria arthritica
laudano sensim cohibendus est fluxus, & postea ex-
pellendus est cum cautela inimicus. (918.)

*Nephri-
tis.*

Art. 938. In paroxysmo arthritico & nephritico
simul paregorica sunt necessaria: adeps cuniculi ex-
terne inunct. dolorem mirifice lenit ex senis calcu-
losi experimento. (920.)

Asthma.

Art. 939. In asthmate arthritico cura varie insti-
tuenda est pro diversitate morbi vel siccæ vel humi-
dæ; arthritis (si fieri possit) in artubus excitanda
est; interim inspirandi difficultatibus omnium ma-
xime certissimeque inflationem mirum in modum
cicurat compescitque potio Coffee.

Angina.

Art. 940. In angina arthritica plurimum valet se-
quens gargarisma; ℞. Aq. hord. ℥j. diamor. ℥iij.
sp. sulphur. per campan. quantum lingua ferre poterit.
m. nihil vero pulvere sequenti præstantius efficacius-
ve novi: ℞. Crystal. mineral. sacchar. crystal. ana
p. æ. misce, teneatur in ore ℥j. donec saliva abunda-
verit, tunc expuatur, & repetatur frequentissime,
mirum quantum hinc salivæ, &c. (942.)

*Pleuritis
peripneu-
monia,
&c.*

Art. 941. „ In pleuritide, peripneumonia &
„ angina arthritica non novi præstantius reme-
„ dium, quam infusum vel decoctum stercoris
„ equini; est etenim medicamentum non modo
„ iis affectibus primario proficuum, sed etiam
„ arthri-

„ arthritidis in artus expulso fortissimus; exper-
tus loquor. „ (919.)

Art. 942. Arthritis caput petens, varios ac peri- *Arthritis*
culosos producit affectus, cephalalgiam, vertiginem, *caput pe-*
apoplexiam, convulsiones, paralyfin, &c. in his af- *tens.*
fectibus cerebrum quam citissime allevetur *evacua-*
tione, revulsione, & in artus amandatione; in hujusmo-
di casibus ægrotantium pedes in *aquam fontan. servi-*
dam immitti curo, ibidemque ad tempus detineri,
unde capiti juvamen præsentaneum obtinetur.

Art. 943. „ Si doctissimum auctorem inspicere haud *Consulen-*
graveris, ille tibi plura amplissime suppeditabit *duz est*
de arthritidis anomalæ ætiologia & curatione. *author.*

Farrago sententiarum.

Art. 944. Omnia remedia calculosis & podagri- *Tempe-*
eis præscripta inutilia propemodum erunt, nisi vi- *rantia.*
num, *venus, otium, & crapula* temperantius u-
surpentur. *Baglivius.*

Art. 945. Novi quosdam insigne levamen accepis- *Dieta la-*
se ex *dieta lactea* per tres aut quatuor menses sine *tea.*
ullo alio alimento: alios vero ex *lactis* usu deterius
habuisse, viscerum obstructions contraxisse; ideo-
que sine prudentis medici consilio utrum conve-
niat, necne, haud temere ineatur. *Vvillis.*

Art. 946. Cum ego olim articulorum doloribus
vexarer (inquit *Sennertus*) & varios de ea re au-
thores legerem, in eo omnes consentire animad-
verti, in arthritidis curatione, plus spei in *bona*
dieta, quam in medicamentis ponendum esse.!

Art. 947. Summarium præscripti celeberrimi
D. B. — pro Nobili quodam Anglicano ad *ar-*
thritidem eradicandam hujusmodi fuit.

-- Lac novum cum duplici aqua commista repudia-
tis aliis quotcunque liquoribus solummodo ad po-
tandum concedendum est; utcunque tamen *coffee &*
thea modica quantitate interdum permittenda sunt,
his vero sorbitionibus lac semper conjungendum est.
Mane cum primum expergiscaris, coctionibus ple-
ne ac perfecte absolutis, libram aquæ fontanæ bi-
bas,

bas, suadeo; & deinde elapsis duabus horis ad jentaculum accedas; cui sufficiat lac coctum addito exiguo pane, jusculum avenaceum, cum vel sine lacte; interdum *coffee*, *thea*, vel *chocolata* cum lacte temperata, panis butyratus, &c. Prandio nihil edendum est, nisi ex avenis, hordeo, oryza vel seminibus millii paratum fuerit, radices dauci vel raparum, spinachia, fabæ vel pisæ, &c. admitti possunt in victum; quinetiam fructibus vesci, cum maturi sint, non interdico; pyra vel mala furno cocta inter edilia minime contemnenda recensentur; sed præ reliquis panem biscoctum cum lacte commendo; aliquando sed rarius de piscibus non salitis modicum comedere licebit. Acida & salsa vitanda sunt. Cœna sit lac & panis. Hora 9. vespertina vel citius cubitum eundum est. Somno indulgeas; quanto enim plus somni capis eo melius tibi cessurum est. Frictio sicca artuum mane & vesperi repetita plurimum valet: Humores enim dissipat & nodorum ac tophorum generationem prohibet: Exercitium inter primaria auxilia pono, equitatio licet potior sit quam curru vehi, ambo tamen utilia sunt, & in eorum frequenti usu esse debes. Inter exercendum solummodo caveas, ne aeri frigido ac humido te ipsum nimium exponas. Si denique his non obstantibus arthritis insultum faciat, & cum vehementia desæverit, quod vix credibile est, interdum dosin laudani exhiberi, parca licet manu & non nisi premente necessitate, concedimus. Transitus a communi vivendi more ad hoc vitæ genus est tutissimus, neque est quod extimescas a subitanea mutatione; sed hoc semel instituto in eo usque ad vitæ terminum persistendum est: nam reditus ad luxum, & liberam vivendi consuetudinem periculo haud vacaret. Arthritis hæreditaria perinde ac adventitia huic regimini cedit: labes etenim morbi in gremio sanguinis latitat, & in utroque genere hujusmodi victu facillime exterminabitur. Amplexibus venereis ne nimis obedientem te geras, concubitus illicitos omnino fugias, &c.

Art.

Art. 948. Perquam celebre fuit præscriptum le- Reme-
dium ce-
lebre.
quens aliquando apud Londinenses: ℞. Rad. turbi-
th. hermodact. jalap. tartar. vitriolat. ana gr. xv. m.
f. pulv. in haust. vin. alb. sumendus singulis mensibus.

In eundem etiam usum electuarius caryocostinum a
quibusdam valde prædicatur. Ast omnium vomitus
podagræ est prophylacticum præstantissimum, qui
potest provocari emeticorum ope in insigni humo-
rum colluvie, ubi juncturæ admodum laxæ, & mor-
bus præ foribus est. Atqui Podagricus est vir sui arbi-
trii, præceptis medicis non auscultat, sed genio in
valetudinis incommodum plerumque indulget.

Art. 949. Ad nauseam ventriculi in hoc morbo Ad nau-
seam
ventricu-
li.
frequentem non datur præstantius remedium quam
vinum Canariense radice zedoaria medicatum. Tin-
ctura corallii specificum audit.

Art. 950. Singularis est ista clarissimi Verulamii
methodus. ℞. Mic. panis albissim. ℥iij. coq. in lacte
recent. Sub finem add. flor. ros. rub. ℥ss. croc. ℥ss. ol.
ros. ℥j. m. f. cataplasma parti affectæ applicand. sub-
tepide; post horas tres amoveatur, & usurpetur fo-
tus sequens per horæ quadrantem cum coccineo pan-
no vel lana ejusdem coloris: ℞. Fol. salviæ mß. rad.
cicut. ℥vj. brion. ℥ss. fol. ros. rub. p. ij. coq. in aq. font.
in qua chalybs candens sæpius extinctus fuerit ℔. iv.
ad ℔ij. colaturæ add. sal. marin. mß. statim post usum
fotus applicetur emplast. diacalcit. cum ol. ros. mala-
xat. Baconis hist. nat., In podagra unicum commen-

„ damus topicum (inquit Dolæus); repellentia vero Topicum
singulare
Dolæi.
„ in hoc affectu non magni facimus, quia inde plus
„ damni quam commodi experti sumus. Sequens
„ vero pro arcano hic in solatium podagricorum
„ communicare voluimus, quod nunquam te fru-
„ strabit effectum, modo in tempore adhibeas; mil-
„ le enim experientiis est comprobatum, quod extra-
„ hat dolores podagricos non repellendo eosdem,
„ sed morbificam materiam extrahendo, resolvendo,
„ & discutiendo. Quandoquidem primordia sunt ut
„ plurimum ab aciditate hostili, ad corporis ambi-

„ tum

„ tum delata, & artus molestante; unde podagræ
 „ character digestionem afficit. ℞. Confect. hamech.
 „ ℥j. pulv. jalap. ℥ss. extract. trifol. fibrin. ℥ij. lixarg.
 „ aur. ℥vj. sapa antimon. ℥ss. sacchar. canth. ℥vj. ol.
 „ olivar. q. s. cere & picis parum f. s. a. emplastrum,
 „ quod imponatur artubus dolorificis quamvis in-
 „ flammatis, & relinquant, donec dolores & hu-
 „ mores evanuerint, quod mire præstat.

Remedia
 varia.

Art. 951. Remedia sequentia interdum pro re na-
 ta in usum adduci possunt; allium conditum, aq. om-
 nium florum, aurum mosaicum, balsamum Rhame-
 lii, cinnab. antimonii, electuarium caryocostinum,
 empl. pleuriticum, empl. smecticum, epithema sapo-
 naceum, expressio millepedum. Flores salis armonia-
 ci martiati, fons podagricus, gum. guaiac. mistura
 balsamica nephritica, rob. Sambuci fere specificum.

I S C H I A S.

Cælii Aureliani sententia.

Accurata
 morbi hi-
 storia.

Art. 952. Dolor Ischiadicus nunc ex manifestis,
 nunc ex occultis causis generatur, ut susceptione fri-
 goris, terrena cubatione, casu aut repentino per-
 cussu, vel luxatione, venere immodica, vel mor-
 bo aliquo prægresso. Adest primo membri affecti
 gravedo & difficilis motus cum levi torpore ac for-
 micatione, in quibusdam cum vehementi, pungen-
 ti, ac fervido dolore, & ad sensum patientis tan-
 quam serpentis convoluti motu; interdum etiam a-
 dest febris, ut se in lecto continere non valeant æ-
 grotantes; dolor in vertebro sentitur, dehinc in ar-
 ticationes partium vicinarum penetrans, ad po-
 plitem pertingens atque suram, dehinc etiam ad ta-
 lum, & pedis summitatem: progressu temporis fit
 cruris totius extenuatio cum debilitate, & ejusdem
 abbreviatio, & miserrima claudicatio, quidam am-
 bulant, capitibus digitorum gradientes, alii an-
 trorsum, alii extrorsum, &c. Loci principaliter af-
 fecti sunt periosteum & musculorum capita sive in-
 fertiones; aliquando in abscessum tendit. Si quis ve-
 lit, consulat authorem de curatione.

Art.

Art. 953. „ Methodus medendi hunc morbum satis contumacem D. Cheynei ex suggestione præclari Pitcarnii sic se habet. Sumat æger provium sufficientia & ventriculi tolerantia *spiritus æther. terebinth. a 3j. ad 3ij. vel 3ß. cum triplici quantitate mellis purissimi quotidie mane jejuno ventriculo ad 4. 6. vel ad summum 8. vices superbibendo haust. ij. vel iij. ser. lact. cum vin. Canarien. alterati*. Intermitti potest ad diem unam aut alteram, si nauseam pariat; diebus, quibus spiritum assumpserit, hora decubitus capiat dosin *Pil. Matthæi*. Spiritus Æthereus est iste, qui in distillatione inter spiritum & oleum prodit. Hæc methodus doloris vehementiam (inquit author) infallibiliter aufert manente solummodo artus quadam debilitate. Et ut reliquæ penitus elimantur exhibenda est dosis *florum sulpharis* in lacte ad tempus bis in die.

Farrago sententiarum.

Art. 954. Si alia non proficiant, ad *causticum* deveniendum est; ipse uti soleo *foliis ranunculi* vel mixtura *calcis vivæ & saponis liquid.* hæc summo pere confert. *Baglivius*. Folia ranunculi (inquit *Ettmullerus*) contusa & regioni lumbari applicata per 6. horas, donec vesicas excitent, quæ discussæ pro more suo emittunt serum acre, Ischiadicum dolorem penitus tollunt & morbum subigunt, p. 630. Applicatio *foliorum ranunculi flammei minoris* facta fuit paulo infra genu a circumforaneo quodam ut ipse observavi plusquam triginta abhinc annis cum successu mirabili: Ego quoque plus semel idem experimentum compertum habui.

Causticum.

Art. 955. Radix Brion. alb. recens tusa & cum ol. sem. lini mixta & loco dolenti tepide applicata mirum in modum dolorem pacat; & renovandus est labor, donec tota materia morbifica transfudetur. *Tachenius de morborum principiis*. Laudatur empl. *Poterii* (931.) „ Emplastrum sequens in præxi expertus sum. *℞. Pic. burgund. q. s. malaxetur*

„ cum

„ cum q. s. ol. sem. sinap. per expressionem. Em-
 „ plastrum Ischiat. quoque applicari potest.

Colocyn-
 this.

Art. 960. Colocynthis clysteribus indita privatim
 coxendicum doloribus prodest. Lister. Interna ea-
 dem ac in podagra.

L U E S V E N E R E A.

Ettmulleri sententia.

Lues Ve-
 nerea.

Sympto-
 mata
 varia.

Art. 961. Innotuit hic morbus Europaeis non ni-
 si circa annum 1493. Controvertitur, an veteribus
 cognitus fuerit, necne. Primo post impurum coi-
 tum plerumque exoriuntur, inflammatio præputii
 & tumor, urinæ ardor, gonorrhœa, bubones in
 inguinibus, pustulæ variæ in pene & aliis partibus,
 atque hinc ulcera sordida & maligna, cancrofa &
 callosa, progressu temporis etiam ossa corrodentia,
 dolores atrocissimi noctu exacerbantes, nodi, to-
 phi, calor in volis manuum & plantis pedum, at-
 que hinc fissuræ & excoriationes, verrucæ, condy-
 lomata, &c. circa anum pilorum defluvium, macu-
 læ rubescentes, flavescentes, aut livescentes. In-
 flammatio testium, raucedo, uvulæ relaxatio & ero-
 sio, palati ulcus, ozæna, tinnitus aurium, surditas
 cæcitas, scabies, tabes, &c. Sed hæc symptomata
 omnia non cuivis contingunt; non raro sub larva
scorbati & *arthritidis* latitat. Ægri ut plurimum rem
 cum infectis se habuisse constanter negant.

Morbus
 varie in-
 cipit.

Art. 962. Paulo post congressum impurum circa
 penem aut vulvam æstus exoritur, aut ardor urinæ,
 hinc inter biduum aut triduum gonorrhœa; inter-
 dum nulla succedit gonorrhœa; sed virus per cu-
 tem potius ad inguina fertur, & bubones excitat;
 contingunt etiam quandoque ulcera callosa in scro-
 to ac perinæo; interdum ulcus cancrosum ac callo-
 sum inter præputium & glandem; in quibusdam in-
 tumescunt testes. Sanguis missus in lue inveterata
 fere maculis lividis aut colore quasi cœrulescente in
 superficie conspici solet. „ In lue confirmata (ut re-
 „ cte observavit Lommius) erumpunt maculæ fre-
 „ quentes, æque more lentiginis exiguæ, alias ru-
 „ bræ

Macula
 ac pustu-
 la.

bræ, alias flavæ; in fronte quoque & temporibus
& pone aures, maxime circa radices capillorum,
dein in capite, vel etiam universo corpore, mali-
gnæ pustulæ, tumoresque non unius coloris efflo-
rescunt, quæ sponte sanantur, iterumque passim ex-
pullulant: pustulæ modo flavæ, modo rubræ sunt,
rotundæ omnes, siccæ, puris expertes, & aridam
crustam habent; ex his deinde in ambitum serpen-
tibus pustulis, cutemque cavantibus, ulcus oritur
virulentum & sordidum.

Art. 963. Galli facilius salivant & citius curantur
quam Germani. Inter sudorifera eminent guaiacum
& sarsaparilla & regula semper observanda est in fri-
gidis guaiacum, calidis sarsaparilla; decoctis sudo-
riferis non incommode addatur antimonium crudum.
In inunctione mercuriali tutius procedunt qui ar-
tuum flexuras, inguina & alas sufficienter fricant;
abdomen, pectus, & caput non inungenda, aut
rarissime.

Curatio
generalis.

Art. 964. In gonorrhœa effluit humor cum acer-
bo dolore a locis circa penis radicem, ubi sunt pro-
statæ, primo seminalis aquosus liquor, qui hinc suc-
cessive flavescit, tum magis acrescit, tandem viride-
scit, aut coerulescit, non raro graviter foetet; urina
cum acerbis dolore mittitur; supervenit tumor præ-
putii & glandis, & ulcuscula, interdum carunculæ in
urethra. Præter cathartica mercurialia convenit pri-
vatim emulsio ex sem. cannabis viridis parata, os se-
piæ, terebinthina, saccharum Saturni, &c. multum
laudatur mercurius præcipitatus viridis, & mercur.
dulc. balsam. Saturni terebinthinatum, ex sacchar.
Saturni & ol. terebinth. blando igne paratum, egre-
gie conducit, ubi ardor nimius circa renes & geni-
talia, ut & camphora; item infusum cantharidum in
vino, quod expertum est remedium medici cujusdam
Belgæ. ℞. Pulv. cantharid. ℥j. infund. in vin. Rhe-
nan. ℥iij. vel iv. infusum stet per aliquot dies in loco te-
pido, & postea filtretur liquor, usus tempore miscean-
tur coch. vj. vij. vel viij. cum cantharo vini, &c. Resina

Gonor-
rhœa.

Curatio.

ligni guaiaci, balsam. de Capaibe, specificum habetur, antimonium diaphoretic. bezoardic. minerale, aqua simplex in qua argentum vivum incoctum fuerit. Injectio. ℞. Aq. calc. viv. ℥iv. mercur. dulc. ʒss. sacchar. Saturn. ʒj. m. pro injectione. Usurpetur liquor per residentiam depuratus (980. 126.)

Digressio de Gonorrhœis non virulentis.

Gonorrhœa vera non virulenta.

Art. 965. Gonorrhœa vera est, in qua semen verum effluit. Succus citri, granator. limon. &c. sunt remedia optima, venerem extinguunt, præcipue si camphora & terebin. in usum adhibeantur, ut & emulsio cum sem. cannabin. sacch. Saturn. os sepia (specificum) cum ceruss. antimonii, balsam. capiv. extract. rad. tormentil. vel ejus decoct. Lenis purgatio cum bolo mercuriali, & die sequent. rhubarb. externe fodus astringentes, &c.

Gonorrhœa.

Art. 966. Gonorrhœa notha, benigna dicta, non virulenta, est quando materia, non semen verum continuo effluit ex pene citra tentiginem aut pruritum venereum, diu durans sine multa virium prostratione, flori albo mulierum respondens; gonorrhœa catarrhalis vocari solet. Partes affectæ sunt glandulæ prostaticæ, nimis laxæ vel exulceratæ.

Curatio.

Art. 967. Cura debet institui generalis, digestio rectificanda, stomachus roborandus, cruditas corrigenda, pars affecta astringentibus firmanda. Est affectus catarrhalis; rosmarinus decoct. e lignis acida profunt; interdum a scorbuto pendet. Non nimis cito supprimenda est hæc gonorrhœa. Ad majorem cautelam aperiendus est fonticulus in crure.

Ulceræ glandis &c.

Art. 968. Ulcuscula glandis & præputii curantur cum unguento diapomphol. & mercurio dulci; si fuerint canerosa & callosa in usum venit solutio mercurii sublimat. corrosiv. in aq. plantag. Si præputium insigniter tumet, & inflammatur, applicetur solutio sacchar. Saturn. in aq. calcis, item camphora in ol. amygd. dulc. soluta. (984.)

Ulceræ vagina.

Art. 969. In mulieribus exulcerantur partes internæ vaginæ, & saniem plorant plus minus parulentam

tam

tam ac lividam, cum insigni dolore ac molestia; nec multa diversam a virorum postulant medelam.

Art. 970. Pro pustulis & tuberculis lac virginale. *Pustulae.*

Art. 971. Ad ulcera sananda *unguent. basil. cum mercur. dulc.* (968. 982.) *Ulcer.*

Art. 972. Ulcera oris & palati curantur cum gargarism. ex decoct. lign. cum melle ros. & pauco alumine. Ozæna decoct. emol. hord. alth. &c. primo tractanda est ad removendam crustam, & postea decoct. elignis, &c. tanquam palati ulcera. Omnia hæc ulcera sub litu mercuriali sponte evanescent, nec metuenda sunt ulcera oris; nam per salivationem citius sanantur. *Oris & palati ulcera. Ozæna.*

Art. 973. Bubonum suppurationi & apertioni pro elicienda virulentia, mature opera danda est, interne sudorifera exhibenda sunt, externe suppurantia, quin & cucurbitæ, &, si secundum votum haud succedant, aperiantur, lanceola profundius intrusa. (99.1) *Bubones*

Art. 974. Lues venerea contagiosa est, generatione, lactatione, contrectatione, saliva, sudore, liquido genitali, exhalatione; & qua parte contrahitur, primo se manifestare solet. Boerhaave. *Quot modis contagium propagatur.*

Sydenhami sententia.

Art. 975. Lues confirmata non nisi per salivationem ab hydrargyro excitatam extirpari potest; ad hanc autem recta licet procedere, sine ulla præcedente evacuatione aut corporis præparatione. Unguentum præscribere soleo ex axung. porcin. ℥ij. argenti vivi ℥j. cum hujusce parte tertia brachia, crura, tibias ad tres noctes continuas manibus suis ægrum perungere permitto, ita tamen ut nec axillas, neque inguina neque abdomen attingat uspiam. Post tertiam inunctionem gingivæ ut plurimum intumescunt, & ptyalismus suboritur; si vero intra id tempus haud procedat, tum turbit. mineral. gr. viij. in conserv. ros. rub. exhibeantur ægro, quod remedium vomitum ciet, & ptyalismum suscitabit; & postea si salivatio jam incepta prius elanguescat, quam sym-

Methodus salivandi.

ptomata penitus disparuerint, extimulanda est subinde cum dosi *mercur. dulc.* Diætam quod spectat & reliquum ægri regimen, eadem prorsus, ac in catharsi, imperanda sunt.

*Quid
agendum
sit, quan-
do ptyali-
smus ex-
citari non
possit.*

Art. 976. In quibusdam reperitur *idiosyncrasia* peculiaris tam salivationis respectu, quam purgationis, ita ut methodus laudata vix gingivarum exulcerationem queat efficere, multo minus ptyalismum movere; in huiusmodi ægris cavendum est medico, ne importunius urgeat, recalcitrante natura, & horrenda symptomata accersat; lente itaque festinet & moras trahat *mercur. dulc.* ℞j. semel in septimana exhibendo, & quantumvis salivatio ad plenum nunquam assurgat, æger tamen copiosius quam pro more solito expuet, & foetor justæ salivationis comes aderit; atque hac methodo morbus expugnabitur concesso debito temporis spatio. His rite peractis (etiamsi morbus penitus profligari videatur) quo minus recidivam postliminio patiatur æger, (utcumque bene se habeat) capiat *mercur. dulc.* ℞j. semel in septimana ad 4. vel 6. vices. ,, Unguenta mercurialia minore quantitate, quam ad *excitandum ptyalismum* sufficiat, inuncta, & diutius continuata, ,, universa Lues venereæ symptomata tollere & morbum penitus eradicare a quibusdam perhibetur.

Listeri sententia.

*Origo
luis vene-
reæ.*

Art. 977. Lues venerea est morbus contagiosus ab humore aliquo venenato, fere in coitu contractus ulceribus doloribusque se manifestans. Ab *insulis Americanis*, in quibus, ante *Hispanorum* adventum, hic affectus populariter grassatus est, illum per *Hispanos* in *Europam* allatum esse, nullus jam dubitat: Credibile est a serpentino genere vel morsu vel cibo assumpto illum ortum esse. A serpente aut scorpione percussos coitu levare produnt; verum foeminas venere ea lædi authore *Plinio*, magnum argumentum originis Luis Venereæ ab aliquo insecto venenato. Ictus serpentum omnium malorum pessimum, ideo lui vener. comparandum. Quis adeo dubitet istam

istam luem ex animalibus ortam esse: nam penis ab istis moribus venenatis vehementer intenditur; & *satyriasi*, id est, furore & libidine perciti nihil præter coitum anhelant. Ita quod vulneratis remedium, foeminis calamitas est; & a foeminis sic infectis invicem mares conflictantur in posterorum diram perniciem. (*de humoribus*, p. 417.)

Art. 978. Foemina gravissimo urinæ ardore & puncti-
onibus ibidem, item condylomatis cancris in pudendi labiis, non sine vehementi capitis dolore afflicta est; illam purgavi 4^{to}. quoque die pillulis de duobus, quibus æqua pars mercur. dulc. adjecta est; apozema ex guaiaco, &c. fuit pro potu ordinario, citra sudorem. Sumpsit etiam bis quotidie cochlear. tinct. sequent. in decoct. guaiaci ℥iv. ʒi. Cochin. ℥iij. cantharid. ʒj. vin. Rhenan. ℔j. digere in B. M. & f. tinctur. Horum usu gonorrhœa admodum virulenta, foetidum & sanguineo-viride pus effundens, integre sublata est, & duobus plus minus mensibus sine ulla ope chirurgica etiam ulcera siccata sunt, dolorque capitis ex toto desit.

Art. 579. In doloribus nocturnis, præmissis universalibus pulvis sequens est maxime proficuus; ʒi. Cochin. ʒj. off. sepia subtilissime lavigat. ʒss. m. dos. ʒij. 6^{ta} quaque hora cum decoct. valid. Guaiac. Guaiacum hydrargyri, ut hydrargyrus veneni, in lue antidotum est.

Pitcairni sententia.

Art. 980. In principio gonorrhœæ virulentæ purgandum est cum ptisana laxante ex sen. sal. tart. stor. melilot. & bibat æger serum lactis; post tres quatuorve dies purgationi insumptos, si ardor urinæ & fluxus sint minores, & color & consistentia meliores, bolum assumat ex terebinth. & rheo per 6. aut 7. dies, si alvum laxat, id fieri solet cum euphoria. Vitanda omnino sunt astringentia; gonorrhœa enim nunquam evadet in Luem Vener. nisi nimis intempestive sistatur. Pitcairn. in MS. (964. 987.)

Art. 981. Methodus therapeutica Pitcairni radicalis

Y 3

Methodus
therapeu-
tica.

Curatio.

Doloras
nocturni.

Gonorr-
hœæ cu-
ratio.

Methodus
therapeu-
tica.

calis sic se habet; post vomitum bis aut ter iteratum exhibeatur *mercurius* per aliquot dies, bis in die; cum os inceperit dolere, abstineat se a *mercurio* per tres aut quatuor dies, tum *purgetur* alternis diebus; oris dolore cessante, iteretur usus *mercurii*; & iteretur hæc methodus, donec symptomata cessarint.

Art. 982. Ad ulcera & eruptiones leprosas *decoctum* pro lotionem, *unguentum*, *aqua cosmetica*, & *cervisia guaiacana*, tanquam remedia maxime efficacia, ab authore laudantur. (968 971.)

Harrisii sententia.

*Infantes
quomodo
curantur*

Art. 983. Infantes a nutricibus lactantibus infecti, quanquam maculis, pustulis, ulceribusque scament, quandoque & nocturnis illis doloribus erunt excruciat, facillime omnium restituuntur. *Farina sarsaparilla* fere insipida, saltem nullo gustu ingrato, panatellis aut pulticulis suis, ut patet, commista, addito etiam, ventriculi gratia, *santalini* polline, *cathartici* debitis intercalatis, tenerimæ ætati, ut læte nonnunquam observavi, salutem perfectam reddidit.

Blegnei sententia.

*Ulceras
pœnis &
præputii.*

Art. 984. Pro ulceribus penis & præputii curandis apprime valet sequens lotio; *℥i. Vitriol. alb. ℥ij. auripigment. alumin. nigr. ana ℥j.* comburantur in crucibulo, ut in lapidem coeant; *℥. Pul. prædict. ℥j. aq. calc. vin. alb. ana ℔j.* f. solutio, &c. Egregie etiam conducit lotio sequens *Lanfranci*, maxime in ulceribus glandis & præputii; *℥. Vin. alb. ℔j. aq. ros. plantag. ana ℥ij. auripigment. ℥ij. aris virid. ℥j. myrrh. aloë. ana ℥j.* misce. Ulceribus satis deterfis medicamentum affusa aqua lenius fieri debet pro futuro; & postremo cura cum *lact. virgin. vel aqua divina Fernellii* (1147.) (*℥. Alumin. rupei ℥iv. coq. in aq. font. ℔ij. ad tertias*; tum *℥. Lithar. auri ℔ss. vin. alb. ℔ss. decoquantur ad ℔j. colentur*, ambæque aquæ commisceantur, & agitentur, donec albescant) perficienda est. Si vero ulcera fuerint duriora, adeo ut callosa & cancroso evaserint, vul-

*Ulceras
callosas.*

go *Shankers* appellata, applicanda sunt remedia valde penetrantia, qualia *mercur. precip. rub. lapis infernalis*, *aq. phagedænica*. Notandum tamen cum primum ex usu horum crustæ inducantur, statim amovenda esse *escharotica*, & *suppurantia* ac *digestiva* adhibenda, quibus crusta sublata, ulcera tandem cum *unguent. Devigonis* sananda esse (vid. etiam, p. 102.) internis remediis interim non neglectis.

Art. 985. Accidunt interdum tumores genitalium *bedematosi* sive *crystallini*: remedia externa hoc in casu debent esse *exsiccantia*, *discutientia*, & aliquatenus *astringentia*; talia sunt *spirit. vin. camphorat.* *aq. calc. cum sal. armoniac.* *sp. vin. cum sapone nigro*, *pauco pipere*, *zinzib.* & *alum. ust.* si adsint simul ulcera *cancerosa* & tumores *duri*, præcavenda est *gangrena*.

Tumores
bedematosi
si genitalium.

Art. 986. De *phimosis*, *paraphimosis*, & *amputatione penis* consulatur author, p. 112. &c.

Phimosis
&c.
Gonorrhœa.

Art. 987. Cura rationalis *gonorrhœæ* inchoanda est cum *leni cathartico*, alternis diebus ex *cassia decoct.* *senn.* & *crystal. mineral.* in sero lact. decoct. *tamarind.* & *alth.* & *rhabarb.* (*gonorrhœa* prope *occlusa*) interim exhibenda sunt quoque *diuretica* maxime *terebinthinata*, & postremo *leviter astringentia*, *aq. minerales*, *troc. mart. astring.* in *aq. simpliciei* coct. *tinct. rosar.* *tinct. coral.* in *coch.* *syr. ejusdem* vel *cydon.* *Ptyalismus* nunquam tollit *gonorrhœam*. (*Pil. de certa Palmarii.* *Tinctura cantharid.*

Art. 988. *Ardor urinæ* *emulsionibus* & *ptisana* seq. ℥℥. *Rad. alth.* ℥vj. *mal. v.* ℥j. *sol. acetos.* p.ß. *hord. mundat.* *sem. papav. alb. ana* ℥ij. *coq. in aq. font.* ℔x. *ad tertias*, sub finem addendo *glycyrrhiz. ras.* ℥j. f. *ptisana* mihi in frequenti usu, mitigari & tolli potest: interdum in graviore casu *venæsectio* est necessaria; ut in *urinæ suppressione*, *femicupium*; ℥℥. *Rad.* & *fol. alth. rad.* & *fol. mal. rud. fœnicul. apii, petroselin. eryng. marin. ana* ℥ij. (*rad. raparum* ℔ij.) *herb. paretar. violar. veronic. flor. cham. melilot. genist. sambuc. ana* ℔j. *sem. fenugr. lin. ana* ℥j. *petroselin. anis.*

Ardor urinæ.

nif. fenic. genist. ana ℥ij. coq. in q. s. aq. font. pro semicupio.

**Tumores
testiculo-
rum.**

Art. 989. In tumoribus inflammatoriis testiculo-
rum & scroti convenit *venæsectio*; *topica discutien-
tia*, & *dolorem mitigantia* sunt usurpanda.

**Caruncu-
la in urè-
trha.**

Art. 990. Carunculæ in urethra sunt curatu dif-
ficillimæ; remedium sequens optimum perhibetur;
*℥. Pulv. alumin. ust. ℥j. præcipit. rub. auripigment.
æris virid. ana ℥ss. unguent. desicc. rub. ℥j. coq. ad
consistentiam mediam inter unguent. & empl. hu-
jus portiuncula cereoli summitati apponatur, & in
urethram intrudatur, &c. de consumendis carun-
culis vide locum p. 177. &c. & consulantur alii scri-
ptores Chirurgici.*

Bubones.

Art. 991. Bubones quoque pacto sunt suppurandi,
interne conducunt *cardiaca*, *alexipharmaca*, *vi-
etus & potus generosus*; externe *suppurantia potentio-
ra*, *emplastra*, potius *cataplasmata*; cum *cucurbita*
semel vel bis in die attrahendi sunt, & cum sint sa-
tis maturi cum caustico aperiri debent, potius quam
lanceola, & aperti diutius sunt servandi. (973.) Ex
erudito & eleganti tractatu Chirurgi *Galleci D.
Blegny.*

P.S. In hoc morbo tractando *D. Turneri Syphilidis*
epitomen exhibere in animo habui; sed defuit mihi
otium; ideoque ad ipsum tractatum præstantissimum
remittendus est lector, & simul admonendus com-
mentationes præclarissimi *Boerhaavii* de hoc mor-
bo ut consulat. Ibi habemus novam morbi ideam,
novam theoriam a medicæ artis antistite, ne ora-
culo dicam, traditam, & novam medendi metho-
dum, saltem aliquid in hunc finem candide & mo-
deste propositum, *pæce nostratis D. Turneri*, qui
etiam de facultate bene meruit. O Fortunati ter &
amplius juvenes nobis senescentibus propemodum
invidendi, qui sub tanto *Gamaliel* vel in ipso pa-
vimento super mattas sedentes felicitatem habetis
vos ipsos pulverizare pulvere pedum illius summi
scientiæ promicondi!

Finis Partis Primæ.

SYNOPSIS

UNIVERSÆ
MEDICINÆ PRACTICÆ:

SIVE,

DOCTISSIMORUM VIRO RUM

DE MORBIS

Eorumque Causis ac Remediis Judicia.

~~ACCESSERUNT NUNC DEMUM~~

Casus nonnulli oppido rari.

PARS SECUNDA.

AUTHORE

J. ALLEN, M. D.

EDITIO NOVA VENETA,
ad tertiam LONDINENSEM prioribus, triente plus,
auctiorem, exacta, additis præterea FORMULIS re-
mediorum ex quinta AMSTELODAMENSI desumptis.

*Τῆς αὐτῆς διανοίας ἐστὶ γινῶναι τὰ ὁρθῶς εἰρημένα.
Ἰπποκράτ. περὶ διαίτης.*



VENETIIS, MDCCXLVIII.

Apud LAURENTIUM BASILIUM.

SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.

2 Y N O P S I S

U N I V E R S A

M E D I C I N E P R A C T I C E

D O C T R I N E

D E M O R B I S

F O R M A T I O N E S

A C C E S S I B I L I T A T E

E T

P A R T I C U L A R

A U T H O R

J. A L L E N M. D.

E D I T I O N O V A

E T

E T

T H I S

E T

V E N I E T I S

A D

E T



C A P. X.

Sive Fasciculus Morborum decimus.

P L I C A P O L O N I C A.

Boneti sententia.

Art. 992.



PL I C A capillorum morbus *Plica in*
est *Polonis*, plerumque *Polonia*
endemius, tam maribus quam *endemia;*
foeminis, imo pueris & in *alibi co-*
fantibus; item in aliis re- *gnita.*

gionibus, ut in *Helvetia*, *Alsatia*, & *Belgii* par-
te ad *Rhenum*, ac in *Hungaria* cognitus, at non
tam frequens. In *Hungaria* interdum animalia
hoc morbo infestari, praesertim equos, testatur
Sennertus.

Art. 993. Est autem plica affectus capillorum *Morbus*
gravis, malignus, & periculosus, in quo capilli *gravissi-*
capitis indissolubili implicatione, & agglutinatione
ne, seu inviscatione contorquentur, cum gravif-
sima totius corporis artuumque tam superiorum,
quam inferiorum capitique laesione, antequam
capilli complicantur, magno dolore, sudore ple-
rumque concomitante.

Art. 994. Praecisio capillorum intempestiva in *Incurabi-*
sic affectis est admodum periculosa. „ Nulla cer- *lis.*
„ ta & appropriata remedia hujus morbi hacte-
„ nus inventa sunt, quae illum perfecte sanare vel
„ penitus extirpare valent; & quoniam in his re-
„ gionibus nusquam invenitur, supervacuum erit
„ de illo diutius expatiari.

T I N E A.

Turneri sententia.

Tinea.

Definitio
morbi.Ejusdem
gradus
varii.Ratio no-
minis.

Curatio.

Art. 995. Sahafati seu tinea ; Angli sonant a *Scall d' Head*. Hujus affectus tres species ab authoribus numerantur, viz. *tinea sicca*, *humida*, & *lupinosa*, quæ revera sunt tantum varii gradus ejusdem affectus ; sed prætermisiss hisce divisionibus minus necessariis morbus definiri potest ; ulcuscula manantia capitibus infantum exorta a vitioso, corrosivo, aut salino humore, glandulas cutaneas exedente, quæ tractu temporis texturam earum destruunt, & deprædantur. In primo gradu velamine albido, sicco, furfuraceo, aut squamoso caput obducitur. In secundo gradu caro subjacens granulata apparet, ad instar seminum in ficibus transversim sectis. Gradus tertius est ulcerosus, sicut *achores* & *favi*. Nomen desumitur a *vermiculo tinea* ob similitudinem foraminum, quæ ab isto animali in chartis & vestimentis effodiuntur.

Art. 996. Ad amovendam incrustationem fots & unguentum sequentia ab *Ambrosio Pareo* laudantur ; ʒ. *Rad. alib. lapath. acut. acetos.* ana q. s. coque in *lixivio tenui*, cui addatur modicum *aceti* pro fotu bis in die usurpand. unguentum conficitur ex *foliis nasturtii hortensis* cum *axungia porcina* contusis vel frixis ; quod 24. horis opus absolvet ; ad radicalem autem curam hujusce mali contumacissimi recte perficiendam consulatur author, qui de eo pulchre scripsit, & optima remedia ex probatissimis scriptoribus cum judicio accumulavit. „ Sed negotium adhuc abbreviare possumus : Experientia etenim edoctus sum hunc „ affectum sola *Pisselæi Indici* inunctione (amota prius incrustatione, ut ante dictum fuit) tuto ac cito sanari posse.

TRA-

TRACTATUS DE OCULORUM MORBIS
cognoscendis & curandis.

Art. 997. Oculum nobilissimum totius corporis organon (quod emphasi quadam *lux corporis* *Subjecti dignitas.* appellatur) curam medicorum præcipuam mereri damnum illud ingens , quod a cæcitate patimur , testatur.

Series Morborum Ocularium (primariorum saltem , quibus reliqui referri possunt) a scriptoribus passim recensitorum in ordinem redacta.

Nomenclatura Morborum.

Morbi vel vitia palpebra- rum. N. XVI.	{	<i>Art. 998.</i> Emphysema , Tumor flatulentus.	999
		Pladrosis , Tuberculum lividum .	1000
		Acrochordon , verruca .	1001
		Psorophthalmia , lippitudo pruriginosa .	1003
		Xerophthalmia , lippitudo arida .	1005
		Sclerophthalmia , lippitudo dura .	1007
		Scleriasis , lippitudo schirrosa , livida .	1008
		Tracoma , asperitas interna .	1009
		Trichiasis , pilorum vitium .	1011
		Madorosis , defluvium pilorum .	1012
		Anchyloblepharon , coalescentia palpebrarum .	1013
		Lagophthalmia , superior palpebra iusto brevior .	1014
		Atoniatonblepharon , defectus quoad motum .	1016
		Hippos , oculi nictatio .	1017
		Ectropium , inversio palpebræ inferioris .	1018
		Phthiriasis , pediculatio .	1020

Oph-

	Ophthalmia, inflammatio oculi.	1021
	Oedema, tumor cedematosus.	1033
	Hypopyon, fanies sub cornea.	1036
	Phlyctænæ, pustulæ miliares.	1037
	Anthracosis, carbunculus oculi.	1039
	Synchysis, humorum confusio.	1040
Morbi	Pterigium, unguis oculi.	1041
Tunica-	Proptosis, ruptura corneæ.	1045
rum &	Rhexis, ruptura tunicarum cum hu-	
Humo-	morum effluxu.	1047
rum N.	Oule, cicatrix, leucoma, &c.	1049
xiv.	Hyposphagma, Suggillatio.	1052
	Hypochyma, suffusio, vel catara-	
	cta.	1054
	Glaucoma, mutatio humoris chrystal-	
	lini in glaucum colorem.	1062
	Epiphora, catarrhus oculi.	1064
	Proptois, exitus oculi fere ex orbi-	
	ta.	1069
	Atrophia, tabes oculi.	1073
	Midriasis, pupillæ dilatatio.	1071
Morbi ac	Meiopsis, pupillæ angustia.	1072
vitia reli-	Plege, oculorum vulnera & contusio-	
qua in	nes.	1073
prioribus	Elcos, ulcus oculi.	1074
classibus	Paralysis, musculorum resolutio.	1078
minus	Strabismus, oculorum distortio.	
compre-		1079
hensa. N.	Encanehis, excrementia carnosae.	1018
xv.	Anchilops, ægilops, & fistula lacry-	
	malis.	1083
	Amblyopia, hebetudo visus.	1085
	Amaurosis, gutta serena.	1088
	Myopia, propinqua visio.	1093
	Presbytia, affectus priori contrarius.	
		1094
	Nyctalopia vitium duplex infra viden-	
	dum.	1095

Emphysema.

Art. 999. Emphysema sive oculi inflatio est Tumor *Emphy-*
flatulentus palpebrarum citra coloris muta- *fema.*
 tionem subito accidens : in corporibus cachecti-
 cis & scorbuticis est affectus levioris momenti.
 (vid. Emphysema 1298.)

Pladrosis.

Art. 1000. Pladrosis, *sarcomatis* quodammo- *Pladro-*
 do species, morum ob similitudinem vocata, est *sis.*
 tuberculum lividum in palpebris nascens, non in
 margine, sed frequentius in medio cilia superioris,
 doloris expers ; est Tumor in *cista* conten-
 tus, sicut Atheroma, steatoma, & meliceris, quæ
 in palpebris etiam quandoque accidunt. Hi Tu-
 mores extirpatu haud difficiles sunt. (vid. Art.
 1304.)

Acrochordon.

Art. 1001. Acrochordon, sive *verruca* oculi la- *Acrochor-*
 tiori sensu pro excrecentia præternaturali acce- *don.*
 pta, est vitium multifarium, viz. 1. *Hydatis* in *Hydatis.*
 superiori palpebra quæ est excrecentia substantiæ
 pinguis, infantibus maxime familiaris, quæ in
 majorem molem quam reliquæ, accrescere solet,
 unde tota palpebra quandoque oedematosa fit ; si
 sit recens & parva sæpe sponte evanescit, vel me-
 dicamentis facile curatur. 2. *Crithe* seu *Hordeo-* *Crithe.*
lum, quod est tuberculum in summa palpebra or-
 tum, prope cilia, quod *grano hordei* simile est,
 unde nomen mutuatur : Foveatur cera alba, vel
 adipe Gallinæ, vel saliva jejuni, vel corpore mu-
 sci abjecto capite fricetur, vel sanguine columbæ
 vel perducis. Si omnia frustra, sectione opus est.
 3. *Chalazion* seu *Grando*, quæ ab Hordeolo pa- *Grando.*
 rum aut nihil differt, nisi forma externa, & for-
 san

Tophus. *Tophus*, cum materia verruca contenta ad crete vel lapidis substantiam accedat.

Curatio. *Art. 1002.* Hæc omnia Tubercula in cistis continentur, & ut plurimum operatione manuali extirpanda sunt: nihilominus vero recordandum est, has operationes, utcumque leviores videantur, non sine cautela, temere suscipiendas esse.

Psorophthalmia.

Psorophthalmia. *Art. 1003.* „ *Psorophthalmia* sive *Lippitudo pruriginosa* est morbus palpebrarum *Psoræ* in re-
„ liquo corpore non multum absimilis, ab acri &
„ mordaci humore proveniente, palpebrarum mar-
„ gines leviter inflammante, quandoque in tu-
„ berculis minimis erumpente, alias farinacea
„ vel pruriginosa scabie incrustante.

Curatio. *Art. 1004.* Est malum contumacissimum & curatu difficillimum, præcipue si fuerit inveteratum.
„ Ut curatio regularis instituat, imprimis mit-
„ tendus est sanguis, & deinde exhibendæ sunt
„ doses aliquot calomelanos alternis vel tertiis
„ noctibus; & bibendæ sunt aquæ minerales ca-
„ tharticæ singulis auroris, quales sunt *Ebesha-*
„ *menes* & nostrates *Alfordenses*, *Lidfordenses*
„ vel *Holtenses*. „ Interim foveantur oculi quoti-
die fotu sequent. ℥. Fol. ros. rub. sambuc. ana Mj.
sem. lin. fœnugr. ana ℥ij. carui ℥j. coq. in q. s. aq. O
vin. alb. ad ℔j. pro fotu bis vel ter in die usurpand.
Inflammatione & humorum acrimonia in hunc
modum sublatis vel lenitis demum palpebræ lini-
ment. sequent. illinantur. ℥. Ung. Pom. ℥j. flor.
Sulph. ℥ss. Camphor. ℥j. ol. ros. q. s. M. vel cum
Infus. sequent. humectentur bis terve in die. ℥.
Fol. Nicotian. opt. ℥j. flor. roris marin. P. i. su-
peraffund. aq. calcis bullient. ℔ss. infund. per hor.
quadrant. O coletur. Valere potest etiam unguen-
tum *Ophthalmicum Pharm. Londinens.*

Xerophthalmia.

Art. 1005. Est etiam genus *arida Lippitudinis*, quod *Ξηροφθαλμία* Græci appellant. Sub hoc neque tument, neque fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam fere levi, ac prurigine graves sunt, & palpebræ citra duritiem ullam noctu prægravi pituita inhærescunt. *Xerophthalmia.*

Art. 1006. „ Quoad curam præmissis præmit-
 „ tendis, quemadmodum in quibusdam similibus *Curatio.*
 „ oculorum morbis, *Celsus* commendat *vipam*
 „ oculis noctu apponendam; nec video quid pa-
 „ nis tosti oleo appropriato aliove liquore ido-
 „ neo imbuti applicationem prohibet; fœtus emol-
 „ liens in Articulo de *Psorophthalmia* memora-
 „ tus hic etiam locum habet.

Sclerophthalmia.

Art. 1007. *Sclerophthalmia* est *Lippitudo dura*, *Scleroph-*
ficca, dolorosa, callositatem crassam in palpebris *thalmia.*
 efficiens, earumque motum valde impediens. Ad
 effectus alterutriusque priorum fere semper quoad
 medendi rationem referenda est.

Scleriasis.

Art. 1008. *Scleriasis* vel *scleroma* oculi est *du-*
rities palpebrarum scirrhusa; vix a *sclerophthal-* *Scleriasis.*
mia differt nisi gradu, unde prorsus malum incu-
 rabile evadit.

Tracoma.

Art. 1009. *Tracoma* est internæ palpebrarum *Tracoma*
 partis asperitas, cum pruritu & rubore, sæpe &
 pustulis semen milii referentibus, ab humore acro.
 Gradus ejus sunt *sycosis*, & *tylosis*.

Z

Art.

Curatio. Art. 1010. Præter generalia, revellentia, intercipientia, topica sint mollientia; postea refrigerantia, ultimo detergentia. Paræus seq. instar omnium esse scribit, si parum vitrioli in multa aq. ros. solvas.

Trichiasis.

Trichiasis.

Art. 1012. Trichiasis vel Phalangosis est vitium pilorum in ciliis, duplici ordine crescentium, vel saltem introrsum spectantium, atque ita oculum lædentium. Ophthalmiam non raro inducit. Forcipe evellendi sunt hi pili nocentes, si fieri possit, secus cura non est expectanda.

Madarosis.

Madarosis.

Art. 1012. Madarosis sive Ptilosis est defluvium pilorum vel palpebrarum glabrities, ex vehementia alicujus morborum trium supra recensitorum plerumque oritur. viz. Psorophthalmiæ, Xerophthalmiæ vel Sclerophthalmiæ.

Anchyloblepharon.

Anchyloblepharon.

Art. 1013. Anchyloblepharon est palpebrarum inter se invicem vel inter ipsas & tunicam conjunctivam coagmentatio vel potius coalescentia. Interdum (ut ajunt) est vitium infantibus conatum; sed frequentius ob incuriam in curandis ulceribus vel aliis quibusdam oculorum morbis provenit. Coalescentiæ præternaturales manu chirurgica cum cautela separandæ sunt; & oculus tanquam in vulneribus & ulceribus topicis appropriatis tractandus.

Lagophthalmia.

Lagophthalmia quid.

Art. 1014. Lagophthalmia est cum superior palpebra justo est brevior: vel nativa est, vel a cicatri-

trice vel convulsione, vel cum infantes in cunis sursum vel retro semper spectant.

Art. 1015. Curatur mollientibus. Si a cicatrice, sectio fit supra eam figura *falcata lunæ*, in plagam *litus* injiciendus est., Sed revera est malum ut plurimum prorsus insanabile. „ *Curatio.*

Atoniatonblepharon.

Art. 1016. Atoniatonblepharon est affectus palpebræ superioris ex impotentia musculi attollentis, ortus, hinc motus ejusdem superne in totum amissus est; provenire potest a *paralyfi*; (novi quosdam a *nativitate* sic affectos) a vulnere vel contusione gravi, discissis scilicet istius musculi fibris: hujus rei documentum habemus satis notabile ac æque deplorandum in insigni quodam *Baronetto Anglicolis* fere omnibus noto ex ictu infelici calcis equinæ. Fœmina quædam a *fistula lacrymali*, qua aliquandiu afficiebatur, ope chirurgica sanata, hunc defectum in supercilio contraxit, &, quod mirum videatur, idem in nepotem traductus est; nimirum virium imaginationis impressione: filia etenim, cum prægnans esset cum matre prædicta cohabitans, & intuitu ac consuetudine quotidie utens filium peperit similiter oculo affectum & insanabilem mansurum. Et fatendum est quidem Atoniatonblepharon a quacunque causa oriundum esse prorsus incurabile; neque curatio sectione, ut nonnulli suadent, temere tentanda est, ne gravius malum, nempe *Lagophthalm.* accersatur. *Atoniatonblepharon.*

Hippos.

Art. 1017. Hippos est instabilitas palpebrarum, cum palpebræ inordinato motu continuo clauduntur & aperiuntur, hujusmodi nictatio ut plurimum est hæreditaria, interdum vero ex mala consuetudine comparatur, vel a gravi aliquo affectu, ut *Hippos.*

356 *Tractatus de Oculorum Morbis* CAP. X.
terrore ira vel timore accidit : sub curam medicam proprie dictam nunquam cadit.

Ectropium.

Ectropiū. *Art. 1018.* Ectropium est affectus inferioris palpebræ, quæ invertitur, & deorsum trahitur, ut interna pars cum deformitate videatur, & instar rubræ carnis appareat; neque enim superiori committitur, sed pendet ac hiat. A paralyfi, convulsione, vel vulnere male curato plerumque oritur.

Art. 1019. Hoc curant *astringentia* (inquit *Forestus*) in aqua ros. in qua ferrum ignitum sit extinctum; seq. sæpe expertus est, ℞. Butyr. rec. diligenter lot. in aq. commun. & postea in aq. plantag. vel ros. ℥iiss. tutiæ præp. & in aq. ros. lot. aloe in aq. plantag. lot. sieff. alb. cum opio ana ℥iiss. camphor. lot. ℥j. f. ung. quo vesperi inunge & aq. calida ablue. De operatione Chirurgica vide Celsum.

Phthiriasis.

Curatio. *Art. 1020.* Phthiriasis sive palpebrarum pediculatio est vitium in quo pediculi inter pilos nascuntur. Malum est (inquit *Sennertus*) minime contemnendum : acres enim fluxiones concitat, & oculi tandem ab iis valde læduntur; idem varia medicamenta enumerat; sed non opus est, ut hic recenseantur; nam sola inunctione saponis nigri pediculi cujuscunque generis facili negotio necandi sunt. (vid. *Art. 1569.*)

Ophthalmia.

Riverii sententia.

Morbi definitio, & divisio. *Art. 1021.* Ophthalmia sive Lippitudo est oculi inflammatio cum tumore, rubore, & dolore; levis inflammatio phlogosis dicitur; chemosis appell.

pellatur, quando utraque palpebra inversa sit, ut vix ab iis oculi contegantur, rubrumque magna ex parte iridem occupet. Alia est ophthalmia *sicca*, alia *periodica*. Elegantem hujus affectus descriptionem habemus apud *Lommium*; „Vehemens oculos urget inflammatio cum multo dolore, & tensione, & tumore & ardore & rubedine; interdum etiam tanta cum punctione, ut oculi tanquam ab infixa acu aut spina stimulari videantur; fervente humore implentur; sequiturque pituita modo paucior, modo uberior; sed & sordes quædam majoribus angulis inhærescunt; & ubi gravius est malum, vicina etiam loca ad malas usque attolluntur, circum circa arteriæ vehementer pulsant; vasa sanguifera tenuia urgent, conspicuaque redduntur; quæ per sanitatem in albo fuerant obscura.

*Eiusdem
descriptio*

Art. 1022: Venæsectio docente *Avicenna* usque ad lypothymiam celebranda est; *cucurbitula* scapulis & spinæ dorsi affigendæ; *catharsis* lenientibus instituenda. Remedium sequens inflammationem sedat, & fluxionem cohibet. *℞. Alb. ovi unius* agitetur cum frusto *aluminis* satis magno, donec unguenti consistentiam adeptum sit, quod extendatur super linteum, & oculo tepide applicetur; post horas 2. vel 3. auferendum est, ne humores nimis astringat. Unguentum fieri potest ex *butyro* & succo *nicotiana* simul coctis maxime efficax. In declinatione collyria magis *resolventia* usurpanda sunt, ut *℞. Sarcocol. nutrit. i. e. per plures dies in lacte macerat.) tutiæ præparat. ana ℥iſſ. aloë ℥j. myrrh. ℥ſſ. mucilag. sem. fœnugr. ℥ſſ. aq. fœnic. euphras. ana ℥iſſ. m. f. collyr.* In ophthalmiis inveteratis, cum alia remedia non sufficiant, ad *mercurialia* tanquam ad sacram anchoram confugiendum est. In graviore casu convenit *Setaceum*; aliquando etiam *masticatoria*, & decoctum e lignis profunt.

Curatio :

*In morbo
inveterato.*

Covvardi sententia.

Ophthalmia hu- mida & sicca. **Art. 1023.** Ophthalmia est inflammatio tunicae adnatæ cum dolore & ardore torquens. Optime dividitur in *humidam* & *siccam*, prout scilicet cum majore vel minore humoris profluvio stipatur. In *ὑποφθαλμία* vel ophthalmia *sicca* oculus quidem intumescit cum dolore quodam, leni rubedine, & pruritu, & gravitate, & cum levi etiam humoris fluxione per vices saltem, non enim datur ophthalmia absolute *sicca*.

Prognosis. **Art. 1024.** Copiosiores lacrymarum effusiones, ut ut mordaces, ophthalmiam non diutius duraturam indicant. Ophthalmia laborantem alvi profluvio corripui bonum est, inquit *Hippocrates*.

Curatio. **Art. 1025.** Ut recte instituatur ophthalmiæ cura cum *venesectione* incipiendum est; conveniunt etiam *cathartica* mitiora, privatim *aquæ minerales purgantes*, vel *sal mirabile* in aqua communi solut.

Varianda est pro ratione morbi stadium. **In principio.** Quoad *topica* considerandus est præ omnibus morbi status: In principio, factis debitis *evacuationibus*, ℥. *Aq. euphrag. fœnic. dulc. ana* ℥j. tut. prepar. ℥ss. trochisc. alb. rhas. ℥j. f. mistura. ℥. *Lact. fœminin. ℥j. succ. fœnicul. dulc. ℥ss. camphor. ℥j. album ovi unius*, probe conquassando misceantur, & redigantur in pulvem forma cataplasmatidis applicand. Huic usui quoque inserviunt mucilagines *seminum cydon. psyl. papav. &c.* quæ sæpius renovandæ sunt, ne acorem contrahant.

In augmento. In augmento ℥. *Aq. Plantag. rosar. pallidarum ana* ℥iss. sacchar. saturn. vel ceruss. lot. ℥j. sp. sal. armon. ℥ss. f. s. a. mistura. ℥. *Aq. solani* ℥ij. succ. sedi ℥ss. *opii thebaici gr. ij. album ovi q. ss.* conquassando probe f. mistura ophthalmica. Si comitetur epiphora, sine vitriolatis commixtis incassum laboramus. **In statu.** In statu *resolventia* remedia repellentius prævalere debent, inquit *Riverius*, præcipue totus e flor. sambuci parat. discutiendi gratia, sed

sed mallem ego sequens adhibere, *℥. Fol. euphrag. fœnic. ana Mj. semin. fœnugr. aloes lot. ana ℥ij. aq. font. pauca aceto acescentis* (ita ut gustu leviter deprehendi poterit) *℔bj.* coquantur simul ad dimid. consumpt. colatura servetur ad usum. In declinatione sola *sarcocolla*, uti suadet *Sen- nertus*, maxime conandum est, si ophthalmia fordes reliquerit, quod priusquam aliquod applicueris medicamentum ophthalmicum, penitus eluantur seu detergantur.

*In decli-
natione.*

Art. 1026. In ophthalmia sicca *emollientia & lenientia* perpetuo intermiscenda sunt, ne *discutientium & exsiccantium* medicamentorum usu inflammatio asperior & intensior reddatur.

Ophthalmia sicca.

Pitcairn in MSS.

Art. 1027. Ophthalmia externa diligenter distinguere debet ab ea, quæ simul est & externa & interna: *interna* est inflammatio retinæ, quam *neo* (quantum scio) descripsit; dabo itaque signum pathognomonicum, & in praxi utilissimum: nam si signa *externæ* ophthalmiæ adsint, viz. rubor, calor, dolorque, & nihil aliud visui se offerat, est solum ophthalmia *externa*; at si præter illa *externa* signa videantur ophthalmico oculis suis observari muscæ in aere volitantes, pulvisve quilibet obscurus vagare, aliarumve rerum incerta simulacra, tum erit ophthalmia *interna & externæ conjuncta*.

Ophthalmia interna.

Art. 1028. Nullus est morbus, qui natura sua *venæsectionem* sæpius postulet, quam ophthalmia.

V. S. copiosa.

„ Et ex observatione quorundam Chirurgorum
„ Gallicorum constat unam Arteriæ Temporalis
„ Sectionem plus valere ad inflammationem minuendam, quam duas vel tres iteratas venæsectiones.

Farrago sententiarum.

Epidemi-
ca.

Art. 1029. Interdum ophthalmia est *epidemicæ* & *contagiosa* ex aere inclementiori. In curanda ophthalmia aliquando apprime convenit *venæsectio* in pede ob majorem revulsionem. Ubi humores sunt aciores & corrosivi, collyriis addenda sunt remedia *fixa metallica*, viz. *tutia preparata*, *lapis calaminaris*, *cerussa*, *sacchar. saturni*, imprimis *flores Zynci*, & *flores Jovis*, quos *Barbette* insigniter commendat. In levi inflammatione frustum *carnis vitulinæ* vel *bovinæ* applicatum morbum discutit. *Eitnull*.

Prognosis.

Art. 1020. Ophthalmia ab uno oculo ad alterum facillime, ac citissime frequenter transit. Tumor, sicut aliarum partium *Plegmones*, vel medicamentis discutitur, vel ad suppurationem & disruptionem vergit, & exinde ulcera consecraria, vel denique, quod pessimum est, ex intempestivo & imprudenti frigidorum Topicorum ac repellentium usu *gangrænescit*. Medici præstantiores uno ore monent, ne topica in principio ophthalmiæ applicemus; multi enim cæci facti sunt medicamentorum copia.

Ophthalmia scrophulosa.

Art. 1031. „ Ophthalmia frequentissime est *scrophulosa*; quo in casu præter *evacuantiæ* remedia *mercurialia* & *specificæ* exhibenda sunt, „ item *millepedes* & *herb. euphras.* in cerevisia infus. pro usu communi per longum tempus; sed „ præ omnibus, quocunque mihi hætenus innotescunt, *aquæ minerales catharticæ*, quales „ sunt *Ebeshamenses* & nostræ *Alfordenses*, *Lidfordenses*, *Holtenses*, &c. diutius epotæ morbum hunc pertinacissimum subigunt, aut saltem „ inducias paciscuntur, ut aliquoties observavi. „ Pro usu externo collyrium sequens, *℞. Mercur. dulc. ℥ij.* teratur in mortario lapideo affundendo *aq. ros. ℥ij.* per 4. vices, & agitetur „ pi-

„ pistillo ferreo candenti toties calefacto. Pro-
 „ dest interdum *cataplasma de pomis Fulleri*, &
 „ etiam fons sequens *Boyleanus*, ℥. Flor. meli-
 „ lot. sambuc. calend. ana Mj. sem. lin. fœnugr.
 „ cym. psyl. cydon. ana ℥ss. hord. parlat. ℥ss. coq.
 „ in aq. font. & vin. canariens. ana p. æ. ad ℥bj.
 „ pro fots in doloribus magnis.

Art. 1032. D. Cheyne in Tractatu suo de Ar- *Virtus*
Æthiopis
mineralis
 thritide testatur *Æthiopem mineralem* larga dosi
 bis in die sumptum diuque continuatum spem Me-
 dici nunquam destituere in cura Ophthalmiæ in-
 veteratæ, immo etiam si *Scrophularis* sit. p. 50.

Cataplasma sequens Ettmulleri in gravissimis in-
 flammationibus dolorem sedare solet; ℥. Pulp.
 pom. dulc. assat. q. v. alb. ovi unius cum sacchar.
 crystal. bene conquassat. camphor. gr. xij. misce.

Stercus vaccinum more Cataplasmatidis tepidum
 ab animali oculo appositum Ophthalmiæ mederi
 dicitur. Ex Ephemer. Leopoltan.

Oedema.

Art. 1033. Oedema oculi est inflatio sive Tu- *Oedema.*
 mor Oedematofus in albo oculi, i. e. in tunica
 conjunctiva sine coloris mutatione, valde promi-
 nens; est malum satis conspicuum. Cum pruritu
 mordaci plerumque incipit, tanquam locus ictus
 esset *spiculo apis vel culicis morfu*; frequentius in
 æstate quam hyeme accidit. *Banister.*

Art. 1034. „ Est etiam alia species Oedematis
 „ oculi minus recte a quibusdam authoribus sic
 „ vocati, quod nihil aliud est quam Emphysema
 „ in palpebris contingens, horum posterius fre-
 „ quentissime vidi, & etiam prius semel vel bis
 „ conspexi; sed hoc ad alium Articulum perti-
 „ net. (*Art. 999.*)

Art. 1035. Ad hujus curationem ut recte fiat, *Curatio.*
 præter alias appropriatas evacuationes *cucurbitu-*
læ cum scarificatione humeris sunt affigendæ; to-
 pica

362 *Tractatus de Oculorum Morbis* CAP. X.
pica quod attinet, *fotus* ex discutientibus Vino
& Aqua incoctis sunt proficui, ut etiam *Muci-*
lag. sem. lin. & fœnugr. cum solutione Myrrh. &
aloe in Aq. rosar.

Hypopyon.

Hypopyon.

Art. 1036. Hypopyon est collectio puris sub cor-
nea (secundum *Kennedy* in ophthalmographia
sua *inter corneæ laminas*) ab ophthalmia vel con-
tusione violenta plerumque ortum ducens. Inten-
tiones curativæ sunt doloris sudatio & puris eva-
cuatio per discutientia, &c. *Couvard.* „ Si ma-
„ teria purulenta discuti nequeat, ipsa cornea
„ lanceolæ mucrone caute & prudenter aperien-
„ da est, quæ operatio periculo vacat, neque
„ semper post se cicatricem fœdam relinquit. In-
„ cisione facta, & pure expulso oculus eandem
„ medicationem postulat, ac in vulneribus ocu-
„ lorum vel post cataractæ detractionem.

Phlyctænæ.

Couvardi sententia.

*Phlyctæ-
na quid.*

Art. 1037. Phlyctænæ sunt ulcera nunc in ad-
nata, nunc in tunica cornea emergentia, velut
tot minimæ vesicæ aqua repletæ, quales solent
aquæ ferventis in aliquas corporis partes affusio-
ne excitari, vulgo apud *Anglos Blysters in the*
Eyes appellantur, & instar granorum millii appa-
rent, & cum usitatus ab acri & corrorente hu-
more producantur, vehementem dolorem & lan-
cinationem pariunt. „ Hæ pustulæ in tunica cor-
nea albidae sunt, in adnata rubescentes.

*Indicatio-
nes cura-
tiva.*

Art. 1038. Præmissis rite evacuantibus, *discu-*
tientia & exsiccantia conveniunt, quæ varianda
sunt, prout morbus sit in augmentu, statu, vel
Declinatione. „ Detergendæ sunt Phlyctænæ cum
molle rosar. addito pauxillo unguent. Ægyptiac. vel
cum

CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 363
cum pulvere nicotianæ (cum cautela usurpato.)
Post deterfionem sanandæ & exsiccandæ sunt cum
Collyrio ex *Aq. plantag. & Trochisc. Alb. Rhas.*
Kennedy.

Anthracosis.

Art. 1039. Anthracosis sive Carbunculus oculi *Anthra-*
est Tuberculum gravissimum in oculo ex inflam- *cosis.*
matione nascens, & ad Ophthalmiam referri po-
test.

Synchysis.

Art. 1040. Synchysis est humorum oculi confu- *Synchysis.*
sa admixtio ab ictu, vulnere, vel contusione vio-
lenta, vid. vulnus seu contus. oculi.

Pterygium.

Ettmulleri sententia.

Art. 1041. Pterygium, vel (Latinis) Unguis, *Morbi de-*
seu oculi pannus, est tunica quædam præternatu- *scriptio.*
ralis ab uno oculi angulo, frequentius interiori,
enata, quæ successive accrescendo tandem ad pu-
pillam pervenit; interdum est tenuis, albida, in-
terdum crassior, & carnosior, aspera, dolorosa,
imo cancrofa, quæ non est attingenda.

Art. 1042. Commendatur ablutio oculorum cum *Curatio.*
proprio lotio matutino; usurpanda sunt remedia
abstergentia, ut *saccharum cand. os sepiæ, crocus,*
vitrum, vel *butyrum Antimonii,* succus *chelidon.*
maj. vitriol. alb. In malo pertinaciori tuto con-
fugiendum est ad *Mercur. sublimat.* item *succus*
formicarum rub. express. & cum *aq. ophthalmica*
appropriata permistus commendatur.

Art. 1043. Ungulam oculi distinguere solent *Differen-*
in *membranofam, varicosam & adiposam;* mem- *tia.*
branosa, alias panniculus appellata, est excrescen-
tia carnosâ ac nervosa, quæ operationem valde
dubiam & incertam admittit; nec tractabilior est
secun-

secunda species cultro tentanda, propter insignem venarum dilatationem & turgescētiā; ultimam adiposam scilicet coloris albicantis & substantiæ quodammodo pinguis, reliquis duobus benigniorem tuto extirpare licet, de operatione consultatur *Author*, ut etiam *Celsus*.

Curatio & Prognosis. *Art. 1044.* Si Pterygium sit recens, *erugine*, *alumine usto*, *sacchar. cand.* &c. absumi potest; fel animalium fere omnium valde commendatur. Pterygium revera est malum periculosum & curatu difficillimum; est etiam frequenter contagiosum ab uno oculo in alium transiens & fere semper metus est, ne cancrōsum evadat.

Proptosis.

Proptosis. *Art. 1045.* Proptosis seu Straphyloma est revera *Hernia oculi* & isto nomine designari debet: disrupta etenim tunica cornea quocunque accidente uvea seipsam protrudit, Tumorem vel *Ramicem* faciens, qui a similitudine aliquali rerum quarundam varia apud Græcos sortita est nomina, uti *Straphyloma*, *Melon*, *Helos*, *Myocephale*, &c. (Vid. *Art. 1069.*)

Curatio. *Art. 1046.* Quoad curam in principio hæud incongruum erit experiri quid valent *Collyria astringentia*, si ex horum usu spes frustretur; ad chirurgicam operationem accedendum est, nimirum ad evacuationem humoris aquei per *paracentesin*, quæ periculo vacat; iste enim humor de novo supplebitur, & vulnusculum curatu non est difficile.

Rhexis.

Rhexis. *Art. 1047.* Rhexis est Tunicarum oculi rupturæ cum humorum effluxu a vulnere, contusione violenta, vel ingenti exulceratione orta, cæcitatem perpetuam inducit, si humores omnes emarunt. Nihilominus vero Globus oculi in hoc casu

casu quandoque humore aquoso replebitur, ut-
cunque tamen haud usque ad dimensionem natu-
ralem: in hoc statu oculo artificiali vitreo defor-
mitas eleganter refarcitur. Si solus humor aqueus
reliquis in oculo manentibus effluerit, natura
frequenter hunc denuo suppeditat, & oculi pul-
chritudo ac visio conservantur.

Art. 1048. In hisce gravissimis oculorum læsio- *Curatio.*
nibus semper convenit *venesectio* quam ocissima,
item *enematum* injectiones, & in vulnus vino ru-
bro cum exiguo melle prius ablutum, instillandus
est *sanguis columbinus* ex animali vivo, vel mix-
tura ex *melle rosarum vitell. ovar. & lacte mulie-*
bri adhiberi potest, & superimponendæ sunt lin-
teæ *albumine ovorum cum tantillo albumine bene*
agitato imbutæ. Post hujusmodi Medicationem a-
liquandiu continuatam *Collyrium ex Myrrh. Aloe*
& Croc. in Aq. Rosar. usui erit.

Oule five Cicatrix.

Covvardi sententia.

Art. 1049. Albugo seu Leucoma est macula cor- *Albugo*
neæ albescens; quo latior & crassior est, eo ma- *quid. Va-*
gis visum obscurat, & quo magis corneæ super. *rietas &*
ficiei incumbit, eo magis albicat, & quo propius *prognosis.*
ad nigredinem vergit, eo altius suas egit radi-
ces, & vix curabilis existit. Quæ e *cicatrice* re-
lictæ exoritur difficillime dissipatur, quæ *ophthal-*
miam sequitur, frequenter sua sponte facessit.

Art. 1050. Totus curationis cardo in *emollien-* *Curatio.*
tibus, resolventibus, seu discutientibus, vertitur,
quæ tamen cum summa cautela sunt usurpanda.
Pro *cicatricibus* tollendis *topica* acriora, imo *ca-*
thartica aliquando prudenti manu adhiberi de-
bent, & primo tentanda est via lenioribus, &
postea ad fortiora licet devenire. *℞. Rad. althæ.*
℥j. folior. malv. euphrag. chelidon. maj. ana Mj.
sem.

366 *Tractatus de Oculorum Morbis* CAP. X.
sem. lin. fœnugr. ana ℥iij. flor. melilot. p. j. coq.
in aq. font. q. s. ad ℔ij. hujus decocti vapor
oculis apertis calide excipiat frequentissime.
 Mallem ego in his oculorum medicamentis uten-
 dis formam *fomentationis*, quam *vaporis* com-
 mendare, præcipue si eidem decocto, dum cale-
 scat, pauculas *salis seu spiritus alicujus volatilis*
guttas instillaveris, quod tum forte prodesse po-
 terit, nisi nimiam affuderis spirituum quantita-
 tem, quæ oculorum tunicas feriat, & irritet.
 Alii utuntur *Jaccharo cand. in aq. fœnicul. seu eu-*
phrag. solut. succus fœnicul. vel chelidon. cum gut-
tulis aliquot balsam. Peruv. potenter albuginem
discutit, inquit Riverius. Sequens ex Riverio fe-
liciter expertus sum; ℥. Aq. ros. ℥iv. dissolve in
ea paululum salis armoniac. ita ut linguam feriat,
deinde imponatur in vase aurichalceo, donec cæ-
ruleum colorem acquirat. Fella animalium præ-
cipue lucii piscis, succus chelidon. &c. sunt re-
media calida & acria, ideoque convenit ea exci-
pere mucilaginis gum. tragacanth. sem. cydon.
&c. vel cum pulv. Trochisc. alb. rhas.

Ettmulleri sententia.

Pro cicatrice in oculo. *Art. 1051.* Albugo seu Leucoma est cicatrix al-
Remedia aliquot. *bida post variolas vel alia ulcuscula in oculo. Pro*
Scarificatio Oculi. *nubecula & albugine delenda conveniunt fel an-*
guillæ, ol. papyri, succ. chelidon. maj. aq. sapphi-
rin. mercurius sublimatus. „ Solemne est apud Chi-
 „ rurgos Gallicos ad vitium amovendum opera-
 „ tionem instituere, quam vocant *scarificationem*
 „ *oculi*. Instrumentum ad hoc opus perficiendum,
 „ quod *Scarificatorem* nominant, fit ex aristis
 „ hordeaceis, N. xx. vel xxv. puta, ad instar pe-
 „ nicilli colligatis; cum hujusmodi autem scopis
 „ sive vermiculis oculum abradunt, quandoque us-
 „ que ad effusionem exigui sanguinis, alternis
 „ vel tertiis forsan diebus idem repetendo ad quar-
 „ tam,

„ tam, quintam vel plures vices; finita in hunc
 „ modum singula scarificatione oculum cum a-
 „ qua tepida multoties abluunt, imo fere con-
 „ tinuo per totum diem, & deinde noctu pulpam
 „ pomi assati applicant: atque hæc est scarifica-
 „ tionis methodus, accuratiorem vero hujus ope-
 „ rationis rationem, non modo in hoc vitio,
 „ sed etiam in quibusdam aliis oculorum affecti-
 „ bus vernaculo sermone evulgandam brevi, ut
 „ opinor, expectare licet.

Hyposphagma.

Art. 1052. Hyposphagma sive *suggillatio oculi* *Hyposphagma.*
 est sanguinis ex ictu vel lapsu, ruptis aut contu-
 sis vasis, vel alio modo apertis, in oculorum
 tunicis adnata, vel cornea, in easdemque effu-
 sio, colore primum rubeo, postea livido vel ni-
 gro. Cui malo & hoc accidit, si corneam magis
 occupet, objecta omnia colorem ad rubrum ver-
 gentem præ se ferunt; nam & ad corneam venu-
 læ porriguntur, ea parte, qua iridem spectat; &
 ex vicinis vasis sanguis in eam effundi potest.

Art. 1053. Si malum sit ingens opus est venæ-
 sectione & purgatione, & topica debent esse *di-*
scutientia. *Galenus* in initio forum usurpat ex de-
 cocto *Fenugraci & Meliloti* & postea *astringen-*
tia. *Sennertus.* In oculorum suggillationibus o-
 ptimum est sequens cataplasma, *℞. Rad. symphyt.*
maj. ℥vj. sigil. Solomon. ℥ij. flor. sambuc. ℥i℥. fa-
rin. fabar. ℥j. coq. in q. s. aq. font. Decoctum sit
pro fotu, & ex radicibus, &c. f. cataplasma. *Curatio.*

Cataracta.

Convardi sententia.

Art. 1054. Suffusio sive cataracta est pupillæ *Definitio.*
 obstructio ab opaco aliquo interposito inducta,
 quæ visum minuit, aut extinguit. Causæ hujus
 affe-

Causa.

Differentia.

Curatio.

Regula
de Cata-
ractis.

Operatio.

Post ope-
rationem
quid fa-
ciendum.

affectus sunt ut plurimum obscuræ, aliquando tamen evidentes, uti contusio, nimis assidua ad lucernam lectio, balneorum usus inordinatus, & in genere quicquid fluxionem ad oculos promoveat; *epiphora* nonnunquam in *cataractam* transit. Differentiæ suffusionum sunt variæ, nempe 1. ratione crassitie vel tenuitatis materiæ, ex qua pellicula constat. 2. ratione coloris, an alba sit, vel nigra, citrina, vel viridis, aut subfusca. 3. a situ, num etenim uveæ, num corneæ propius adhæreat: Certum enim est *cataractam* semper inter *uveam* & *tunicam scleroticam* contineri, in quo nunc humore aqueo, instar *syndonis*, innatare & fluctuare videtur, nunc firmiter tunicis, præsertim uveæ, adhærescere.

Art. 1055. Suffusio in initio discuti potest, ut multi fidei integerrimæ authores testantur. Suffusio nigra, nec medicamentis, nec acu curabilis est. Sequens est optima regula de cataractis, scilicet; si quando videatur accrescere, & discutientium medicamentorum vires excedere, sufficienti temporis serie permittatur callescere, donec acui depositoriæ idonea naturaliter reddatur. Modus operationis perficiendæ unicus est; intrudendo, scilicet, acum depositoriam per adnatam & corneam e minoribus oculorum angulis versus nasum, & *cataractam* eadem involvendo, tandemque ad oculi basin deponendo, ut ibidem resideat, seu leni manu figatur. Post hæc usitatum est, quietem per plures dies patienti imperare vel in lecto vel extra, & stypticis aliquibus seu medicamentis agglutinantibus oculum male affectum obducere.

Art. 1056. „ Statim post operationem simul ac
„ acus oculo evulsa fuerit, instillandæ sunt guttæ
„ aliquot sanguinis columbini a vivo animali, &
„ toti oculo superimponantur lintæ duplicatæ al-
„ bumine ovorum cum frustulo aluminis conquassa-
„ to & tantillo melle rosaceo bene irrigatæ.

Art. 1057. Suffusio, quæ a morbo aliquo gra-

„ vio.

„ viori, a pertinaci cephalalgia, vel a contusio- *Prognosis.*
 „ ne violenta ortum duxerit, est omnium longe
 „ pessimæ indolis. Suffusiones, quæ sunt virides,
 „ vel cineritiæ, item quæ ferri rubiginosi, mar-
 „ garitarum vel testudinis marinæ colorem refe-
 „ runt, acu curabiles sunt: e contra suffusiones
 „ nigræ vel flavæ, item cretæ, plumbo, malo ci-
 „ treo, colore similes, non attingendæ sunt. Præ-
 „ ter calorem, ratio etiam habenda est substan-
 „ tiæ, & consistentiæ suffusionum, quæ a
 „ fricatione oculi palpebris operati dignoscendæ
 „ sunt; frictio enim oculi cum digito suffusionem
 „ reddit latiore & extensiore cum vel sine dis-
 „ ruptione; si autem pristinam figuram statim re-
 „ cuperat sine disruptione, operationem fausto
 „ eventu successuram esse sperare licet: sin vero
 „ ex frictione suffusio in partes & frustra defiliat,
 „ operatio nullatenus molienda est, sed cunctan-
 „ dum est, donec suffusio firmior & maturior
 „ evaserit.

„ *Art. 1058.* „ De operandi modo alibi dictum *Nota quæ-*
 „ est (*Art. 1057.*) sed in ipsa operatione quædam *dam.*
 „ adnotanda occurrunt, ibidem minus memora-
 „ ta. In cataractis adhuc imperfectis interdum
 „ simul ac acus infigitur, statim oculus *inunda-*
 „ tione humoris lactei impleri videtur, quem ab
 „ ipsius cataractæ vesiculis acu sauciatis proveni-
 „ re credibile est. Quandoque oculus acu introducta
 „ cruore plenus conspicitur. Alias intromissa acu
 „ cataracta statim duplo grandior augeri videtur,
 „ tuberosis ostrearum testis (vel spermatis ranarum
 „ in paludibus) quodammodo similis. Hæc ac-
 „ cidentia saltem ad tempus operationi impedi-
 „ mento esse solent. Cataractæ nonnullæ, utcum-
 „ que aspectu benignæ ac pulchræ ante operatio-
 „ nem conspiciuntur, sunt tamen adeo *tenaces*
 „ ac rigidæ, ut acui depositoriæ obtemperare o-
 „ mnino respuant, & quoties infra detruduntur,
 „ toties iterum assurgunt. Aliæ etiam si septennes

„ vel oſtientes fuerint , ſunt tamen *molles tan-*
 „ *quam gelatina* , atque ita vim acus eludunt .
 „ Aliæ *Uveæ* tam firmiter adhærent , ut acu ſepa-
 „ rari nequeant , atque hæ ſunt omnium peſſimæ
 „ ab iſtu vel contuſione violenta ortum plerum-
 „ que ducentes . Quod ad accidentia antedicta ,
 „ nimirum *humoris lacteſcentis* , *cruoris* , &c. in
 „ operatione contingentia , attinet , octiduo vel
 „ noniduo plerumque ſponte evaneſcere ſolent ,
 „ reliquæ tamen quædam aut fragmenta interdum
 „ manere poſſunt . Poſt operationem viſio quan-
 „ doque ſtatim , ſed frequentius circa nonum
 „ diem aliquatenus ſuccedit , at non perfecta &
 „ fortis ante duas vel tres ſeptimanas , vel for-
 „ ſan tot menſes præteritos expectanda eſt . *Ba-*
 „ *nifter & alii* .

Pitcairni ſententia .

Error Ri- *Art. 1059.* Signum pathognomonicum a *Rive-*
verii, *rio* , *Plempeio* , & aliis traditum ſuffuſioni nulla-
Plempeii, *tenus* convenit , nempe affirmant ſuffuſionem cum
&c. *ingruere* , cum varia ſimulacra ante oculos voli-
 tant , pili , aranæ & ſimilia , quæ apparitiones
 ex omnium opinione , ſi perpetuo offerantur , eſt
 vera & legitima ſuffuſio : has apparitiones aſcri-
 bunt corpusculis humori aqueo innatantibus , quæ
 cataractam efformant ; verum naturam oculi igno-
 rant : Nam corpuscula humori aqueo innatantia
 nullum ſenſum in retina depingunt ; imo ea quæ
 corneæ exteriori adhærent nullam ſui in retina pi-
 cturam exprimunt , nec cicatricis corneæ ulla eſt
 imago , neque ob eam vel eas (ſi plures ſint) ul-
 læ rerum obvolitantium ſunt apparitiones : Ea
 enim eſt concavitas retinæ , ut ad objectum in ea
 depingendum , hoc eſt ad congregandos in uno
 ejus puncto omnes radios , e quovis objecti pun-
 cto emiſſos , debeat objectum viſibile removeri
 a retina ultra diſtantiā corneæ a fundo oculi .

Hinc

Hinc sequitur, si incipienti cataractæ conjungantur etiam simulacra muscarum &c. tum oculi etiam *Gutta Serena* laborant.

Farrago sententiarum.

Art. 1060. Si suffusio sit profunda, pupilla angusta apparet; intra sex menses plerumque confirmata evadit. Oculo digito compresso suffusio nonnihil diffuens & latior facta, & postmodum ad pristinam magnitudinem revertens nondum matura est; si vero nullam patitur mutationem discutiti potest. *Riverius*. Si oculus suffusione affectus soli obversus nullam possit lucem percipere, frustra est omnino operationis periculum facere; est etenim cataracta cum *Amaurosi* conjuncta, quod malum est incurabile. *Barbette*.

Prognostica signa aliquot.

Art. 1061. Cataractam revera ut plurimum nihil aliud esse quam opacitatem praternaturalem humoris *Crystallini* videre licet *Transact. Philo-* *Opacitas humoris crystal-*
soph. N. 373. Et hanc fuisse opinionem plurimum Chirurgorum Gallicorum, viz. *Maitre Jan*, *Antoine*, *Bissau*, *Heister*, &c. ex horum authorum lectione plane constat: Cataractas autem membranosas rarissime occurrere fere omnes consentiunt. (vid. Artic. subseq.)

Glaucoma.

Art. 1062. Glaucoma est mutatio humoris crystallini in glaucum colorem humore crystallino per exsiccationem condensato. *Oribasius in lib. viii. cap. 47.* dicit, Glaucoma & suffusionem veteres unum eundemque morbum esse existimarunt. *Paulus Aegineta* idem asserit. Valde curiosæ sunt disquisitiones Gallorum de distinctione inter suffusionem & Glaucoma. vid. *Acad. sci. Vol. XII. p. 47. item Vol. XXII. p. 36. &c.* Posteriores tamen Græci proprie Glaucoma saltem pro humoris cry-

Glaucoma.

372 *Traclatus de Oculorum Morbis. CAP. X*
stallini in glaucum colorem mutatione accipiunt.
 Quod ubi fit, visio impeditur; nam humore isto pelluciditate spoliato species visibiles *ad retinam* perfecte transferri nequeunt. Cognoscitur hoc malum, quod citra pupillam insignis & profunda apparet albedo, & omnia tanquam per fumum aut nebulam videntur. A cataracta ergo distinguitur, quod *albedo profundior* appareat, in cataracta *in ipsa pupilla & fere juxta corneam*. Sennertus. (vid. Art. præcedentem.)

Situs Humoris Crystallini vitiat.

Situs humoris Crystallini vitiat.

Art. 1063. Est & aliud vitium humoris Crystallini, viz. *Situs naturalis mutatio*, ubi, scilicet, latiore sua parte, quæ lentis majoris instar compressa est, Pupillæ foramini non recta opponitur, sed vel sursum declinat, vel deorsum, vel ad latera: & quidem si Crystallinus humor situm mutet in uno oculo, in altero vero naturalem retineat; vel si ambo difformiter situm mutant, ita ut alter sursum, alter deorsum, vel ad latera vergat, res geminatae apparent; *mutatur enim planum*, ut loquuntur optici: hic affectus, sicut antecedens, est omnino incurabilis. Sennertus.

E P I P H O R A.

Couvardi sententia.

Epiphora quid.

Art. 1064. Epiphora est præternaturalis oculorum defluxio, quæ *Anglis sonat a Rheum in the Eyes*; humore scilicet seroso acri fere continuo, depluunt oculi genas excoriante.

Curatio.

Art. 1065. Intentiones curativæ sunt 1. humoris peccantis alio derivatio per *venesectionem*, *cucurbitulas*, *vesicatoria*, *cathartica*, &c. 2. acrimoniæ per remedia idonea correctio, quæ plerumque vino *chalybeato amaro* feliciter peragitur; aliquando vinum simplex liberaliter epotum epiphoram

CAP. X. *cognoscendis & curandis.* 373
 phoram sanat (præcipue non assuetis idem bibe-
 re), & postremo, præmissis recte prædictis eva-
 cuationibus & alterantibus ; *topica astringentia*
 adhibere licet.

Pitcairni sententia.

Art. 1066. Epiphora est quasi species *catarrhi* Oculorum
catarrhus, ejus-
dem curatio.
 in glandulis oculorum. Præmissis universalibus
 usurpandi sunt *fores astringentes, linimenta, &*
collyria, &c. Cataplasma sequens ex *Platero* egre-
 gias habet vires, ℞. *Pulp. pomorum acidorum*
 (vulgo vinos. dict.) in aq. ros. macerat. ℥ij. mu-
 cilag. sem. fœnugr. ℥ss. album. unius ovi. lapid.
 hematit. ℥ss. cort. granat. ℥j. ol. ros. q. s. m. f.
 Cataplasma tepide applicandum.

Farrago sententiarum.

Art. 1067. Epiphora antiqua, & quæ senibus
 accidit, difficulter curatur imo frequenter in fi-
 stulam lacrymalem degenerat. Remedia in princi-
 pio debent esse blande *astringentia* & postea sic-
 cantia ; lapis calaminaris est singularis. Aqua Aq. oph-
thalmica
præcel-
lens.
 ophtalmica sequens ex *Hoffmanno* valet fere
 in omnibus oculorum affectibus usque ad mira-
 culum ℞. *Vin. rhenan. Aq. plantag. rosar. ana*
 ℥iij. tut. præp. ℥ij. myrrh. elect. pulv. ℥ss. coq.
 ad tertiæ partis consumptionem sub finem in no-
 dul. suspend. pulv. virid. aris. ℥j. camphor. gr. viij.
 colatura sine expressione sit pro usu ; utilissima
 quoque est aq. sapphirina, item collyrium certum.

Art. 1068. Huc pertinet ; si non idem sit ; Rheuma
oculi.
 Rheuma sive fluxus Oculi, vel delacrymatio,
 quod est serosorum vel tenuium humorum ab
 oculo profluvium, sine insigni inflammatione,
 a *Fistula lacrymali*, vel ab ungula male curata
 quandoque oritur, & tunc prorsus incurabilis
 existit ; vulgo vocatur a *Weeping Eye*.

Proptosis.

Proptosis. Art. 1069. Proptosis est exitus oculi fere ex orbita, ex contusione, &c. vid. contusionem Oculi & Vulnere Art. 1052. 1073. huc referri potest buphthalmia, magnus oculus, sive oculi valde prominentes, vulgo *Goggle Eyes* naturali conformatione oriundi. Quomodo ab alio morbo eodem nomine insignito differt. (vid. Art. 1045.)

Atrophia.

Atrophia. Art. 1070. Atrophia oculi, sive imminutio, profunditas vel macies oculi, est quando omnes oculi partes imminuntur & contabescunt. Nusquam hunc morbum, ut memini, tanquam *particularem* inveni, nisi a tabe universali provenientem; Celsus vero & alii hunc agnoscunt; adeo infrequenter, ut opinor, contingit, ut peculiarem medelam vix postulet: ad hanc classem pertinet *Microphthalmos*, sive parvus oculus, *The Pink-Eye or the Pig-Eye* a naturali conformatione ortus.

Mydriasis.

Mydriasis. Art. 1071. Mydriasis, sive *Pupillæ Dilatio*, est cum foramen illud, quo uvea tunica ad species visibiles admittendas donata est, ita præter naturam versus iridis circulum ampliatur, ut visio hac de causa lædatur. Objecta visibilia grandiora apparent & minus distincta: alia est *nativa*, alia *adventitia*, prior est incurabilis; si a siccitate oriatur, humectantia indicantur. Interdum est *guttæ serena* prodromos.

Meiopsis.

Meiopsis. Art. 1072. Meiopsis, sive *Pupillæ Angustia*, est malum præcedenti contrarium; nimirum cum pupilla

CAP. X. cognoscendis & curandis. 375
pilla angustior est quam naturaliter esse debet.
Hi affectus insanabiles sunt.

Plege.

Art. 1073 Oculorum vulnera, sive a punctura, incisione, vel contusione sunt periculosissima. Omni arte fluxus humorum inhibendus est, viz. venæ sectione, hirudinibus, clysmatibus, vesicantibus, intercipientibus, &c. & febris suppressiva testaceis, emulsionibus, &c. Interim remedia externa sunt ante omnia Sanguis columbinus e vivo animali in oculum vulneratum instillatus, aq. hordei & mel rosar. pro collyrio, oxyrhodinum i.e. acetum, in quo fol. ros. rubr. incisa fuerint cum albumine ovar. conquassat. pro defensivo. Sequens cataplasma habet Turner. *Art. Chirurg. p. 370. Vol. I. 24. Fol. ros. rubr. sambucana Mj. coq. in q. s. lact. vaccini colatur. Hs. add. mic. panis alb. q. s. ut reducatur leni coctione ad debitam consistentiam sub finem addendo vitellum unius ovi cum tantillo croco minutim scisso, f. cataplasma sub tepide applicand. illinendo prius palpebram tumefactam cum ung. sambucin. consulatur author loco citato.*

Plege.

Elcos.

Art. 1074. Ulcera in tunica conjunctiva vel cornea, a quacunque causa oriantur, a vulnere, inflammatione, a variolis vel combustionibus, &c. periculosa sunt, & aliquando curatu difficilia, & semper metuendum, ne opacam cicatricem post se relinquant.

Elcos.

Art. 1075. Quoad curam, materia ad oculum fluens divertenda est & evacuanda, sordes detergendæ, dolor, si adsit, mitigandus, & nativa oculi temperies restituenda & conservanda. Detergentia & exsiccantia sunt usurpanda, lenia ta-

Curatio.

men & temperata, sine asperitate & mordacitate. Ad ulcera detergenda (inflammatione, si adsit, prius penitus sublata) vix datur præstantius remedium quam *aq. ophthalmica sapphirin. Bat.* & deinde *collyrium ex sarcocol.* in cap. de ophthalmia laudatum, & postremo *collyr. tum trochisc. alb. rhas. cum camphora, sacchar. saturni vel lap. calamin. præp. &c.* oleum ovorum valde commendatur.

*Species
varia.*

Art. 1076. D. Banister a priscis medicinae scriptoribus octo vel decem species ulcerum in oculo accidentium enumeravit, ut *ulcus rotundum, inustum, sordidum, depascens, cancrum, &c.* Sed distinctio nimis subtilis videtur. Verum enimvero notatu dignum est ulcus istud, quod *Græci Peribrosin* nominant in Angulo oculi cum pruritu vix tolerabili conjunctum. Sequens medicamentum ab authore valde comprobatur. *℞. Mucilag. sem. cydon. lin. in aq. plantag. & parietar. extract. ana ℥j. vitriol. alb. in aq. rosar. solut. 3℥. vitriolum album est antidotus ad pruriginem.*

Covvardi sententia.

*Prognosis,
Curatio
ulcerum
ocula-
rium.*

*Art. 1077. Omnia oculorum ulcera sunt periculosa & curatu difficillima. Totus curandi cardo in usu detergentium & exsiccantium vertitur, quibus tamen sæpissime addi debent lenientia sive anodyna. Non differt horum ulcerum ab aliorum curatione methodus tractandi, nisi quod ob tenebritudinem & insignem partium usum cura non vulgari suscipienda sint. Porro his in casibus conveniunt agglutinantia cum detergentibus mixta; inter quæ liquorem ex ovo cocto & indurato sacchari cand. q. s. repleto in cella vinaria extillantem maxime commendat *Riverius*; quod medicamentum, si magis abstersivum desideres, addito *myrrhæ pulverisatæ* pauculo saccharo cand. supra præscripto, magis proficuum reddetur.*

Para-

Paralysis.

Art. 1078. Paralysis oculi est affectus musculorum ocularium paralyticus, ex quo motus vel penitus amittitur vel multum impeditur. Est malum, uti credo, rarissime contingens; utcunque nihil habet in se peculiare a paralyfi aliarum partium diversum quoad theoriam vel therapiam. *Paralysis*

Strabismus.

Art. 1079. Strabismus seu strabositas est oculorum unius vel utriusque respectu ad se invicem distortio, sive *obtusus transversus*, vulgo a *Squinting*. Ex inæquali musculorum ocularium exercitio provenit. Infantes hunc affectum facile contrahunt; interdum ob incuriam nutricum, quæ malo situ ad fenestram cunabula disponunt. Adolescentes quoque interdum in eum incidunt, vel a vitiosa oculorum praxi, vel a contagione, dum alios hoc morbo affectos intuentur. *Strabismus*

Art. 1080. Strabismus difficillime curatur; si a cunabulis peperam versus fenestram locatis ortum duxerit, mutanda est eorum situatio. *Paulus Ægineta* ad hoc vitium emendandum larvam machinatus est, & faciei adaptavit, ita ut per duo foramina recta tantum antrorsum liceret prospicere. Ego ad adolescentulum quendam generosum strabismo affectum accersitus, statim ac intellexi unum tantum oculum affici, consului, ut *sanus subligaculis probe claudatur* per duas septimanas, quo facto alter oculus omnimodorum motuum liberime potitus integre sanatus est, & in futurum cum altero motus sociales recte servavit, & nunc elapsis aliquot annis sine recidivatione juvenem elegantiforma præditum in bonum virum evasurum fore spero. *Curatio*

Encan-

Enchantis.

Enchantis.

Art. 1081. Ex curatione unguis vitia nascuntur, quæ ipsa aliis quoque de causis oriri solent. Interdum fit in Angulo parum ungue exciso, vel aliter, tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur: *ἐχάρδις* grece nominatur. Excipi Hamulo, & circumcidi debet: hic quoque diligenter temperata manu, nequid ex ipso Angulo abscindatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, atramento sutorio, &c. *Celsus.*

Curatio.

Art. 1082. Enchantis est excrescentia carnosissima in majori oculi angulo carunculæ lacrymalis adhærens; si mollis & laxa fuerit, *Alumine usto & saccharo cand.* deleri potest; sin vero tumor sit durior & grandis filo per medium transmissio detinendus est, & forcipe abscindendus, & vulnus tinctura myrrhæ & melle rosaceo fovendum. *Kennedy.* In operatione suscipienda cavendum est, ne glandula lacrymalis nimium lædatur, exinde enim fluxus oculi perpetuus continuo in genam depluens supervenire solet, quemadmodum in fistula lacrymalis male curata plerumque accidit. (Vid. *Art. 1068.*)

Fistula Lacrymalis.

Covvardi sententia.

Morbi nomina & descriptio.

Art. 1083. Anchylops, Ægilops, & Fistula lacrymalis apud authores promiscue usurpantur; ægilops vero est tumor (vel potius ulcusculum) carunculæ majoris ad internum oculi canthum; anchylops nominatur, cum adhuc nondum sit ulcerosus; fistula lacrymalis proprie appellatur, quando ulcus sinuosum ibidem efformatur; compressione digiti liquor e cantho ovi vitello similis,

lis, & foetorem emittens extillat; humor corrosivus viam facit, aut invenit, unde meatus colatorii nimis patentes facti, perpetuo stillicidio vexantur; imo frequenter os *ethmoideum* penetrat, erodit, & ad *cariem* miserabilem deducit; in quo statu non nisi *cauterio* actuali curabilis est, hujusmodi fistula frequenter cancrosa evadit, & tunc *Riverius* monet remediis non esse attingendam.

Art. 1084. Cura est totaliter chirurgica, nisi *Curatio* quod intus dari possunt pauca *evacuantia* & remedia quædam humorum acrimoniam *destruentia*, præcipue *mercurialia*, & decoctum *e lignis*. In initio si anchylops adhuc sit, *repellentia* maxime proficua sunt, ut suppuratio præveniatur; huic usui inserviunt *refrigerantia*, *astringentia*, & *vitriolica*: Si vero nec refrigerantibus repelli nec solventibus discuti poterit, quin ad suppurationem vergat, aperiendus est abscessus, & *detergentibus*, *consolidantibus*, ac *cicatrizantibus* secundum artem tractandus. Alii sunt qui curam ægilopis moliantur *instrumento chirurgico*, per os nasi tramitem perforando, quo liquor perpetuo extillans per nasum evacuetur. „Sed graviter errant, qui existimant *perforationem* hoc commodum præstare, ut materia per os effluat; foramen enim ossis a carne ex ipso pullulante brevi obstruetur. Os non est perforandum nisi præsentem maximam ipsius corruptionem, quæ perveniat usque ad cavitatem internam ipsius nasi; sola siquidem ejus superficie corrupta satisfuerit partem læsam scalpro abradere, euphorbium inspergere, &c. præmitti debet *setaceum*, quod tanti est momenti, ut inveteratam fistulam lacrymalem sine hoc præsidio vix curari posse in aliquibus observaverim. *Hercules, Saxen.* & *Hildanus*.

Visus Hebetudo.

Covvardi sententia.

Hebetudo
visus.

Unde.

Curatio.

Dua re-
gula ad
visum
prolon-
gandum.Euphra-
sia vires.

Art. 1085. Hebetudo visus est caliginosus vi-
dendi modus, cum objecta visibilia nebula velut
tenui obvoluta apparent; primu est hic status in-
gruentis mali peioris, nisi præveniat, prodro-
mus; & *cataractam* aliquando ob incuriam patien-
tis, aut inscitiam medici inductam præcurrit. A
statu sanguinis viscido & pituitoso oriri potest, vel
a spirituum animalium penuria, vel ab humoris in
oculo defectu, vel ex mala partium conformatione.

Art. 1086. Ad hanc oculorum hebetudinem di-
scutiendam indicantur remedia, quæ sanguinis
lentorem tollunt & quæ spirituum animalium
penuriæ occurrunt. Quandoque convenit *venæ-
sectio*, & deinde *catharticum cum calomel.* exhi-
bere. *Millepedes* inter specifica recensentur; *sa-
lia volatilia* & *deobstruentia* in sanguinis lentore
mira præstant; salivationem per *masticatoria*, po-
tius quam *tabaci fumo*, excitatam prodesse autu-
mo; *cerevisia oxydorica pharm.* Bat. propinari po-
test; *collyria vitriolica* & *astringentia* sunt vitan-
da; convenit *aqua ophthalmica sapphirina Bat.*
In genere duæ regulæ ad visum utilissimæ, licet
non usquequaque sufficientes, statuuntur. 1. Ut
mane quolibet, nullo habito ad tempestatem re-
spectu, *frigida caput, tempora, & pone aures*
alluamus. 2. Ut a *calidis & piperatis eduliis*,
nec non *potulentis spiritosis*, quantum fieri pos-
sit, abstineamus.

Art. 1087. „ Euphrasia quoquo modo sumpta,
„ seu in pulverem redacta, & cum vino albo po-
„ ta, seu per se sola masticata & deglutita, seu
„ in vino vel cerevisia infusa, seu in aqua ad
„ modum theæ, seu succus ejus expressus, *viden-*
„ *di facultatem mirifice roborat & adauget, de-*
„ *bilem*

CAP. X. cognoscendis & curandis. 381
„ bilem aut amissam reparat & restituit. Arnol-
„ dus de Villa nova & alii.

Gutta Serena.

Couvardi sententia.

Art. 1088. Gutta serena seu Amaurosis est vi-
sus abolitio, sine ullo sensibili vitio in oculis ap-
parente, ab obstructione *nervi optici* orta, influ-
xum spirituum animalium prohibente. Quæ a cau-
sa quacunque subitanea exoritur facilius curatur,
quam cui deplorabile illud infortunium obrepit.
In vera amaurosi pupilla nigrior & amplior so-
lito apparet, sed non semper, & gravitas super-
cilia premit. Definitio.

Art. 1089. Quoad therapiam post universalia
(ubi indicantur) medicamentis *volatilibus*, *anti-*
scorbuticis, *chalybeatis*, *mercurialibus*, *cephali-*
cis, & *nervinis* cura tentanda est; vix aliquid
sperandum est a *topicis*; si aliquibus utamur, de-
bent esse *discutientia*. Curatio.

Pitcairni sententia.

Art. 1090. Si nullis ophthalmiæ signis appa-
rentibus, muscæ aut aranæ & similia oculis ob-
servari videntur, signum est *pathognomonicum* gut-
tæ serenæ nascentis. Signum
pathogno-
monicum.

Art. 1091. Curatio hujus affectus medicamen-
tis *mercurialibus* tentanda est, imo *salivatione* &
decocto guaiaci. Curatio.

Art. 1092. „ Tutiora sunt *purgantia* (inquit Et-
„ mullerus) quam *vomitiva*; conveniunt *sudo-*
„ *rifera*, maxime *sassafras* & *euphrasia*, *junip.*
„ *rosmarin.* *millepedes*, *masticatoria*, &c.

Myopia.

Art. 1093. Myopia, sive luscitio, est propin-
qua Myopia.

qua visio, quam nos Angli vocamus *Purblindness* a naturali conformatione oritur: qui autem oculos ita formatos habent, nunquam cæcutiunt, neque conspiciendorum in extrema senectute indigent.

Presbytia.

*Presby-
tia.*

Art. 1094. Presbytia est affectus myopiæ contrarius; e longinquo melior est visio, quam propinqua; senibus præcipue accidit, & est malum prorsus incurabile; conspiciendi vero egregio sunt adjumento.

Nyctalopia.

*Nyctalo-
pia.*

Art. 1095. Nyctalopia est malum duplex, cujus species duæ sunt sibi invicem contrariæ. In prima specie visio noctu vel in locis obscuris est præstantior, in clara luce valde diminuta & fere nulla. In altera specie nisi clara & splendida luce nihil omnino cernitur. Hæc sunt vitia a mala constructione oculi orta, ideoque incurabilia.

Hæmorrhagia Narium.

Sydenhami sententia.

*Hæmor-
rhagia
narium
& hæmo-
ptoe in-
terdum a
febre pen-
dēt.*

Art. 1096. Nonnullæ febres intercurrentibus annis numerari debent, quæ vulgo pro symptomaticis tantum habentur; hujusmodi sunt hæmorrhagia narium & hæmoptoe. Primo ut plurimum appulsu febris præ se fert indicia, qua derepente sibi per nares, qua data porta, faciente viam; dolor & calorincipit adhuc torquent; sanguis per vices profluit, dein aliquandiu sistitur, & mox denuo iterum atque iterum erumpit; donec tandem remedium usu vel sponte omnino cessat, ita tamen ut ægro singulis annis a recidiva metuendum sit.

Curatio.

Art. 1097. Sanguinis fervorem nimium atque ebullitionem, ut compescamus convenit *venæsectio*.
(san-

CAP. X. *Narium Morbi.*

383

(sanguis eductus est pleuritico-
victus tenuis ac incrassans similis) item
 die injiciendum est *enema refrigerans*, & dosi
diacodii hora somni exhibenda est. Quoad ex-
 ternas applicationes, lintea quadruplicata immer-
 sa *aqua frigida*, in qua *sal prunelle* dissolvatur,
 & postea leviter expressa admoveantur nuchæ, ac
 utrinque cervici sæpius in die. Item post univer-
 sas evacuationes peractas liquor sequens applice-
 tur; ℞. *Vitrio. hungar. alum. ana ℥j. phlegmat.*
vitriol. ℥ss. coque tamdiu, donec omnia fuerint
 dissoluta, liquorem frigesactum filtra, & add. *ol.*
vitriol. partem duodecimam; turunda ex linteo
 raso liquore hoc probe humectata, nari ex qua
 sanguis stillat, indatur per dies duos isthic relin-
 quenda.

Art. 1098. „ Quando hæmorrhagia narium a
febre pendeat, *cortice peruviano* profligari potest,
 æque ac hæmoptoe; de qua alibi. (§ 36.)

Cortex
peruv.

Art. 1099. „ Opinione vulgari hæmorrhagias
 „ ordinario ex arteriolarum evanescentium ru-
 „ ptura accidere statutum est; Sed in errore ma-
 „ gnopere versantur: in omni etenim *critica sal-*
 „ *tem hæmorrhagia* sive narium, sive partium
 „ circa fauces & guttur, sive pulmonum, sive
 „ renum, sive hæmorrhoidum, sive uteri, san-
 „ guinis fluxus *mediantibus glandulis* omnino fit,
 „ *per ductus scilicet excretorios* sanguis exilit,
 „ quod probe notandum est.

Nota be-
ne.*Etmulleri sententia.*

Art. 1100. Quidam hypocondriaci, scorbuti-
 ci & cachectici variis & stupendis hæmorha-
 giis obnoxii sunt, ita ut sanguis non unciatim,
 sed libratim effluat.

Quinam
hæmor-
rhagiis
obnoxii
sunt.

Art. 1101. In nimia effervescentia & sanguinis
 fervore conveniunt *blanda acida*, item succus
menth. urtic. &c. martialia pluribus scopis in cu-
 ran-

Curatio

Hæmor-
rhagia
habitua-
lis.

randis hæmorrhagiis satisfaciunt : *martialia* etenim per se semper astringunt , per accidens aperiant , ut observare licet in mensibus nimis fluentibus & obstructis . Ipse novi exempla infantum & adultorum etiam frequenter hæmorrhagiis narium obnoxiorum solo esu *passularum* curatorum . In hæmorrhagia *habituali* sequens electuar. est proficuum ; ℞. *Pulp. passular.* ℥ss. *pulv. rhabarb.* ℥ij. *tart. vitriolat.* ℥j. *syr. cydon.* q. f. m. (Materia medica in hæmorrhagia late patet , sequentia simplicia sunt insigniora.) *folia plantaginis* , *urtic. millefol.* *heder. terrest.* *polygon.* *flor. ros. rub.* *balaustr.* *cort. granat.* *rad. symphyt. maj.* *bistort.* *tormentil.* *muscus terrest.* *gallæ* , *sem. hyoscyam.* *papaverina* , (*catechu*) *usnea cran. human.* *gum. arab.* *sang. dracon.* *lapid. hæmatit.* *tinct. mart.* *sacchar. saturn.* *stercus asininum* aut *suillum* & *caninum* . Externe *buso sicc.* *stercus porcinum recens excrementum* , *bol. armen.* *pil. leporin.* *crepitus lupi* , *alumen ustum* , &c.

Farrago sententiarum.

Aliquid
notandū
in V. S.

Art. 1102. Phlebotomia ad revellendum ampliori foramine celebrari debet , & ut magis confertim sanguis effluat , inter detrahendum eundem multum prodest vulnus sæpius digito occludere , dein aliquantulum sanguinis emittere .

Deligatio
artuum .

Art. 2103. Deligatio artuum hæmorrhagiæ sistendæ conducit ; notandum est tamen artus omnes simul non diu ligandos esse , quoniam sanguis in extremis diu detentus , & a corde nimis exulans lypothymias terribiles inducit . *Album græcum* in omnibus hæmorrhagiis est medicamentum singulare ; *spiritus vitriol.* vel *eiusdem ol. in aq. simpl. stillat.* in hæmorrhagiis periculosis est extremum remedium & raro fallax .

Remedia
varia .

Art. 1104. Reliqua melioris notæ sunt *calcanthum rubefactum* , *colophonium pulverisatum* , *Pip-
ticum*

ticum regis, ol. terebinth. decoct. catechu, decoct. incrassans, decoct. styptic. elect. Boyleanum, pulvis Galeni, elect. styptic. tinctura rosar. epithema de sacchar. saturni in casu deploratissimo moribundo post omnia tentata feliciter expertus sum.

Olfactus amissus.

Ettmulleri sententia.

Art. 1105. Olfactus amissus rarissime recuperatur, præcipue in senibus. Præ reliquis multum confert *majorana* quocunque modo usurpata, item *rosmarinus*, suffitus ex *succino gum. animæ, &c.* quæ valent in *catarrho* hic locum habent. (470.)

Olfactus amissus raro curatur.

Art. 1106. Ozæna est ulcus sordidum in naribus latens, frequenter est venerum, interdum cancrum evadit.

Ozæna.

Art. 1107. Ad curationem conveniunt folia & unguentum *e nicotiana*; si crusta adfuerit, cum *oleo amygd. dulc.* removenda est; interdum usurpantur fumi ex *cinnabar. & mercur. dulc.* in injectionibus, imo nonnunquam *mercurius sublimat.* Galli utuntur *mercur. præcip. cum unguent. ros. subact.* & cum turundis applicato. (972.)

Curatio.

Art. 1108. Polypus narium est sarcoma seu ex-crescentia carnosæ in naribus ex earum summitate pronascens, & nasum nunc replens, nunc in fauces usque descendens, a *polipo pisce* nomen accepit, nunc mollis est, & lubrica, nunc una nunc pluribus radiculis se affigit. Excrescientia hæc nunc alba, nunc rubra, nunc livida apparet, si livescit, & dolet, fere cancrum naturam sapit; & non attingendus est polypus cancrum. Polypus narium est malum curatu admodum difficile., *Rhasis* polypum hæmorrhoides narium appellat ob similitudinem. De ejusdem extirpatione videantur scriptores chirurgici. Si in ulcus cancrum degeneraverit, admittit curationem fictam & fucatam; in hunc finem unguentum sequens

Polypus narium.

Raro curatur.

„ est valde proficuum, ʒ. Unguent. de plumbo
 „ succ. solan. ana ʒj. aq. ros. ʒss diutissime agi-
 „ tentur in mortario plumbeo & f. ung.

Art. 1109. Riverius distinguit inter *sarcoma* &
 „ *polypum*, & quidem jure merito; *Sarcoma* (in-
 „ quit) est excrescentia carnea in naribus genita,
 „ *hyper-sarcomi* simillima in imis narium partibus
 „ succrescens; *Polypus* vero in summis ac supe-
 „ rioribus juxta nasi radicem. Cura tentanda est
 „ primo astringentibus lenioribus, & deinde me-
 „ dicamentis potentioribus, inter quæ eminet
 „ *mercurius præcipitat. rub. cum melle rosaceo per-*
 „ *mistus*; remedia adhuc magis *caustica* cum cau-
 „ tela usurpanda sunt, idque *decrecente luna*,
 „ cum tumor imminuitur.

LINGUÆ VITIA.

Etmulleri sententia.

Gustus læ-
siones.

Art. 1110. *Gustus læsiones.* In amisso gustu con-
 venit *Raphanus* ante pastum masticatus, item *ce-*
phalica & *nervina*. Sed gustus & odoratus vitia,
 si inveterata sint, sunt curatu difficilia, maxime
 in senibus.

Aphonia.

Art. 1111. *Loquela amissa* frequenter a linguæ
paralysi accidit; curatur *aromaticis*; convenit de-
 coctum *salviae*, *eruc. sinap. &c.* in vino; item *ros-*
marinus, *rad. pyreth. zinzib.* sed præ reliquis suc-
 cus *salviae*.

DENTIUM & GINGIVARUM MORBI.

Dentium
caries &
nigredo.

Art. 1112. *Dentium caries & nigredo* fit a ni-
 mis calidis, frigidis, dulcibus, acidis, fumis ex
 mercurio, a scorbuto, &c.

Curatio.

Art. 1113. *Vitanda* ergo sunt antedicta, & den-
 tes a cibo repurgentur & vino eluantur. *Pumex*
 bis vel ter ignitus & vino albo extinctus & in
 pulverem subtilissimum redactus albissimos facit den-
 den-

dentes ; quidam solo pulvere panis usti utuntur (qui optimum & tutissimum est dentifricium.) *Cinis nicotiana* est turpe medicamentum , sed dentes reddit albos. Ad dentium sordes tollendas & colorem vitiosum emendandum varia extant dentifricia in practicoꝝ libris ; ℞ *Os sepiæ* ℥j. rad. *pyreth.* lapid. *pumic.* alum. ust. ana ℥j. *cinnam. lign.* aloe tart. *rhenan.* ana ℥ss. f. pulv. subtilissimus . Pro usu domestico pulv. panis usti ad dentes mundandos sing. auroris , & postea opiatum sequens usurpandum ; ℞ Pulv. flor. ros. rub. ℥ij. *myrrh. elect.* ℥ij. alum. ust. ℥j. *sacchar. saturn.* ℥j. cremor. aq. calc. supernatant. opobalsam. ana ℥ij. aq. hungar. q. s. misce. Post usum hujus abluatur os cum vino rubro.

Art. 1114. In dentifriciis usurpandis optime cavendum est , ne crebrior & durior attritus gingivarum , eas atterat & absumat. Curatio .

Art. 1115. Ad dentes firmandos valet solutio *Dentium* *terre japon.* ℥j. in vin. rub. ℥ss. pro lotionē (in- *vacilla-* quit *Boyle* multis in locis) conducit etiam gum. *tio.* *lac.* quocunque modo usurpatum.

Art. 1116. In gingivis putridis & dentium vacillatione inde orta , ℞ Gum. lac. ℥ij. cremor. aq. *putrida.* calc. supernatant. ℥j. alum. ust. ℥j. flor. ros. rub. ℥ss. m. f. pulv. subtilissimus cum paucō mel. ros. usurpand. vel cum vino rub. gallico in quo infusa sunt fol. ros. rub. rad. tormentil. &c. In graviore malo ad unguentum *Ægypt.* deveniendum est (vel mel. unguent. *Ægypt.* supernatans) plura videantur in cap. de scorbuto. De gingivis putridis & dentium vacillatione . Interim multum valet tinctura gum. lac. *Fulleri.* , , Præ reliquis autem , , quocunque in libris inveniuntur , pro dentibus , , firmandis , iisdemque & gingivis a putrefactione , , ne conservandis ; nec non oris fœtore præcavendo , non datur præstantius remedium quam *Masticatio* foliorum *Nicotianæ* modica quantitate : , , eo etenim sufficiunt grana quatuor pro una vi-

ce, idque tantum semel in die usurpandum
 per horæ quadrantem in ore detinendo. Inter-
 rim super omnia improbandus est turpissimus
 quorundam mos totis diebus masticandi, non ad
 hos laudabiles fines consequendos; sed plane
 nescientium quare, forsan solummodo foedissimæ
 consuetudini indulgendi gratia.

*Dolores
 dentium.*

Art. 1117. Oleum *Buxi* dentium dolores quos-
 vis ad miraculum sedat (inquit *Reverius*) oleum
origani est in frequenti usu. *Pix livid.* in ore de-
 tent. dolorem tollit, ut ab amico accepi. *Rad.*
pyrethri in ore manducat. pituitam evacuat & do-
 lorem lenit. Decoctum *nicotianæ* in ore deten-
 tum dentium dolorem potenter sistit (inquit *Ett-*
mullerus). „ Sed ultra omnia, quæ hætenus no-
 vi, succus radicis *iridis luteæ* dolenti denti af-
 fricatus vel ipsa radix in ore masticata in in-
 stanti quasi ex incantamento dolorem ex causa
 quacunque oriundum fugat. Communicator af-
 firmat se quadragies ad minimum pari succes-
 su tentasse; ego etiam ipse sæpius expertus sum
 & plurimi ex meo suasu idem facerunt: si den-
 tis cavitas sit magna, imponi potest plumbum
 foliatum.

*Nota be-
 ne.*

Art. 1118. Nonnunquam (inquit *Sennertus*,
 & ipse idem plus semel observavi) per dentium
 radices & maxillæ foramina, per quæ vasa in eas
 subeunt sensim extra effluit sanies e dente corru-
 pto & tubercula in mala vel mento excitat, quæ
 nullo modo curantur, nisi dens extrahatur. Vide
 locum p. 262. Vide etiam *Cheselden Anat.* p. 19.

*Vermes
 dentium.*

Art. 1119. Decoctum *sabinae* in ore detentum
 vermes dentium elicit, ut auctor est *Ettmullerus*.

A U R I U M M O R B I.

Ettmulleri sententia.

Art. 1120. In inflammatione & ulcere aurium *Inflam-*
 adest insignis ardor in aure; & dolor tensivus, *matio &*
 & pulsabilis vehemens cum rubore, quandoque, *ulcus au-*
 conjuncta est febris, interdum delirium, & mo- *rium.*
 tus convulsivi.

Art. 1121. Insensibiliter discutitur, vel suppu- *Methodus*
 ratur; convenit *venæsectio*, item *sudorifera* tan- *curandi.*
 quam in aliis inflammationibus. Externa non ni-
 si cum cautela sunt usurpanda; fomenta tamen
 ex *emollientibus* & *discutientibus* sunt proficua.
 Si discuti nequeat, ad *suppurantia* accedendum
 est, ut *cepe sub cineribus* affat. pulv. rad. *lilior.*
alb. caric. ping. ol. cham. amygd. amar. &c. Ul-
 cere rupto, si pus effluens sit album, & quale;
 &c. melius est, quam si sordidum; saniosum;
 &c. fuerit; sufficit, si modo mundus servetur
 meatus auditorius; id quod optime mediante *uri-*
na humana assequimur; si ulcus fuerit sordidissi-
 mum urinæ addi possunt succus *cepe* & *mel rosar.*

Art. 1122. Otalgia, sive auris doloris causa *Otalgia*
 frequentissime est inflammatio, de qua modo di- *curatio.*
 ctum est; interdum vero ab acri humore prove-
 nit, ubi non est adeo insignis ardor & pulsatio.
 Fumus *nicotianæ* cum fistula inversa auri immis-
 sus valet ad dolorem compescendum, item *mille-*
pedes in ol. communi vel *amygd. amar. infusi*, &
ol. scorpion.

Art. 1123. Si dolor autem a vermibus fuerit, *Vermes*
 dolor tunc vage lancinans, hinc inde rodens per- *in auri-*
 cipitur: educendi sunt vivi, aut intus enecandi; *bis.*
lac tepidum auribus immissum dulcedine sua ver-
 mes allicit, ita ut prodeant: succus *absynthii* in-
 terficat, vel angit eisdem, item *oleum nucleorum* *quid a-*
persicorum, vel *amygd. amar. diacolosynthis* quer- *gendum*
betani cum granis aliquot *mercur. dulc.* item *elix.* *sit.*

propriet. argentum vivum in aq. appropriata incoct. &c.

Tinnitus. Art. 1124. Tinnitus aurium frequentissime est affectus chronicus & valde molestus, interdum in omnimoda surditate terminatur; raro curatur, sæpe recidivat.

Curatio. Art. 1125. Præmissis universalibus, suffitus ex succino, olibano, & gum. anima est egregius; spiritus sal. armoniac. cum bombyce in aurem immixtus tanquam singulare a Lindano laudatur; item fel lucii piscis, ol. castor. zibet. &c. in usu sunt.

Riverii sententia.

Surditas. Art. 1130. Surditas & gravis auditus secundum magis & minus tantum differunt, eo affecti ægre sonum percipiunt; auris afficitur vel in exteriori vel interiori parte. Meatus auditorius interdum cerumine vel alia quavis sorde obturatur; in interiori parte auris affici potest humoribus in cavitate collectis, qui frequentius *pituitosi* sunt.

Causa. Art. 1131. Obturatio externæ aurium cavitationis oculis ipsis dignoscitur, si ad solem cavitationem introspicias. Pro cavitate externa eluenda, uti licet decocto salior. *salvia* & *flor. rorismarin.* in p. æ. aq. & vin. alb. facto, quod cum syphone prudenter injiciatur. Nihil æque conducit in surditate a causa interna etiam post centum remediorum usum, quam ut æger præmissis præmittendis *sulphureis balneis* caput madefaciat; sedeat sub canali balnearum, & verso epitonio, aquam accipiat. *Ova formicarum* contrita & cum succo *cepe* in aurem infusa quam vetustissimam surditatem persanant. Si affectus sit contumacissimus post omnia incassum tentata excitare licet *ptyalissimum* ex inunctione mercuriali.

Etmulleri sententia.

Art. 1132. Inter remedia externa in surditate præ reliquis granum unum *moschi*, vel *ambra*, vel *zibethi* cum bombyce involutum & vesperi auribus immissum est optimum remedium, præcipue in senibus; laudatur etiam *fel anguilla* cum *spiritu vini*, & *fel perdicis* a *Lindano*, liquor ex ovis *formicarum* expressus, si quid aliud, admodum confert. Sunt qui valde commendant suffitum ex *sulphure* mediante fistula in aurem transmissum; extremum remedium est salivatio. *Vapor auricularis Fulleri.*

Remedia
externa.

U V U L Æ R E L A X A T I O

sive Procidentia.

Art. 1133. Gurgulio seu uvula est glandula pendula ad formationem & modulationem vocis conferens, quæ defluxionibus, æque ac aliæ glandulae, obnoxia est; si infra tumeat, supra gracilis evadit. E palati extremo propendet, inque fauces & gulæ caput fertur, itaque hæc loca titillatione quadam afficit, metuque præfocationis sollicitat.

Uvula relaxatio.

Riverii sententia.

Art. 1134. Humor pituitosus in columellam defluens, eam humectat, emollit, & relaxat, ut longior facta partem superiorem oesophagi tangat, & nauseam pariat.

Causa.

Art. 1135. Evacuantia universalis eadem esse debent ac in *catarrho*. In principio *topica astringentia* & *repellentia* conveniunt, quemadmodum in curatione *anginae*, quibus postmodum *resolventia* & *exsiccantia* erunt admiscenda: Remedia autem forma pulverum potius quam liquidorum sunt

Curatio.

Excisio.

ut plurimum utiliora & efficaciora, præsertim si nulla adsit inflammatio. Excisio si ultimum remedium, sed cum suprema cautione admolienda est; nam valde periculosa est (inquit *Hippocratis Progn.*) de qua operatione videantur auctores chirurgici. „ Audiamus *Tulpium*. A medicis „ *prolapsus palati* vel omnino prætermittitur, „ vel leviter tractatur; & tamen vitium est non „ minus grave quam rarum. Vidi equidem tu- „ morem hunc in palato adeo celeri gressu ex- „ ortum, ut vix licuerit cogitare de *Gargaris-* „ *mate*, ne dum de aliis auxiliis, præterquam „ de sola *scalpelli incisione*, qua dextre & festi- „ nanter id temporis instituta vidimus non mo- „ do effluxisse inde plurimum aquæ, sed detume- „ scente palato ad se rediisse hominem extinctio- „ ni jam proximum. Unum ex optimis remediis „ pro uvula prolapsa est *semen cannabis* in po- „ sca parum coctum pro gargarismate (inquit „ *Ettmullerus*). Proficua quoque esse possunt „ sequentia pro arbitrio vel potius iudicio periti „ medici usurpata; *decoctum catechu*, *decoctum* „ *rad. tormentil.* cum paucis *sale armoniaco* & „ *alumine crudo*, *gargarisma* pro uvula, *pulvis* „ *uvularis*.

Remedia
varia.

A P H T H Æ.

Boerhaavii sententia.

Aphthæ
quid.Et quas
partes oc-
cupat.

Art. 1136. Aphthæ sunt parva, rotunda, superficiaria ulcuscula os internum occupantia; sunt enim exulcerationes ultimorum emissariorum, hinc occupant omnia loca, ubi talia emissaria hiant; adeoque labia, gingivas, genas internas, linguam, palatum, fauces, tonsillas, uvulam, gulam, stomachum, intestina tenuia, (ad anum usque) ubique fere eadem specie. Præcedere solent, febris, incipiens cum diarrhœa vel dysenteria, nausea, appetitus prostratus, præcordio-
rum

rum anxietas, debilitas magna, evacuatio notabilis, stupor, somnolentia. Varius est aphtharum color, albus, fuscus, flavus, lividus, niger, quarum posteriores sunt peioris notæ. Sapor omnis aboletur; adeo plerumque oris siccitas, interdum, crustis deciduis, salivatio vel diarrhoea adoritur, imo dysenteria ex vasorum dilatatione.

Varius
aphtha-
rum color

Art. 1137. Ut curetur optime hoc malum, exhibenda sunt *calida, diluentia, resolventia, & abstergentia*, ut crusta in faciliem citumque lapsum disponatur; simulac lapsus conciliatus est, tum *anodyno, demulcente, & simul parum corroborante* medicamento utendum, uti *gelatin. C. C. vel seq. ℥. Aq. ros. stillat. syr. papav. alb. ana ℥ij. vitel. ovor. ij.* Misce, hujus pauxillum ore assiduo contineatur. In fine dandum est *catharticum corroborans ex rhabarbaro, &c.*

Curatio.

Ettemulleri sententia.

Art. 1138. Aphthæ succedunt frequentius febribus ingentibus, aliquando oriuntur ex vitio salivæ, & cruditate ventriculi. Aphthas futuras in morbo cognoscimus ex sopore & singultu, qui toto morbi decursu non dormiverunt, in soporem incidunt, & tunc aphthæ prodeunt. Singultus accidit, si sint ex ventriculo, & tunc plerumque sunt deteriores.

Aphthæ
unde.

Art. 1139. Nil pejus quam sæpius purgare in hoc malo. Tota curatio consistit in *humectatione*, quæ emolliat, & leniter calefaciat; optimum est *decoctum raparum cum nitro*, item *decoctum herb. bellidis major. cum ficibus & sal. prunel.*

Curatio.

Farrago sententiarum.

Art. 1140. Spiritus vitrioli vel sulph. melli rosaceo permixtus in pueris ac adultis a Riverio commendatur; si vero morbus sit valde pertinax (inquit

Banda-
num ulti-
mum re-
medium.

quit idem) & humorum fluxus copiosus, adeo ut vita sit in summo periculo, extremum remedium est *Laudanum*, quod dolorem sedat, & humorum fluxum inhibet.

*Cortex
peruv.*

Art. 1141. Post febrem aphthæ, vel singultus, vel horum utervis, si non sponte faceffat, sed in longum tempus decurrat, facile fugatur usu *corticis peruv.* Usurpari potest ad os colluendum gargarisma sequens ℥. *Succ. pomorum agrestium* (omnium opt. *Cochagee*) ℥ss. *Syr. de rub. idæ.* ℥j. m. *Sydenham. sched. mon.*

*Remedi-
um singu-
lare.*

Art. 1142. „ Sequens omnibus remediis, quæ
„ hætenus expertus sum, multis parafangis an-
„ tecellit in hoc morbo vincendo ℥. *Terr. japon.*
„ *pulverisat.* ℥iij. *coq. in aq. calc.* ℥xij. ad tertiæ par-
„ tis consumptionem, colaturæ add. *sacchar. sa-*
„ *turn.* ℥j. *mel. ros.* ℥ij. capiat æger *coch.* j. sin-
„ gulis horis vel sæpius, teneatque paulisper in
„ ore & sensim degluciat: est remedium vere au-
„ reum. Videantur plura in cap. de infantum
„ morbis. (1559.)

GUTTA ROSACEA.

Etmulleri sententia.

*Gutta ro-
sacea.*

Art. 1143. Gutta rosacea est rubor faciei tubero-
sus, pustulosus, guttis interdum sanguineis simi-
lis, qui nasum sæpe & genas inæqualiter & valde
tingit, potatoribus satis frequens est; ut plurimum
ad mortem usque comitatur. Præmissis universali-
bus conveniunt *saturnina*, &c.

Turneri sententia.

*Morbi no-
mina &
descriptio*

Art. 1144. Gutta rosea seu rosacea ita dicitur
a parvis rubicundis quasi guttulis, sive tuberculis
igneis per universam faciem, & præcipue nasum,
hinc inde sparsis. Appellatur etiam *rubedo ma-*
„ *culosa*. „ Rectius vero, me iudice, *INSI-*
„ *GNIA*

GNIA BACCHANTIUM FLAGRANTI
 FULGORE RADIANTIA. Est morbus pro-
 fecto apud *Damnionios* & *Belgas* maxime fami-
 liaris & tere *Endemius* ob pravam bibendi con-
 suetudinem. Tres gradus a quibusdam nume-
 rantur, viz. *Rubedo simplex*, *rubedo pustulosa*,
 & *rubedo ulcerosa*; facies & nasus aliquando in
 molem prodigiosam supercrescunt, adeo ut vul-
 tus aspectu horrifico plane tremendus & mon-
 strosus evadat. Novi quendam hoc morbo glo-
 riose affectum, cui inter pocula, quibus liber-
 time indulgit, sanguis per ipsam cutem variis
 in locis exiliri consuevit, & ubertim confluere,
 quod per aliquot momenta potationis negotio
 impedimento esse solebat; mox vero suppressa
 hæmorrhagia, ut canis immundus vel amica lu-
 to sus ad sordem & illuviem se recipere solent,
 ita ille ad charissimam compotationem lætus re-
 cubat, ibique commorari solitus, donec vultum
 in *torrem* accenderet, tantum non ignem unde-
 quaque spargentem, ipsis tenebris fulgentem.

Art. 1145. Agnoscendum est interim hunc mor-
 bum maxime abstemiis & temperatis interdum sed
 rarius accidere; ut plurimum enim spirituosorum
 liquorum ingurgitatione accersitur.

Art. 1146. Ut ad curam sternatur via, impe-
 randus est victus humectans & refrigerans, &
 idem regimen observandum ac in *psora*, vel in
eruptionibus scorbuticis; sed maxima adhibenda
 est cautela in his mutationibus faciendis; a liquo-
 ribus calidis & spirituosis ad victum tennem &
 potum refrigerantem non est facilis transitus. Ex
antimonio & *mercurio præparata* tam interne quam
 externe sunt maxime proficua. Author noster mo-
 re solito quamplurima remedia ex *Sennerto*, *Ma-
 yernio*, &c. accumulavit, sed in calce monet se
 multoties opem tulisse singularem remediis facile
 parabilibus & minus pomposis, nimirum cum *sa-
 le tartari*, *nitri sacchar. saturni pomato* admist.

*Ad gra-
 dum emi-
 nentem
 proventus*

*Sobriis
 rara acci-
 dit.*

Curatio.

Euporista

albu-

albumine ovorum cum frusto aluminis aut cum granis aliquot camphoræ & sublimat. item ol. myrrhæ, sequens valde efficax perhibetur, ℥. Ovum duriuscule coctum, eximatur vitellum & cum pulv. myrrh. elect. suppleatur locus, & in cellaria suspendatur, ut per deliquium fluat: hoc etiam est cosmeticum insigne, ut & unguentum faciale Bat.

*Remedia
vatis.*

Art. 1147. „ In eruptionibus pustulosis levioribus linimento sequente feliciter usus sum; ℥. Ung. diapomphol. ℥ss. mercur. dulc. ℥j. alum. ust. ℥ss. ol. rhod. gut. iij. ol. ros. q. s. misce. In graviore casu linimento & lotione sequentibus præmissis rite præmittendis; ℥. Litharg. aur. ℥j. sacchar. saturn. ℥j. ung. pomat. fragrantissim. ℥j. ol. rhod. gut. iv. amygd. dulc. q. s. m. f. linimentum pro locis in facie maxime affectis sing. diebus vesperi illinendis. ℥. Aq. plantag. ℥vj. succ. limon. ℥ij. mercur. sublimat. gr. xij. camphor. ℥j. infund. clausæ & calide per horæ dimidiam, colatura sit pro lotione bis vel ter in die usurpanda. Hæc ultima est Aq. divina Fernellii, & sequens Pitcairni. „ ℥. Litharg. aur. ℥ij. mercur. sublimat. corrosiv. ℥j. acet. ℥x. infund. per hor. 12. in vase stanneo sæpius agitando, post subsidentiam effundatur liquor limpidus. Usus tempore instillentur guttæ aliquot ol. tart. per deliquium, donec lactescat. „ In eundem finem adhiberi potest etiam Aluminatum Bateanum præmissis rite præmittendis.

C A P. X I.

Sive Fasciculus Morborum undecimus.

M O R B I C U T A N E I.

Ettmulleri sententia.

Art. 1148. **C**UTIS nigredo est vel *nativa*, *Cutis ni-*
 vel *accidentalis*, prior est incu- *gredo.*
 rabilis; posterior, quæ ab ardore solis contrahi-
 tur, succo citri tollitur; idem facit *spiritus vini*
camphoratus, item *tinctura benzoes*. Interdum *Curatio*
 saponēs odorati cosmetici a delicatis expetuntur,
 qualis est sequens; ℞. *Sapon. venet. ℥j. amygd.*
amar. nucleor. persic. excort. ana ℥ij. pulv. rad.
ireos flor. aron. ana ℥j. sal. tart. ℥ss. ambra gris.
mosch. cum spiritu rosar. solut. ana ℥ss. zibet. gr.
v. cum q. s. essentia benzoes f. massa saponifor-
mis. „ Sequens est cosmeticum insigne ℞. *Flor.*
bismuth. ℥ij. ungt. pomat. albiss. & fragrantiss.
℥vj. ol. rhod. gut. ij. misce. Ut etiam *arcanum*
cosmeticum.

Art. 1149. Lentigines sunt maculæ obscure fla- *Lentigi-*
 vescentes magnitudine lentis, faciem, collum, & *nes.*
 manus defœdantes; cuti pertinacissime adhærent,
 nec facile curantur in iis, quibus per aliquod
 tempus effloruerunt. *Lac virginale, ol. tart. per Curatio*
deliquium, ol. myrrhæ per deliquium cum albumi-
ne ovi parat. &c. ad lentigines tollendas a quibus-
 dam usurpantur.

Art. 1150. Ephelides sunt maculæ cutaneæ fus- *Ephelides*
 cæ & interdum asperæ, mulieribus communes,
 quæ potissimum frontem, interdum genas, imo
 collum & manus deturpantes, in longum & la-
 tum sæpe ad palmæ magnitudinem se explicant;
 gravidas in specie afficiunt, in quibus etiam per
 reliqua ingravidationis signa dignoscuntur.

Art.

Macula hepatica. Art. 1151. Maculae hepaticae sunt obscurae flavi coloris interdum ad palmae fere magnitudinem; nunc minores cum cutis aliquali asperitate; occupant imprimis collum, pectus, atque dorsum, interdum manus cum singulari pruritu. Curantur ut *Lentigines* (1149.)

Sudamina. Art. 1152. Sudamina sunt papulae sudorum, in collo, pectore, brachiis, &c. oriuntur a sudore bilioso cutem exasperante. Schmitz. Milii granis similia sunt, causa proxima est serum plus minus acre. Ettmuller.

Effere.

Effere. Art. 1153. Effere est tuberculorum genus in Graecorum & Latinorum scriptis non occurrens; sed ab Avicenna & Arabibus describitur, & in nostris regionibus frequenter reperitur. Vocatur *Effere*, *Sora* & *Sare*; erumpunt tubercula parva ad rubrum vergentia, duriuscula, cum insigni pruritu, subito universum corpus occupant, non secus ac si ab *Apibus*, vel *Vespis*, vel *Culicibus* homo demorsus, aut *Urticis* percussus esset; ex biliosis & salis humoribus oriuntur. Tubercula haec plerumque brevi temporis spatio, etiam nulla cura adhibita, sponte evanescere solent; & fortasse morbus est paulo lenior & benignior, quam eruptio illa quam nos vocamus a *Rash*, vel quam *Erysipelatis* secunda species Sydenhami (1168.) In opere practico circumspectione & cautela opus est, praecipue si cum eo febricula conjuncta fuerit; nam in hujusmodi eruptionum diagnosi, prognosi, & curatione primae notae medicos deceptos novimus.

Phlyctana. Art. 1154. Phlyctenae seu Phlyctenes sunt vesiculae parvae pruriginosae & ferventes, sero limpidi repletae, quae intra digitos & circa carpos ori solent: Interdum in scabiem & serpiginem degenerant, curantur ut aliae eruptiones cutaneae.

Art.

Art. 1155. Sirones sunt pustulæ in volis manuum & plantis, pedum æstivo tempore emergentes, & cum insigni pruritu molestantes, in quibus latent subtilissimi vermes Sirones dicti; ac effodiendi sunt; usurpanda sunt unguenta & lotiones mercuriales.

Art. 1156. Vari sunt tumores parvi & duri ex rubedine in summitate tandem albescentes, ut plurimum in facie & collo oriuntur magnitudine seminis cannabis. Juvenes utriusque sexus ad venterem aptos præ cæteris molestant; ubi rubor intensus conjunctus est, difficilis est satis curationis, & licet pustulæ removeantur, rubedo tamen permanet, cui si inflammatio & raucedo conjungantur Lepre imminentis signum est. *Lac virginis, sachar. saturn. essentia benzoës, camphorata, &c.* usurpari possunt. Curatio :

Art. 1157. Lichen, serpigo & Herpes sunt affectus sibi ipsis cognati gradibus vero a se invicem distantes.

Art. 1158. In Lichene cutis est aspera cum pustulis hinc inde erodentibus, crustis furfuraceis & cum summo pruritu ad partes vicinas serpentinibus.

H E R P E S.

Turneri sententia.

Art. 1159. Herpes simplex est cum pustulæ singulæ (plerumque in facie) oriuntur; sunt albidæ, aut flavæ, & acuminatæ cum basi inflammata; a puris guttula, quam continent, exoneratæ sponte exarescunt. Herpes simplex.

Art. 1160. Herpetis species secunda est Serpigo, nos Angli vocamus a Tetter, vel a Ringworm. Pustulæ minutæ accumulatim exurgunt, quandoque figura rotunda vel annulari cum dolore & pruritu insigni. Serpigo ad digestionem nunquam pervenit, tantum ex scalpura humore tenui defluit.

Art.

Curatio.

Art. 1161. Difficillime curatur, postquam enim penitus extincta videtur, certis anni temporibus repullulare solet. Vulgus uti solet atramento; sed in morbo pertinaci præmitti debent universalia; egregie faciunt *agua minerales cathartica* & postea sequens linimentum, ℥. Unguent. rosat. ℥j. mercur. precip. ℥j. Arcan. corallin. ℥ss. ol. Rhod. gr. ij. m. efficax etiam est *lac sublimat.* ut aliquoties expertus sum, sed usurpandum est cum cautela, ne inflammationem inducat. Lotio sequens a *Parac.* commendatur, ℥. Sulph. calcanth. alum. ana ℥j. macerentur in q. s. *aceti fortis*, & coletur liquor pro lotionem.

Herpes
miliaris.

Art. 1162. Herpetis species tertia est *Herpes miliaris*, idiomate nostro audit *the Shingles*. Ex innumeris parvis pustulis constat variis in corporis partibus erumpentibus, viz. Cervice, pectore, lumbis, femoribus, &c. Locus affectus nonnihil inflammatur, æger leviter febricitat, assurgunt pustulæ albidæ & suppurantur, succedunt parvæ rotundæ crusticulæ semina milii referentes, unde nomen.

Curatio.

Art. 1163. In hoc morbo tractando indicationes curativæ quoad remedia interna eadem omnino sunt ac in *Erysipelate*; cavendum est primario, ne repercutiantur pustulæ; conveniunt ergo discutientia: pustulæ eminentiores forcipe scindantur, & applicetur *ceratum ex oleo & cera*, ut vestimentis minus hæreant. In declinatione adhibere licet *exsiccantia*, ut *unguentum diapomphol. sutia*, vel potius nostrum *ceratum de lapide calaminari*, Applicatio sequens valde efficax perhibetur ℥. Sem. sinap. contus. ℥ss. vitriol. virid. in q. s. aq. plantag. solut. ℥ij. misce. Unguentum *Herpeticum Bateanum* usui esse potest.

Art. 1164. ,, Herpes miliaris ad naturam *Psoræ* proxime accedit (inquit *Vviseman*) quapropter *cathartica mercurialia*, nec non *alterantia*, ad curam rationalem exposcit.

Sch-

Schmitzii sententia.

Art. 1165. Herpes exedens est pustulosa inflammatio cum pruritu & rubedine, partem, in *Herpes exedens.* quam serpit, exulcerans; oritur a bile ardentissima; facile summum corpus ad epidermidem usque penetrat, ubi cum retinetur, nec ultra expirat, eam partem exedit.

Art. 1166. Frequens cathartorum usus adhibendus est. Profunt unguentum *Diapomphol. & alb. Rhas.* nec non plumbi lamina in aqua aluminosa diu macerat. Si tumor usque adeo acris, ut ulcus phagedænicum excitet, quod mitioribus nequaquam cedit medicamentis, ad valentiora recurrendum; ad *Arsenic. sublimat. optime trit. & cum unguento alb. mixt.* Denique si magis magisque serpat ulcus, ad ferrum ignitum accedendum. *Curatio.*

E R Y S I P E L A S.

Sydenhami sententia.

Art. 1167. Erysipelas seu ignis facer quancunque partem corporis occupat, at præ reliquis faciem; ex improvise corripitur æger, dum sub dio versatur (*rusticis syderatio audit*) pars affecta paulisper intumescit cum dolore & rubore summis, (ac ingenti æstu,) & denso minimarum pustularum ordine distinguitur, quæ aucta magis inflammatione in vesiculas subinde facessunt. Sensim latius serpit malum, & de loco in locum progreditur & febrem habet conjunctam. *Erysipelas.*

Art. 1168. Alia est etiam species, licet rarius occurrens, ex nimia spirituosorum liquorum com- *Alia species.* potatione plerumque orta; febriculam, quæ agmen ducit, mox excipit pustularum per universum fere corpus eruptio, quæ urticarum puncturas referunt, & non nunquam in vesiculas attolluntur, mox recedunt cum pruritu vix tolerando, quoties scalpturam subeunt, denuo apparent.

Curatio. Art. 1169. *Venæsectio* convenit & postero die *lene catharticum*, & *paregoricum* hora somni. Pro usu externo *fotus discutiens*, & *mistura* sequens, ℥. *Spir. vin. t̄ss. theriac. androm. ʒij. pulv. piper. long. garyoph. ana ʒij.* misce, *charta emporetica* hac *mixtura* *madefacta* *parti circumvolvatur*. Sanguis in hoc affectu est *pleuritico*rum similis, & quandoque *secunda*, vel *tertia Venæsectio* postulatur.

Art. 1170. Altera species pari fere modo *amolien-*
da est, nisi quod *remediis externis* minus egeat.

Ettmulleri sententia.

Differen- Art. 1171. Erysipelas digito leviter pressum *ma-*
ria ab in- *culam albam* ostendit & subito rursus *rubescit*,
flamma- quod non fit in *inflammatione*, nisi fortius *pre-*
tione. matur. *Scorbutici* huic morbo sunt *obnoxii*.

Curatio. Art. 1172. *Purgatio* est summe vitanda; *venæ-*
sectio est periculosissima: Est enim morbus *cuta-*
neus; ideoque interne *diaphoreticis* cura est *in-*
choanda & *absolvenda*, inter quæ *Rob. Sambuci*
eminet, est *potens sudoriferum*. Externe omnia
Curatio. *unctuosa astringentia* & *actu frigida* sunt *fugien-*
da. *Spiritus Theriacalis camphoratus* est *reme-*
dium laudabile. Erysipelata per *unguenta oleosa*
aut *mucilaginoso* inepte tractata subito *serpentem*
inducunt gangrenam.

Freindii sententia.

Cathar- Art. 1173. De *purgatione* in Erysipelate haud
sis in Ery- *convenit* inter *authores*, sed omnia *dubitanter*
sipelate *proponunt*, & in ultimo morbi *discrimine*, vel
capitis. nulla dant *consilia*, vel *timiditatis* atque *hæsit-*
ationis plena; mihi vero satis *experimentis* esse
edoctus videor, ut *pronuntiem* in *capitis Ery-*
sipelate, si quando *cerebro tentato* *oboriatur Co-*
ma, *delirium*, *nervorum distentio*, aut nullam
sub-

subesse salutis spem, aut *purgantia* maxime profectura. Neque in his rerum angustiis expectandum esse, quod & in variolis experimur, dum vel febris lenita sit, vel tumor plane subsederit. Nam cardiacis refrigerantibusve remediis contra febrem pugnare, topica admoveere, quid demum aliud est, quam nugas agere, donec in medio curationis cursu æger intercidad? Exemplum singulare huius praxeos in medium profert doctissimus author. *De Feb. commentar. vij. p. 117. quod vide.*

Farrago sententiarum.

Art. 1174. Erysipelas foris intro verti non bonum: intus vero foras bonum (inquit *Hippocr.*)

Art. 1175 Epithema sequens a *Barbette* commendatur, ℥℥. *Trochisc. alb. rhas.* ℥j. *camphor.* ℥j. *sp. vin.* ℥j. *aq. sambuc.* ℥vj. f. mixtura, cum hac madefiant lintea, & calide applicentur, & sæpius renoveantur, quoties siccescunt. Epithema.

Art. 1176. D. *Turner* valde commendat misturam ex *ol. sambuc.* & *aq. calcis* cum paucis spiritu vini camphorat. Existimat misturam *Sydenhami* esse nimis calidam, sed (credo) inexpertus loquitur; est enim profecto medicamentum in hoc affectu omnem laudem exuperans, ut per vicenium multiplici experientia comprobavi. *Cataplasma fimi vaccini* est valde proficuum ad dolorem leniendum. Vindicatio mixtura Sydenhami.

Art. 1177. In Erysipelate symptomatico convenit linimentum seq. ℥℥. *ol. sambuccin. lixiv. ten.* ana p. æ. agitentur invicem diutissime in phiala, donec in unguentum coalescant: valet etiam lotio ad Erysipelas *Fulleri*, quam ex experientia sua author laudat. (Vid. *Essere* 1153.) Erysipelas symptomaticum.

P S O R A.

Ettmulleri sententia.

Scabies
humida
& sicca.

Curatio.

Art. 1178. Scabies est vel *humida*, quæ apparet sub forma ulcusculorum cutaneorum; vel *sicca*, quæ saniem exsiccatam & incrustatam repræsentat.

Art. 1179. Humida facilius curatur quam sicca; purgandum est cum *helleboro* & *mercurialibus*; conducunt *absorbentia* & *sudorifera* ex *antimonio* præparata, decoct. *elignis*, *viperina*, *rob. sambuc.* &c. externæ conveniunt remedia ex *saturno*, *mercurio*, *sulphure*, *calce viv.*, *camphora*, *nicotiana*, *litharg.* &c. ℞. Ungt. *nicotian.* ℥ss. flor. *sulph.* ℥ij. *mercur. dalc.* ℥j. ol. *hyperic.* q. s. m. conveniunt etiam balnea ex *herbis* & *radicibus* appropriatis. (in lixivio tenui coctis). Vide plura in cap. de morbis infantum. (1561.)

Celsi sententia.

Pfora
quid.

Prognosis.

Art. 1180. Scabies (sive Pfora) est durities cutis rubicundior, ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies; fitque ex his continuata exulceratio pruriens, serpitque in quibusdam cito. Atque in aliis quidem ex toto desinit, in aliis vero certo tempore anni revertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eo difficilius tollitur; itaque eam, quæ talis est, *ἀνείαν* Græci appellant, id est *feram*. In juvenili ætate sæpe ab aliis morbis præservat, vel eos sanat; diuturnior in lepram migrare potest; in senibus contumax & curatu difficilis; *sicca* difficilior curatu, quam *humida*; quæ ex interno humorum vel viscerum vitio oritur; & plerumque critiche erumpit, minime impedienda, nec intus repellenda.

Vvil-

Vuillisi sententia.

Art. 1181. Pfora sive Scabies est pustularum in corpore sparsim eruptio, præcipue circa juncturas artuum, & inter digitos, ab humore acris ^{Quas partes ob-} & falso procedens, ob pruritus insignem scalpen- ^{fidet.} di necessitatem inducens. Nullius certe morbi la- ^{Contagio-} bes (peste tantum excepta) facilius aut certius ^{sa.} quam Pfora propagatur.

Art. 1182. Præmissa venæsectione utilissime propinatur cerevisia medicata sequens, ℞. Rad. poly- ^{Curatio} pod. querc. lapath. acut. ana ℥iij. sen. opt. ℥iv. epi- rhym. turbit. mechoacan. ana ℥ij. santal. citr. ℥j. sem. coriandr. ℥vj. præpara s. a & f. saccul. pro cerevis. conjug. iv. post dies v. vel vj. hauriatur & sumatur ℥xij. plus minus omni mane per viij. vel x. dies. Pro usu externo sulphur in hoc morbo virtutem quandam specificam habere videtur, & linimentorum fere omnium est basis. ℞. Axung. porcin. ℥iv. flor. sulph. ℥ss. pulv. zinzib. ℥ss. ol. tart. per deliq. q. s. m. f. unguentum, cui odoris gratia addi possunt guttæ aliquot ol. rhod. Unguenta ex hydrargyro sunt periculosa. Restat adhuc alius facilior & multo elegantior pruritus sanandi modus; nempe, ut indusium aqua font. cum sulphure pulverisat. incoctum & exsiccatum super nudum ^{Alia me-} corpus per 4. vel 5. dies gestetur; ita namque mor- ^{thodus} bus iste sine balneatione, aut litus squalore, aut ^{curatio-} malo odore curari solet. Pauperes flores sulphu- ^{nis.} ris cum lacte intus sumant.

Farrago sententiarum.

Art. 1183. Borellus pro pauperibus & militibus ^{Sapo ni-} commendat solam saponis nigri lotionem, sed ci- ^{ger.} to abluenda est, ne cutem excoriet.

Art. 1184. ℞. Pulp. subtilissim. rad. hellebori al- ^{Radix} bi q. v. flor. lact. q. s. m. f. Unguentum. Acrem ^{hellebori} dolo- ^{albi.}

dolorem excitat, & interdum inflammationem; ideoque omnibus minus convenit: morbum vero, ubi usurpari liceat, fere semper certo sanat. *Decoctum ejusdem radicis* est forsan medicamentum tutius & elegantius.

*Animal-
cula.*

Art. 1185. Ex pruritu intolerabili hunc affectum jugiter comitante *animalcula* in causa esse, & morbi essentiam constituere quidam suspicati fuerunt; unde etiam ejusdem *contagium* adeo prompte communicari crediderunt: sed nondum aliquid de hac re compertum habemus nisi quod a Dre. Bononio traditum invenimus *Philos. Transact.* N. 283. qui (si ei fides adhibenda sit) rem extra dubium posuit: ille enim loco citato *animalculum* descripsit figura externa instar testudinis, ejusdemque iconem exhibuit; ova quoque facto scrutinio reperit, unde generatione citissima quemadmodum pediculi producuntur. Curiosus videat locum.

*Saliva-
tio.*

Art. 1186. In morbo inveterato & remediis aliis haud cedenti excitare licet *Ptyalismum*.

*Remedia
potentio-
ra.*

Art. 1187. In officinis optimum remedium est *unguentum ex oxylapatho*. Potentissima sunt *balneum & linimentum ex Barbette*. Interne *ethiop. mineral. bezoar. mineral. carn. viperin. antimon. diaphor. tinct. antimon. decoct. e lignis gum. guaiac. &c.* Extreme *unguentum herpeticum, unguentum psoricum mercuriale, lotio mercurialis*; hæc postrema cum cautione sunt usurpanda.

I M P E T I G O.

Vuillisi sententia.

*Impetigo
quid. E-
jusdem
graphica
descri-
ptio.*

Art. 1188. Impetigo varia sortitur nomina, appellatur *Lichen, vitiligo, lepra graecorum, &c.* Imprimis papillæ sive pustulæ rubræ, modo singulares, modo plures simul congestæ in variis corporis partibus, præsertim vero in brachiis aut cruribus exoriuntur; quibus singulis novæ adjun-
gun-

guntur, & latius serpentes sese in orbem diffundunt, cujusque harum superficies & nonnihil albidula & squamosa apparet, unde, si scalpatur, squamæ decidunt, & ichor sæpe tenuis exsudat, qui tamen mox exsiccatus, in squamam rursus crustaceam indurescit. Hic affectus quandoque membra singularia infestat, reliquis partibus intactis; & est naturæ mediæ inter scabiem & lepram; differt a priori, quoad pustularum formationem; namque in Psora ubique fere singulares, & spatiis licet exiguis, ab invicem remotæ existunt, hic plures conglobatim, & quasi per racemos magnis intervallis sejunctos erumpunt. Lepra multo immanior est & horrenda, viz. crustacea & squamosa, ubique continua, & per totum corpus diffusa.

Differentia hujus morbi a Psora & Lepra.

Curatio.

Art. 1189. Impetigo difficulter admodum curatur, & si in affectionem quasi leprosam transeat, incurabilis ut plurimum evadit. Remedia fere tantum magna in curando hoc affectu valent, cujusmodi sunt venæsectio, cathartica mercurialia, serum lactis (medicatum) acidula chalybeata, herbarum expressiones succulent. Decoct. e lignis, medicamenta chalybeata, salivatio, &c. Sæpius lui veneræ aut scorbuto supervenit. Balneatio interdum nocet; novi plures haud graviter impetiginosos Bathoniam profectos, inde prorsus leprosos rediisse. Acidula purgantes contra impetiginem leviolem juvare aliquoties comprobavi, sed plus valent, aqua Tunbrigenses, &c. sed præ reliquis remedia viperina in hoc affectu, ut & in elephantiasi & ipsa lepra insignem habent virtutem. Inter topica balnea aut linimenta e pice liquida confecta, cæteris quibusque longe præstant; formulæ utriusque apud authorem subduntur. Fortissima sunt unguenta mercurialia.

Per remedia magna.

Art. 1190. „ Quantum confert ad hunc morbum curandum corpus in ipso mari frequenter „ abluere & aquas marinas sæpissime ac diutissime

Lepra.

„innatāre est experimentum satis notum & pe-
ritissimis medicis comprobatum.

Ettmulleri sententia.

*Signa
diagnosti-
ca.*

Art. 1191. Lepra convenit cum scorbuto confirmato; est etenim summus & contumacissimus *scabiei scorbuticæ* gradus; in lepra vero longe major est succi nutritii corruptio, quam in scabie, quatenus non tantum cutis, sed etiam subjacentes partes carnosæ exulcerantur; scabies ferina & inveterata in lepram degenerare solet. Contagium ad tertiam vel quartam generationem interdum propagari solet. Inter signa externa apparet cutis nunc ad colorem lividum & nigrum vergens, nunc flavescent & ex rubro nigricans. Aeri exposita mox corrugatur, exasperatur & infrigescit, tota apparet unctuosā, ut aqua ipsi inspersa vix hæreat, sensim crassescit, rugosa & asperior redditur; furfure nunc purpureo nunc albicante, ac sic calce incrustata esset, imprimis in facie adspersa videtur, multisque nodositatibus tuberculis mobilibus & indolentibus, potissimum pone aures, circa frontem, mentum, & artus defœdatur, & morphæa, impetigine, & scabie sicca pertinaci, aliisque pustulis afficitur (de reliquis signis diagnosticis consulator auctor. (pagin. 587.)

Prognosis.

Art. 1192. Lepra inveterata incurabilis est; sanguis in lepra foetidus est & nigrescens; serpi-
go, & impetigo in manuum ac pedum digitis, cum pilis parvis ascendentibus est malum signum.

Curatio.

Art. 1193. Tanquam *Lues Venerea* curanda est. *Viperina* maxime conducunt. *Balnea, Therma* &c. in usu sunt.

Turneri sententia.

Art. 1195. Lepra Græcorum apud nos saltem
non

non est adeo frequens, aut maligna, ac apud exteros, ubi comparata sunt *Nosocomia Sti. Lazari*, ut ob funestam morbi contagionem infecti ab humano genere prorsus dissociantur. *Ambrosius Paræus* animadvertit in nonnullis *Germaniæ* regionibus eam inveniri, sed frequentius in *Hispania*, & per totam *Africam*, & quibusdam locis in *Gallia*.

Quibus
regioni-
bus fre-
quentior
est.

Art. 1195. Lepra ut plurimum circa cubitos & genua primo erumpit, mox latius serpit, & per universum fere corpus sensim caput attollit.

Art. 1196. Lepra hæreditaria & inveterata est prorsus incurabilis. Ad hunc affectum curandum veteres & recentiores quoque commendant remedia *viperina*, item ex *antimonio*, *mercurio*, & *fulphure præparata*, *guaiacum*, *radices oxylapath. polypod. epithem. &c.* *Jacobus Dovynetus* virtutes decocti *corticis ulmi* magnopere extollit cum vino albo diutius propinati, asseritque remedium esse certum; extat in *Pharm. Bat.* Etiam si omnes fere scriptores in viperarum laudibus tanti sunt; *Fernelius* tamen & *Palmarius* eas esse omnino inutiles affirmant, præcipue in corporibus calidioribus. Ipse *ptyalismus* ad hunc morbum contumacissimum penitus eradicandum impar frequentissime invenitur. Inter cætera linimentum sequens in usum adhibere soleo; *℞. Unguent. e flor. aurant. ℥j. mercur. præcip. alb. ℥iſſ. camphor. ℥ſſ. vitriol. alb. ꝯſſ. ℥j. misce*, Author noster copiosa formularum segete ex optimis scriptoribus collectarum abundat; & revera de morbis cutaneis erudite ac pulchre scripsit.

Salivatio.

Ex Cl. Deodato apud Fabricium Hildanum.

Art. 1197. Elephantiasis *Græcorum*, seu Lepra *Arabum*, est affectus contagiosus plurimum vitiorum congerie corpus defœdans. In cute vel faciei, vel frontis, vel genarum, cubiti, femorum,

Elephantiasis descriptio.

ma-

manuum, pedumve tubercula facile mobilia, indolentia, & ex livore ad rubedinem tendentia, horridumque aspectum præbentia epullulant; in ore, in palato, in faucibus circa linguæ radicem, tubercula nunc flavescentia, nunc sublivida exoriuntur; in pedum digitorum interstitiis, vel in plantis, in crassa præsertim & dura illius parte, item in aliis artuum locis ulcera efflorescunt, hæc ulcera & fissuræ veram cutem penetrant, lata sunt, & ulterius serpunt labiis callosis ac pertumidis, atque læsa facile cruentant, indolentia licet: ulcera quoque nares depascunt; adsunt tumores in aurium ambitu, crassescunt labia, pedes manusque valde inflatæ ac tumidæ sunt.

Ettmulleri sententia.

*Morbus
describi-
tur.*

Art. 1198. Elephantiasis *Arabum* ita vocatur, quia cutis tumida, rugosa, & aspera apparet. Senes vino liberalius indulgentes quandoque invadit. Est tumor pedum (crurumque) rubicundus, lividus seu nigricans cum ulceribus varicosis, e quibus serum acre limpidum effluit; interdum etiam solæ crustæ furfuraceæ totos pedes occupant (*Lepra est universalis*). Affectus ut plurimum est criticus, ideoque cavendum est ab externis repellentibus, ne gravius malum excitetur.

Turneri sententia.

*In nostris
regioni-
bus vix
occur-
rens.*

Art. 1199. Elephantiasis sive *lepra Arabum* est morbus in nostris regionibus, saltem nunc dierum vix cognitus. Ab *Aretæo* eleganter describitur; nomen accipit (inquit ille) ab aspectu fædo & deformi, ex partium inæquali protuberantia, & cutis densitate ac scabritie, hinc inde rugis & fissuris, labiis tumidis interspersæ, *elephantis* cutem quodammodo referentis. Mendicantem in agro prope *Londinum* jacentem vidimus morbo

bo huic maxime affini miserrime laborantem.

Art. 1200. Hic affectus apud authores *Leontiasis* & *Satyriasis* appellatur; & ob magnitudinem morbi a plerisque medicis plane incurabilis merito agnoscitur. *Remedia ad lepram Græcorum*, si quæ alia, hic locum habent. *Decoctum ulmi Pharm. Bat.* potanti graveolentissimos movet sudores (inquit author) & cum vino albo epotum ab *Elephantiasi* & *Lepra Græcorum* liberat. *Est incurabilis affectus.*

Tovvnei sententia.

Art. 1201. In Insulis Caribarum *Æthiopes* servituti mancipati (& etiam inter incolas alterius coloris nonnulli) *Elephantiasi* sunt obnoxii; graviore alicui morbo ut plurimum est succedanea, iis præcipue, quibus ex dura necessitate infortunium est victu insalubri sustentari, accidere solet. Hic sequitur morbi hujusce *graphica descriptio*, quam videre licet apud authorem, eadem fere cum modo ab *Aretæo* memorata. Morbo jam plene formato homo cæteroquin bene se habet, neque incommoditatem ullam sentit, nisi molestum onus monstruosi cruris, quocum tamen per viginti annos duræ servitutis muneribus, quibusdam saltem, fungi novimus. *Elephantiasis amputato crure* solet statim alterum invadere. *Æthiopes famularis.*

C O M B U S T I O.

Ex Pavio apud Hildanum.

Art. 1202. Combustio est solutio continui epidermidis, & cutis ut plurimum, nonnunquam etiam carnis musculosæ, venarum, arteriarum, nervorum, &c. vi ignis impressa: hanc autem combustionem sequuntur mox dolor acerbissimus, inflammatio, pustulæ; & si combustio profunda, corpusque cacochymicum fuerit, facillime degenerat in ulcus foetidissimum & malignum. *Combustionis definitio.*

Art.

*Primus
gradus.*

Art. 1203. Tres sunt gradus combustionis. In primo gradu cutis rubicunda est, dolor acerbissimus & pungitivus, non aliter, ac si cutis urticis fricata esset, mox inflatur locus & elevantur pustulæ, in quibus aqua clara & alba continetur, tandem quoque epidermis separatur; primum & precipuum negotium est ut impediamus, ne pustulæ oriantur, hocque fit locum combustum in oleum vel aquam calidam quantocius immergendo, vel ad ignem admovendo; est etenim ignis proprii inusti mali alexiterium; hinc cepæ in mortario cum sale contusæ & paucio sapone empyreuma ad se attrahunt.

*Intentio
curativa.*

*Gradus
secundus.*

Art. 1204. In secundo gradu pars illico inflatur, rubescit, dolet, urit, & ipso momento pustulæ elevantur, ægerque de tensione cutis conqueritur: est enim vi ignis contracta atque densa. In hoc casu ubi vera cutis combusta & contracta fuerit, non cepæ, sal, sapo, &c. applicanda sunt, sed remedia emollientia, calida & humida, toti loco ambusto imponatur sequens unguentum; ʒ. Unguent. basil. ʒi. ol. ros. lilior. alb. ana ʒss. vitel. ou. N. ij. misce, & applicato defensativo, pars affecta involvenda est fascia in oxycrato madefacta; unguento prædicto addi potest crocus, vel etiam opium in extremo dolore.

*Gradus
tertius.*

Art. 1205. In tertio gradu ipso momento, dum res ignita adhæreat corpori cutis illico evadit nigra vel saltem livida, & obtuse sentit, si scalpello pungatur; est enim dura & exsiccata crusta, ea cum deciderit, remanet ulcus profundum & putridum.

Curatio.

Art. 1206. Tertius gradus est admodum periculosus; est enim metus gangrænæ; quo circa eschara in diversis locis ad carnem usque incidenda est, idque fieri debet primo vel secundo die, hoc facto, unguentum in secundo gradu præscriptum applicari potest, defensativum, &c. convenit venæsectio revulsionis gratia. Sequens autem fomen-

fomentum vim habet sedandi dolorem, cutem emolliendi, & digestionem promovendi; ℞. Rad. albh. ℥ij. sem. cydon. fanugr. ana ℥ss. flor. cham. melilot. ana Mj. coq. in aq. font. q. s. pro fotu (& add. sp. vin.) Si vero combustio adeo magna fuerit, ut in gangrænam degeneret, caute & cum iudicio procedendum est, & semper aliquid applicandum, quod putredini adversetur.

Art. 1210. Pustulæ statim ab initio in omni combustionem incidendæ sunt, ut aqua acris & fervida effluere queat. *Vesiculae semper incidenda.*

Art. 1211. In oculorum combustionibus applicantur *defensativa* fronti & temporibus, fluxio humorum ad partem *venæsectione* & omni arte inhibenda est; oculis continuo instilletur *lac muliebre* cum aq. ros. commistum, & applicetur sequens cataplasma; ℞. Pulp. pomor. assat. ℥ij. farin. fanugr. ℥ij. hord. ℥j. coq. in lacte vaccin. & f. cataplasma, cui add. croc. ℥ss. Interim universalia recte instituantur. In omni combustionem, ubi dolor est vehemens & ultra tolerantiam applicari potest cataplasma ex mic. panis alb. in lacte coct. cum paucis croco & opio ad dolorem mitigandum, ad tempus saltem, sed in oculorum combustionibus cavendum est de opio. Sanguis columbinus ab animali tepidus eximium habetur *anodynum*.

Art. 1212. Magna adhibenda est cura ne turpis cicatrix post combustionem curatam relinquatur, ut autem hoc incommodum vitetur, ab initio usque ad finem curationis *emollientia* sunt usurpanda, & postea applicanda est *lamina plumbea spissa mercurio inuncta*. *De cicatrice turpi præcavenda.*

Art. 1213. Si facies pulvere *bombardico* combusta & grana pulveris cuti infixæ fuerint, illico extrahendus est pulvis, quantum fieri poterit, acu vel alio instrumento acuto; si vero chirurgus in principio non advocatus fuerit, ita ut cutis jam cicatrizata, maculæ vero nigræ relictæ fuerint, necesse est denuo exulcerare cutem *vesicatorio*. *Facies pulvere pyrio combusta quemodo curanda.*

Art.

Combustio a fulmine.

Art. 1214. Ignis a fulmine omnium vehementissimus & periculosissimus est, in se continet facultates quasdam supernaturales, quibus animal quandoque protinus extinguitur. Si partes externæ lædantur secundum gradum ustionis sunt medicandæ, sicut in aliis combustionibus, nisi quod putrefacientia & escharam relaxantia hic locum non habent; sed escharæ statim scalpello excidendæ sunt; & interne optima cardiaca sunt propinanda.

Sydenhami sententia.

Vires sp. vini in ambustis.

Art. 1215. Omnibus remediis quotquot adhuc inventa fuere, spiritus vini facile palmam præripit in ambustis, cum cutem subjacentem ab omni putrefactione tueatur, ac vendicet, atque eo nomine curationem quam cito absolvat, digestionem, quæ non nisi admodum tarde sua tempora percurrit, etiam non moratus: nempe si lintea spiritu vini imbuta partibus ab aqua ferventi, pulvere pyrio, vel simili, læsis, quamprimum hoc infligitur malum, applicentur, eademque spiritu dicto madefacta subinde repetantur, donec dolor ab igne penitus evanuerit, & postea solummodo bis in die.

Farrago sententiarum.

Remedia varia.

Art. 1216. In ambustionibus superficialiis (inquit Turner) mihi solemne est imponere ol. lini & aq. calc. simul conquassat. vel ol. sambuc. & alb. ovor. Vesiculæ aqueæ resecandæ sunt, & unguent. diapomph. vel quod melius est ceratum nostrum de lapide calaminari locis excoriatis applicandum. Inde ceratum (pluribus intentionibus satisfaciens) convenit etiam in gradu secundo ambustionis. Et revera est medicamentum omnem superans laudem, non modo in hoc casu, sed etiam in vulneribus & ulceribus curandis. Ex-

tat

rat apud authorem exemplum curationis ambu-
 stionis gravissimæ, in qua tota praxis venuste il-
 lustratur. Chirurgus librum consulat., Ubi plu-
 „ res partes, vel totum corpus ambustum est, ra-
 „ ro ægri convalescunt, sed vehementia sympto-
 „ matum misere moriuntur. *Vviseman* commen-
 „ dat cataplasma ex fimo equino ad empyreuma
 „ extrahendum. *Calx viva* multoties lota cum ol.
 „ lini vel hyperici, item ceratum ex cerussa & ol.
 „ lini, spirit. vin. camphorat. &c. sunt remedia
 „ vulgaria, sed minime contemnenda. Sequens
 „ est *Boyleanum*, ℥. Sacchar. saturn. ʒss. acet.
 „ vin. alb. opt. ʒiv. f. solutio, deinde add. ol.
 „ sambucin. q. s. ut fiat unguentum.

*Nonnulla
vulgaria.*

C A P. XII.

Sive Fasciculus Morborum duodecimus.

TUMORES IN GENERE.

Art. 1217. **N** Usquam unquam vidi definitio-
 nem tumoris, nisi ex aliqua par-
 te peccantem; quocirca sequentem in medio pro-
 tuli. Tumor in genere est præternaturalis alicu-
 jus partis, vel totius corporis, magnitudo mole
morboſa aucta.

*Definitio
tumoris.*

Ettmulleri sententia.

Art 1218. Tumores proprie dicti oriuntur vel
 a stagnatione, hoc est ab impedito fluidorum tran-
 situ; vel a congestione paulatina, ubi facta quasi
 secretionem tumore procreantur; vel denique per
 novi humoris in parte generationem & collectio-
 nem; Exempla primæ speciei habemus in phleg-
 monibus, tumoribus cedematosis, flatuosis, &c. Per
 con-

*Tumores,
eorundem
tres spe-
cies.*

congestionem paulatinam nascuntur tumores critici; per novi humoris in parte generationem producantur topi, caneri, ganglia, tumores omnes in cystide contenti, &c.

Intentio-
nes cura-
tiva.

Art. 1219. Remedia quod attinet, tumoribus in genere applicanda in tres classes dividuntur (secundum totidem curationis intentiones) in res-
solventia, *discutientia*, & *suppurantia*, repellentibus a medicis sanioribus jam ex usu merito repudiatis.

Resolven-
tia primi
gradus.

Art. 1220. *Resolventia*, *emollientia*, seu *attenuantia* primi gradus sunt radices & herbe malv. alth. mercurial. violar. lilior. alb. parietar. flor. melilot. sem. lini, fenugr. carica pingues, uva passa, axungia, medulla, ol. amygd. dulc. lilior. alb. unguent. dialth. &c.

Secundi
gradus.

Art. 1221. *Resolventia* secundi gradus sunt radices & herb. apii, puleg. cepæ coct. charesolii, sambuci, cicut. scabios. flor. hyper. croci, sambuci, chamæm. adeps anserin. ursin. gum. caramahac. styrac. liquid. terebinth. farin. fabar. spermaceti, ol. cham. amygd. amar. hyperic. laurin. empl. de cicuta cum ammoniac. diachylon. &c.

Tertii
gradus.

Art. 1222. *Resolventia* tertii gradus sunt radices & herb. bryon. cucumer. agrest. raphan. cepæ crud. asari, scill. absynth. centaur. min. nicotian. sem. sinap. erucæ, cymini, gum. ammoniac. galban. bdell. sagapen. opopanax. elem. myrrh. nidus hirundin. spir. urinae, armoniaci, spir. vini, fermentum, ol. lateritium, scorpionum, terebinth. lumbricorum, nicotiana, petreleum, bals. sulph. Unguentum martiatum, diachylon cum gummi, oxycroc. diasulphuris, de cicuta cum ammoniaco, de ranis cum mercurio. Ex simplicibus prædictis varia fieri possunt composita, fomenta, cataplasmata, &c.

Discu-
tientia.

Art. 1223. *Discutientia* sunt prædictis vicina (imo pleraque simplicia & composita resolutivum tertii gradus sunt discutientia) talia sunt, quæ

CAP. XII. Tumores in genere. 417

quæ sequuntur, radices feniculi, ireos, aristolochia rotund. cucumer. asinin. pyreth. zinzib. flor. sambuci, plantæ aromaticæ, organ. puleg. thym. majoran. rosmarin. absynth. salvia, ruta, sabin. lavend. hyssop. abrotan. flor. cham. melilot. lavend. salv. croci, anthos, bacc. junip. lauri N. M. mac. &c. aromata, sem. anethi, cym. fenic. rutæ, sinapeos, castor, camphora, ol. lumbric. cham. cym. anisi, spica, terebinth. succini, sulphuris, stercora animalium, &c. Ex prædictis simplicibus fieri possunt fots, cataplasmata, &c. sequens cataplasma potenter discutit; ℞. Flor. laur. rosmarin. rut. ana Mj. flor. cham. sambuc. summit. aneth. ana Mss. coq. in aq. & vin. a. p. æ. ad mollitiem, deinde add. far. fabar. fursur. stercor. vaccin. ana ℥ij. mellis ℥iv. m. f. cataplasma. „ Fots sequens est valde discutiens; ℞. Summit. hyperici absynth. centaur. min. ana Mij. flor. cham. sambuc. ana p. ij. bacc. junip. laur. ana ℥iss. coq. in lixiv. ten. ℔vj. ad ℔iv. in colatur. dissolv. sal. armoniac. crud. ℥j. & usus tempore add. sp. vin. commun. ℔j.

Art. 1224. Externis hisce commodissime simul adhiberi debent diaphoretica interna ex alcalium republica desumpta. Diaphoretica interne.

Art. 1225. Suppurantia denique sunt medicamenta, quæ maturationem faciliorem ac promptiorem reddunt; eminentiora autem sunt, quæ sequuntur; radix alth. lilior. alb. brionie, cepæ coctæ, allii sub cineribus cocti, herb. malvæ, alth. flor. melilot. chamem. croci sem. lini, fenugr. far. bord. tritici, mic. panis alb. carica pingues, gum. ammoniac. oleum, lilior. alb. chamamil. unguent. alth. fermentum acre, sapo venetus, stercus bovinum, &c. Sequens cataplasma est valde efficax, ℞. Rad. alth. lilior. alb. ana ℥ij. fol. malv. Mj. pulv. sem. lini ℥j. ad mollitiem coctis add. cep. sub cineribus assat. ℥vj. Unguent. basil. ol. lilior. alb. q. s. m. f. f. a cataplasma. Præ reliquis egre-

gium suppurans est *lac*, in quo coctus est *sapo venetus*, plus minus proratione indicationis, hoc appositum cum linteis multiplicatis mire maturat & aperit abscessus.

Phlegmone quid.

Art. 1226. Plegmone sive inflammatio est tumor ad tactum renitens cum tensione, rubore, dolore pulsatorio, & ardore; nunc quidem genuina ex sanguine puro, nunc vero spuria, ad erysipelata, vel œdematosos tumores, vel scirrhus propius accedens. Omnes inflammationes vel insensibiliter discutiuntur, vel suppurantur, vel male tractatæ in gangrænam abeunt.

Curatio.

Art. 1227. Interne conveniunt *sudorifera ex alcalibus*; & omnia ea, quæ in *pleuritide* usitata sunt, hic commode usurpari possunt, v.g. *spermaceti* cum *antimon. diaphoret.* additis quibusdam *salibus volatilibus*. Externe in initio decoctum *sulphuris* in urina, quod a *Paracelso* laudatur, item *stercus vaccinum, equinum, &c.* Si sit erysipelata conducit *spir. vin. camphorat.* cum *flor. sambuci* incoct. In ardore magno religiose vitanda sunt oleosa. Si discuti nequeat remediis supra memoratis, ad suppurationem producenda est medicamentis appropriatis, modo recensitis; & quum maturus fiat, nisi sponte rumpatur, aperiendus est abscessus vel lanceola vel caustico ex *lixivio de sapone & calce viva in lapidem simul coctis*; & postea mundificandus, & consolidandus; omnibus his intentionibus satisfacit linimentum sequens, *℞. Terebinth. clar. ℥j. mel. ros. ℥vj. bals. peruv. vitel. ov. solut. ℥ss. misce f. linimentum digestivum.*

Inflammatio mammarum.

Prognosis.

Art. 1228. Sæpe ex lactis coagulo in mammis, aut quod alias stagnat acescentia vitiosa, inflammatio mammarum lactantibus accidit; hæc autem aliquando est erysipelacea; adfunt tumor, dolor, rubor, &c. Inflammationes omnes mammarum sunt periculosæ, quia ut plurimum abeunt in abscessus, & hinc in ulcera saniosa, interdum etiam

etiam in *fistulas*: si non abeunt in abscessus, indurantur in *scirrhus*, qui levi errore abeunt in *cancros*: rarissime enim inflammationes mammarum, in specie ex lactis coagulo, discuti possunt.

Art. 1229. In genere in omnibus mammarum affectibus observandum est, quod mamilla affecta raro ad sanitatem perducatur, nisi altera sana lacte exsiccetur; quia dum lac influit ad unam mammam, etiam fluit ad alteram, & sic malum exasperatur. *Aqua calcis vive*, si quæ alia, inflammationem omnem avertit, resolvit, & discutit. Unum ex expertissimis ad mammarum inflammationes remediis est cataplasma factum ex farinis, viz. *Ex farina fabarum, lupinorum, & lentium in oxycrato coctis, & subactis, & cum albuminis ovi paulo mistis*; emplastrum de *spermate ceti Mynsicht. empl. de cicuta, &c.* inflammationes similiter resolvunt. Sed raro discutiuntur hi tumores, ideoque tutius est suppurationem promovere.

Art. 1230. „ Ubi tumor est durus sine inflammatione, convenit sequens ceratum. *℞. Summit. absynth. pulv. ℥ij. sem. lentium, fenugr. fœniculi ana ℥j. succ. hyoscyam. cicut. ana ℥iij. unguent. dialtheæ ℥ij. axung. anatis, anseris ana ℥j. sevi cervin. ℥ij. styrac. liquid. ℥ss. ceræ q. f. f. ceratum.* Cicuta per se applicata nimium incallescit, & cutem exulcerat, sed in vino cocta, & cum axungia porcina contusa, hosce tumores duros emollit. *Vviseman.*

Art. 1231. Inflammatio testium frequentissime oritur ex ictu vel compressione violenta inter equitandum; adsunt dolores gravissimi, & nunquam convulsiones (& vomitus), & interdum metus est gangrænæ, nisi cito discutiatur; aliquando in abscessum tendit.

Art. 1232. Curam quod attinet; mittatur sanguis copiosissime quamprimum, & injiciatur enema leniens & emolliens; interna eadem esse debent,

*In scir-
rhum vel
cancrum
transitus.*

bent, ac in aliis morbis inflammatoriis. Externe pro discutiendo tumore & resolvendo expertissimum est cataplasma ex *farina fabarum cum oxy-
crato* cocta & applicata, addi etiam commode potest *sem. cymini*, item *flores chamemeli* & *meli-
loti*, & erit magis discutiens; si tumor discuti ne-
queat, *suppurandus* est cum maturantibus mitiori-
bus. Inflammatio male curata plerumque in scir-
rhum transit, & quandoque in cancrum abit, præsertim si punctiones acutæ sentiantur: in hoc casu *discutientia* sunt usurpanda, maxime autem conducit *Emplastrum de cicuta cum ammoniaco*.

*Furuncu-
lus quid.*

Art. 1233. Furunculus (quem nos vocamus a *Boil*) est inflammatio parva in locis extimis orta, in acutum tuberculum tendens, ovum columbini magnitudine non excedens, cum rubore & dolore, interdum cum ardore atrocissimo, ac si carbo igneus admotus esset.

*Quomodo
tractan-
dus est.*

Art. 1234. „Furunculi ut plurimum periculo
„vacant; demonstrant plerumque constitutionem
„firmiorem, materiam peccantem foras propul-
„santem. Repellere est nefas; discuti non possunt,
„nec debent; frequentius sponte sua suppuran-
„tur, & aperti ex se coalescunt, si non, tantillo
„*balsam. peruv.* consolidari possunt. Si *habitu-
„les* sint, internis *alterantibus* præcavendi sunt,
„in quem finem *rosmarinus*, item *radix barda-
„na* a quibusdam specificè prodesse habentur.

Sennerti sententia.

Parulis.

Art. 1235. Gingivæ quandoque inflammatione (quæ Græcis Parulis dicitur) cum dolore corripuntur, & apostemata patiuntur, quæ in ulcera, interdum cancrum, fistulas, gangrænam desinunt.

Pregnos.

Malum per se patet, quod nisi maturis præfidiis succurratur, in apostemata & ulcera diuturna, imo nonnunquam in gangrænam, vel in cancrum incurabilem abit.

Art.

Art. 1236. Per revulsionem, derivationem, & Curatio.
 gargarismata appropriata, &c. opera danda est in
 initio, ut præcaveatur apostematio; si vero ad
 suppurationem vergat, caricæ per medium di-
 scissæ imponantur. Si abscessus sponte non ape-
 riatur, scalpello aperiri potest. Apertus abscessus
 hydromelite mundetur, tandemque ulcus exsicce-
 tur & claudatur.

Celsi sententia.

Art. 1237. Pessima pustula est, quæ Epinyctis *Epinyctis*
 vocatur, ea colore vel sublivida, vel subnigra, *quid?*
 vel alba esse consuevit; circa hanc autem vehe-
 mens inflammatio est, & cum aperta est, repe-
 ritur intus exulceratio mucosa, colore humori
 suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus
 est; neque enim ea faba major est. Atque hæc
 quoque oritur in eminentibus partibus, & fere
 noctu, unde nomen quoque a Græcis ei ἐπινυκτίς
 est impositum. Periculosa non sunt hæc tuber-
 cula, molesta tamen ob dolorem; noctu inque-
 tudinem pariunt, & adustum ac vitiosum suc-
 cum in corpore redundare significant. Omni-
 no suppurandæ sunt epinyctides, saniem ejiciunt
 sanguineam, digestivis & mundificativis tractan-
 dæ sunt, & ut furunculi, curandæ.

Art. 1238. Huic tuberculo cognatum esse cre- *Termin-*
 ditur Terminthus; verum quid proprie ter- *thus.*
 minthus antiquorum fuerit (inquit Sennertus)
 vix satis constat, nisi quantum ex Galeno ha-
 betur, qui scribit terminthorum nomen nigras
 quasdam pustulas in cruribus maxime orientes,
 a figuræ, coloris, magnitudinisque similitudi-
 ne, quam cum terminthorum, id est, cicerum
 fructu (ut vulgo vertunt, seu ut alii, & re-
 ctius terebinthi fructu) habent, derivatum,
 significare.

*Quomodo
tractan-
da sunt.*

PHYMA, PHYGETHLON, BUBO, & PAROTIS.

Hi sunt quatuor Glandularum Tumores Inflammatorii insigniores.

Etmulleri sententia.

Phyma. Art. 1239. Phyma est tumor glandularum (sub maxilla inferiore) rotundus, acuminatus, plus minus rubens ac dolens; statim augetur & suppuratur. „ Facilius curatur in pueris, difficilius in juvenibus & adultis, sed in his rarius accidit. „ In cura a repellentibus cavendum est; natura in hujus suppuratione potissimum occupata est, ideoque illius conatus adjuvandus est medicamentis maturantibus impositis. „ Applicari potest *diachylum cum gummi*, sed præstat cataplasma *suppurans*.

Phygethlon. Art. 1240. Phygethlon, Latinis Panus ob similitudinem fungi arbori adnascentis, est tumor durus, phymate major magisque rubens ac dolens. Curatur (interdum) *discutientibus*, pro quo scopo convenit *oleum tartari fatidum* vel *ligni guaiaci*, his interdum *emollientia* cum *anodynis* junctis adduntur, &c. sed frequentius suppurantur.

Sennerti sententia.

Bubo. Art. 1241. Bubo est tumor inflammatorius in inguine vel sub axilla; cum rubore & dolore apparet, & plerumque febris levior accidit; & quidem si per crisin accidit bubo, eodem erumpente, statim levatur alius morbus. Bubones *benigni* (non enim hic de *venereis* & *pestilentialibus* agitur) non sunt periculosi præcipue si statim suppurantur; si vero diu protrahantur, & tardius maturentur, periculo non vacant, cum in fistulas periculosas facile abeant.

Art.

Art. 1242. Curatio bubonum & aliarum in *Curatio.*
 inflammationum instituenda est eadem; hoc tamen
 probe notandum est, quod *suppurantia*, quæ ad-
 hibentur, debeant esse *fortiora* quam in aliis in-
 flammationibus; glandulæ etenim sunt frigidio-
 res quam aliæ partes, neque habent adeo exqui-
 situm sensum. „ Quamobrem *cucurbitæ* cum fru-
 „ tu applicari possunt; in hunc finem etiam con-
 „ ducunt *fermentum acre*, *sapo niger*, *stercus co-*
 „ *lumbinum*, *sem. sinap. urtica*, *carica*, *cepe as-*
 „ *sata*, &c.

Ettmulleri sententia.

Art. 1243. Parotides sunt glandularum pone au- *Parotis.*
 res inflammationes: plerumque post male judica-
 tas febres protruduntur a fausto naturæ conatu.
 Maturationi opera danda est, & tractandi sunt
 sicut *bubones*, & aliæ inflammationes ad suppu-
 rationem vergentes.

Art. 1244. „ *Ranula* est tumor sublingualis, *Ranula.*
 „ mollis, albicans, & quasi pellucidus, œdema-
 „ tis speciem præ se ferens, linguæ motum ac lo-
 „ quelam impediens. Periculo ut plurimum va-
 „ cat, nisi diuturnior fuerit, vel male tractatus;
 „ tunc enim metus est, ne *cancrosum* evadat.

Art. 1245. „ Aperiendus est cultro, vel potius *Curatio.*
 „ ferro ignito, prodire solet mucus ovi albumini
 „ colore & consistentia similis. Compertum est
 „ etiam aliquando *lapillos* ibidem generari; ideo-
 „ que a chirurgo semper explorandi sunt. Post
 „ apertionem os abluatur sæpius in die *cum de-*
 „ *cocto hordei mel. rosar. & tinct. myrrh.*

Art. 1246. Paronychia est tumor ordinario ob- *Parony-*
 veniens in extremitatibus digitorum, ultimis nem- *chia quid*
 pe articulis, ita tamen, ut non excludantur re-
 liqui articuli. Quandoque est erraticus, & ex
 uno digito in alium transit, ita ut uno persana-
 to mox vicinus inquinetur, donec omnes successive

Causa.

infestaverit: tantus est dolor, ut subinde universum brachium consensu afficiatur. Oritur ex humore acri admodum corrosivo, immediate *perio-steum*, & ipsi adhærentes *tendines*, occupante; supervenit inflammatio ad apostema vergens, sed frequentius *gangrænescit*.

Curatio.

Art. 1247. Quo citius ichor maturatur, eo minus periculum est ossis cariei, in hunc finem quidam applicant *sterquilinum*, & sic dolor & tumor optime discutitur, & sistitur: „ Cataplasma „ *Lumbricorum vivorum* subito atrocem dolorem „ sedat, uti testantur plurimi authores. „ Ubi vero paronychia altiores egerit radices, opus est *incisione*, quæ etiam tutissima est, & quidem usque ad ipsum os; facta *incisione iheriaca* cum *spiritu vini* soluta digito applicanda est.

Paronychia pedis digitorum.

Art. 1248. Huc quoque pertinet affectus perniciosissimus, qui *pollices pedum* cum doloribus atrocissimis infestat, & nihil aliud est quam *paronychia pedis digitorum*, cui *gangræna* & *sphacelus*, & tandem mors subsequitur. Ex eadem causa provenit, & eandem medendi methodum postulat. Tutissima est *digiti resectio*.

Dua species.

Art. 1249. „ Paronychia revera est malum minime contemnendum, *Latinis* dicitur *panarium*; ejusdem duæ sunt species, una *benigna*, „ vulgo a *Mhitflavv* appellata; altera *maligna* a „ *Felon* dicta; in priori specie suppuratio facile „ procuratur, & materia albicante emissa facillime sanatur. Altera vero est periculosissimum „ malum, & fere nunquam curatur sine *incisione* „ *matura* ad os usque.

Pernio.

Art. 1250. Perniones pedes & manus affligunt tempore hyemali; partes affectæ tument, & ex albedine ad aliqualem cærulescentiam inclinant, (pruriunt vehementer) dolent, & tandem, nunc cum, nunc sine exulceratione evanescunt. (præmissis universalibus) Partes affectæ illinantur cum *petreolo*, quod præservat & curat. „ *Unguentum*

Curatio.

„ rosatum cum ol. terebinth. in rapo affato est res
 „ medium comprobatum (inquit *Vviseman* .)

A N E U R I S M A.

Sennerti sententia.

Art. 1251. Aneurisma est tumor ex tunicae in- *Aneuris-*
 terioris arteriarum apertione , & exterioris dila- *ma unde*
 tatione : aperitur vel venæsectione imperita : cum *fit :*
 exterior tunica , utpote mollior , coalescit denuo,
 interior , ut durior , aperta manet ; vel a causa
 externa .

Vvisemani sententia.

Art. 1252. Noster clarissimus *Vviseman* existi- *Opinio*
 mat aneurismata non fieri ex dilatatione vel rela- *nostratis*
 xatione tunicae exterioris arteriae , sed potius ab *Vvisemani*
ambobus tunicis ruptis , vel *sauciatis* unde tumor
 ab effluxu sanguinis in musculorum interstitiis ef-
 formatur : hæc autem opinio multo probabilior
 videtur ; utcunque sit tamen , eodem res redit ,
 quoad curandi methodum .

Art. 1253. „ Aneurismata quandoque fiunt pro-
 „ culdubio simplici arteriae tunicarum *dilatatio-*
 „ ne (ut cum sanioribus quibusdam medicis sen-
 „ tiamus) quemadmodum in *venis varicosis* fre-
 „ quentissime accidere solet ; saltem in hunc mo-
 „ dum ab origine plerumque nascuntur , utcun-
 „ que tamen diuturniora cum fuerint , & in gran-
 „ dem molem aucta , tunicae arteriales multis in
 „ locis rumpuntur , præcipue interna , ut ex om-
 „ ni sectione patuit . Accuratam hujus affectus
 „ historiam si quis velit , adeat D. *Freind* Hist.
 „ Med. p. 179. &c. Pro accuratiore adhuc aneu-
 „ rismatis naturæ explicatione . Vid. Philos. Tran-
 „ fact. N. 402.

Art. 1254. „ In Transact. Philosoph. N. 265. In- *Historia*
 „ signis extat Historia *Aneurismatis Aortae* . Ho-
 „ mo

„ mo per infortunium aliquod violentam pecto-
 „ ris concussionem passus in *Hæmoptysin* incidit,
 „ qua diutius perseverante tandem mortuus est.
 „ Secto cadavere *Aneurisma Aortæ* repertum erat
 „ adeo ingenti mole, ut totum latus Thoracis
 „ dextrum impleverit.

Etmulleri sententia.

Aneuris. *Art. 1255.* Aneurisma est tumor a collectione
mat. cau. sanguinis arteriosi ab arteria exesa aut laxata ni-
sa N. B. mis, aut rupta ex quacunque violentia, ab im-
 perita in venæsectione vulneratione. Frequentia
 sunt aneurismata a vehementi *cordis palpitatione*,
 ita ut ramus arteriæ descendens intumescat.

Diagnos.

Prognosis.

Curatio.

Aneurisma frequentius collum occupat, interdum
 crura & brachia, sed rarius, ex violenta commo-
 tione. Est tumor mollis tactui cedens, aliquan-
 do tamen non cedens, alias cum, alias sine pul-
 su, colore a reliqua cute non variat. „ *Exinde*
maximum periculum habet, „ quod interdum ab
 imperitis chirurgis habeatur pro abscessu suppura-
 to; unde si aperiatur, subito sub manibus ægri
 cum sanguine animam emittunt. „ In collo ne
 „ unum quidem curatum vidi (inquit *Barbette*),
 „ palliativa cura diu vivere possunt.

Art. 1256. Si aneurisma sit a venæsectione ine-
 pta, mox ligetur pars læsa *ligatura* forti, & fiat
venæsectio in latere opposito. Curiosum est quod
 observat *Horstius*, quod applicatio *laudani opii*
 arteriæ hæmorrhagiam sistat. Notum est empla-
 strum *Galenii ex thure, aloe, pilis leprinis, &*
albumine ovi, item multum conducunt *lamina*
plumbea, emplastra astringentia (cum *sacchar. sa-*
turni). His irritis cura per operationem chirur-
 gicam facienda est, viz. per *deligationem* arte-
 riæ (superne tantum). De nova methodo *Gal-*
lorum in aneurismate vide locum p. 1246.

V A R I X.

Ettmulleri sententia.

Art. 1257. Varix est tumor ex laxata venarum tunica, unde sanguis in venis fere stagnat. *Varix quid.* Malum est frequens mulieribus in ultimis gestationis mensibus, uti & post partum difficilem. Hic affectus quibusdam non parum proficius est ad conservandam sanitatem, in specie melancholia hypochondriaca (unde fluxus hæmorrhoidalis iis salutaris est.)

Art. 1258. Cura a ligatione magna ex parte pendet; fodus ex alum. fract. acac. (flor. ros. rub. cort. querc. &c.) in aceto coct. convenit. In ruptura venarum, & gravi hæmorrhagia optimum euphoriston est sterco suillum forma pulveris adpersum cum linteis ex astringentibus expressis & admotis cum fasciatione, &c. *Curatio. In ruptu- ra venarum.*

HÆMORRHOIDES.

Vvisemani sententia.

Art. 1259. Hæmorrhoides ani sunt venarum hæmorrhoidalium tumores varicosi, morbus est simplex, quando venæ solæ intumescant, vel compositus, cum partes vicinæ afficiantur, vel cum quasi novum corpus generetur ipsis adhærens, vel appendens; unde (ob similitudinem aliqualem ita dicta) ficus, crista Galli, condylomata, &c. producuntur. *Hæmorrhoides quid.*

Art. 1260. Hæmorrhoides sunt vel apertæ, i. e. sanguinem effundentes vel cæcæ, tumentes, scilicet, sine hæmorrhagia, exquisite tamen dolentes. *Apertæ vel cæcæ.*

Art. 1261. Alvus aperta sedulo servetur. Ad inflammationem, quæ sæpe accidit, valet sequens fodus; ℞. Fol. plantag. polygon. summit. rub. equiset. ana Mß. flor. verbasc. Mij. lim. lini ℥ij. flor. ros. rub. cort. granat. balauft. bacc. myrt. ana ℥vj. coq. *Curatio.*

*In dolore
magno.*

coq. in q. s. aq. font. & vin. rub. pro foru. In extremitate doloris; ℥. Ol. vitel. ov. ℥ij. opii gr. viij. m. item bals. sulphur. Rulandi dolorem sedat.

*In fluxu
nimio.*

Art. 1262. In fluxu nimio sanguinis, venæsectio, cucurbitulæ, &c. conveniunt revulsione gratia. Interne astringentia & opiata, quemadmodum in aliis hæmorrhagiis; externe suppositoria ex cort. granat. flor. balauft. thure, mastich. &c. cum gum. tragacanth. ichthyocol. alb. ovor. &c.

Ettmulleri sententia.

*Differen-
tia ab æ-
lio morbo.*

Art. 1263. Distinguendus est ante omnia fluxus hæmorrhoidalis verus, a diarrhœa cruenta scorbuticorum, alias vocata dysenteria scorbutica mendosa (636.) Hæmorrhoides veræ attritu excrementorum plerumque aperiuntur, & sanguis cum excrementis una evacuat, sed si sanguis promiscue excernatur tam ante quam post excrementa sine dolore & torminibus, probabile est, quod sit fluxus scorbuticus. Hæmorrhoides ad venerem omnino impotentes reddunt cum magno foeminarum tædio.

Apertio.

Art. 1264. Hæmorrhoides consueto fluore suppresso, sive in cæcas degenerantes, aperiendæ sunt; de aperiendis iisdem vide locum p. 173. Remedia aloetica fluxum hæmorrhoidum promonent. „ Externe convenit hirudinum suctio, vel frictio „ ani cum foliis ficus recentibus modice tritis, „ quæ forti impressione lac acre ac fere causticum plorant, „ cuius acrimonia vasa tumentia „ successive aperiuntur; vel si hoc non sufficiat, „ intrudantur suppositoria ex hiera picra cum pul- „ vere colocynthidos & melle parata, quæ hæmor- „ rhoides insigniter stimulant, & cataplasma ex „ stercore columbino, sem. staphidis agris & lupi- „ norum applicari potest. „ In doloribus condu- „ cit fons ex decoct. verbasc. flor. sambuc. & sem. hyoscyam. Laudatur scrophularia, sed chelidonium

Dolores.

minus est instar omnium pro usu interno quocunque modo usurpatum. *Camphora & sacchar. saturni* pro usu externo in unguentis. Ad hæmorrhoidum exulcerationem linimentum ex auro fulminante, & ol. amygd. dulc. est singulare experimentum apud Anglos.

Varia
Remedia.

Riverii sententia.

Art. 1265. *Mercurialis* docet tamarindos præcipue miram potestatem habere ad compescendum hæmorrhoidum fluxum. In fluxu immodico fodus ex *verbasc. tapso. barbato, fol. plantag. flor. ros. rub. balaust. &c. in aq. ferrat. & vin. astringent. decoct.* convenit; ut & unguentum comitiss. curato hæmorrhoidum fluxu, præcavendum est, ne redeat, quod fit victus ratione convenienti, venesectione bis vel sæpius in anno, purgatione leni, &c.

Fluxus
immodicus.

Art. 1266. Oleum buxi præ cæteris dolorem lenit, si illius gutta una supra hæmorrhoides apponatur, vel cum ol. sem. lini misceatur, item saccharum saturni in aq. ros. pro fodu dolorem sedat.

In gravi
dolore.

Mayernii sententia.

Art. 1267. Chalybs seu ferrum est specificum in hoc affectu obstructions viscerum tollens, atram bilem domans & plurimum dulcificans, viscera roborans, &c. Cerevisia parari potest cum battituris, vel ferri rubigine, & herbis & rationibus specificis, &c. *Aquæ spadenses & minerales acidulæ*, multum valent. Vernix, qua utuntur pictores est remedium singulare in curandis hæmorrhoidibus, tam apertis, quam latentibus; si apertæ fuerint, & nimis tenaciter vernix cuti adhæreat, addatur ol. rosarum: hujus usu sanatus est Carolus quintus a muliere, cum nulla ope curari pos-

Remedia
varia, ex-
terna, &
interna.

posset: vernix autem præparatur ex ol. lin. ℥xi. tereb. ven. ℥iv. sandarac. purissim. sive gum. junip. ℥iij. liquentur simul lento igne, &c. De suppositoriis vide locum. ℥. Unguent. popul. ℥ij. cochinel. in alkool. levigat. ℥ij. sacchar. saturn. ℥j. ol. hyperic. q. s. misceantur diuturna agitatione in mortario plumbeo, f. unguentum e bombyce applicandum & continuo gestandum.

Farrago sententiarum.

*Vires
scrophu-
laria.*

*Unguent.
de lina-
ria.*

Art. 1268. Si quis hæmorrhoidum dolore infano torqueatur, (inquit Sennertus) minimum quid *scrophulariæ*, vel radicis vel foliorum, cum cibo aut potu capiendo, statim dolore liberatur, sive ipsam plantæ substantiam siccam vel viridem, sive decoctum ejus assumat. Sedandis hæmorrhoidum doloribus (inquit Chesneau) præstantissimum est *unguentum de linaria a Voulphio* inventum, & pluribus medicis Germaniæ communicatum; simile anodynum, licet variis usus fuerim, nunquam inveni; sequenti modo paratur. ℥. *Herb. linar. cum floribus q. v. decoquatur cum adipe porcin. quousque adeps valde virescat fiatque unguentum, usus tempore adjiciatur vitelli ovi tantum quantum unguenti quantitas requirit.*

*Cepæ &
porri, &c.*

Art. 1269. Cepe vel porrum sub cineribus coctum cum ol. ros. & paucis croco valde laudatur a Solenandro (& pro certo porrum cum butyro in sartagine frixum dolorem quasi ad miraculum sedat.) De viribus *chelidon. minoris* in hoc affectu consulatur Solenander, qui de hoc morbo egregie scripsit. *Oleum succini* per se usurpatum dolorem atrocissimum compescit. Sequens linimentum est admodum proficuum, ℥. *Balsam. sulph. terebinth. unguent. nicotian. ana p. æ. m. f. liniment. & sequens Boyleanum*, ℥. *Sacchar. saturn. ℥ss. acet. opt. ℥iv. ol. sambucin. q. s. m. f. linimentum.* *Rosmarinus* singulis auroris comestus hæ-

mor-

hemorrhoides penitus tollit. Ad dolorem & ardorem compescendum, & fluxum immoderatum lente sistendum, instar arcani (inquit *Dolæus*) medicis junioribus commendo vile sed proficuum hoc remedium *℞. Alcohol. lapid. scissil. q. v. cum butyri non saliti q. s. f. unguent.* Aliquando etiam sequentia in usum adduci possunt; *Tabulæ divinæ, fots ad hemorrhoidum dolorem, fots ad hemorrhoidum fluxum immodicum, electuarius styptic. Cataplasma de ovis, enema de verbasco, unguentum hemorrhoidale.*

Ettmulleri sententia.

Art. 1270. Hernia varicosa est tumor varicosus venarum spermaticarum; tactu patet, quasi funiculi tensi hinc inde oblique distributi & nodi inæqualiter uvæ in modum conglomerati observantur, cum testiculi plus minus relaxatione; dolor aliqualis (aliquando acutus) percipitur. Difficile est malum, & quod etiam interdum cancerosi aliquid occultum habet.

Hernia varicosa.

Art. 1271. „ In genere medicamenta quæ conducunt in aliis tumoribus varicosis, præcipue „ hemorrhoidibus cæcis in hoc affectu etiam sunt „ proficua; deligationem aptam vix admittit; „ opem fert psychrolusia vasa relaxata contrahendo firmandoque, ut & lotiones & fots astringentes frigide usurpati, & præ reliquis sequens, „ *℞. Liqueur. coriariorum, quo utuntur subigendis coriis ℔j. sacchar. saturn. ℥ij. alum. ℥iſs. f. solutio quæ sit pro usu prædicto; conveniunt venæsectiones, purgationes cum Hellebor. nigr. & calomel. Rubigo ferri cum gum. Ammoniac. millepedes, Tinctura Hellebor. nigri, absorbentia, antiscorbutica, &c. sed ante omnia oleum lini frequenter intus sumptum expertus laudo.*

Curatio.

Art. 1272. Oedemata sunt tumores molles, qui digito prementi cedunt, & pressionis vestigia diutius

Oedema.

tius retinent, frigidi, indolentes, & albicantes, sæpius in cruribus evenientes. In leucophlegmatia totum corpus œdematosum videtur. „ Oedema frequentissime a pituita sola originem trahit, „ & *perfectum œdema* nominatur; quandoque vero „ cum aliis humoribus mixtum est, & *imperfectum* appellatur; hujusmodi sunt *Oedema Phlegmonodes*, *Erysipelatodes*, *Scirrholes*, &c. „ Hi tumores aliis morbis plerumque supervenire solent, imprimis chronicis, interdum etiam affectibus soporosis & convulsivis, gravidis quoque familiares sunt.

Curatio. Art. 1273. Conveniunt interne *stomachica & aromatica*, intermissis interdum *sudoriferis & diureticis*: externe *fotus & cataplasmata discutientia* ex *absynth. roremarin. cham. salv. puleg. rut. flor. sambuc. melilot. cham. bacc. junip.* in lixivio & vino coct. addi potest etiam *sulphur vivum* intercoquendum. *Stercus* quorundam animalium cum *urina humana* valde proficuum perhibetur.

Vvisemani sententia.

Prognosis. Art. 1274. Oedema ut plurimum non est periculolum; quidam corporis crassioris, & crapulosi cruribus œdematosis diutius vivunt; ex hydrope aut phthisi malum caloris nativi defectum ostendit; in abscessum tendens periculolum est; si indurecat, in scirrhum abire solet. Quoad curam medicamenta interna eadem sunt ac in *cachexia & hydrope*; externa *discutientia, fasciatio*. „ Præ „ reliquis vero pro usu interno recordandum est „ *tincturam Hieram* eximias vires obtinere.

Etmulleri sententia.

*Scirrhus
qualis est
tumor.*

Art. 1275. Scirrhus est tumor durus tactui renitens, indolens, immobilis; ut plurimum sensim generatur in partibus mollioribus; præter glandu-

dulas occupat alias partes, imprimis carnosas, siue internas, nempe viscera, siue externas quascunque. N. B. Scirrhus est vel indolens & legitimus, vel dolens & præterea nonnihil livescens & nothus qui subinde est cancrusus, unde si curatur periculum est, ne in cancrum degeneret. „ Scirrhus, qui doloris est expers, & cui pili incrementum, incurabilis omnino habetur; coloris lividi valde periculosus & sæpius in cancrum degenerat; imperfectus exiguus, aliquo modo dolorificus aliquando licet rarissime curatur.

Prognosis.

Art. 1276. „ Quoad curam instituenda est catharsis cum mercurio dulci & helleboro nigro, & aliquoties repetenda; & in intervallis cum fructu exhiberi possunt pulveres absorbentes, antimon. diaphoret. cinnab. antimon. Elect. nigrum, decoctum e lignis, milleped. viv. vel præp. „ Interim externe usurpanda sunt resolutiva fortiora cum discutientibus moderatis permixta, ut tumor successive resolvatur. Stercus bubulum aceto incoctum scirrhum mirifice dissipat; item oleum tartari rectificatum, fetidum licet, tumores duros potenter emollit & discutit, ut etiam cataplasma ex brion. cum stercore capris. Scirrhus, si non potest sensim resolvi, non est suppurandus, ne cancrusus evadat, intactus omnino est relinquendus, aut applicatione nitri in aceto dissoluti in lapideam duritiem indurandus. „ Scirrhus, qui omni sensu destituitur, est incurabilis.

Curatio.

Art. 1277. Strumæ seu scrophulæ sunt tumores vel indolentes & benigni, vicinis partibus colores similes, mobiles, &c. vel dolentes fixi, colorem subcæruleum vel sublividum repræsentantes, hæ strumæ malignæ dicuntur, vix aut ne vix quidem curabiles. Prioris generis strumæ discutientibus tentandæ sunt; emplastrum de cicuta cum ammoniaco; in incipientibus convenit focus cum spongia aqua calcis ebria; empl. de ranis

Scrophulæ.

Curatio.

cum mercurio. Scrophulæ suppuratæ non sunt statim aperiendæ; sed quamdiu fieri potest, abscessus clausus linquendus est; propterea, ut eo major glandulæ strumosa pars per maturationem in pus abeat, nam tota, si fieri possit, est absumenda. Interne convenit *purgatio cum hellebordo nigro & mercurio dulci, & acidum absorbentia, &c.* ossibus adhærentes fere incurabiles sunt.

Vvisemani sententiâ.

Definitio. *Art. 1278.* Struma seu scrophula est tumor, durus, inæqualis, rarissime dolorificus, reliquo corpori plerumque concolor, aliquando leviter rubescens aut liviscens, a peculiari seri sanguinis aciditate ortus, quod ubicunque in glandulas, musculos, membranas, imo ipsa ossa incidit, coagulatur & indurescit. Glandulæ sunt sedes huius morbi frequentiores, præcipue autem ac primario glandulæ mesenterii, quæ nunquam intactæ sunt, si morbus alicubi in corpore vigeat. Cernitur frequentissime in labiis maxime superiori, illud incrassat, & fissura obsignat.

Prognosis. *Art. 1279.* Prognosis a magnitudine morbi, & reliquis ægroti constitutionis circumstantiis plerumque desumitur; est morbus admodum difficilis curatu, & ubi hæreditarius, insanabilis, ut etiam in ætate grandioribus, vix post annum quadragesimum curatur.

Curatio. *Art. 1280.* Medicamenta interna sunt *cathartica, alterantia, & specifica, millepedes, lac asinum, decoct. sarsæ, Pulv. ad strumas Bateanæ, spongia calcinata, paronychia cum folio rutaceo, &c.* Sudoris provocatio eodem modo ac mediis, ut in *Lue venerea*, instituta hic plurimum facit, immo vel sola strumas tollit, &c., Externe indicationes sunt *resolutio, suppuratio, & extirpatio*: Strumæ molliores aliquando resolvuntur; strumæ phlegmonoides frequenter suppurantur,

tur, sed antiquæ, duræ ac crudæ raro ad perfectam suppurationem perveniunt. Si struma sit mobilis & libera, extirpatio per *incisionem* est cura promptissima: sin vero strumæ sint grandiores & profunde jacentes extirpatio per *caustica* melius efficitur, inter caustica ad hoc institutum optimum est istud, quod conficitur ex *calce viva in lixivio saponis* cocta: Apertione per causticum facta, struma escharoticis est absumenda, huic usui inservire potest *pulvis sine pari* dictus ex æquali parte *mercurii sublimat. auripigment. & calcis viv.* mitior est *mercurius præcipitatus*, cum, vel line *alumine usto*, lente tamen operatur.

Art. 1281., Præstantem hunc tractatum Auctoris, chirurgus juvenis iterum atque iterum diligenter evolvat.

Consulendus est auctor.

Farrago sententiarum.

Art. 1282. Notarunt quidam medicamenta ad curandas scrophulas in ultima lunæ phasi majori cum successu assumi, & in novilunium usque continuari debere. Decoctum *folior. tussilaginis* interne sumptum per longum tempus ultra omnia, quæ hætenus nota sunt, hunc morbum tollit, ut experimento fidelis D. *Francisci Fuller* mihi quondam amicissimi constat; videatur locus medicinæ gymnasticæ p. 39. Pro specifico etiam habetur *paronychia folio rutaceo* in cerevisia infusa. Infusum *rorismarini* instar theæ, item *rad. scrophulariæ* ab *Ettmullero* summe laudantur. *Lamium* in lacte coctum ipsum coagulat; serum intus sumptum & coagulum ulceribus applicatum sine alio quocunque remedio morbum sanant, ut a quodam rustico accepi, qui & ipse & aliquis ejusdem vicinus, ambo deploratissime strumosi, curati sunt. Extat historia strumarum delectarum applicatione manus hominis mortui in *Act. Philof.* Sequens emplastrum strumas resolvit, vel ad suppura-

De viribus tussilaginis.

Paronychia, &c.

putationem deducit, & nunquam fallit, ait Zacutus cum juramento lib. i. prax. admirand. observ. 101. ℞. rad. brion. magn. in taleolas ten. sect. ℥ss. frige in sartagine quousque contabescat, cola & add. terebinth. abietis ℥ss. cer. ℥v. f. unguentum s. a.

Tumores
albi.

Art. 1283. Sub strumarum nomine veniunt, aut venire possunt, articulorum tumores albi dicti, & revera plerumque sunt pessimi commatis, de his empirici, & tyrones nonnunquam graviter hallucinantur, illos cum artuum luxationibus confundentes, unde mille mala; quocirca cautela opus est.

Prognosis.

Art. 1284. Hi tumores discuti nequeunt, aut saltem rarissime & quam difficillime; si autem in abscessus vergant, pandoræ pyxides sæpius includunt, ossium caries, ligamentorum putredines, ulcera fistulosa, & curatio denique non raro saltem imperfecta erit, articulis scilicet inflexibilibus relictis, & quod adhuc pejus, tandem aliquando tabes universalis induci solet.

Curatio.

Art. 1285. Curatio interna eadem est ac in aliis strumosis affectibus. Suffusio frigida hic multum prodest, speciatim a fide dignis mihi nunciatum fuit plures curatos fuisse artum aliquamdiu detinendo sub flumine molari decidentis aquæ, idem experimentum aliquoties repetendo. Atque hic attestantem habemus Cheyneum hoc remedii genus in isto affectu esse infallibile vid. Tractat. de Arthritide, p. 87. Aptæ deligatio parti affectæ tempestive inducta fluxionem plerumque prohibet. Cunctatio periculosa est: abscessus enim hujusmodi summam chirurgi peritiam postulant, ut supra dictum est.

SPINA VENTOSA.

Vvisemani sententia.

Art. 1286. Spina ventosa est scrophulæ quædam species; quæ est ossis protuberantia cutis colore non mutato; raro accidit, nisi in infantibus & junioribus: In ossibus minoribus, uti cranii, maxillæ, digitorum, &c. est curabilis; non vero in majoribus.

Spina
ventosa.

Art. 1287. Aperiendus est locus juxta protuberantiæ longitudinem ac os cariosum eodem modo tractandum est, ac in ulceribus cum ossibus cariosis postea dicetur.

Curatio.

Art. 1288. „Chirurgus curiosus consulat D. Fre-
„md, Hist. Med. Vol. II. p. 54. &c. de hujus affe-
„ctus natura & indole a libris Rhasis & Avicennæ.

C A N C E R.

Ettmulleri sententia.

Art. 1289. Cancer est tumor plane singularis; ac omnino sui generis. Punctio ab ægro primo percipitur; a nisi magnitudine successive, modo citius modo tardius incrementum capit, & progressu temporis evadit tuberculum durum, nigricans, lividum; quando exulceratus sit, ardor est acerbissimus instar aquæ fortis corrodens & depascens cum insigni putrilagine & foetore; venæ tumorem ambiunt hinc inde turgidæ & nigricantes, tanquam pedes cancrini (unde nomen fortitur.) Strumas & scirrhos male tractatos frequentius subsequitur; in mammis vero per se inchoat, in genitalibus utriusque sexus interdum adoritur. In partibus faciei externis, ore, naso, labiis, &c. appellatur noli me tangere, item lupus; revera sunt cancorum species. Opera danda est progressum impedire, ne exulceretur cancer. „Postquam enim
„cutis disrupta fuerit, certo certius hominem

Cancer
tumor sin-
gularis.

Noli me
tangere
& lupus.
Cura
palliativa.

„ miserrime interimit, carnem ubique avidissime
 „ depascendo, fungos tanquam brassicas floridas
 „ ubertim protrudendo, per acrimoniam humo-
 „ ris causticam vasa nervosa & sanguifera destru-
 „ endo & erodendo; unde icoris copiosa effusio
 „ cum vitæ fere dispendio; hæmorrhagiæ frequen-
 „ tes & profusæ plerumque agmen claudunt, &
 „ & mortem optatam accelerant. „ Cataplasma
 ex *cicuta* potenter mitigat cancerum (sed caven-
 dum est, ne cutem excoriet) *fonticuli* sunt inu-
 rendi. Interne conveniunt purgantia ex *belleboro*
 & *mercurio dulci*, decoctum *lignorum*, *millepe-*
des., item *pulveres testacei* & *lac asinum*, &c.
 Cancer ulceratus vix aut ne vix quidem curatur.
Oleum stercoris humani in ulceribus cancerosis est
 summum remedium; si enim oleo hoc illinitur,
 ulterior progressus præcavetur. Multum quoque
 faciunt medicamenta *saturnina*, acidum acre cor-
 rosivum mire absorbentia & edulcorantia; sed cu-
 ra radicalis in *arsenico* consistit (si verbis fides
 habenda sit.)

Hildani sententia.

Curatio per medicamenta. Art. 1290. Galenus canceri curandi rationem du-
 plicem statuit, quarum prima perficitur medica-
 mentis humores atrabiles expurgantibus; altera
 consistit in extirpatione tumoris. Quantum atti-
 net ad primam nisi statim ab initio administrata
 fuerit, parum aut nihil ad sanitatem posse, cer-
 tum est; quandoquidem jam materia ita compa-
 cta atque indurata est, ut medicamentis purgan-
 tibus non cedat. Altera via a *Galeno* præscripta
 est Extirpatio tumoris; hanc autem nonnulli *fer-*
ro candente, alii medicamentis *erodentibus*, reli-
 qui vero *cultro incisorio* perficiunt. Quantum ad
Cauterium actuale, illud cum *Albucafi* in scirrho-
 sis & cancerosis humoribus atque ulceribus suspe-
 ctum habeo, quandoquidem vi ignis, qui id sum-

mo gradu caloris & siccitatis agit, magis indu-
rescit materia atrabilaris fitque malignior. Por- *Escharo-*
ro extirpatio quæ fit medicamentis *escharoticis*, *tica.*
aut *septicis*, sive quovis simili medicamento ero-
dente, mihi quoque propter nobilitatem partis af-
fectæ, suspecta est. Adde experientiam docuisse
cancrofa ulcera hujusmodi medicamentis exacer-
bari, atque pejora fieri. Superest extirpatio, quæ *Instru-*
manu & instrumentis incidentibus fit, quæ præ *menta.*
aliis eligenda est, & tamen sua habet incommo-
da & difficultates.

Farrago sententiarum.

Art. 1291. Quibus occulti cancri fiunt (inquit *Cancro*
Hippocrates in Aphorif.) eos non curare melius; *occulti*
curati enim cito pereunt; non curati vero lon- *non me-*
gius tempus perdurant, i. e. (si mentem senis re- *dicandi.*
cte assequor) remedia plus nocent, quam pro-
sunt, & officiosa medicatio mortem accelerat.

Art. 1292. Certe, si quid aliud, epithema *Epithe-*
semani cancro occulto cum fructu aliquo applica- *ma.*
ri potest, quod fit ex solutione *sacchari saturni*
in aq. spermat. ranarum, cui urgente dolore gra-
viori, addi possunt *trochisci alb. rhas. cum opio.*
„ Emplastrum si velis, sit *de minio simpl. Pharm.*
„ *Lond. edit. ult. in linteo extensum*, quod mitis-
„ simum est ac innocuum.

Art. 1293. Cancer parvus, incipiens, liber, *Qualis*
loco apto situs, vasis magnis non adcretus, cau- *cancer*
sa externa ortus, in juvenili sanoque corpore, so- *extirpan-*
lus in toto corpore cum bona spe curationis ex- *duc.*
tirpari potest.

Art. 1294. Quibus sunt cancri in cavitate cor- *Qualis*
poris, aut palato, sede, vel utero, si secantur, *non at-*
vel urantur, ulcera cicatrice induci non possunt. *tingendus.*

Art. 1295. Inter remedia *Empirica* valde præ- *Reme-*
dicatur sequens pulvis, *℥. Verrucar. calcibus po-* *dium em-*
sterioribus equi masculi adherent. ℥ij. abluantur *piricum.*

aqua communi, deinde in vino albo per noctem infundantur, & postea exsiccentur & in pulverem reducantur, dos. ℥ss. bis in die in vehiculo qualicunque idoneo. Sapo veneta ad ℥j. bis in die exhibita, vel forma pilulari, vel in vehiculo appropriato dissoluta, cancerum operatione quadam occulta vel specifica sanare dicitur. *Vid. Turneri Art. Chirurg. p. 83. Vol. I.*

Art. 1296. Opportunum est monitum D. Vvinter in hoc casu. Cancro laborantes (inquit) incipiant, ubi plus sæpe finire solent, ad *dietam lacteam & aquas Bristolenses*, tanquam ad sacram anchoram, confugiendo, & medicamentorum farraginem, præcipue *mercurialium & topicorum* vitando.

*Remedia
varia.*

Art. 1297. Interne etiam exhibentur *antimonialia, mercurialia, viperina*, decoct. e lign. millepedes, &c. *cerevisia ad canceram, cerevisia ad scrophul.*

TUMORES FLATULENTI.

Sennerti & aliorum sententia.

*Tumor
flatulen-
tus unde.*

Art. 1298. Tumores flatulenti (quos Græci *emphyseumata* vocant) a flatibus seu spiritu flatuoso oriuntur, materiam flatibus producendis præbet humor crassus, pituitosus vel melancholicus. Cognoscuntur hi tumores, quod pars in molem nunc majorem nunc minorem attollitur, sine coloris mutatione; ex distentione autem interdum dolor aliquis excitatur, nulla tamen gravitas sentitur, digito pressi foveam nullam relinquunt, & ut plurimum periculo vacant; accidunt frequenter in palpebris, genibus, scroto, præputio, &c.

Curatio.

Art. 1299. Conveniunt interne flatus *discutientia*. Non temere aperiendi sunt hi tumores, præcipue in articulis existentes, in aliis locis punctura facillime curantur. Applicationes externæ debent esse *discutientia*. „ Emplastrum si velis,
„ sit

„ sit de cymino cum exigua calce viva. Plura em-
 „ physmata novi (inquit Turner) discussa appli-
 „ catione calcis vivæ latæ more cataplasmatibus,
 „ ut etiam linteis aqua calcis forti imbutis. Ca-
 „ vendum est ut accurate distinguatur ab aneuris-
 „ matibus. Vid. Art. 1255.

Art. 1300. Tumores in suis propriis folliculis Tumores
Capsula-
res.
 inclusi non sunt adeo difficiles tractatu ac strumæ:
 hujusmodi sunt ganglium, lupia, meliceris, athe-
 roma, steatoma, bronchocele, &c. Observatum
 fuit, quod hi tumores capsulares subinde *Lunæ*
phases imitantur.

Art. 1301. Ganglium est tumor in tendine cor- Gangliū.
 poris concolor, doloris periculique expers. Cura-
 tur frequenter sola frictione sicca diuturna, ali-
 quando frictione cum saliva absque aliorum me-
 dicamentorum usu; quidam applicant laminam
 plumbeam argento vivo inunctam; „ vel sequens
 „ emplastrum tertio vel quarto quoque die reno-
 „ vandum, ℥. Empl. de ranis cum mercur. ʒss.
 „ de cicuta cum ammoniac. ʒij. argenti vivi gr.
 „ xvi. min. ʒj. cum styrac. liquid. q. s. m. f. em-
 „ plastr. vel ℥. Mercur. dulc. ʒij. Galban. colat.
 „ ʒj. misce pro emplastr. his remediis non cedens
 „ sectione tollendum est.

Art. 1302. Lupia est tumor mollis & rotundus Lupia.
 in juncturis & locis siccis ortus; a Ganglio pa-
 rum, situ saltem, & mollitie, discrepans; mate-
 ria frequenter in folliculo continetur; eandem fe-
 re cum Ganglio recipit curationem.

Art. 1303. Meliceris, Atheroma, & Steatoma
 sunt tumores, qui materiam habent peculiarem in
 propria tunica aut folliculo clausam: Si enim ma-
 teria intus contenta sit melli similis, meliceris; Meliceris.
 si pulvi frumentaceæ, quæ ἀθήρα dicitur, Athe-
 roma; si sebo, Steatoma appellatur. Omnes hi Athero-
ma, Stea-
toma.
 tumores sunt corpori reliquo concolores, a par-
 vulo incipiunt & diu ac paulatim excrescunt.
 Non sunt periculosi, diu tamen durant, & cir-
 cum-

circumferuntur; interdum vero sponte in abscessum desinunt, quod si non fiat, non tam difficulter ut *scrophulae* ac *scirrhi* curantur.

Curatio.

Art. 1304. Curatio eorum omnium eadem fere est, eandemque requirunt dietam ac pharmaciam cum *oedematosis*, ut plurimum sunt adeo benigni, ut internis vix indigeant. Si sponte non aperiantur *sectio* instituenda est; ita ut cystis cum suis contentis penitus tollatur; si enim aliquid de tunica illa relinquatur, tumor regenerabitur. Vel ulcus fistulosum fœdissimum difficilis & tardæ curationis relinquetur, ideoque quod *cultro* nequit auferri *cauteris* absumendum est, ne iterum repullulent.

Talpa seu Testudo.

Art. 1305. Talpa seu Testudo est tumor mollis & latus, ex impuris humoribus inter cranium & cutem putrescentibus collectus, *talpæ* aut *testudinis* formam referens.

Prognosis.

Art. 1306. Hujusmodi apostemata, ut & alii capitis erodentes affectus, propter cerebri viciniam & futurarum cranii proclivem in cariem lapsum periculo non vacant, quæ corruptionem cranii jam induxerunt, mala sunt.

Curatio.

Art. 1307. Quoad curam, præmissis universalibus, tumor *resolventibus* & *discutientibus* tentandus est, si discutientibus tolli non possit (quod raro fit) *suppurantia* adhibenda sunt, & quidem neque semper perfecta suppuratio expectanda est, sed si aliqua saltem suppurationis signa adsint, tumor mature aperiendus est, ne os *cariem* contrahat.

Natta.

Art. 1308. Tumor, quem Natam, Nattam, & Napram appellant, est magnus & mollis sine dolore & colore, in dorso præcipue excrescens, quandoque tamen in humero & aliis partibus erumpens, a tenui quidem radice pendens; ita tamen incrementum sumens, ut aliquot libras pendat, & melonis vel cucurbitæ quantitatem æquet, qui cum non semper easdem figuras habeat, ideo

etiam

etiam diversis nominibus ab authoribus appellatur. Materia quidem in eo interdum videtur carnosae, sed non vere caro est, verum adipi similis. Non curatur nisi ex *sectione*. „ In Transactionibus
 „ Philosophicis N. extat historia *ingentis Nar-*
 „ *tae* maxillae inferiori adnascentis, viginti pondo
 „ pendentis, cujus basis fuit quinque digitos lata;
 „ abscissa erat & homo perfecte sanatus.

H E R N I A.

Etmulleri sententia.

Art. 1309. Herniae verae sunt tantum duae, nempe intestinorum vel omenti extra abdomen elapsus, horum posterior non est adeo molestus neque periculosus, ac prior. Nomen vero late sumptum plures alios tumores comprehendit, ut in sequentibus patebit.

*Hernia
quot.*

Art. 1310. Hernia itaque proprie dicta in genere est prolapsus intestinorum tenuium aut omenti ex limitibus suis a vulnere, aut laxatione peritonæi. Aliquando est hæreditarius, ita ut herniosi parentes herniosos generent filios, sed rarius (novi talem progeniem.) Hernia in adultis ut plurimum est incurabilis. Ex Hernia frequenter morbus *Iliacus* producitur; interdum intestina inflammantur, & gangræna corripuntur. Herniae ordinario & frequenter fiunt in inguine, scroto aut umbilico; aliquando vero in aliis locis, nunc supra nunc infra umbilicum, nunc in lateribus longe supra inguina, nunc in superiori femoris parte musculosa, nunc juxta spinam dorsi, &c. ex observatione *Barbette*. „ Valde curiosa est observatio *M. Mery de Hernia vesicae scilicet urinaria in scrotum prolapsa*, aut saltem ibidem munere suo fungentis: existimat enim hoc vitium malæ conformationi ortum suum semper debere. *Memoir. de l'Acad. Vol. XVII. p. 146 &c.*

*Hernia
in genere
definitio.*

*Quibus
in locis
accidit.*

Art. 1311. Intestina facibus cum enemate car- *Curatio*
mi-

minante & emolliente prius exonerata, in loca sua cum cautela sunt reponenda, mediante *fotu* ex emollientibus & carminativis cum *spiritu vini*, &c. & ita reposita in situ naturali omni arte & debitis subligaculis retinenda sunt, ne denuo excidant, adeo ut peritonæum ruptum aut laxatum consolidetur. Interne conveniunt *vulneraria*, speciatim commendatur *perfoliata* item *symphytum majus*; continuus in dorso decubitus est Herniarum *panacea*, etiam in senibus. „ Quicunque „ *Hernia* debilitatur summopere debet cavere (ut „ prudenter admonet *D. Harris in Dissert. Med. „ & Chirurg.*) a ventriculo cibis incongruis im- „ plendo, spiritibusque furibundis nimis pertur- „ bando, & a colicis doloribus spasmisque exci- „ tandis, atque a tussi importuna contrahenda, „ quoniam istæ corporis concussionēs ac tumultus „ solent hernias horride amplificare.

*Hernia
reductio-
nem res-
puentes.*

Art. 1312. „ Herniæ intestinales reductionem „ respicientes periculum subitaneum minantur. „ Symptomata quasi *Passionis Iliacæ* superveniunt, „ dolores gravissimi, vomitus enormes, singul- „ tus, & demum pulsus languidus, & sudores „ frigidi, diagnosi indubitata instantis gangræ- „ næ, & mortis appropinquantis. Audentes in- „ terdum *sectionem* moliuntur cum successu ta- „ men valde ancipiti; nam res est perquam diffi- „ cilis & periculi plena, nec temere tentanda; „ & hac præcipue de causa, quoniam, fere sem- „ per, non nisi sero nimis operatio suscipitur.

*Pneuma-
tocele.*

Art. 1313. Pneumatocèle seu Hernia ventosa, est tumor membranarum testium a flatibus ortus, estque saltem inflatio testium, nunc unius, nunc utriusque, nunc scroti quoque adest dolor tensivus sine gravitate.

*Hernia
tempora-
ria.*

Art. 1314. „ Infantes ex eorum temperiei humi- „ ditate & fibrarum laxitate huic affectui sunt val- „ de obnoxii, & a flatibus intra eorum intestina „ oclusis sæpenumero adoritur *extemporanea quæ-*

„ *dam*

„ *dam Hernia inguinalis*, & quandoque etiam
 „ *testiculorum*, quæ statim facta flatuum explo-
 „ sione subsidit.

Art. 1315. Hæc Hernia flatulenta est omnium *Curatio*
 levissima, & curatu facillima; conveniunt inter-
 ne flatus *discutientia* & remedia ad *colicam fla-*
tulentam; externe *fotus discutientes*, *cataplasma*
ex farina fabarum, *sem. cymin.* *fimo vaccin.* *sul-*
ph. viv. &c.

Art. 1316. Hydrocele sive Hernia aquosa est *Hydroce-*
 tumor aquosus testium a lymphæ recessu testibus *le*.
 impedito; est hydrops testium particularis, & a
 tumore scroti, qui in ascite accidit, distinguitur;
 similis est Herniæ carnosæ, sed in aquosa induci
 potest fovea, quod non fit in carnosæ; præterea
 pelluciditate se prodit.

Art. 1317. Tentanda est cura interne cum *hy-* *Curatio*
dragogis & *diureticis*, externe *discutientibus*; hic
 quoque valet cataplasma, in sectione de Hernia
 ventosa, descriptum (1315.) cum additione *bal-*
sam. sulphuris. De operatione chirurgica vide lo-
 cum. p. 991.

Art. 1318. Sarcocoele seu hernia carnosæ est tu- *Sarcocoele*
 mor a carne superflua adnascens; ex contusio-
 ne vel ictu plerumque oritur, & ex insensibili
 principio sensim augetur, secus ac in aliis testium
 tumoribus; est fere indolens, sed ægri pondus per-
 ciunt. „ Est revera *sarcoma* vel potius tumor
 „ *scirrhus*; & metus est, ne temporis progres-
 „ su in *cancrum* abeat: ideoque *castratio tempesti-*
 „ *va* imperanda est, de qua consulantur scripto-
 „ res chirurgici. Caro superflua quandoque *tuni-*
 „ *carum scroti communium secundæ* adnascitur, &
 „ non *testiculis*, quo in casu sine horum læsione
 „ tolli potest.

Art. 1319. „ Sarcocoele (inquit *Barbette*) me- *Prognosis*
 „ dicamentorum ope vix tollitur; chirurgiæ ve-
 „ ro opera raro sine ablatione testiculi; ad ingui-
 „ na ubi se extenderit fere incurabilis habetur. „

In-

Curatio. Internè conveniunt medicamenta ad *strumas*. „ Spe-
 „ ciatim a scriptoribus fere omnibus commenda-
 „ tur *radix anonidis* intus sumpta per longum
 „ tempus. „ Externe *resolventia* & *discutientia*,
 „ *emplastrum de cituta cum ammoniaco*, de *ranis*
 „ cum *mercurio*, sed ex hoc vis testis periclitabitur.
 „ His nihil proficientibus ad auxilium chirurgi-
 „ cum deveniendum est. Fiat itaque foramen cau-
 „ terio potenciali adhibito in *superiori tumoris par-*
 „ *te*, & suppurantia medicamenta applicentur,
 „ ut hoc modo, si possibile sit, caro ea tolli pos-
 „ sit: quamvis tamen visitatione omne pus non est
 „ emittendum ut tanto melius carnis reliquiae
 „ consumi possint. Superest *castratio*, ut ante di-
 „ ctum sit. De *Hernia varicosa*, vide sect. de
 „ *Varice*. (1270.

Hernia
varicosa.

Broncho-
cele qua-
lis est tu-
mor.

Prognosis.

Curatio.

Art. 1320. „ *Bronchocele*, sive *hernia guttura-*
 „ *lis* improprie dicta, est tumor prominens in
 „ gutture, amplo spatio protebrans corpori con-
 „ color, utcunque mollis & mobilis, & doloris
 „ expers; modo caro hebes includitur, modo
 „ humor aliquis melli aquæve similis, interdum
 „ etiam minutis ossibus pili immixti; ut pluri-
 „ mum periculo vacat; quandoque vero materia
 „ putrescens malignam induit naturam, unde in
 „ *cancrum* degenerans mortem inferre solet. *Al-*
 „ *pinorum montium incolis* est morbus *endemicus*.
 „ *Art.* 1321. „ Præmissis universalibus, humor
 „ peccans discutiendus & absumendus est. Inter
 „ *topica* laudat *Aetius bdellium* & *capræ ster-*
 „ *cus* in aceto liquatum. Si medicamentis non
 „ cedat, ex *Rogerii* consilio admovendi sunt duo
 „ *setonæ*, ut sensim humor defluat: & superfluum
 „ postea erodentibus paulatim est absumendum.
 „ Denique si venis, arteriis & nervis implicata
 „ non fuerit, *incisione* potest extrahi cum cysti;
 „ hanc operationem *Galli* foeliciter moliantur.
 „ De hoc tumore consulatur *Turner. Art. Chi-*
 „ *rurg. p.* 178. &c. Vol. I. Item in *Appendice p.*
 „ 21. &c.

„ 21. &c. Etiam si sit tumor in cysta inclusus; ta-
 „ men extirpatu difficillimi eventus ex structura
 „ loci. „ Qui hanc operationem aggreditur, Lu-
 „ pum auribus tenet.

A N I P R O C I D E N T I A.

Etmulleri sententia.

Art. 1322. Ani procidentia fit, quando sub fæ- *Ani pro-*
cidencia.
 cum excretionem intestinum rectum ita prominet
 & protruditur, ut non possit rursus sponte re-
 trahi intra corpus, aut licet retrahatur, mox in-
 cipiat denuo prolabi. Est interdum malum chro-
 nicum (præcipue quando a paralyfi ortum ducit) *Causa.*
 & difficulter curatur. Ani procidentia causa sunt
 alvi adstrictio, diarrhoea, dysenteria, vel præci-
 pue tenesmus; difficillima est curatu, quando
 hæmorrhoides comitem habet.

Art. 1323. Si adsit inflammatio prius arcenda *Curatio.*
 est cum fotibus mollientibus & discutientibus, &
 remotis impedimentis reponendus anus in situ na-
 turali: Alvum leniter laxantia pro re nata sunt
 „ quandoque propinanda: „ Alias absente inflam-
 „ matione aut tumore foveatur *astringentibus*, quæ
 „ etiam sub forma *suffitus* usurpari possunt. „ *Pa-*
 „ reus spongiam *astringentibus* imbutam ano ap-
 „ plicat. Stans alvum exoneret æger, sic enim
 „ non tam facile excidit. Inter *astringentia* mihi
 „ nondum innotescit remedium efficacius quam
 „ *fotus pro hernia varicosa.* (1271.) „ Tenesmus
 „ frequenter affligit, in tali casu remedia ad te-
 „ nesmum adhibenda sunt.

Art. 1314. „ Intestinum rectum foras prolapsum *Reductio.*
 „ a frigore externo periclitatur, ne gangrænes-
 „ cat, quapropter citissime reducendum est. Re-
 „ ductio quandoque perfici potest *artificio sequen-*
 „ te, aliis mediis incassum tentatis, viz. na-
 „ tes patientis extensa manu quinquies, sexies
 „ aut pluries verberando, quo muscoli ani leva-
 „ tores

„tores intestinum rectum in priorem sedem at-
„tollent.

V E R R U C Æ & C L A V I.

Ettmulleri sententia.

Verruca & clavi. Art. 1325. „Quales tumores vel potius excre-
„scentiæ sunt verrucæ & clavi nemo non novit .
Verrucæ sunt vel planæ seu sessiles, vel penfiles,
acrochordones appellatæ.

Curatio verrucarum. Art. 1326. Si verrucæ in sola cute sint radica-
tæ facile curantur vel tolluntur, sin vero a sub-
jectis tendinibus originem ducant, vix radicitus
extirpari possunt citra ingens periculum; idem
etiam de clavis pedum verum est. Succus *cheli-*
don. maj. vel *esula* vel *dentis leonis* vel *tithy-*
mali, &c. sæpius illitus verrucas absumit. A-
qua, in qua solutum est *sal armoniacum* est ex-
perimentum *Borelli*: „Atque hoc est medicamen-
„tum unicum certissimum quod se cognoscere in
„tota medicina fassus est *D. Mapletost* haud pri-
„dem *Professor Grashamensis*: hoc equidem re-
„medium est ut plurimum maxime efficax, sed
„non certissimum & infallibile, neque tamen ars
„nostra omnium nobilissima, est adeo incerta,
„sicut vir doctissimus suggesserit.

Curatio clavorum. Art. 1327. „Clavus (inquit *Celsus*) nonnun-
„quam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen
„maxime nascitur, præcipue autem ex contuso,
„quamvis interdum aliter, doloremque movet.
„Clavi a *Plinio Morticini* appellantur. „Ad cu-
ram quod attinet, emolliendi sunt cum *emplastro*
mynsicht. e galbano crocat. cum sale armoniaco,
& postea evellendi sunt; eidem usui inservire po-
test *emplast. de ranis cum mercurio*. Item recipia-
tur *caro bubula recens*, cujus frustulum instar em-
plastri iis alligetur, & sæpius removeatur; sic
enim cito sponte dilabi dicuntur.

Art.

Art. 1328. De cornibus non lubet differere, quoniam pauciora sunt visibilia.

C A P. XIII.

Sive Fasciulus Morborum decimus tertius.

CONTUSIO, &c.

Ex observatione & inter legendum.

Art. 1329. **C**orpora nostra vel a casu ab alto, *Contusio.* vel ictu violento, vel compressione ponderis incumbentis, &c. sæpissime læduntur; partes carnosæ contunduntur, & ipsa ossa luxantur & quandoque franguntur. Ex prædictis causis accidit plerumque *ecchymosis* cum vel sine *Ecchymosis.* tumore, quæ revera est accumulatio vulnusculorum cum attritu solidorum & vasculorum, unde liquida stagnant, coeunt, & interdum putrescunt, cohærentibus quandoque integumentis externis, vel iis etiam interdum hinc inde læsis.

Estmulleri sententia.

Art. 1330. In ecchymosi curanda imprimis opera danda est, ut sanguis extravasatus, congruatus, & acore inquinatus, successive resolvatur, insensibiliter absumatur, & per meatus seu porulos corporis eliminetur. Conveniunt remedia interna *acidum absorbentia*, sanguinem congruatum *resolventia*, simul & blande *diaphoretica*, eminet *sperma ceti* cum *lapillis cancrorum*, *succin. preparat. coral. rub. &c.* *Antimonium diaphoreticum*, & *salia volatilia* sunt egregia. Externe imprimis *resolventia*, & sanguinem grumatum insensibiliter dissipantia sunt usurpanda, huc

Cavea-
tur a
Gangræ-
na.

facit *spiritus vini* nunc simplex nunc *camphora-
tus*, nunc *crocatus*, cum linteis applicatus, effi-
caciùs est si addatur *theriaca*, & etiam *balsam.
peruv.* maxime in contusionibus partium nervosa-
rum. In contusionibus levioribus applicatio *car-
nis bubulæ* in tenues lamellas sectæ optime con-
ducit. Quod si his & similibus remediis ecchy-
mosis nequeat dissipari, opera danda est, ut san-
guis extravasatus in pus convertatur; si vero me-
tus sit gangrænæ, mox pars contusa profunde sca-
rificetur, & sanguis congrumatus, quantum fieri
potest, eximatur, & tanquam gangræna tracte-
tur, de qua alibi (1384.) „ In omni contusione
graviori convenit *venæ-sectio*.

Farrago sententiarum.

Reme-
dium sin-
gulare.

Art. 1331. Quidam adolescens ex alto cecide-
rat; & omnia membra admodum contusa fue-
runt, ut brevi moriturus videretur. Pater ipsius
accepit *favor cum melle* & coxit in vino ad consi-
sistentiam unguenti, quod extendit super *corium
vervecis* recenter mactati, eoque ægrum involvit,
reiterata per triduum operatione, æger omnino
curatus est, ex *Riverio*.

Vires dub.
camara.

Art. 1332. ʒi. Fol. solani lignosi sive *dulcamar.*
Miv. sem. lini subtiliter pulverisat. ʒiv. coq. in
vin. *moschatellin.* cretic. aut *larido porcin.* ad con-
sistentiam cataplasomatis, quod loco contuso te-
pide admoveatur: unius noctis spatio tumorem
capitis humani magnitudine resolvit & contusio-
nes deploratas musculorum sanavit (inquit D.
Hulse apud Raium) vires quoque ejusdem plan-
tæ pro usu interno sunt egregiæ; est enim basis
infusi traumatici apud *Falierum*; addit author sin-
gulare esse experimentum ad casum ab alto &
contusionem: cruorem quippe extravasatum &
grumescentem mirifice dissolvit, &c.

In simpli-
ci contu-
sione.

Art. 1333. In simplici contusione sufficiunt em-
bro-

CAP. XIII. Contusio Capitis. 431

brocationes cum ol. rosar. myrtil. & aceto, & applicatio cataplasmatum sequentis vel hujusmodi 24.
Far. horad. fabar. ana ℥iij. pulv. nuc. cupress. balust. alum. rap. ana 3ss. ros. rub. ℥iij. ol. ros. 3iβ. alb. ov. N. ij. acet. q. s. m. f. cataplasma. Ex Viseman.

Art. 1334. Præter remedia modo recensita interdum in usum venire possunt sequentia; Bolus ad casum, pulvis ad casum, oleum sem. lini intus sumptum; emplastrum smecticum; &c. Remedia varia.

Etmulleri sententia.

Art. 1335. Gravior contusio capitis interdum cranium findit, vel in loco contuso, vel loco opposito (& vocatur *contrafissura*), nunc penetrat utramque laminam, nunc externam illæsa interna, nunc e contra. Signa fissuræ sunt multiplicia, ut vomitus biliosi, vertigo, sanguinis per os, nares, &c. effluxus, subitanea obmutescencia, & brevi superveniens delirium, convulsio, paralytis; symptomata hæc superveniunt nunc mox in principio, ubi gravior fuerit læsio, nunc quarto vel septimo die, ubi levior. Si æger firmiter teneat funiculum inter maxillas & chirurgus fortiter trahat, si habeat fissuram, in loco fisso dolorem percipiet. Necesse est ut plurimum, ut perforetur cranium, ut sanguini & saniei pateat exitus. Observandum est, quod vulnera simplicia capitis interdum post quartum vel septimum diem contrahant dolores, hinc rigorem & febrem; hæc si superveniant, & alia adsint symptomata; suspicio est fissi vel fracti cranii, Si vero non adsint alia symptomata, non statim ad trepanationem accedendum est; febris enim ex aliis causis oriri potest. In contusionibus cranii & læsionibus meningium septimo vel undecimo die gravis supervenit ophthalmia, & est signum mortis imminenti. Baglivi.

Contusio capitis.

Signa fissuræ cranii.

Boerhaavii sententia.

Capitis
contusio-
nis esse
caus.

Concussio
vehemens

Art. 1336. In capitis contusionibus, & inde ex collecta materie, interdum creantur varii tumores, erysipelas, oedema, dolores, convulsiones, ossis & periosteï putredines, febres, mors. — Cranium in junioribus intro pressum, vel in adultioribus post fracturam intro pulsum, cerebrum premit; pro varietate loci pressi, pro varia magnitudine, profunditate, acutie, punctura prementis, producit hebetudines, sopores, vertigines, tinnitus, caligines, deliria, vomitum bilis, dolores capitis, convulsiones, paralyfes, lotii sæcumque spontaneum exitum, apoplexias, febres, mortem. Concussus validus capitis interdum eadem facit rumpendo, comprimendo &c., In his „ affectibus religiose consulatur laudatus author „ *in cap. de capitis vulneribus*, qui (si quid ego „ iudicando valeo) omnium scriptorum est facile princeps. In contusionibus gravioribus semper recordandus est *aphorism. Hippocratis*, „ nempe omne quod contusum, necesse est, ut „ putrescat, & in pus vertatur. „

Etmulleri sententia.

Luxatio
Ossium.

Duplex.

Art. 1337. Luxari dicuntur ossa, quando eorum capita ex situ naturali removentur; hæc autem luxatio fit a vi externa ut plurimum, quandoque vero oritur a causa interna; namque hoc malum iis, qui scorbuto laborant, aut qui affectibus catarrhalibus sunt obnoxii, nonnunquam accidit; in his enim funiculi nervei laxantur & resolvuntur, & fere insensiles fiunt, unde *paralyfi scorbuticæ* subinde supervenire solet.

Art. 1338. Duplex est luxatio nempe *perfecta*, quando os a sede sua omnino amoveatur, vel *imperfecta*, quando non totaliter a sinu suo extrusum

sum sit os, sed hæreat adhuc in sui receptaculi margine.

Art. 1339. Præ cæteribus omnibus os femoris *Prognosis* difficillime luxatur, istius etiam luxatio est omnium curatu difficillima; in adultis raro aut nunquam restituitur sine miserrima in perpetuum claudicatione; ratio est, quoniam ligamentum fortissimum, quo in receptaculo suo illigatum est, vel ruptum sit, vel insigniter relaxatum. Valde probabile est (*observante D. Cheseldan ex duobus dissectionibus Anat. pag. 33.*) quod os femoris nunquam vel rarissime luxetur, & quod fractura cervicis istius ossis pro luxatione frequentius accipiat, unde femur decurtatur, &c. Impossibile enim est (ut cum illo dicam) quod caput ossis inter musculos firmum ac stabilem locum inveniat ambulationis munere obeundo, tanquam in acetabulo. Luxatio in talo seu pedio est omnium periculosissima, ubi sunt os tali, calcanei, tria ossa innominata, os cubiculare, &c. ibidem quoque copiosissimi sunt tendines, unde dolor atrocissimus, inflammatio, quandoque etiam convulsio. Os humeri (*ex observatione Barbettiana*) raro luxatur, & etiam ita raro reducitur, quin aliquantulum protuberet, quam ob causam patiens sæpenumero manum ad caput porrigere nequeat. Dorsi vertebrarum ad interiora luxatio malum lethale censetur; idem de costis ad interiora luxatis plerumque dicendum est.

Art. 1340. Quoad curam luxationis; os luxatum, membro extenso, mature reponendum est, *Curatio* quo facto, nil aliud incumbit chirurgo, nisi ut commodis ligaturis os firmet, apteque collocet, ac inflammationem facile superventuram, & alios affectus mature arceat. Fasciationes non debent esse nimis strictæ, ne compressis vel coarctatis vasculis oriantur tumores; neque tamen nimis laxæ, ne pars semel restituta denuo ex loco elabatur. Si

*Inflam-
matio.*

ad sit inflammatio, antequam membrum reposti-
tum sit, nihil prius tentandum est, quam inflam-
matio discussa fuerit; quamdiu durat, tamdiu pars
inepta est extensioni, sin vero violentius luxatio
inflammata extendatur, supervenit ex nimio do-
lore convulsio interdum lethalis. Ut ergo inflam-
matio imminens præcaveatur, vel præsens discu-
tiatur, conducit fons sequens, *℞. Summit. hy-
peric. Miss. beton. chamæmel. rorismarin. ana Mj.
rad. consolid. maj. ℥iij. aristoloch. rotund. ℥vj. sem.
quatuor calid. maj. ana ℥ss. coq. in aq. font. &
vin. ana q. s. ad ℥ij. sit pro fons, & in eodem
humectentur fasciæ tepide circumvolvendæ: ubi
major adfuerit contusio, augeatur quantitas *rad.
consolid.* ubi levior *Aristolochiæ*; ubi urgent do-
lores *capita papaveris* possunt addi. Supervenit
quandoque tumor *œdematosus*, in quo casu illi-
nantur partes affectæ cum oleo volatili penetran-
te, convenit etiam *petroleum*, item *bals. peruvia-
num* cum *spiritu juniperi* temperatum. In luxatio-
nibus prodest inunctio cum oleo *hyperici* & *ol. te-
rebinth.* *Ol. distillatum fœtidum tartari* est hor-
rendum ratione odoris, sed tamen nihilominus est
nobile admodum ratione efficaciar; conveniunt
ex *lumbricis* parata pro usu externo & interno.
Experientia didici *ovum cum oleo terebinthina* &
pauco aceto conquassatum in luxationibus esse re-
medium utilissimum, omnibusque intentionibus
satisfaciens. *Belloste.* Convenit etiam illud *Boy-
leanum* nempe *furfur tritici in aceto coctum*.*

*Fractura
ossium.*

Art. 1341. In fracturis ossium, vel frangitur os
secundum *latitudinem*, hoc est transversim; vel
secundum *longitudinem* finditur, quod proprie di-
citur *fissura*. Fracturæ in senibus frequentius oc-
currunt, quam in junioribus, quoniam illorum
ossa sunt aridiora.

*Longitu-
dinales.*

Art. 1342. Fracturæ ossium longitudinales, i.
e. *fissuræ* difficile cognoscuntur, sed facillime cu-
rantur: neglectæ aut non rite curatæ ulcus post
se

se trahunt, imprimis si in loco fisso ossis caries superveniat, admodum periculosa sunt, & saepius ad membri abscissionem deducunt.

Art. 1343. Fracturae transversales sunt cognitu faciliores, curatu difficiliores. Os fractum in medio sui dat fracturam leviolem, quam circa articulum. Fractura cum vulnere & multa partium contusione & laesione est gravius malum & periculosum, ut etiam quando os in plura frustula frangatur. In adultis femur fractum rarissime aut vix unquam sine claudicatione restituitur. Minora ossa fracta intra 7. vel 14. diem fere sanantur; ossa majora intra 20. ad 40. praeter propter curationem recipiunt.

Art. 1344. In cura fracturarum duo scopi chirurgi incumbunt, nimirum ossa fracta facta extensione in situm naturalem reponere, & reposita per fascias & ferulas firmare; tunc enim natura eadem denuo firmiter conglutinat, & formatur *callus*, qui substantia quidem similis est ossi, conformatione vero sola ab eodem differt. Si adsit inflammatio, curanda est, antequam aliquid circa fracturam tentandum est, qua curata, atque osse reposito illinatur locus fracturae cum *ol. hyperic.* vel *ol. lumbricorum terrest.* cum guttis aliquot *ol. therebinth.* & applicetur emplastrum ex *racamahac.* cum paucis *ol. distillat. rosis marini* malaxatum; applicato emplastro imponantur ferulae tres aut quatuor ad summum, quae postmodum jungantur per tria ligamenta; Ligationes autem debent esse moderatae; nam si sint *arcte* nimis partem suffocant, & gangraenam inferunt. Experientia constat praeter ceteris quibuscunque lapidem *osteocolle* a $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$. ad $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$. intus sumptum esse remedium singularissimum in callis ossium fracturum generandis, & augmentandis, utcumque obscurissimum sit, quomodo operatur. Haecenus de fracturis simplicibus; quaedam cum vulnere complicatae sunt, post repositionem ergo ossis vulnus

Transversales.

Prognosis. Curatio.

Vires osteocolle.

Fractura complicata.

considerandum venit, quod, ut alia vulnera, de quibus postea, tractandum est; emplastrum fracturæ applicandum perforatum esse debet in loco vulneris, ut ita beneficio foraminis vulnus commodè tractari possit. Si os iterum frangatur, non frangitur in callo, sed circa callum.

V U L N E R A.

Boerhaavii sententia.

*Vulneris
in genere
historia.*

Art. 1345. Vulnus est soluta unio recens, cruenta, partis mollis a corpore duro & acuto facta. Partes vulneratæ sensim magis magisque a se mutuo recedunt; cruor plerumque primo cum impetu effluit, dein sensim sponte sistitur; tum crusta sanguinea cavo vulneris innascitur, & liquor dilutus, rubellus, tenuis effluit; labia vulneris incipiunt rubere, calere, dolere, tumere, retorqueri; atque eodem tempore febricula cum calore & siti adest; (in magnis vulneribus) hinc tertio, quartove die ferius vel ocys vulnere adest liquor tenax, albus, pinguis, æqualis, pus; eodem tempore rubor, calor, dolor, tumor, retorsio labiorum, febricula, cessant, vel minuuntur; & sensim cavum vulneris a fundo sursum, & ab ambitu versus centrum, crescente carne impletur, coeunte margine albo; postremo ficcatur vulnus, & obducitur cicatrice.

*Vulnera
arteriarum.*

Art. 1346. Ex arteria majori tota dissecta oritur hæmorrhagia lethalis; arteria vero non nimis magna transversim dissecta, retrosiliens, atque inter solida vicina se recondens, sibimet obturaculo est; si vero arteria transversim vulnerata non totaliter dissecta fuerit, oritur hæmorrhagia perpetua, ea autem sedata a tenuitate cicatricis cedente aneurisma.

Hæmorrhagia.

Art. 1347. „ Ad hæmorrhagias vulnerum sistendas, præter vasorum ligaturas & fibularum li-
„ nariarum applicationes, *styptica* quamplurima
„ in consuetudinem veniunt; usitatiora sunt, quæ
„ se-

„ sequuntur; *Pulvis Galenicus*, *alum. ust. colco-*
 „ *thar. vitrioli*, *muscus India*, *styptic. regis*, *oleum*
 „ *terebinth. tinctura antiphthifica Ettmulleri*, vel
 „ *potius Michaelis* (vid. *Ettmuller. Vol. I. e. 476.*)
 „ *præstantissimum quidem remedium*, *Helvetii*
 „ *stypticum*, viz. *tinct. chalybis cum tartaro præpa-*
 „ *rati spir. vin. extract.* atque hoc est ultimum re-
 „ *medium eorum*, quæ sunt *melioris notæ*; nisi
 „ *quis nova lumina* consecretari velit, *ignes fatuos*.
 „ *Non deerunt Thrasones ac fumi venditores*,
 „ *quamdiu mundum adeo credulum invenire pos-*
 „ *sint*. Proh dolor! nunquid sermo hic de vulgari
 „ *tantum opinione movetur?* Utinam ne dicam
 „ *hujusmodi impostores fautores habere Equites*
 „ *Auratos*, *Camerarios*, &c. Sed *regerent tor-*
 „ *quem epilepticum tempore Oribasii in usu fuisse;*
 „ *ita quidem majores nostri, omni ævo, & Hip-*
 „ *ocrates ipse impudentissimis agyrtis mundum*
 „ *infestari conquesti sunt. Exiguum opii frustulum*
 „ *in foramen arteriæ sanguinem fundentis intru-*
 „ *sum hæmorrhagiam extemplo sistere dicitur. N.*
 „ *B. Stypticum Doct. Eatoni idem esse vel saltem*
 „ *non multum diversum a styptico Helvetii apud*
 „ *exteros aliquamdiu obsoleto & nunc demum*
 „ *tanta cum ostentatione redivivo; in ambobus*
 „ *vim maximam a spiritu vini oriri eisdemque ef-*
 „ *fectus ipsum spiritum vini solum præstare lu-*
 „ *culenter demonstravit D. Sprengellius. Tran-*
 „ *fact. Philosoph. N. 383.*

Art. 1348. Nervi toti dissecti retrosiliunt, se *Nervos*
recondunt, ramulos vulnere paulo superiores tra- *rum vultu*
hunt, & vicinis dolorem obstructionemque cre- *nera.*
ant, parti vero infra vulnus positæ stuporem, im-
mobilitatem, marcoremque. Nervi puncti, vel
dimidiato discissi dolores, aliquando primo obtu-
fos, nonnunquam vivos excitant, primo in loco
vulneris, post per omnes nervos nexos, vicinof-
que; hinc calores, tumores, rubores late sparsos,
febres, deliria, spasmos, inflammationem, in-
flam-

Tendi-
num ac
membra-
narum.

flammati aperturam cum evacuatione acris, tenuis, & copiosissimi sæpe feri; postea insensibilitatem, rigiditatem, exsiccationem, immobilitatem producant, vel gangrænam & mortem. Eadem fere parum mutata etiam in tendinibus diversimode læsis obtinent; & membranæ, tendinum, nervorumque sæpe productæ quum sint, similiter quoque afficiuntur.

Sutura
curandi.

Art. 1349. „ Tendines magni recens abscissi vel rupti sutura refarciri possunt, extremitates ita conjungendo, ut glutine naturali vel callo quodammodo uniantur, & usus artuum conserve-
tur. Chirurghi Gallici frequenter & etiam alii qui ex nostratibus hoc præstant cum fausto eventu. Extat apud *M. Petit* instantia *amborum tendinum Achillis* penitus disruptorum *sola ligatione* sine ulla futura curatorum. Vid. *Memoir. de l'Acad. Anno 1722. p. 68.*

Curatio.

Art. 1350. „ Nervorum ac tendinum vulnera, (*inquit Barbette*) putredinem facile concipiunt, & sunt admodum periculosa; punctura est periculosior quam sectio. His vulneribus probe animadvertendum est frigida externa valde nocere; hoc non tantum de medicamentis sed etiam de aere intelligendum est. Medicamenta debent esse moderate calefacientia & exsiccantia, minime acria, qualia sunt *oleum lumbricorum, rutaceum, hyperici, terebinthina, cera, sp. lavend. comp. elixir. propriet. balsamum peruvianum, opobalsamum, gum. elemi, spiritus vini, &c.* In punctura recenti tendinis aut nervi (ut loquitur *Joh. Mekren*) illico foramini imponatur plumaceolum sequenti vel simili mistura madefactum *℥. Ol. terebinth. sp. vin. ana. p. j. ol. ceræ in quo aliquid euphorbii solutum p. ij. misce*, huic superimponatur plumaceolum siccum, mox spatula parum ignita applicetur, ut calor & vis mixturæ ad interiora læsa deferatur, hoc peracto, plumaceolum unguento *Basil.*

„ *fil.* inunctum priore remoto admoveatur, &
 „ superimponatur *Emplast. stipt. Paracels.* In pun- *Nota be-*
 „ ctura tendinis juxta observationes & ratiocinia *ne.*
 „ *D. Cheselden* brachium in situ acclinato non
 „ extenso tenendum est.

„ *Art. 1351.* „ Inter venæsectionem celebrandam *Punctura*
 „ homines interdum, maxime ab imperitis chi- *tendinis.*
 „ rurgis, a *punctura tendinum* in artus amitten-
 „ di, atque adeo in vitæ discrimen conjiciuntur.
 „ Qui vero hujusmodi punctura plectuntur, do-
 „ lorem non statim sentiunt, sed duodecim horis
 „ post phlebotomiam se eodem affici conquerun-
 „ tur, non tam in orificio nuper facto, quam in
 „ partibus ad axillam tendentibus, ubi tandem
 „ dolor se figit, & tunc maxime percipitur, cum
 „ brachium extendatur; attamen læsa pars tumore
 „ admodum insigni non afficitur, eodem avella-
 „ næ magnitudinem vix superanti, sed ex orificio
 „ humor aqueus vel ichor quidam jugiter distillat,
 „ quod quidem præcipuum puncturæ tendinis
 „ diagnosticum est habendum. Curatur cataplas- *Curatio.*
 „ mate sequent. ut propriis oculis observavi; *℥.*
 „ *Rad. lilior. alb. ℥iv. coq. ad teneritudinem in*
 „ *lact. vaccin. ℥ij. deinde ℥. farin. lini avenac.*
 „ *ana ℥iij. coquantur farina ad cataplasmatism con-*
 „ *sistentiam in q. s. lactis a radicibus prædictis co-*
 „ *lati, & radicibus contusis misceantur; f. cata-*
 „ *plasma parti affectæ calide applicandum mane*
 „ *& vespri. Sydenham.* Ego quoque hujusce ca-
 „ taplasmatism efficaciam semel atque iterum ex-
 „ pertus sum.

„ *Art. 1352.* Vulnera sequentia sunt lethalia; ce- *Vulnera*
 „ rebelli, item cerebri profunda adeo, ut medullam *qualia le-*
 „ oblongatam multum lædant, medullæ spinalis pro- *thalia.*
 „ funda vulnera, maxime parte superiori; cordis in
 „ cava penetrantia; magna quoque vulnera pulmo-
 „ nis, hepatis, lienis, renum, pancreatis, mesen-
 „ terii, stomachi, intestinorum, uteri in gravidis,
 „ vesicæ circa arterias ejus majores, aortæ, caro-
 „ tidum,

tidum, & similia arteriarum venarumque magnarum. Vulnera magna bronchiorum, vulnera utroque latere thoracis cavitatem penetrantia, diaphragmatis præcipue in ejus parte nervosa, vulnera magna ventriculi, intestinorum tenuium, &c.

Ettmulleri sententia.

*Musculi
temporalis peri-
culosa.*

Art. 1353. Vulnera musculi temporalis sunt periculi plena, & rarius curantur, (inferunt plerumque *spasmos horrendos.*)

Curatio.

Art. 1354. Cura vulnerum consistit in unione partium separatarum, quod opus est solius naturæ, quæ beneficio succi nutritii ad omnes partes distributi sensim sensimque easdem renovat, & reducit; chirurgi autem opus est hic adjuvare eam, in hoc bono opere sequendo ejusdem ductum, removendo imprimis impedimenta externa, ac applicando remedia, quæ parti sint familiaria ac amica, *vulneraria & balsamica* appellata. In curandis vulneribus interne prodesse *vulneraria & alcalia*, inter quæ eminent *album græcum, cancer fluvialis, mercurialia, &c.* Immo tota curatio interna consistit in blandiori *diaphoresi* promovenda & conservanda; ideoque *mixtura simplex vulneratis* optime convenit. In vulneribus recentibus non necesse est, ut cura in longum protrahatur; sed potius suppressa hæmorrhagia, & remotis corporibus extraneis, statim instillantur guttæ aliquot *bals. peruvian. simpl.* quod interdum vulnus cito conglutinat: interdum tamen necesse est, ut, neglectis balsamicis, *digestiva* applicentur methodo vulgari, ubi, scilicet, conjuncta est contusio, uti in vulneribus *sclopetorum* evenit. *Digestiva* (1367.) ordinario constant ex *terebinthina & vitello ovi* tanquam basi, quibus pro re nata, nunc *mellis parum* cum *myrrha* aut *bals. peruv.* aut *gum. elemi, &c.* addendum, im-

*Digesti-
va.*

pri-

primis si circa partes nerveas, quæ alias facile putrescunt, suppuratio expectanda est. *Elixir proprietatis* omnes nostri corporis putredines arcet ob *myrrham*, ut & *colcothar. vitrioli* ab *Helmontio* laudatum, ex hoc *Felix Vvurzii* unguentum suum fuscum parabat. *Balsamum peruvianum* reliquis balsamis præfertur, proficuum quoque est *balsamum saturni therebinthinatum*, & *balsamum sulphuris cum oleo hyperici factum*; laudatur *oleum Momordicæ*: *oleum Hyperici* ex seminibus expressum, cui proprii flores infusi sunt, est egregium; *spiritus theriacalis* pro lavandis vulneribus recentibus, est optimum putredinem prohibens, &c.

Art. 1355. Turundis parce utuntur saniores præstici, neque unquam sine premente necessitate; *Turunda da.* nam nimis frequenter & diu usurpatæ consolidationem impediunt, item partes cutaneas circa labia ad occallescentiam solent disponere.

Quod sequitur de turundarum usu & abusu; & de rara solutione vulnerum, ex libro valde raro & vix comparando *Johannis Baptiste Magari* de rara medicatione vulnerum, &c. decerpſi,

Art. 1356. Turundæ & penicilli nihil aliud sunt quam corporea extranea partis affectæ naturam *Turunda & penicilli.* infestantia, & in illis expellendis semper laborat; partem vulneratam distendunt, comprimunt, eisdemque sunt oneri, & propterea fluxionis periculo eam exponunt. Veruntamen turundarum & penicillorum usus aliquando saltem admittendus est ac necessario, & in quibusdam casibus æstimandus, viz. quando ob complicatum affectum remoranda est vulneris sanatio, ut quando viscera vulnerata sunt, & in cavitate thoracis aut abdominis materia continetur aut sub cranio collecta est, & similium statu olim *Romani Chirurghi*, ne sua laude fraudentur, & longa & sedula *Solutio rara vul-* observatione novum curandi vulnera modum, *nerum.* quo rarissime solvuntur, adinvenere, qui cum experientiæ potius quam rationi & procerum nostro-

strorum doctrinæ inniti videretur ; eum *Cæsar Magatus* , ad methodum reducere conatus est : *Modus Ludovico Sepralio* clarissimo *Italiae* ornamēto valde arrisit , ipsumque ad praxin felici successu adhibuit , & suis scriptis commendavit : Quoties vulnus solvitur ac detegitur , toties interturbatur & a proprio munere distrahitur natura : & quamvis accedat utilitas ex nova recentium medicamentorum impositione , attamen majus est detrimentum quod ex crebra solutione sequitur , quam commodum ex nova medicamentorum impositione , quorum virtute vulnus haud destituitur , *sanatio etenim est duntaxat naturæ opus* . Status vulneris sub tegumentis oculis mentis cognosci potest ; in quibusdam vero casibus solutio & detectio vulneris est perquam necessaria , nempe , quando manualis aliqua operatio requiratur ad peregrinum corpus vel ossis aliquam portionem evellendam , &c. quando caro spongiosa supercreseat , quando ingentis putredinis , vel sordidorum excrementorum abundantia sit suspicio , quando adsit dolor vehemens vel erosio & pruritus ; sub his & similibus circumstantiis detegenda sunt vulnera , ut congruis remediis his malis occurratur .

Ulcerum. Art. 1357. In medicina facienda experientia docet eandem curandi rationem a vulneribus ad ulcera transferri posse , idque adeo felici successu , ut sæpe deplorata ulcera , & innumeris tractata remediis , facillimo negotio hac via sanabilia evadant , corporibus solummodo prius a cacochymia bene purgatis & ulceribus a sordibus deterfis :

*Vulnera
sclopeto-
rum.*

Art. 1358. Vulnera sclopetorum post extractionem globuli plumbei , sicut alia vulnera cum contusione conjuncta curanda sunt ; convenit *venæ sectio* ; revulsio enim (inquit *Galenus* ,) quæ e directo fit , celerrimam utilitatem adfert , die proximo *enema lenitivum* injici debet , & fons sequens usurpari , *℞. Summit. hyperici , contaur. min. scord. absynth. ana Mj. flor. ros. rub. chamam.*

ma m. melilot. sambuc. ana Miß. fursur. p. i. coq. in aq. font. ad ℥iij. colatur. add. vin. auster. ℥j. sp. vin. ℥vj. m. pro fotu. Si pus laudabile obtineatur, nimirum album, æquale, leve, minime foetidum, &c. res in vado est; sin vero pus non fuerit secundum votum, cum unguentis admisci debet præcipit. rub. Vviseman.

Art. 1359. Sclopetorum vulnera sunt omnium Periculosa
 pessima ac periculosissima; nam adest semper in-
 signis contusio, & partium dilaceratio; tardius
 ad suppurationem perveniunt. Vix ante tertium
 vel quartum diem.

Art. 1360. Ad curam quod attinet, omni ex- Curatio
 tranco ex vulnere prius exempto, loco digestivi
 communis, optime applicatur *balsamum Parai*,
 singulariter commendatum ad curam vulnerum
 sclopetis inflictorum; descriptio hæc est a *Sen-*
nerto & Barbette, ℥. *Ol. lilior. alb. vel viola-*
rum ℥iv. in hoc coq. *catelli* duo nuper nati ad
 ossium usque dissolutionem, postea add. *lumbrico-*
rum terrestrium in vino coct. ℥j. coquantur si-
 mul colaturæ adde *terebinth. vin. ℥iij. sp. vin. ℥iij.*
m. f. linimentum, quod egregie conducit ad se-
 dandum dolorem, & maturanda vulnera sclope-
 torum. Ubi autem suppuratum est vulnus, &
 omne contusum separatum, *mundificativa* sunt
 usurpanda, & vulnus s. a. tractandum est, do-
 nec sponte caro nova succrescat.

Art. 1361. Vulnera capitis superficialia facile
 curantur cum *balsamo peruviano*, vel oleo *hyperici* *Capitis*
ci, imponendo desuper *emplastrum de betonica*; *vulnera.*
 sed præ reliquis omnibus quocunque pro capitis
 vulneribus convenit *emplastrum e gum. elemi*, sive
linimentum Arcæi; vitanda sunt omnia unctuosa;
 convenit etiam *gum. elemi tum terebinth. mistum*
 in cranii vulneribus. De eximiis virtutibus hu-
 jus unguenti audi sis ipsum inventorem. Hujus
 linimenti a nobis inventi ea vis est ut concoquat,
 digerat, mundificet, atque carnem etiam indu-
 cat;

cat ; hujus certissimi in omni periculo faciendo usus nunquam me poenituit : & cui omnes ii quicunque fuerint experti , *balsami nomen* non immerito fecerint.

*Cranium
nuda-
tum.*

Art. 1362. Pericranio læso , ut nudet diu os, vel ut putrefiat , os privatus vasis periostei adeoque & suis , stagnat in his liquor , putrefactus squamam separat , und os flavium , fuscum , nigrum , tandem foliolum deponit . In hoc casu curatio (tuto , prompte , & expedite) fit os leviter *parva terebra* diversis vicinisque locis usque ad medium perforando , unde *exfoliatio* cavetur , periosteum inde renascitur applicando pulmaceola *Spiritu vin. mastichino* imbuta , & cura citissime præstabitur . Ex *Boerhaave* , „ quem chirurgus „ præcipue minus exercitatus in vulneribus capitis & calvaria læsa præ reliquis omnibus quibuscunque diligenter consulat ; & errores in praxi evitabit . In omnibus capitis vulneribus , præcipue gravioribus , ubi cranium denudatum fuerit , danda est opera , inter medicandum , partem vulneratam , quantum poterit , a frigore externo tueri .

*Balsamum Sa-
maritanum.*

Art. 1363. Balsamum Samaritanum in curandis vulneribus valde commendatur a quibusdam , privatim a *M. Le Clerc* , quod conficitur ex *vin. & oleo oliv.* diuturna coctione in balsamum redactis : est etiam aliud magis compositum , quod frequenti usu comprobatum est ; *℞. Vin. Hispan. ol. ros. ana ℥ss. sacchar. cand. mel. violar. ana ℥ij.* coquantur simul lento igne & f. balsamum , *Belloste* .

*Inflam-
matio
vulne-
rum.*

Art. 1364. Inflammationem vulnerum præ reliquis sistit *aqua calcis* , vel per se , vel cum *camphora* , aut *sacchar. Saturni* sociat .

Synovia

Art. 1365. Synovia est fluxus aquæ albicantis ex articulis vulneratis , estque periculosum symptoma , & subinde partium atrophiam relinquit , ut com-
Curatio . pescatur , inspergatur pulvis astringens ; quidam
chi-

chirurgus recepit *usneam cran. human. & laccam pictorum ana.* Alias singulare experimentum est *stercus porcinum* cum sanguine vulneris invicem mistum, ac coctum, & ita vulnere applicatum instar cataplasmatidis. *Ettmuller.*

U L C E R A.

Ettmulleri sententia.

Art. 1366. Ulcus est solutio continui ab acedine corrodeute cum partium quarundam ablatione; corrodens hoc in ulceribus est acce acidum, alimentum parti proprium in excrementum acce, five in saniem immutans; ulcus autem est vel simplex vel complicatum, sinuosum, fistulosum, cariosum, &c. Ulcera antiqua maciem, febres lentas, aliaque mala æque excitant, ac ulcera pulmonum.

Ulcus quid.

Art. 1367. Ulcera diuturniora sine internorum usu rarissime curantur; interna autem debent esse *acidum absorbentia & destruentia*, & *sudorifera*, præcipue decocta *lignorum*, *antimonialia*, *viperina*, & *volatilia*; inter purgantia optimum est *extractum hellebor. nigr. cum mercurio dulci*; sed omnibus præferenda sunt *vomitiva*, sæpius repetita, ad facilem ulcerum curationem reddendam: His etenim & hujusmodi internis omnino neglectis, frustra frequentissime chirurgicum imploratur auxilium. In ulceribus pertinacissimis, & alias incurabilibus ipsa *salivatio mercurialis* in auxilium vocanda est. Antiqua ulcera interdum claudi non possunt, nisi in loco opposito fiat *foriculus*. Quoad remedia externa, in genere sunt *digestiva*, *mundificantia*, *sarcotica*, & *epulotica*, quæ pro varietate conditionis ulceris curandi a prudenti chirurgo usurpanda sunt. Sequens est *digestivum* probatissimum, ℞. *Terebinth. venet. ℥j. vitel. ovi unius, mel. ros. ℥vj. ol. hyperic. ℥j.* fiat unguentum; interdum addantur *gum. elemi*, un-

Curatio.

Digestiva.

*Mundifican-
tia.*

guentum basilic. thus, mastiche, farina hordei, &c.
Mundificanria a chirurgis usurpata quamplurima
sunt, insigniora tamen, quæ sequuntur; *radix apii,*
aristolochia utriusque, fol. nicotianæ, flor. hyperi-
ci, album gracum, camphora, balsamum peruvian.
myrrhā, aloe, euphorbium, ex sulphure præpara-
ta, saturnina, as vitide, arsenicum, aqua calcis
vivæ, mercurius dulcis, mercurius præcipitatus,
balsamum sulphuris, oleum & unguentum nicotia-
næ, unguentum ægyptiacum, apostolorum, ,, item
,, oleum camphoræ, viz. camphorā in dupla quan-
,, titate spiritus nitri solutā, &c. ,, Sarcotica &
Epulotica gradualiter tantum differunt; sequens
valde proficuum perhibetur, ℞. Unguent. diapom-
phol. rutianā p. j. diasulph. Rulandi p. ij. ol. nico-
tian. parum M. ,, Vix datur præstantius quam em-
,, plastrum de lapide calaminari D. Turner.

*Sarcotica
& Epulo-
tica.*

Art. 1368. In ulceribus vetustis emplastrum se-
quens est egregium, ℞. Calcis vivæ bis vel ter
lot. & parum exsiccāt. q. v. ol. lini q. s. misce, &
cum bolo armen. vel bol. rub. tingatur ad carneum
quasi colorem.

Callus.

Art. 1369. In ulcere diuturniore aut male tra-
ctato aliquando supervenit callus, qui nunc citi-
git simpliciter ambitum seu orificium ulceris ip-
sus, nunc vero totum sinum ulceratum incru-
stat, & occupat, & talia ulcera sinuosa cum cal-
lo interno vocantur Fistula, quæ difficiles sunt
curatu propter callum, qui nisi auferatur, sunt
incurabiles. Amplificandus est sinus cum rad.
gentian. & absumendus est callus cum pulv. alum.
ust. mercurio præcipit. succ. nicotian. &c. Aliquan-
do necesse est, ut tota fistula cultro incidatur, &
aperiatur, & deinde callus absumendus cultro vel
antedictis remediis.

Fistula.

Caries.

Art. 1370. Caries ossis frequenter accidit in ul-
ceribus inveteratis, quæ est corrosio ipsius ossis,
& quasi ejusdem ulcus; si os denudatum fuerit,
primo oleosum quodammodo & pingue apparet,
hinc

hinc successive flavescit, deinde nigrescit, & postea foraminulatum redditur, & quasi teredinibus perforatum; si absconditum fuerit os, specillo expiscanda est caries; tunc enim os in fundo non glabrum sed inæquale, & scabrosum percipitur, quin & quæ affluunt ex ulcere sordes & excrementa pingua oleosa & acria majorique copia, & ulcera nequeunt ad cicatricem perducī. Labia ulceris sunt dilatanda, remedia unctuosā vitanda; pulvis *euphorbii* est expertissimum remedium, huic proximum est *radix irid. florent. mercurius dulcis* valde commendatur, ut & *oleum garyophyllorum* ad exfoliationem promovendam. „ *Oleum*
 „ *camphoræ*, viz. *camphora* in dupla quantitate *spiritus nitri soluta* a quibusdam prædicatur. *Hist. de l' Acad. Vol. IX. p. 74.* Si hæc & similia succellu careant, denudandum est os, & abradendum; & si corruptio sit profundior, terebrum, vel quod potius est, *cauterium actuale* adhibendum est: nam ultra omnia ferri igniti tactus ossis humiditatem exsiccat, idemque ad promptam desquamationem disponit.

Curatio.

Vissemani sententia.

Art. 1371. In ulceribus simplicibus tractandis non raro mihi fuit usitatum ulcus digerere, detergere, & incarnare cum *unguento basilic. & mercurio præcipit.* in proportionē majori vel minori pro re nata invicem commistis, & postea ulcus *cicatrizantibus* claudere: Sed rarissime inveniuntur ulcera simplicia; complicantur enim ut plurimum variis accidentibus, uti intemperie, dolore, fluxione, &c.

Ulceræ
simplicia.

Art. 1372. „ Ulceribus quandoque accidit *intemperies* curationem tantopere impediens ut *ries*.
 „ hanc expectare non detur, nisi illa prius corrigatur; hæc autem est quadruplex. In intemperie calida pus acre est, labra ulceris rubra,

Calida.

„ & adest insignis dolor. „ Usurpanda sunt *refrigerantia*, moderate *astringentia*, & *repellentia*; talia sunt *fotus astringentes*, *unguentum album camphoratum*, *refrigerans Galeni*, *populn.* & *similia*.

Frigida. Art. 1373. In intemperie *frigida*, „ labia ulceris „ mollia sunt, albicantia, & ubi res male succedit, livida evadunt. „ Conveniunt *fotus discutientes* & *attenuantes* quemadmodum in tumoribus *œdematosis*, & unguenta ac emplastra debent esse *exsiccantia* & *detergentia* quæ satis nota sunt.

Humida. Art. 1374. In intemperie *humida*, „ caro mollis est & flaccida, sæpe supercrescens, humorum fluxus copiosus; „ hic indicantur *exsiccantia* & *astringentia*, qualia sunt *unguentum diapompholyg. tutia*, *e calce lota*, *nutritum*, *desiccativum rubrum*, &c.

Sicca. Art. 1375. „ Ulceræ cum intemperie *sicca* conjuncta, ubi pus paucum aut fere nullum, difficulter sanantur. „ Topica debent esse *humectantia*, *fotus ex emollientibus*, unguenta & emplastra & *digestiva* conveniunt; *unguentum basilic.* & *mercur. præcipit.* apprime conferunt. In his omnibus hætenus memoratis remedia interna non sunt negligenda.

Ulceræ cum dolore. Art. 1376. In ulceribus cum ingenti dolore vix ferendo, præmissis rite internis, quæ indicantur, attendendum est ad conditionem ipsius ulceris, ut deprehendatur vera doloris causa; inspicendum est, an humor sit crassus, qui *sordes* vocatur, vel tenuis & *ischorosus*, qui *sanies* appellatur; uterque peculiariter *detergentibus* corrigendus est, his rite peractis manente adhuc dolore ad *lenientia* & *anodyna* confugiendum est; cataplasmata ex *mucilag. sem. psyllii*, *cydoniorum*, *farbord. croc. vitel. ovi*, &c. *unguentum populn. refrigerans Galeni*, &c. refrigerant & dolorem leniunt; sed pro varietate causarum varia exurgit indicatio.

Art.

Art. 1377. In ulceribus frequenter caro spon- *Fungus*
 giosa sive fungosa succrescere solet; a nimio hu-
 morum affluxu ortum ducens, vel a chirurgi im-
 peritia; supprimenda est medicamentis *exsiccantibus*;
 imo *catharticis & causticis* absumenda est;
 mitiora sunt *lapis tutia, alumen ustum, mercurius*
precipit. fortiora *vitriolum romanum, aq. lapidis*
medicamentos. aq. viridis Fallopii, &c., De reli-
 quibus ulcerum affectionibus & accidentibus con-
 sulatur author, qui candide & modeste scripsit.

Bellostii sententia.

Art. 1378. Coronidis loco subnectere haud pi- *Euporist.*
 gebit, & experimentum illud *M. Belloste* propter
 singularem illius virtutem in ulceribus curandis;
 quod quidem *euporiston* nihil aliud est quam deco-
 ctum foliorum juglandis in aqua cum paucis saccha-
 ro; modus utendi est linteolum imbuendo, & ul-
 ceri imponendo, & non sæpius quam secundo vel
 tertio quoque die eandem applicationem reno-
 vando, donec ulcus sanatur. Hoc medicamentum
 utcumque simplex & vulgare videatur, suppurat,
 detergit, incarnat, putredini resistit, &c. cer-
 tius & scilicetius quam aliud quodcunque remedium
 hactenus notum, inquit author, qui multo co-
 piosior est in illius laudibus. p. 260.

Vvisemani sententia.

Art. 1379. Ad ulcera pertinet *Fistula in Ano*, *Fistula in Ano.*
 quæ est ulcus sinuosum a phymate vel hemorrhoi-
 dibus internis ut plurimum ortum ducens. *Fistu-*
læ quæ a phymate oriuntur, sunt pejores, dolen- *A phy-*
mate.
 tes admodum & curatu difficiliores, utpote in
 musculorum interstitiis profunde penetrantes, &
 cuniculos agentes, & quanto sinus ab ano sunt
 remotiores, tanto deteriores, quoniam apertio-
 nem per incisionem non admittunt. Sic arbi-

„ tratus est *author noster*; quoniam in isto rerum
 „ statu necesse est, ut musculus ani sphincter di-
 „ scindatur: Sed D. Berbeck Chirurgus Eboracen-
 „ sis, vir probus, & hac operatione speciatim ce-
 „ leberrimus, asseruit se sphincterem ani frequen-
 „ ter penitus divisisse, & etiam si ægri durante
 „ vulneris curatione fæces continere nequeant,
 „ post consolidationem facultatem sphincteris re-
 „ centricam redintegratam fuisse. *Vid. Cheselden*
 „ *Anat. p. 63.*

*Ab hæ-
 morrhoi-
 dibus.*

Art. 1380. Fistulæ ab hæmorrhoidibus internis
 originem trahentes inter tunicas intestini recti
 sensim generantur, & perforationem exiguam ha-
 bent juxta ani ambitum, unde saniem tenuem
 sive ichorem sine dolore emittunt; progressu ve-
 ro temporis superveniunt pruritus & excoriatio-
 nes; orificia tandem callosa evadunt, & quan-
 doque ad tempus clauduntur, & deinde certis in-
 intervallis denuo erumpunt.

Sennerti sententia.

*Fistula
 non teme-
 re curan-
 da.*

Art. 1381. Fistulæ, si copioso fluxu, aut foeto-
 re, aut alio modo, nihil incommodi afferant,
 sed potius natura superfluos humores e corpori-
 bus *cacochymicis* & *cachecticis* cum ægri commo-
 do per eas evacuet, curari non debent, sed ser-
 vari. Fistulæ vero simplices & recentes sine pe-
 riculo curari possunt.

*Incisio per
 filum.*

Art. 1382. Incisionem quod attinet, si ea sine
 periculo, ne scilicet musculus ani lædatur, & fæ-
 ces præter voluntatem egrediantur, tentari pos-
 sit, fit vel *filo seu laqueatione*, ut appellant, vel
ferro. *Filo* ita fit: Sumatur filum ex serico, vel
 seta equina, aut aliud, quod non facile putrescat,
 id immittendum in extremitatem specilli stannei
 vel plumbei, instar acus perforati, & in fistulam
 intrudendum, digitoque, oleo rosaceo inuncto,
 in rectum intestinum immisso, filum apprehen-
 den.

CAP. XIII. *Gangræna & Sphacelus.* 471

dendum, specillum extrahendum, & duæ extremitates ejus connectendæ, & quotidie vel a chirurgo, vel ab ipso ægro arctius constringendæ, donec tota fistula incisa sit; hinc callus absumendus, & ulcus curandum.

Art. 1383. Ferro *incisio* celerius hoc modo fit; ^{*Incisio cum in.*} in fistulam specillum plumbeum immittendum, ^{*strumento*} usque dum in intestinum rectum penetret, & hinc ^{*ferreo.*} instrumento falcato digito in anum immisso secundum styli plumbei ductum fistula incidenda, cavendo tamen, ne hæmorrhoides lædantur, & hæmorrhagia excitetur. Incisione peracta, penicillum albumine ovi & pulveribus astringentibus illitum immittere decet; die sequente Hippocrates *eris flore usto* conspergit, & frustulum spongiæ melle illitum intrudit, ut fistula aperta serveretur, idque diebus septem continuat, donec callus absumatur; interim spongia vino austero madida imponenda, ut humores reprimantur. De Callo absumendo alibi dictum est. (1369.)

GANGRÆNA & SPHACELUS.

Etmulleri sententia.

Art. 1384. Gangræna significat incipientem partem mortificationem, cum dolore tamen & aliqua- ^{*Gangræna & Sphacelus quid.*} li ardore conjuncta est. Sphacelus vero seu necrosis e contra est perfecta mortificatio, in qua omnimoda vitalitatis est carentia; differunt ergo saltem gradualiter gangræna & imminens sphacelus.

Art. 1385. Interdum supervenire solet fracturis, ^{*Causa.*} vulneribus male tractatis, ulceribus cacoeth. & tumoribus, imprimis sanguineis; aliquando autem a causis internis oritur. In partibus gangrænosus color mutatur in pallidum, obscurum, sublivescentem, aut cæruleum, & tandem in nigricantem: caro autem tensa mox evadit flaccida & mollis, & sphacelo facto, cutis sponte a partibus ^{*Diagnos.*}

472 *Gangræna & Sphacelus. ICAP. XIII.*
separatur, & aqua quædam decolor pravi odoris
effluere solet, & pars affecta halitum cadavero-
sum spirare.

Prognosis. Art. 1386. Certissimum est gangrænam a cau-
sa interna lethalem esse: Auferatur enim licet
membrum, iterum regerminabit malum, & ne-
cessario mortem post se trahet.

Curatio. Art. 1387. Ad gangrænam sistendam interna om-
nia sunt sudorifera & alexipharmaca; externe au-
tem decoctum calcis vivæ est mirabile, vel soli-
tarium, vel efficacius, si in eodem incoquatur
sulphur, & dissolvatur mercurius dulcis, addito
spiritu vini (camphorato.) In graviore gangræna,
præmissa profunda scarificatione, conducit finus
equinus, in vino aut urina coctus, fuit experi-
mentum & secretum Sylvii & Barbetti, (& me-
lius esset si adjiciatur spiritus sal. armoniac.) In
usum quoque venire solet unguentum ægyptiacum
calide usurpatum, facta prius, ut artis est, sca-
rificatione, &c., Chirurgis nostratibus solemne est
,, locis scarificatis oleum terebinth. calidum cum
,, triente tincturæ myrrhæ & aloe adhibere, &
,, emplastrum e theriaca Londinensi calefactum su-
,, perimponere.

Boerhaavii sententia.

*Signa
gangre-
na.*

Art. 1388. Signa Gangrænæ sunt phænomena
inflammationis subito ablata sine correctione cau-
sæ, sensus hebes, color pallidior, cinereus, fuf-
cus, lividus, &c. mollities, flacciditas, ad tactus
vestigia non resurgens, pustulæ ichore lymphati-
co subflavo vel rubello plenæ in loco inflamma-
to; ubi a frigore, pruritus & punctura ingens,
una cum rubore intenso, quem brevi nigredo
mortifera sequitur.

*Perfecta
necrosis.*

Art. 1389. In perfecta necrosi sensus motusque
integre tolluntur (gravitas aliqualis quodammo-
do in parte sentitur;) color est lividus, fuscus,
niger;

niger; caro est flaccida, & frigida; adest foetor cadaverosus, corruptio mortifera profunda, omnia vicina depallescens in ossa usque. Gangrænæ illico succurrendum; sphacelus illico extirpandus. In senio fere semper a quacunque causa lethalis est, ita in hydropicis, phthisicis, & scorbuticis.

Art. 1390. Ut suppuratio acceleretur, conducit *scarificatio* putrefacti usque ad vivorum initia; sic enim suffocatione nimia imminuta, loco serpentis gangrænæ fit abscessus, quo cutis & adeps gangrænosa plerumque a subjectis adhuc vivis separantur. Incisa pars *calidis liquoribus*, corruptioni resistentibus, & *duritiem escharæ emollientibus* fovenda; toti parti affectæ assiduo applicanda *cataplasmata calida*, & cum calore continuo sustentato agentia; huc etiam plurimum facit rarior partis detectio, quam vulgo fieri solet. Si ab *gelu* gangræna fiat, pars *nive imposita* vel impositis linteis *aqua gelida* humectatis operienda erit, donec spiculis frigoris in nivem vel aquam receptis, iterum solvi incipiat, redeunte vita: aliter caloris applicatu pars putrescit, actis nec eductis spiculis; eo autem peracto *calidis* refocillandus *cardiacis*, & in *sudorem usque* calefaciendus æger est. De *amputatione* videatur locus N. 469. & consulantur reliqui scriptores chirurgici.

Curatio :

A gelu gangrænæ

Bellostii sententia.

Art. 1391. Bellostius sequens unicum remedium instar omnium ad gangrænâ & sphacelum venditat, *℞. Spirit. nitr. vel aq. fort. p. ij. argenti viv. p. j.* fiat solutio; in hoc liquore madefiant lintea, & parti gangrænosæ circumvolvuntur, & prompte separabitur mortuum a sano, neque opus est, inquit author, ut aliud quodcunque medicamentum ad gangrænâ sistendam excogitemus; non enim reperitur aliud, quod tam cito, & tam certo, pensum absolvat.

Remedium singulare.

C A P. XIV.

Sive Fasciculus Morborum decimus quartus.

C H L O R O S I S.

Ettmulleri sententia.

Chlorosis quid. *Art. 1392.* **C**hlorosis sive febris alba virginum, longe distat a *cachexia muliebri*, hæc enim antecedit aut insequitur mensium suppressionem; chlorosis vero est affectus proprius virginibus & viduis, saltem extra consortium virorum viventibus, aut quibus mariti non satisfaciunt. Hoc morbo affectæ pallent, habentque sub oculis coronam subcæruleam vel subrubescentem, tristes sunt, & adest sæpius febricula lenta, & quasi erratica, pulsus inæqualis & varius, vomitus etiam interdum infestat, ac præcordiorum anxietas, &c. Mensium suppressio est fere tantum effectus hujus morbi. Tales volunt (inquit *Lindanus*) cohabitare viro.

Riverii sententia.

Morbi descriptio. *Art. 1393.* Pallent ægotæ, & adest gravitas corporis, segnities, intumescencia faciei & palpebrarum, palpitatio cordis, difficultas spirandi, somnolentia, rerum absurdarum appetentia &c.

Curatio. *Art. 1394.* Præmissis universalibus *chalybeatis* & *amaris* restituendæ sunt; & in frigidioribus decoctum *ligni guaiaci* multum juvat.

MEN-

M E N S T R U A T I O.

Art. 1395. „ Mulierum profluvii menstrui ra- Men-
„ tiones expedire & theoriam exponere admodum struatio.
„ difficile & longum esset, & professæ nostræ
„ brevitati minus congruum; ideoque paucissimis
„ solummodo attingam. Menstrua, perinde, ut
„ de cæteris quibuscunque humoribus notum est,
„ (quantumcunque a medico quodam magni no-
„ minis nuper defuncto dissentire videar) e solis
„ excretoriis ductibus glandularum uterinarum,
„ ibidem locatarum, & isti muneri inservientium
„ prodire sine difficultate asserere audeo: quod sa-
„ tis manifestum est ex ipsa partium anatomia,
„ ex chylo scilicet supervacaneo in humorem i-
„ stiusmodi viscidum cocto, & in orbe sanguinis
„ paulatim accumulato. Insignis est menstruorum
„ præ eo sanguinis lentor ac visciditas; ingratum
„ quoque ac inusitatum odorem in plerisque spi-
„ rant, non qualem sanguis e venis missus, aut
„ ex hæmorrhagiis effluens. Rubent quidem men-
„ strua, quod & serum & sanguinis integri glo-
„ buli rubri una cum isto humore transmittun-
„ tur, ob ampliatas præter modum in istis ducti-
„ bus commissuras, unde materia excreta est com-
„ positum quiddam ex sanguine & prædicto hu-
„ more glutinoso, crasso, & viscido. Quanti-
„ tas singulis vicibus ordinario excreta, in statu
„ sano & naturali, fit ab unciiis quinque vel sex
„ ad octo vel decem ad summum, non a viginti
„ ad triginta, secundum laudatum authorem.
„ Fœtus in utero chylo materno, in gremio san-
„ guinis circulante, per vasa umbilicalia delato
„ omnino nutritur, non sanguine menstruo; si-
„ cut idem loqui amavit. Lac in mammis a chy-
„ lo, eoque non multum mutato, secernitur,
„ non a materia per vias uterinas excerni solita;
„ quemadmodum vir eruditus somniavit, qui
„ tra-

„ tractatum de emmenologia in juventute scri-
 „ ptum.

Ettmulleri sententia.

*Fœminis
 propria.*

Art. 1396. Fluxus menstruus est fœminis pro-
 prius ; („ memorantur tamen *quædam fœminæ*
 „ menstruis prorsus immunes „) nam inter ani-
 malia nullum præter *simium & barbum piscem* si-
 milem pati fluxum dicitur : Nonnulli tamen , li-
 cet pauci , viri singulis mensibus talem fluxum
 per penem patiuntur . „ Hujusce phænomeni præ-
 „ ternaturalis & rarissime accidentis in toto vi-
 „ tæ curriculo duo tantum exempla mihi cogno-
 „ visse obtigit . Viris quoque (*inquit Lister in*
 „ *dissertatione de humoribus*) menstruum chyli
 „ superpondus , æque ac fœminis , accrescit ; sed
 „ in *urinam* convertitur , profluitque mensura-
 „ tim perinde ut virginibus forte ante puberta-
 „ tem , & vetulis rursus a cessatione mensruo-
 „ rum . Hæc opinio in *Aphorif. 65. & 66. Lib.*
 „ *I. Sanctorii* fundatur viz. Corpora quoque vi-
 „ rorum sana & moderatissimo victu utentia sin-
 „ gulis mensibus fiunt solito ponderosiora , unius
 „ scilicet duarumve librarum pondere , & redeunt
 „ ad consuetum pondus circa finem mensis , ad
 „ instar mulierum ; sed facta crisi , per urinam
 „ paulo copiosiore , vel turbidior . Ante di-
 „ clam crisin menstruaalem a somno factam , vel
 „ gravitas capitis , vel corporis lassitudo persen-
 „ titur , & deinde paulo copiosiore urina evacua-
 „ ta omnia sedantur .

*Tempus
 erumpen-
 di, & de-
 sinendi.*

Art. 1397. Fluxus mensium ordinario incipit
 quasi motu naturæ critico ad finem *secundi septe-*
narii , & definit similiter circa finem *septimi se-*
ptenarii ; nonnunquam citius inchoat , & diutius
 fluit . „ Cuidam puellæ *quinto ætatis anno* men-
 „ ses eruperunt . Alias nonnullas novi *octennes* &
 „ *novennes* , quibus earundem fluxus incepit ; sed
 „ in hujusmodi ætate præmatura , utcumque una
 „ vel

„ vel altera vice fluxerunt, vix unquam (quantum
 „ ego observare potui) constanter menstruatim
 „ evacuatae fuerunt. Novi foeminam, adhuc vi-
 „ ventem, nunc *septuagenariam*, si non aliquot
 „ annis seniore, quae ab ineunte pubertate men-
 „ struatim recte purgata fuit, & jam nunc in tam
 „ proventa aetate catameniis colore & consisten-
 „ tia usitatis, periodis solitis, haud destituitur,
 „ cui per totum vitae cursum uno tenore minus
 „ interrupto cum optima valetudine jugiter flu-
 „ xerunt. Haud scio, an universa medicinae hi-
 „ storia par exemplum suppeditet, necne. „ Ex
 „ quo hoc scripsi aliud exemplum inter legendum
 „ mihi occurrit, viz. in *Transact. Philos. N. 337.*

M E N S I U M S U P P R E S S I O.

Etmulleri sententia.

Art. 1398. Quibus menses nunquam fluxerunt, *Mensium suppressio-
nis cura-
tio.*
 & tamen sanæ sunt, medicamentis non sunt ten-
 tandæ; menstruatio enim est opus naturæ. In sup-
 pressionem mensium inter purgantia *colocynthis* (id-
 eoque *pil. ex duobus*) & *helleborus niger* menses
 stimulare & uterum sollicitare solent, præsertim si
mercurius dulcis adjungatur. *Radices angelicæ*,
fol. marrub. alb. &c. in vino infus. cum *aromat.*
quibusdam & *amaris* in frequenti usu sunt. *Sabi-*
num est fortissimum remedium, & ejus oleum est
 potentiæ stupendæ ad menses ciendos & foetum
 pellendum, ut etiam *borax veneta*; *aristolochia*
 est fere specificum.

Art. 1399. Indicationes curativæ sunt quæ se- *Indicatio-
nes cura-
tive.*
 quuntur. 1. Ventriculi chylosis imprimis est recti-
 ficanda. 2. Sanguinis cruditas volatilibus, salinis,
 aromatibus, est corrigenda. 3. Humoribus viscidis
 vasa uterina obstruentium iisdem incidenda.
 4. His peractis, remediis appropriatis fermenta-
 tio menstrua stimulanda est. Menses stimulandi
 sunt statim fluxionis tempore, si cognosci possit,
 si non,

si non, interrogandæ sunt, an non singularem interdum in corpore percipiant sanguinis motionem, & agitationem, & insolitos dolores lumborum, & pulsationes in locis vicinis, aut febriles effervescencias &c. tunc enim temporis propinanda sunt *stimulantia*: Si vero nulla horum adsunt, monent practici, quod convenientissime dentur specifica tempore novilunii & crescente luna. „ Empiricum est (inquit *Forestus*) menses in extenuata provocare niti. „ *Rosmarinus* aliquid singulare habet in morbis mulierum a mensibus obstructis ortis. Urina nigra in mensibus suppressis est bonum signum.

Farrago sententiarum.

*Virtutes
Mercurii
Auri in
hoc & a-
liis mor-
bis do-
mandis.*

Art. 1400. Mercurius (inquit *Pitcairnus*) melius cum vi ejusdem generis & majori, fluxum menstruum provocat quam *mars*. Idem affirmare licet de auro, si atteratur (& atteri potest) in partes adeo parvas, ut earum superficies, habitatione molis tantæ sint, quæ reddant partes illas aquæ levitate pares. Morbi lepra, fluor albus, lues venerea, scorbutus, &c. auro quam mercurio tutius atque citius sanabuntur.

*Radix
hellebori
nigri.*

Art. 1401. „ Radix hellebori nigri veteribus in
„ frequenti usu *humoribus attenuandis, & priva-*
„ *tim mensibus movendis* nuperis annis moderna
„ praxi redintegratur, & non infimum locum in-
„ ter *emmenagoga* obtinet, præcipue, ubi ob ca-
„ lorem hæcticum *chalybeata* porrigere nefas es-
„ set. In mensium suppressionibus quandoque et-
„ iam locum habent externa remedia, qualia sunt
„ *suffitus, balnea, fomenta* &c. pro certo his plu-

*Medica-
menta a-
lia.*

„ rimum usus est *Hippocrates*. „ Præter dicta *em-*
„ *menagoga cantharides cum camphora* (dos. ana a
gr. ij. ad vj.) menses movent; *martiata omnia,*
„ *ens veneris, extractum ecphracticum, tinctura*
„ *martis, enema hystericum, enema terebinthinatum,*
„ *ele-*

CAP. XIV. *Mensium Difficultas.* 479
electuarium martis, infusum chalybeatum amarum,
mistura ecphrastica, vinum chalybeatum, &c.

MENSIVM D I F F I C U L T A S.

Ettmulleri sententia.

Art. 1402. In quibusdam mulieribus præcipue *Mensium difficultas*
sedentariis (& quæ nunquam pepererunt) menses
cum vehementi dolore & perturbatione fluunt;
dolores patiuntur tanquam colici, & parturien-
tium similes, aut hysterico affectu laborantium,
&c. & si non mature succurratur, metus est ne
omnino supprimantur menses.

Art. 1403. Si medicus in ipso paroxysmo & *Curatio:*
præsentis dolorifica excretionem consulatur, præ-
scribere debet *carminativa & stomachica*. Ex-
tra paroxysmum eadem exhibenda sunt ac in ca-
tameniorum suppressione; in paroxysmo conve-
niunt *clysteres carminantes & terebinth.* qui diffi-
ciles menses facilius promovent; laudatur *sperma*
reti. Si dolores sint maxime atroces & sympto-
mata gravissima, *laudanum* propinari debet, sed
non sine *menses moventibus consociatis*. Pro usu
externo fofus sequens, ℞. Fol. laur. artemis. ana
Mij. puleg. Mj. Flor. cham. sambuc. ana p. j. rad.
angel. levist. ana ℥ij. bact. laur. ℥j. junip. ℥ss. con-
cil. & contus. coq. in q. s. vin. Hispan. vase
clauso.

Art. 1404. Cum menses per loca aliena effluant *Menses*
(per oculos, aures, nares, gingivas, vias salivæ, *per loca*
œsophagum, alvum, vesicam, mammas, cutim, *aliena e-*
vulnera, ulcera, &c.) *saphæna* secari debet, aut *gredientes*
cucurbitula inguinibus, femoribus internis vel su-
ris applicari.

Halmitoni sententia.

Art. 1405. Fœminæ nonnullæ sub tempus cata- *Remediū*
meniorum corripuntur doloribus ita acerbis, ut *ad dolores*
illo. *catame-*
niorum.

illorum, qui parturientes excruciant, pæne sint æmuli: ad quos leniendos nihil unquam novi præstantius, quam *oleum amygdalarum dulcium* vel *lini* recenter expressum ad ℥ss. vel ℥vj. vel per se vel cum *syr. violar.* sing. noct. per menses aliquot, (hoc remedium expertus laudo, sed in majori quantitate exhiberi debet.)

MENSIUM FLUXUS NIMIUS.

Ettmulleri sententia.

*Fluxus
mensium
nimius.*

Art. 1406. In omnibus nimio mensium fluxu laborantibus ventriculi robur enervatum est, & ut plurimum adest dolor in dorso, & circa lumbos; foeminæ sunt scorbuticæ, tactu molles, & habitu quasi aquoso præditæ. In mulieribus senescentibus nimia menstruatio plerumque incurabilis est.

Cyratio.

Art. 1407. In curatione fluxus non est subito nimis sistendus, ne graviora mala inducantur. *Rhabarbarum* præ reliquis purgativis laudatur, quoniam pollet vi astringente; *venæsectio* culpatur, fluxum enim vehementiorem reddit. „ Quotidiana tamen experientia docemur *venæsectionem* *Revulsionis* gratia celebratam plurimum prodesse; secunda est vena in Brachio, & sanguis partitis vicibus mittendus *digito per vices foramini imposito*: ita enim multas vidimus, quæ detracto sanguine multo convaluerunt, cum nullis aliis remediis possit reprimi fluxus. Conveniunt opiata speciatim *semen hyoscyami* (unde valet *electuarium Boyleanum*); item *succus plantaginis*, *urticæ*, *menthæ*, *decoctum cort. granatorum visc. quercin. tinctura* & *syr. e coral. saccharum saturni*, &c. cum fructu usurpantur. Ex marte preparata, licet menses stimulant, tamen fluxum nimium constringunt; chalybeata enim proprie sunt astringentia. „ *Mercurius* & *Mars* „ (inquit *Pitcairnius*) fluxum nimium ventris & „ men-

„ menstruum immodicum tollunt, æqualiter tol-
 „ lendo impedimenta aliarum secretionum, & sic
 „ eas augendo, cum per circularem motum ad
 „ omne corpus æqualiter ferantur. „ Sicut alias
 hæmorrhagias, ita in specie uterinas sistunt *ster-*
cora animalium, imprimis *caninum*, *asininum*, &
suillum (hoc ultimo utuntur rustici in mictu san-
 guinea jumentorum.) Pulvis sequens vel huic simi-
 lis in frequenti usu est cum vino rubro, ℞. Co-
 ral. rub. præp. lapid. hæmatit. bol. armen. ana ℥j.
 borac. calcinat. alum. crud. ana ℥ss. laudan. opiat.
 gr. iv. f. pulv. pro chart. vj. sumatur una bis in die.
 Spongia cum vino rubro & aceto imprægnata vul-
 væ applicari potest, vel sperma ipsum ranarum
 cum pauco aceto & alumine linteis multiplicatis
 eodem loco usurpatum a quibusdam laudatur. Si
 mulier sit *bibacula* omnia erunt frustra. „ Malum
 „ hoc frequenter diuturnum est (inquit *Vvaldsch-*
 „ *midius*) & viam sternit ad hydropem vel atro-
 „ phiam; & quæ semel morbo hoc graviter la-
 „ borarunt, plerumque manent *valetudinariæ*.
 „ Conveniunt *blandiora evacuantia* non fortiora;
 „ *sudorifera* sunt proficua, privatim rob. *sambu-*
 „ *ci*, *juniperi*, &c. *Viscus quercinus* est expertum
 „ remedium *Paracelsi* ad nimium catameniorum
 „ fluxum.

Hamiltoni sententia.

Art. 1408. In nimio mensium profluvio eminet *Remediũ*
 apozema sequens, ℞. Cort. aurant. N. vij. coq. *singulare.*
 in aq. font. ℥iij. ad ℥ij. colatura edulcetur cum
 sacchar. alb. dosis sit coch. x. ter quaterve in die.
 Hoc medicamentum magno cum successu præscri-
 psi, præcipue si nulla pars placentiæ post partum
 vel abortum remanet. (*expertus laudo*) In nimio
 etiam mensium fluxu pil. cathartic. cum opio exhi-
 bere soleo, unde fluxus mensstruus & ventriculi
 morbi diminuti sunt. p. 41.

*Alia re-
media.*

Art. 1409. „ *Usnea cranii humani* ad fluxum si-
stendum a quibusdam multum laudatur; sed præ
„ omnibus quotcunque mistura acida (16. 191.)
„ cum vino Florentino copiose sumpta utramque
„ adimplet paginam, ut frequentissime expertus
„ sum. Sunt & alia quamplurima remedia, quæ
„ sunt usus eximii in hoc affectu, uti, *haustus ja-*
„ *ponicus*, *pulvis hæmoptoicus*, *tinctura rosarum*,
„ *fotus ad hæmorrhoidum fluxum immodicum*, &c.

FLUOR ALBUS.

Sydenhami sententia.

*Fluoris
albi de-
scriptio.*

Art. 1410. Quod effluit modo album, modo
pallidum, modo flavum, viride, aut subnigrum,
modo acre & erodens, tetrum quandoque & gra-
veolens; decoloratur facies, dolet spina dorsi,
prostrernitur appetentia, oculi pedesque intumes-
cunt. „ Animi mœror gravis & diu protractus
„ fluorem album frequenter producit teste *Sylvio*
„ *Delebee.* „

*Methodus
medendi.*

Art. 1411. Ut cura recte incipiatur, instituen-
da est *venæ-sectio*, & postea *catharsis* ad tres vi-
ces; & deinde curativæ indicationes ad sanguinem
invigorandum corroborandumque omnino dirigen-
dæ sunt; itaque agra aggrediatur usum sequen-
tium remediorum; ℞. *Theriac. androm.* ℥ss. *con-*
serv. flaved. aurant. ℥j. *diascord.* ℥ss. *zinzib. con-*
dit. nuc. moschat. condit. ana ℥iij. *pulv. e chel.*
cancr. comp. ℥ss. *cort. exter. granat. rad. angelic.*
hispan. coral. rub. præp. trochis. de ter. lemn. ana
℥j. bol. armen. ℥ij. *gum. arab.* ℥ss. cum q. s. *syr. e*
ros. sicc. f. elect. de quo sumat ad magnitudinem
nuc. mosch. major. ter in die hor. medicis per
ensem integrum, superbibatque infus. sequent.
coch. vi. ℞. *Rad. enul. campan. imperator. ange-*
lic. calam. arom. ana ℥ss. *sol. ablynth. roman. mar-*
rhub. alb. centaur. min. calaminth. vulg. salv. sicc.
ana Mj. *bacc. junip.* ℥j. incidantur minutatim, &
in-

infund. frigide in vin. canarin. ℥iv. coletur usus tempore. Vescatur *cibis eupeptis*, & abstineat ab usu *olerum & fructuum qualiumcunque*, & singulis partibus bibat *vinum Hispanicum*. Eadem fere methodo, atque iisdem remediis *diabetes* sanatur, omissis solummodo *venæ-sectione & catharsi*.

Fulleri sententia.

Art. 1412. Fluorem album ab ulcere uteri & gonorrhœa scite distinguere operæ pretium est. Differen-
tia.
In *fluore albo* dantur plerumque lassitudo spontanea & lumbago gravativa. Humor effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serosus plus minus pituitosus, & mucosus, in mali initio inodorus & mitis; pedetentim vero acrescit, & excoriat. In *ulcere* dolor sentitur, & mordicatio in utero, vel ejus cervice, idque a principio, materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta, alba, levis, æquabilis, & sæpe foetida. In gonorrhœa acerrimus torquet urinæ ardor, & stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur. Colluvies defluens est plerumque parcior, quam in fluore albo, crassior tamen, multo alba primum, postea flava, virescens, acris, exedens, sed raro foetida. Pudendum mucosa quadam materia conspurcatur; Gonorrhœa (quod habet Charleton de Catameniiis, p. 151.) certo potest ab uterino fluore internosci, quod prorumpentibus catameniiis, non desinat; sed cum his, & mox ab iis sanatis persistat: *uterinus* vero fluor cesset in mensium eruptione & aliquanto post tempore.

*Ab ulcere
uteri.*

*A Gonorr-
rhœa.*

Ettmulleri sententia.

Art. 1413. Fluor albus in initio plerumque est mitis, progressu vero temporis est acris ac mordax, & a colore albo flavescit, vel viride scit, & graveolet; omnibus ætatibus contingit, Qualis
est morbus
& quibus
contingit.

puellis trium vel septem annorum natis, vetulis, &c. menstruatibus & non menstruatibus, ante & post mensium periodum, gravidis etiam; typum aut periodum certam nullam observat, sed nunc copiosius nunc parcius fluit, nunc menses comitatur, nunc iisdem cessantibus aliquamdiu perstat; circa menstruationis tempus tamen uberius ante & post scaturit. Nihil aliud est procul dubio quam gonorrhœa muliebris, virili non virulentæ analoga ex glandulis prostratis effluens (de sede & ætiologia hujus morbi optime differit Author noster.) Quod in naribus coryza, in oculis nimia lacrymatio, in faucibus tussis & screatus, talis est fluor hicce in foeminis.

Curatio.

Art. 1414. In curando hoc affectu exhibendum est vomitorium imprimis, & postea stomachica sunt propinanda, & cruditas cachectica corrigenda per chalybeata & volatilia, & postremo specificis morbus est profligandus; purgantia parcius administranda nisi rhabarbarum & mercurius dulcis; sudorifera & diuretica præcipue in scorbuticis sunt proficua, maxime decoctum e lignis & terebinth. Decoctum e roremarino diutius continuatum hunc morbum sanat; decoctum nucis pineæ cum ligno visci quercini sæpius haustum, item lamii flore albo pæne specifica audiunt; ut & osteocola, (camphora teste Greenfield). „ Electuarium ex visco „ arboreo (parum enim discriminis est in qualem- „ canque arborem crescat) cum q. s. albumine ovi „ & tantil. Syr. de Alth. larga dosi exhibitum diu- „ que continuatum ex multiplici experientia fluo- „ rem album certo certius sanare compertum ha- „ beo. Vires mucilaginis baccarum nondum ex- „ pertus sum.

Farrago sententiarum.

*Differen-
tia inter
fluorem*

Art. 1415. Differentia inter fluorem muliebrem Gallicum & non Gallicum (inquit Pitcairnius in MSS.)

MSS.) est quod in Gallico humor sit tenuis & serosus plane; in fluore albo & non Gallico viscidus.

Art. 1416. Fluor albus etiam si non sit virulentus (secus ac in viris) tolli non potest nisi remediis lvi venereæ propriis. De curanda gonorrhœa vide (980.) ex MSS. Pitcairni.

Art. 1417. Remedia quoque sequentia quandoque in usu sunt; electuarium de colophonia, elect. styptic. emulsio styptic. haustus contra fluorem, haust. japon. haust. saturn. pil. ad colluviem, pil. saturn.

FUROR UTERINUS.

Sennerti sententia.

Art. 1418. Furor uterinus pertinet ad maniam, & peculiaris ejus species est. Feminae in insania illa venerem potissimum appetunt, vel ea non satiari possunt. Causa est semen nimis copiosum & præfervidum.

Art. 1419. Hic insanus amor curatur, si nimius seminis proventus prohibeatur, aut legitima venere evacuetur, vel medicamentis absumatur.

CONCEPTUS & GRAVIDITAS.

Sennerti sententia.

Art. 1420. Conceptionis signa præcipua sunt, retentio seminis in utero, suppressio mensium, ciborum fastidium, ventris tumor versus ventriculum acuminatus, motus in utero perceptio, non fluctuantis aquæ, nec flatus vagantis speciem referentis, sed motus lenis, blandus ordinatusque, tandemque mammarum intumescencia papillarumque color in lividum mutatus, & lac in mammis collectum: hæc signa si omnia adfuerint, non amplius femina dubitet se esse gravidam. Urina est mendax. Vide plura sub titulo Mola (1426. 1429.) „ Gravidam mulierem cognosces (inquit Hippocrates de supers.) si ocu-

„ li cavi videantur, & album oculorum nativam
 „ non habeat albedinem, sed lividum sit; necnon
 „ si cibum aversetur, oris ventriculi morfu tor-
 „ queatur, & saliva abundet. Recensita signa
 „ (ut recte *Sponius* in locum) sunt æquivoca,
 „ tam in gravida quam in non gravida reperiri
 „ possunt: ex his itaque solis non licet medico
 „ graviditatem asserere, sed tantum si cum aliis
 „ multis concurrant; cumque intricatissima res
 „ sit graviditatis cognitio, caveat medicus, ne
 „ uno aut altero tantum male frusus signo, teme-
 „ re nimis suam de illa proferat sententiam: de-
 „ bet itaque tota signorum syndrome perpendi.

Etmulleri sententia.

*Alia si-
gna.*

Art. 1421. Nonnullæ mulieres extra gravida-
 tionem libidine pruriunt, sed facta conceptione
 ardor videtur extinctus. Clausura uteri est signum
 conceptionis; exploranda est obstetricis digito.
 Signum conceptionis pathognomonicum non da-
 tur. Cito post conceptionem mulieres frequen-
 ter sentiunt frigus quoddam vel horrorem vel
 horripilationem quandam circa corporis periphe-
 riam, saltem mulieres dicunt se sentire nescio
 quid: hinc succedunt symptomata varia circa sto-
 machum ac digestionem, vomitiones, pica, &c.
 venter sensim attollitur, maxime circa regionem
 umbilicalem & sursum, imprimis circa lineam
 albam prominet, regiones laterales quodammodo
 æquales, & quasi pressæ, quod probe observan-
 dum est.

*Nova be-
ne.*

Art. 1422. „ Fœminæ nonnullæ, paucissimæ
 „ licet, fluxum regularem menstruorum per totum
 „ gravidationis cursum patiuntur, aliis eisque fre-
 „ quentioribus ad quatuor vel quinque primos a
 „ conceptione menses minore licet singulis vicibus
 „ quantitate solent fluere, donec omnino suppri-
 „ mantur. Ordinario, si catameniorum fluxus ul-
 „ tra

„tra quartum mensem diutius protrahatur, fœtus imbecillem ac valetudinarium reddit, si ultra sextum, mulier abortione periclitatur.

Art. 1423. Gravidatio a tumore hydropico ex signis sequentibus discernitur; color faciei vividus, vivacitas & vigor oculorum significant gestationem; in hydrope vero perit oculorum nitore, &c. In gravidis tumor abdominis sursum vergit, estque inæqualis; contra in hydrope. Quo se vertunt hydropicæ, eo labitur aqua; sitis in hydrope est major; sentitur fluctuatio in hydrope; ephelides (1150,) in facie apparentes est signum ingravidationis. Gravidis facies (inquit *Barbette*) aut nativa est, aut valde collapsa; morbidis tumida plerumque & decolor.

Quomodo
distinguitur
ab hydrope.

Art. 1424. „Quoad sterilitatem. Adhuc in tenebris (inquit *Lister*) sunt generatio & utriusque sexus virtutes: uteri, qui sani & secundum naturam se habent, prolis quidem concipiendæ potes sunt; at in quo consistit ista sanitas, quæstio est. Quando mas (inquit *Etmullerus*) emittit genituram (debitæ consistentiæ) largiter; & quando nullum adest vitium conformationis, mas absolvitur, & vitium sterilitatis est in fœmina, quæ mille modis potest impediri.

Sterilitas

M O L A.

Sennerti sententia.

Art. 1425. Mola est massa informis sine ossibus & visceribus ex imperfecta conceptione loco fœtus genita; aliquando una, nunc plures molæ excluduntur; nonnunquam solæ, sine fœtu, nunc ante, nunc cum, nunc post fœtum; nonnunquam pluribus annis in utero gestantur. (Mola nulli fœminæ accidere potest sine viri consuetudine.)

Molæ
quid.

Art. 1426. Mola distinguitur a conceptione vera per motum: motus enim molæ est saltem tre-

Quomodo
distinguitur
a vera
concepta

mulus & palpitans, non vero in omnem situs differentiam, ut in vero foetu accidit; præterea si foemina de latere in latus convertitur, mola in latus, in quod decumbit, instar lapidis volvitur cum insigni ponderis sensu. Quinetiam foetus verus a mola discernitur a figura ventris, qui cum foetu præcipue versus umbilicum attollitur & acuminatur, & versus latera utrinque molliter coarctatur; in mola vero in omnem dimensionem æqualiter intumescit. Mammæ quidem in mola intumescunt, sed lac verum in iis non generatur; sed cruda tantum materia a mensium suppressione. Molæ sunt periculosæ, si solæ sint; pluribus annis utero hærent, quibusdam etiam consenscunt; interdum vero nullum incommodum præter molestiam & pondus afferunt.

*Mola ex-
pulsio.*

Art. 1427. Ad deturbandam molam ex utero, primo conducit *venæsectio*, deinde fortis *purgatio*, eaque repetenda, & ultimo *mensēs moventia* sunt exhibenda, & etiam quæ foetum mortuum vim habent expellendi, & secundinas retentas movendi; *pessus* quoque interdum usurpatur; his incassum tentatis ad *chirurgiam* deveniendum est. Interdum etiam accidit, ut foeminæ *varia monstra viventia* præter & contra naturam generent, ut passim videre est apud authores practicos.

Monstra.

Etzmulleri sententia.

*Mola a-
quosa ve-
sicularis.*

Art. 1428. Ex liquorum & membranularum confusione sub primis gestationis mensibus oritur mola aquosa vesicularis ex pluribus membranaceis particularibus capsulis conflata; „ nempe ex *hydatidibus* infinitis inter se connexis varia magnitudine, & vasculis sanguiferis quamplurimis in immensam molem, tactu mollem, & undique defluentem constare solet; hujusmodi *molam vesicularem* ipse vidi ex utero foeminæ exclusam, cum ingenti fluxu sanguinis; illa vero convalluit, & alios liberos peperit.

UTE.

UTERUS INFLATUS.

Ettmulleri sententia.

Art. 1429. Uterus inflatus intumescit non secus ac in gravidis, & sensim augetur, menses si- mul supprimuntur, aut parcius fluunt, quin & lac in mammis generatur, unde tales se gravidas esse credunt; in hoc statu manent ultra gestationis tempus ad annum integrum vel diutius, & postmodum vel medicamentis, vel supervenientibus doloribus parturientium, vel interdum sine his excludunt ex utero solummodo aliquos bombos & flatulentias, & venter subsidet; unde hic affectus *mola ventosa* seu *flatuosa* appellatur a quibusdam: interdum vero sine manifesta talium flatuum eruptione insensibiliter flatus exhalant, & venter subsidet. Videtur fieri occasione geniturae maris sine conceptione in utero contentae. Tumor non prominet praecise in medio abdominis, sed in omnes dimensiones se expandit, nunc augetur nunc diminuitur; insignis tensio dolorque sentitur, pondus est minus, quam in conceptione legitima.

Uterus inflatus

Mola ventosa

Art. 1430. Flatus uterum distendentes ejicienti sunt aperto uteri orificio interno, item remediis internis fortiter purgantibus & alterantibus discutiendi sunt.

Quomodo flatus discutiendi sunt

Sidenhami sententia.

Art. 1431. Sunt duae species tumorum abdominis hydropem mentientes foeminis familiares. Prima est *carnium* in partibus intra abdomen ex- crescentia praeternaturalis, quae ventrem in molem haud minus conspicuam attollit, quam solet inclusa aqua. Altera species *flatibus* ortum debet, qui non tumorem tantum, sed & alia in- gravidationis signa pariunt, & veram conceptionem

Excre- scentia carnosae in abdomine.

Flatus

nem æmulantur, tandem vero venter, pari quo increverat, gradu, sensim detumescens spem vanam eludit. (1429.)

UTERI HYDROPS.

Boerhaavii sententia.

Hydrops uteri. Art. 1432. In cavo uterino, clauso accurate ejus ore interno, sæpe colligitur tanta aquæ copia, ut integrum abdomen mentiatur *ascitem*; morbus est difficulter cognoscendus ob signa fallacia graviditatis. (1423.)

Curatio. Art. 1433. Curatur laxatione oris uterini per fomenta, vapores, ulcerina adhibita, &c.

Etmulleri sententia.

Uteri hydrops. Art. 1434. Uteri hydrops est tumor ejus aquosus, qui foeminas decipit, ut se gravidas æstiment; constat ex copiosa limpida aqua, rarius crocea; interdum conjunctus est hic hydrops cum gravitatione vera (quod ipse novi.) Signa sunt fluctuatio, & delapsus a latere ad latus, indolentia tumoris pressi, insignis gravitas in vulvam incumbens, & frequenter labiorum intumescencia cedematosa. Hydrops uteri discernitur ab ascite, si color faciei sit bonus, sitis nulla, tumor incipiat a parte inferiore, &c. Hydrope uteri post conceptionem correptis foetus intra aliquot menses abortu ejicitur. Observandum quoque est, quod post fluxum aquæ intereant mulieres.

Quomodo distinguatur ab ascite.

Curatio. Art. 1435. Verus uteri hydrops est morbus rarissimus; si cum foetu conjugatur parum aut nihil tentandum est; nam partu incipiente aqua hydropica ultro effluere solet. In genere eadem remedia, quæ alias in ascite usurpari solent, hic locum habent, speciatim elaterium cum mercurio dulci, ut & vomitoria & clysteres acres, item uterum stimulantia ut borax, crocus, extra-

Etiam

CAP. IV. *Hydrops Ovarii.* 397
Etum sabinae, castoreum, myrrha, &c. Injections uterinæ ex decoct. mezer. thermæ sulphuræ, &c.

H Y D R O P S O V A R I I.

Sydenhami sententia.

Art. 1436. *Hydrops ovarii* oritur ab obstructione in testiculorum alterutro, quæ sensim ejusdem crasin subvertit, ubi reposita morbi minera, tunica ejusdem mirum in modum distenditur, quæ jam tantum non crepante, natura humori excipiendo vesiculas quasdam suggerit, quibus tandem disruptis, & in abdominis cavitatem se exonerantibus, eadem occurrunt symptomata ac in *ascite*. *Hydrops ovarii unde tur.*

Boerrhavi sententia.

Art. 1437. Notabilis hydropis species ovaria mulierum sæpe occupat, qui morbus ut plurimum steriles annosasque mulieres obsidet, difficulter cognoscitur, & vix sine inciso cadavere; curatur vero nunquam, sed transit sæpe in *ascitem*. *Quibus accidit.*

Art. 1438. „Fœmina innupta viginti quinque circiter annos nata ventrem sensim intumescens, tem habuit anni spatio ad parturientis magnitudinem. Medicis, quos consuluerunt, gravitatis suspicio incidebat; obstetrices rem ita se habere audacter affirmabant; mulier ipsa insonantem accusari constanter instabat. Ego accersitus, certiorque de rerum statu, examine prius instituto, factus, illam *hydrope ovarii* laborasse, & morbum incurabilem esse pronunciaui. Post septimanas aliquot mortua est; sectoque cadavere in abdominis cavo invenimus aquæ coloris citrini sesquicongium; in infima ventre tumorem caput humanum æquantem ad hypogastrium dextrum aliquanto vergentem; *sinistrum*

„ta-

„ tamen esse ovarium in adeo ingentem massam
 „ turgescens, altero sano, statim agnovimus, in
 „ superficie conspiciuntur nonnullæ *hydatides*,
 „ una ovum anserinum æquans, reliquæ minores.
 „ Tota moles septem pondo pendebar. Tumorem
 „ facta incisione plane *strumosum* esse, & de spe-
 „ tie *steatomatis* liquido deprehendimus. Uterus
 „ erat sanus, & in statu virgineo; glandulæ me-
 „ sentericæ tumefactæ, tres reliquis insigniores
 „ ovum columbinum æquantes, strumosaque e-
 „ rant de genere *Meliceridis*. Jecur & lien parum
 „ discolorata, non vero scirrhusa. In thorace a-
 „ quæ, illi in abdomine analogæ, libræ duæ re-
 „ pertæ sunt, alter pulmonum lobus paulisper ab-
 „ sumptus; cor sanum; totum corpus valde lema-
 „ ciatum. In nosocomio D. *Thomæ* plusquam tri-
 „ ginta abhinc annis cadaver feminae eodem mor-
 „ bo defundæ sectione patefactum vidi, unde ju-
 „ stam ac legitimam *diagnosin atque prognosin*
 „ præcedentis casus proferre mihi contigit.

„ *Art. 1439.* „ In transactionibus *Regiæ Societa-*
 „ *tis Londini* N. 381. insigne & singulare exem-
 „ plum habemus hujus morbi larga sectione cura-
 „ ti per D. *R. Houstoun* in femina quinquagesi-
 „ mum octavum annum agente. Medici & chi-
 „ rurgi locum videant.

Hydrops
in cista
inclusus.

„ *Art. 1440.* „ Hujusmodi quoque sunt *hydro-*
 „ *psies enkistæ* gallis appellati, sive *hydropes in*
 „ *cistis inclusi*. Integrum abdomen quandoque ad-
 „ implent visceribus coarctatis, & in angustias
 „ detrusis, sacco ab ovario, vel partibus circa
 „ ovarium originem ducente. Admodum curiosa
 „ est historia hujus affectus apud *Du Verney Me-*
 „ *moir. de l'Acad.* p. 187. lectu dignissima.

A B O R T U S.

Riverii sententia.

Art. 1441. Abortus est immaturi fœtus exclusio. *Abortus signa.* Signa antecedentia sunt lumborum coxarumque gravitas insolita, & ad motum segnities, appetentia dejecta, rigor aut horror per vices recurrens, capitis dolor, præsertim circa oculorum radices, laterum ventrisque superioris constrictio, mammarum detumescencia & extenuatio; si vero dolores frequentes & fere continui renes & lumbos excrucient, qui versus pubem & os sacrum exporrigantur, cum quodam ex utero egerendi conatu, certum imminentis abortus indicium est; si autem dolores & illos & conatus sanguis purus vel serosus vel aqua ex utero profluens subsequatur, abortum instare, & disrupta vasa & membranas, atque os uteri apertum esse significat. „ In genere quicquid fœtui in utero mortem affert, id abortus quoque causa est; quippe fœtus emortuus citra corruptionem in utero diutius retineri nequit, & quanquam insolita quædam dentur exempla fœtuum emortuorum in utero diu detentorum, ibique fere consumptorum, hæc admodum rara sunt. *Deventer.* *Prognosis.* *Aretæus* testatur se nullas vidisse servatas ex iis, quibus in abortu vel post abortum convulsiones supervenerunt. Abortus in primipara periculosior est.

Art. 1442. Ad abortum præcavendum maximo *Præcautio.* in usu sunt *radices tormentil. mastiches, & grana kermes*, circa *emplastra* hoc animadvertendum est, ea non diu esse gestanda, sed per intervalla removenda; alioqui diutius lumbis affixa renes adeo calefaciunt, ut miseræ mulieres aliquando urinæ ardore afficiantur, vel arenulas aut sanguinem mingant. *Vena sectis aliquoties*

Art. 1443. Mulier quædam, quæ tres abortus *repetita.* con-

consequentes passa erat, a duobus mensibus gravida patiebatur dolores circa umbilicum & lumbos, qui abortum minabantur; *venesectionem* imperavi, statim liberata est; sed eadem symptomata accesserunt eo prorsus tempore, quo menstruas purgationes pati consueverat extra graviditatem; ideoque iterata fuit *venesectio* mense 3. 4. 5. 6. 7. & 8. recurrentibus doloribus, & tandem mense 9. peperit filium, &c.

Ettmulleri sententia.

*Effluxus
aquarum
immatu-
rus.*

Art. 1444. Interdum per aliquot septimanas aut per mensem fit aquarum ex utero effluxus immaturus, quod periculosum est; metus enim est, ne foetus moriatur; hoc vero aliquando evenit citra ullam noxam.

*Ad Præ-
cavendū
abortum.*

Art. 1445. Ad abortum præcavendum commendatur *decoctum verben.* item *grana kermes*; ex regno animali *cancris fluviatiles*, *tinctura coral.* *sucus cydon. citri*, *pulvis pelliculi ex ventriculo gallinarum exsiccāt.* Externe *panis tostus* vino generoso madefactus, & aromatibus conspersus abdomini & lumbis applicatus. Abortus a serosa *cachexia* metuendus decocto *lign. guaiaci* optime præcavetur.

*Vomitūs
in gravi-
dis.*

Art. 1446. Vomitus in gravidis, si diutius continuatur circa medium gestationis tempus, potius *phlebotomia*, quam aliis remediis compescendus est: ultimis mensibus est admodum periculosus; tunc blande *laxantia* sunt exhibenda, & appropriata *stomachica*: externe *emplastr. stomachicum magistral.*, vomitio in gravidis, (inquit *Hamilton*) „ quæ sitim excitar, & linguam aridam reddit; le- „ *ni catharsi* (viz. cum *pil. tartar. Quercetan.* ʒss. „ vel ʒij.) foelicissime sanatur; propinari etiam debet *oleum amygdalarum dulcium.* p. 13. & 48.

Farrago sententiarum.

Art. 1447. „ Quæ abortum consequuntur sym- Prognosis.
ptomata enixarum communia sunt ; periculo-
rior tamen est abortus quam partus maturus ;
periculosior quoque est 6. 7. & 8. mense.

Art. 1448. Sequens est medicamentum *Solenan-* Remedia
dium sin-
dri , *℥℥ Mastich. thur. alb. ana ʒss. mytil. bol.*
armen. orient. lacrym. sang. dracon. ana ʒss. m. f. gulare.
pulvis ʒ℥. Hujus pulv. ʒj. infarciatur dactylus ;
ejecto nucleo ligneo, involvatur charta, madescat
deinde vino clareto, & calefiat sub cineribus,
deinde edatur. Hoc remedium in fluxu nimio
menstruum, & etiam in foetu retinendo efficax es-
se experientia didici (inquit author) primum Bo-
nonie a præceptoribus edoctus.

Art. 1449. *Oleum sem. lini* contra abortum est Alia re-
singulare experimentum authore *D. Hamilton. p.*
42. In usu quandoque sunt *emplast. smectic. tabu-*
la embryonum (instar omnium) *foetus astringens,*
foetus stomachic. electuarium contra abortum, mi-
stura consolans, mistura acida, tinctura rosa-
rum, &c. media.

PARTUS DIFFICILIS.

Art. 1450. Experientia constat (inquit *La Mot-* Termina
te) mulieres alias alius diutius foetum in utero ge- partus.
stare. Usitatissimus partus terminus ad finem no-
ni mensis accidere solet ; nonnullæ vero mense
7. 8. 10. 11. immo, addit author, non ante inte-
grum annum pariunt. „ Ex observatione liquet in-
fantes 8. mense natos frequentius mori, quam
qui 7. nascuntur, quod valde obscurum est.

Estmulleri sententia.

Art. 1451. Dolores parturientium legitimi & Dolores
parturi-
opti- entium
legitimi.

optimi sunt, qui continuo ex lumbis incipientes secundum abdomen deorsum protenduntur ad regionem pubis usque; hinc clunes & coxas occupant, & ita tremorem genuum inferunt, qui *spasmodorum* est effectus. „ Si quando dolores ad pedes & brachia tendunt, male ominantur. Ex observatione constat quod feminae, quae partum primum facile absolunt, de partu in partum difficilius habent, & saepe vel in partu vel in puerperio moriuntur, quo vero laboriosius pariunt, primiparae, eo melius habent de partu in partum.

Dolores
nothi.

Art. 1452. Dolores nothi, qui feminis aliquando accidunt sunt plerumque *colici*, *iliaci*, aut *hysterici*; at a veris parturientium distingui possunt; quandoque vero cum veris conjuncti sunt.

De disrup-
tione
membrarum.

Art. 1453. Non semper consultum est membranas discindere, & non faciendum, nisi indicia imminentis partus sufficientia adsint, & fetus legitimum habeat situm.

Partus
difficilis
causa.

Art. 1454. Tres sunt circumstantiae praeter reliquis, quae partum difficilem & periculosum reddunt; fetus mortuus, haemorrhagia partum praecedens, aut convulsiones. Funiculus umbilicalis fetus frontem communiter cingit; quando vero aliquot gyris circa collum aliamve partem circumvolvatur, casus est periculosus.

Situs vi-
tiosus.

Art. 1455. Situs fetus vitiosus est maxime periculosus, quando pedibus primo prodit infans, ita ut etiam manus deorsum inclinent: Nam sic fit, ut egresso corpore orificium uteri internum circa collum se stringat, ita ut caput adhuc in utero hæreat (tales fetus dicuntur *Aggripæ*;) ubi non potest emendari talis positura, obstetrix saltem alterutrum brachium eo dirigat, ut sursum versus ad caput vergat, &c.

Enema
quando
que injici-
endum.

Art. 1456. Alvo existente clausa, vel intestini flatu turgidis enema carminativo-emolliens ad facilitandum partum optime conducit, imo in ipso partu.

„ De

„ De agendis instante partu, & de officio ob-
 „ stetricis ex sequentibus colligere licet.

*Stricturæ quædam breves perfectam obstetrican-
 di artis ideam complectentes, maxime ex Deven-
 terio depromptæ, qui ultra omnes hanc chirurgiæ
 partem luculentissime tractavit, partus difficilis
 causas clarissime demonstravit, & modum partus
 incommoda arte removendi significanter indicavit.*

*Art. 1457. Cognitio ossium pelvem constituen-
 tium, ejusdemque pelvis figuræ obstetricibus im-
 primis utilis est, immo necessaria; aliter enim cæ-
 cutientes, temere, & inconsulto auxiliatrices a-
 cturæ sunt; atque ut distinctam pelvis ideam con-
 cipiant, Sceleton iterum iterumque conspiciere
 debent; ubi observare licet in sceleto muliebri
 partes infimas ossium sedentariarum magis ple-
 rumque distare, neque adeo deorsum versus ossis
 coccygis acumen inflecti, quam in masculo sce-
 leto, id quod sapientissimus atque benignissimus
 Creator ita constituit, ratumque habuit ad evita-
 tionem plurium adhuc partuum difficilium, qui
 tamen satis frequentes sunt.*

*Pelvis co-
 gnitio ne-
 cessaria.*

*Art. 1458. Capacitas & figura pelvis in mulie-
 ribus varia est. Magni interest qualis sit pelvis
 forma sive conformatio in gravidis æque ac in
 parturientibus; linea recta est norma sui & obli-
 quæ; ita pelvem bene formatam qui cognoverit,
 pravam dispositionem facile deprehendet. Pelvis
 in quibusdam est nimis angusta, in aliis nimis am-
 pla, & patentior quam par est, in quibusdam de-
 nique non satis distantia intercedit inter ossa pu-
 bis & os sacrum ejusdemque appendicem os coccy-
 gis, hujusmodi pelvis plana dicitur. Omnes hæ
 pelvis pravæ formæ diversa incommoda afferunt
 in praxi occurrentia.*

*Figura &
 capacitas
 varia.*

*Art. 1459. Obstetrices inexpertæ tangentes fœ-
 minam digitos in vaginam recta protendunt secun-
 dum longitudinem fœminæ, & hoc pacto offen-
 dunt*

*Situs oris
 uteri.*

Si

dunt

dunt ossis sacri curvamen, unde digitis resiliens ore uteri non invento confunduntur; sed ex constructione pelvis luculenter patet (quod probe animadvertendum est) *cavitatem ejus longitudine sua non secundum longitudinem spinæ dorsæ tendere, sed ab imo oblique, anticam versus ascendendo progredi, quasi per eam umbilicum ventris attingere velis*: quare quærentes os uteri non recte versus curvatum os sacrum digitos intendere debent, sed ab imo sursum tendere, quasi per muliebria *umbilicum* attingere velint.

Quomodo
se habet
ante & in
partu.

Art. 1460. Uterus & vagina sibi invicem coadunata sunt, uterusque qua in acutum terminat parte, prope ipsius os, in vaginam intrusus est, vel acuminatus prominet; ita ut in foeminis non imprægnatis, immo & prioribus graviditatis mensibus, *tactu percipiatur acuminatus*: at in partu os pariter cum utero laxatum adeo & extensum est, ut vagina cum utero videatur *unicum quasi utrem* constituere, orisque uteri & vaginæ differentia sentiatur nulla, nisi quod vagina tenuior molliorque. Os vero uteri callosius sit, nec tum *acuminatum* quid tactu percipiatur. Ex hac rerum mutatione, si opus fuerit, optime conjecturæ licet *propinquitatem & longinquitatem temporis pariendi*; certum autem tempus inde infallibiliter præfiniri non potest.

Uteri po-
situra va-
ria.

Art 1461. Certissimum est veras difficillimorum partuum causas non adeo dependere a *pravis posituris* infantum in utero quam a *perverso ipsius uteri situ*. Quo majorem gravidæ foetum gestant, eo altius uterus in ventrem assurgit, cum enim cavitas pelvis non sufficiat ad capiendum prægrandem uterum, uno vel pluribus infantibus ex omni parte absolutis una cum secundinis & humoribus repletum, exinde necessario sequitur, ultra oram pelvis in cavitatem ventris, uterum ascendere; atque tum posituram naturalem aut retinet, aut non; si retineat, vocatur *uterus rectus & bene sit*.

ne situs, atque tunc acuminata ejus pars recta tendit in *cavitatem pelvis*, fundus vero circa *umbilicum* versatur: Positura autem mutata, huc vel illic aliquantulum inclinatus *uterus obliquus vel prave situs* appellatur, quorum insigniores sunt quatuor; *primus*, quando os uteri nimis suspensum ab antica parte ad ossa pubis adigitur, & infans capite in ossa pubis facile impingens hæret immobilis, aut quod deterius est, capite super ista ossa transfertur. *Secundus* pravus uteri situs est, quando in ventrosis mulieribus uterus pronus propendet, ore ad os sacrum converso. *Tertius*, quando fundus uteri in latere sinistro paulo altius vel demissius ponitur, ore ad spinam dextri ossis ilij vel pubis converso; huic contrarius est *quartus & ultimus*. Ex his & hujusmodi obliquis uteri posituris oriuntur partus difficiles, unde matris vel infantuli vel utriusque interitus sequitur, nisi solertis obstetricantis opera servantur.

Art. 1462. Aliquot diebus ante puerperium prægnantis venter aliquantulum extenuatur, quod tunc temporis bene situs infans in cavitatem pelvis *prono capite delabitur*, quod felicitis partus est prælagium: Infans enim prave situs vel uterus obliquatus in cavitatem pelvis haud ita prompte illabitur. Sed isthæc descensio plerumque gravidis *aliquid incommodi* affert sive eundo, sive mingen-
do, sive dejiciendo, sive hæmorrhoides producendo, &c. Scilicet a pressione capitis infantis, immo interdum muliebria intumescere facit. Hæc incommoda non facile nisi post partum evanescunt.

Art. 1463. Tandem tempore partus jamjam imminente dolores lumborum ac inguinum cum vi *deprimente* per vices ingruentes sentiuntur, & humor aliqualis glutinosus profluit; qui, cum rubescere incipiat, certissimum partus indicium est. Callida obstetrix genuinos dolores a spuriis *tacta* facile dignoscet; hi enim os uteri arctius costringunt, genuini vero illud dilatant. Adest insuper

*Uteri descensus
ante puerperium.*

*Signa
instantis
parus.*

sanguinis vehemens commotio, faciei rubor, concussio & tremor totius corporis, maxime genuum, aliis concitatur vomitus, &c.

Partus naturalis.

Art. 1464. Partus naturalis (ubi scilicet recta datur uteri ac infantis positura) est, qui *sola natura vi* sine arte vel alieno auxilio perficitur, obstetrice haud indigens, nisi ut infantulum excipiat, & funem umbilicalem abscindat &c.

In difficili partu quomodo parturientes adjuvanda est.

In quibusdam vero maxime in mulieribus an-
nosis res non adeo facile expeditur. Ideoque in-
stante partu, obstetrix, ut laboranti opem quam
maximam ferat, altera manu in vaginam immissa
& dorso conversa, digitorum apices quousque po-
test, subter caput infantis insinuet, caute tamen,
manum ibi tenens immotam, donec dolor irruat;
alteram manum extrinsecus abdomini imponat,
super fundum uteri; deinde doloribus irruentibus
ipsa simul incipiat utraque manu cooperari; ma-
nu scilicet intra corpus deprimat contra ossis sa-
cri acumen, quod retrorsum premendum est; al-
tera manu extrinsecus uterum deorsum leniter
premat. *NB.* Maxima apertio & amplificatio pel-
vis, qua pateat fœtui via, a retrocessu ossis sacri
vel totali vel quoad acumen ejus sive ossis coccygis
expectanda est. In ipso parturiendi articulo, præ-
cipue pelvi plana existente, optimum ad partum
facilitandum adjumentum datur osse coccygis for-
tissime detrudendo, idemque singulis dolorum
paroxysmis irruentibus repetendo.

Dolores naturales & genuini.

Art. 1465. Ad partum felicem facilemque re-
quiruntur dolores naturales, suo tempore & mo-
do, *instar nimbi irruentes*, quibus ventris & inte-
stinorum muscoli adstricti tantam depressionem
impetumque in uterum faciunt, quasi a corpore
expellendus esset; atque horum dolorum impulsu
aperitur uterus, fœtusque in ostium expellitur &
mulier partum edit: hi vero dolores quandoque

*Dolores terziver-
santes.*

pravi vel irriti sunt, quos vocant aut vocare pos-
sunt *feroces aut terziversantes dolores* quodammo-
do

CAP. XIV. *Partus difficilis.* ³⁰¹
do irruentes quidem sed non penetrantes, neque
veram depressionem facientes, sed tandem re in-
fecta cessant, ac in cruciatum aut spasmus labo-
randique impotentiam mutantur. In hujusmodi
tergiversantibus doloribus medicamentis propel-
lentibus non est utendum, quia exinde cruciatus
ingravescent; sed contra lenientibus & anody-
nis.

Art. 1466. Obstetrix parturienti advocata, ha-
bito brevi examine, illam sine mora *tactu explo-*
rare debet; tactus autem fit duobus prioribus di-
gitis, ut eo melius singula sensu distinguantur.
Ex quo cognitionem *situs uteri* assequetur: cer-
rior facta erit, an os uteri situm sit *super mediam*
pelvim, an *in antica ad ossa pubis*, an *in postica*
ad os sacrum, aut *in dextro*, an *in sinistro latere*,
an os uteri *apertum sit*, & *quam late pateat*, &
quid in eo prævium exhibeatur, caputne an aliud
membrum, seu *aquæ protuberantes*. Si os uteri sit
in media pelvi & vertex infantis in ostio oris ute-
ri, tunc nullo negotio opus est, & solum expe-
ctandum, dum natura parturientem dolorum im-
petu ad laborandum concitet.

Art. 1467. Sin vero, ore uteri in pelvim dire-
cto, obstetrix tactu nec caput, nec nates possit
sentire, nihil in ostio se exhibente præter aquas
quæ ceperunt exuberare, isthæc *partus difficilis*
indicia sunt; & obstetrici incumbit non otiosam
esse, & nisi habilis sit *ad peritum chirurgum ob-*
stetricantem confugiendum est; infans enim trans-
versus prodit, quare mox post *aquarum effluvium*
caput in ostium producendum est, aut infans pe-
dibus extrahendus.

Art. 1468. Si loco capitis altera solum manus,
pes, genu, cubitus, vena umbilicalis, aut ma-
nus una cum pedibus prodeant, idem periculum
imminet. Si podex prævius exhibeatur, tunc mi-
nus periculi, siquidem infans cum valentioribus
doloribus complicatus excludi potest, at vero si

*Parturientes
tactu ex-
ploranda.*

*Indicia
partus
difficilis.*

*Præva
infantis
versio.*

obstetrix egregie callet artem, *sub aquarum effluviū* infantis situm facile mutare potest, pedesque in ostium producere, unde facilior adhuc enixus. Si pes unus prodeat, alter adjungendus est, aliter metus est, ne *coxa luxetur*.

*Positura
uteri tā-
m explo-
randa.*

Art. 1469. Si obstetricis tactu deprehendatur, quod os uteri super mediam pelvim non situm sit, sed in antica in ossa pubis, aut in postica ad os sacrum, aut in latere ad ossa coxendicis nimis conversum sit; grave periculum imminet, præcipue *quanto magis uterus a recta positura declinat*: tunc a natura enixus non sperandus est; cunctatio nihil commodi sed multum mali inferre potest; ideoque maturato opus est: istiusmodi enim uteri positura mortem afferre solent infanti, & parturienti etiam, *si soli naturæ id negotiū committatur, aut non nisi vulgares suppetiæ ferantur*. Partus experto chirurgo excludendus est, periculum subinde ingravescit, opera fit difficilior, cruciatus parturientis aggravantur, viresque ad ferendos dolores deficiunt; cunctando remisque velisque plenissimis in discrimen fertur parturiens, sed maturata partus exclusionem periculum subterfugit.

*Difficul-
tas ex
mala ute-
ri positu-
ra, & ex
pravo in-
fantis si-
tu.*

Art. 1470. Licet uteri positura sit percommoda, *si fœtus in illo prave sese versat*, difficilem partum sequi necesse est: & vice versa ut ut infans recte ad exclusionem situs sit, uteri tamen perversa positura partum dabit difficilem, major difficultas patiendi e prava hac uteri positura resultat, quam a pravo infantis situ, sed maxima omnium adhuc & fere insuperabilis difficultas ex *ambobus simul conjunctis* exoritur.

Nota bene.

Art. 1471. Utero denique seu recte seu plus minus oblique posito, si aquis effusis, membrum aliquod (sive manus sive pes, &c.) exclusum sit, id indicat partum confestim ac sine mora excludendum esse.

*Vis Uteri
contracti-
va.*

Art. 1472. Mirabilis est vis uteri contractiva; instan-

instante partu, cum aquæ effluxerunt, illico uterus decrescit, & stricte adeo coangustatur, ut infantem compresse concludat; quare mox post defluvium aquarum infantem excludi necessum est, *vel partus difficilis expectandus est.* Si foetus exclusum non statim secundina sequitur, fundo adhuc adhærens, uterus mox contrahitur; & nisi quid sanguinis concreti remanserit, post aliquot horulas non nisi multo labore potest recludi ad secundinam extrahendam. Partu jam edito, & secundina exclusa, si manus aliquandiu in utero retineatur (quod obstetricantium est officium) sentiet uterum circa manum *contrahi & occludi*, quod semper evenit nisi corpus quoddam heterogeneum contractioni obstat.

Art. 1473. Quocirca protinus ab exclusione infantis *manus utero immittenda est* extrahendæ secundine causa; quoniam, si hoc fit sine mora, sine ullo puerperæ dolore vel incommodo fieri potest ore uteri adhuc patente; hoc modo puerperium tutissime ac certissime penitus absolvitur; ex hoc enim optimo scrutinio obstetrix certior facta est, non solum an secundina libera sit, vel cohæreat, & num unus adhuc vel plures infantes adhuc vivi vel mortui restent, vel si quid alienum excludendum sit, sed etiam num frustula quædam secundinæ, aut membranarum residua sunt in utero aut sanguinis grumi, &c.

Quid faciendum sit partu excluso.

Art. 1474. In pelvi ampliore periculum est, ne inter parturiendum uterus ipse vel vagina ligamenti nimium laxatis *una cum foetu prolabatur*: ad hoc grave malum præcavendum obstetricis est diligenter operam navare manibus suis os uteri fortiter sustinendo.

Procidencia uteri præcavenda est.

Art. 1475. Si funiculus umbilicalis solus, vel cum manu, cubito, humero vel genu prodeat obstetrici accurate observandum est *momentum effusii humorum* ut immediate manu immissa in situm infantis inquirat, secum dijudicans, an con-

Effluxis aquis urgendus est partus.

sultius sit caput in ostium dirigere, aut infantem pedibus extrahere; & quod tutius censet & commodius, efficiendum: præstat enim infantem sine mora *pedibus extrahere*, quam capiti in ostium dirigendo diutius immorari, & nihilominus vel tandem ad pedes quærendos necessitate adigi.

In omni fere difficultate tutior methodus est infantem pedibus extrahere.

Art. 1476. In genere in qualicunque uteri obliqua positura, vel infantis prava versione methodus tutissima, promptissima, minusque dolorifica, partum accelerandi est *infantem pedibus extrahere*, idque in principio laborum, mox post effluuium aquarum, quamprimum constat parturientem genuinis parientium doloribus laborare; hoc pacto plures mulieres ac infantes aliter perituri servarentur.

Clysterum usus.

Art. 1477. Parturientibus solemne est vel *clysterem emollientem* adhibere ad intestina crassioribus excrementis exoneranda, & meatus laxiores reddendos, vel nonnunquam *stimulantem*, ut pigri dolores excitentur. Insuper nonnulli chirurgi obstetricantes maxime commendant *syphonem*, quo inter labores oleum in internos corporis meatus quaquaversum injiciatur, sed hoc tanquam necessarium non est judicandum.

Instrumenta.

Art. 1478. Instrumenta ad partum educendum quod attinet, rarissime dicam, immo ne unquam quidem usui esse possunt, præterquam infantibus curia neglectis, vel monstris excludendis.

Infans in utero mortuus.

Art. 1479. Pro certo cognosci vix potest vivine an emortui sint infantes in utero: ex tactu maxime signum omnium certissimum obtinetur, viz. *cuticulæ capitis supremæ dissolutio*, quæ non nisi post obitum infantis contingit.

Instantibus magnis hæmorrhagiis fetus exclusio arte præstanda est.

Art. 1480. Prægnantes quandoque ex vehementi animi affectu, casu, collisione vel nimia extensione hæmorrhagia facile corripuntur, quæ *profluvia immodica & continua* ex avulsione fecundinæ oriuntur, nec fisci possunt, adeo ut sanguis

guis conglobatim distillans deliquia tandem inferat, & nisi foetus excludatur, convulsiones sequuntur, & mors; quocirca in hoc casu extrema non expectanda, sed in tempore foetus extrahendus est.

Art. 1481. „ Inter signa foetus mortui in utero ab auctoribus recensita certissimum (inquit *Baglivius*) & fere infallibile est *Tenesmus*, si-
 „ ve crebra voluntas faeces deijciendi mulieri superveniens. Puerperæ sæpius inopinato moriuntur, (inquit *Vvaldschmidius*) quatenus ob nimium parturiendi conatum aneurisma internum
 „ rumpitur, & sanguis in cavitationem nobiliorem effunditur cujus causam sæpe non cognoscunt
 „ adstantes & medici, nisi post mortem aperto cadavere.

Foetus

mortuus.

Aneurisma internum.

Art. 1482. Non conveniunt remedia *pellentia* nisi in partu naturali, in præternaturali ab iisdem abstinendum. Præter remedia usitata ad partum facilitandum, & foetum pellendum commendatur decoctum *stercoris equini* item *aurum fulminans*, tanquam singulare & ultimum remedium; *pulvis testiculorum equin.* a practicis laudatur. *Sternutatoria* aliquando foetus exclusionem adjuvant. In casu desperato, foetu mortuo, vomitoria fortiora sunt exhibenda, privatim *mercurius vitae* ad expellendum foetum. Quidam exhibent *ol. succin.* a gr. xii. ad xxx. usurpantur etiam quandoque *balnea emollientia* & *laxantia*, *mistura hysterica spirituosissima*, *trochisci hysterici*, *trochisci de myrrha*, &c.

Remedia pellentia.

SECUNDINA RETENTA.

Vvaldschmidii sententia.

Art. 1483. Obstetrices & adstantes sæpius nimis indulgent parturientibus, easque post enixum partum e sella dimittunt, utut *secundinae* nondum extractæ sint; verum in eo errant gravissime, quan-

Secundina

reper-

ta.

*Sympto-
mata se-
cundina
retenta.*

*Remedia
pellentia.*

quandoquidem parturiens nunquam dimitti vel in-
lectum deduci debet, nisi prius secundinas reddi-
derit. Hæ autem tutius ac commodius manu pe-
rita ab utero divelluntur, & extrahuntur, ubi fu-
niculus umbilicalis, qui indicis loco est, recens
adhuc est: Quod si orificium uteri jam clausum
sit, debet apice unius digiti iterum aperiri, &
digitus prudenter circumduci, donec & alter inseri
potest: Jam si digitos ad fundum uteri usque ex-
porrigere possis, quærendus est locus, ubi secun-
dinæ utero adhærent, & digito inter uterum &
placentam inserto caute hæc divellenda: caven-
dum vero ne forte ipsum apprehendas uterum,
quem facile dignosces, cum placenta ob vasorum
congeriem admodum inæqualis & durioris sit su-
perficie. „ Secundina retenta brevi post putrescit,
„ hinc febris & dolor ventris insignis & tormina
„ infra umbilicum circa uteri regionem superve-
„ niunt; sin frustulatim prodeat, aliquando cru-
„ delem hæmorrhagiam excitat, adest difficultas
„ anhelitus, halitus foetens intolerabilis, lipothy-
„ miæ, & tandem convulsiones. Quæ per geni-
„ talia excernuntur, post aliquot dies sunt saniosa,
„ & horrenda foetida, unde etiam lochia foeto-
„ rem cadaverosum referentia partem secundina-
„ rum in utero relictam indicant, quæ successive
„ sub putrilaginis forma ex utero effluit.

Art. 1484. „ Remedia secundinas pellentia ea-
„ dem fere sunt ac ea, quæ in partu difficili &
„ foetu mortuo usurpari solent, speciatim pulvis
„ secundin. human. præp. item pulvis sabin. ʒss.
„ cum croc. ʒss. ut & oleum succin. borax, casto-
„ reum, &c. Euporiston vulgare pro usu externo
„ est cataplasma ex sem. lini in oleo lini coct. De
„ injectionibus & pessis vide locum p. 1128.

L O C H I A.

Etmulleri sententia.

Art. 1485. Post partum uterus denuo fibrarum suarum beneficio se contrahit, sicque spongiæ instar compressæ liquores contentos exprimit, unde purgamenta seu lochia succedunt. Effluit primo sanguis fere purus, hinc dilutior, & postremo materia mucosa alba: quantitas & tempus durationis hujus purgationis varium est; nonnullæ ad dies quindecim purgantur, aliæ ad octo solummodo.

*Lochio-
rum flus-
sus ratio.*

Art. 1486. Sudor puerperis est proficuus usque ad diem septimum vel nonum; & si hoc eveniat, incolumes sint, aliter vix sine febre aut aliis gravioribus symptomatibus puerperium transigunt; sed cavendum est, ne nimius sudor lochiorum fluxum sistat.

Sudor.

Art. 1487. Cautus sit medicus, ne turbet motum naturæ, cum lochia per aliena loca excernantur; sit enim aliquando cum euphoria. „ Si „ quando cum lochiorum suppressione sanguinis „ perturbatio insignis cum vomitu siti & vigiliis „ adfuerit, sæpe laudanum croco admistum cum „ foelici successu exhibitum novi (inquit Villi- „ sius.) Dolentibus mammis post partum lactis „ causa, lochia supprimuntur frequentissime; re- „ mittente mammarum dolore lochia libertati re- „ stituuntur, ut recte observavit Baglivius.

Cautela.

*De lochio-
rum sup-
pressione.*

Art. 1488. Ad lochiorum fluxum promovendum conducunt sequentia, ex myrrha preparata, crocus, borax, castoreum, radix zedoaria, antimonium diaphoreticum, sperma ceti ad sanguinem fluidum reddendum in symptomatibus gravioribus laudanum, emmenagoga omnia, aristolochia fere præ cæteris foetum mortuum secundinas, & lochia, potenter movet.

*Remedia
ad flu-
xum pro-
moven-
dum.*

Art. 1489. Ad fluxum lochiorum nimium con-

*In fluxu
nimio.*

du-

ducunt *cydoniata*, *tinctura* & *syrupus* e *coralliis*,
lapis hematitis, *crocus martis astringens*, *blanda*
acida, *trochisci de carrabe*, *Alumen ad ʒj. in con-*
serv. ros. rub.

DOLORES POST PARTUM.

Ettmulleri sententia.

*Remedia
ad dolores
post par-
tum.*

*Art. 1490. Dolores post partum sunt quasi te-
 nesmus uterinus, & cum vehementiores sint, flu-
 xum lochiorum impedire solent. Herb. chærefol.
 & sperma ceti a practicis valde laudantur, & præ-
 cipue oleum amygdalarum dulc. item decoctum flor.
 chamæ. antihysterica, & nervina (anodyna cum
 cautela adjunctis antihystericis & croco), Tin-
 ctura succini cum aq. cinnamon. extracta &
 cum exigua cinnamon. quantitate temperata est
 specificum (inquit Baglivius) egregius etiam
 est bolus ad casum. Cepæ cum vino coctæ, &
 postea cum oleo in sartagine frixæ, contusæ,
 & supra ventrem calide more cataplasmati ap-
 plicatæ statim dolorem sedant (inquit Byrius.)*

DE ACCIDENTIBUS QUIBUSDAM ALIIS,
 quibus aliquando obnoxie sunt gravidae
 & parturientes.

Ettmulleri sententia.

*Tumores
edematoso-
si.*

*Art. 1491. Gravidae aliquando circa labia pu-
 dendorum edematose intumescunt; in tali casu
 fetus discutiens ex calce viva est egregius, teste
 Lysero. Item convenit fetus ex decoct. fol. cham.
 & sambuc. in vino & aq. (vel potius in vino &
 lixivio ten. coct.) item flor. melilot. & sem. fæ-
 nigr.*

*Alia ac-
cidentia.*

*Art. 1492. In pudendorum excoriatione vel ru-
 ptione prodest oleum hyperici & rosar. cum. ovis
 contus. In fissuris decoctum raparum aut linimen-*

tum

CAP. XIV. De accidentibus, &c. 509

tum sequens, ℥. cer. alb. ℥ss. ol. amygd. dulc. ℥ss.
balsam. peruv. ℥iv. M. De ruptura Perinæ & cu-
ratione per futuram vide locum p. 1140. „ Ruptu-
ra Perinæ est malum miserabile & valde mo-
lestum, & si non tempestive curatur, admo-
dum indecorum futurum: ideoque obstetricis
est officium (quandocunque istud infortunium
acciderit) rem non celare, (uti pessimus mos
obtinuit) sed statim auxilium periti chirurgi ad-
vocare, ut partes disruptæ futura, ut artis est,
conjungantur.

Ruptura
Perinæ.

Art. 1493. Ad lac fugandum applicetur mam-
mis emplastrum de cicuta, lac imminuet, & in-
durationem prohibebit, item diachyl. simpl. &
emulsio lactis in ferrum candens. „ Solemne est
etiam mulierculis lintea duplicata spiritu vini
intincta axillis supponere in eundem usum. „
In genere in omnibus mammarum affectibus mam-
milla affecta raro ad sanitatem perducitur, nisi
altera sana lacte exsiccetur. Inflammationes mam-
marum rarissime discutiuntur; aqua calcis vivæ
si quæ alia (forsan cum sale armoniaco) inflam-
mationem resolvit, & discutit; prodest etiam ca-
taplasma ex farinis, emplastr. e spermate ceti, de
cicuta, &c. De tumore duro indolente scirrhuso
periculum est, ne in cancrum degeneret, discuti-
entibus & penetrantibus tractandus est, ut empl.
de ranis cum mercurio, de cicuta cum ammonia-
co, &c.

De lacte
fugando
& mam-
marum
affectibus.

FEBRIS LACTEA.

Etmulleri sententia.

Art. 1494. Circa tertium vel quartum a partu
diem supervenire solet febris, quam vocant la-
cteam, biduum vel triduum durans, dum lac per-
fectum in mammis generetur, circa septimum aut
nonum a partu diem sudore blando terminatur,
& raro sub praxin medicam cadit. Pulveres te-
ra-

Febris la-
ctea facil-
time cu-
ratur.

stacei, & *blanda diaphoretica* indicationi satisfaciunt; promovendus est quoque *lochiorum fluxus*, eodem tempore, si non sufficienter fluant.

*Febres
maligna
puerpera-
rum.*

Art. 1495. In omnibus febribus acutis & malignis puerperarum respiciendum est ad *lochiorum fluxum*, & ad symptomata in primis viis. Admodum periculosa sunt hæc febres, nisi statim in principio diarrhœa, lochiorum fluxu, aut simili evacuatione solvantur. In specie tinnitus aurium & gravitas capitis tertio aut quarto die supervenientes generis nervosi symptomata graviora innuunt; quibus si accedant summa præcordiorum anxietas, respiratio difficilis cum pulsu debili & inæquali, res desperata est.

Curatio.

Art. 1496. In his febribus summa habenda est ratio lochiorum; nam si suppressa fuerint, fluxus eorum est provocandus; si vero non amplius fluant, & antea rite fluxerint, febres hæc, *ut aliæ*, curandæ sunt. Puerperarum febres sunt plerumque *malignæ*; in quibus *sal. volat. CC. succini, cinnabaris antimonii, antihæcticum Poterii, tinctura coral. &c.* sunt valde proficua.

FEBRIS MILIARIS.

Hamiltoni sententia.

Ratio nominis, & accurata morbi descriptio.

Art. 1497. Febris *miliaris* a pustulis sive vesiculis seminis milii speciem referentibus nomen accepit; febris *vesicularis* etiam appellari licet. Vesiculæ primo sunt plenæ sero limbo deinceps subflavo, perlarum colore non absimili. Hæc febris est specie duplex, viz. *simplex*, quoties hæc pustulæ erumpunt solæ; *composita*, cum pustulæ papillares rubræ miliaribus sunt interspersæ, quæ ubi solitariae sunt, vulgo appellantur *a Rash*.

Historia.

Hanc febrem sæpe comitantur dolores colici, nephritici, pleuritici, rheumatismatici, vel parturientis æmuli; nec non oppressio pectoris cum de-

depressionem spirituum, vigiliæ, & spirituum commotio a *Hurry in the Head* vulgo dicta, quoties ægræ ad somnum se componunt, pulsus frequens & debilis, &c. Hæ pustulæ plerumque in pectore, collo & digitorum interstitiis, interdum etiam in toto corpore sunt conspicuæ. Difficillimum est eruptionis diem assignare; quantum autem assequi possum, eas opinor decimo aut undecimo die a principio plerumque pullulare; si modo febris habet progressum regularem; & circa decimum octavum, vel, ubi materia morbifica abundat, circa vigesimum primum vel secundum diem desiccari.

Art. 1498. Est morbus usitatissimus in puerperis (vocatur ab *Ettmullero febris purpurata* p. 401.) a primo calore interno vel dolore ante partum, ad eruptionem a partu, frequenter dies non undecim. In puerperis hac febre correptis diarrhœa est symptoma periculosum eruptionem & lochiorum fluxum impediens. Respiratio difficilis, vox faucibus hærens, & linguæ tremor, præcipue dyspnœa nervosa periculosa sunt.

Puerperis frequenter accidit.

Art. 1499. Ad curationem quod attinet, testacea sunt exhibenda, quæ calorem foveant medicamentum, simul & edulcorant, & diaphoresin promoveant; vesicatoria sunt applicanda alia post alia per totum fere morbi decursum. ℞. *Sperm. cet. pulv. e chel. cancror. comp. ana* ℥j *croc. gr. v. syr. paralyf. q. s. m. f. bolus* sexta quaque hora sumendus. Spirituum defectus & pectoris oppressio cum suspiriis sunt hujus febris signa pathognomonica. *Antimonium diaphoreticum* est medicamentum ad pustulas miliares emittendas; nec non ad levandum delirium a me sæpissime comprobatum dos. ℥j. sexta quaque hora.

Curatio.

DELIRIUM IN PUERPERIO.

**Delirium
in puerpe-
ris.**

Art. 1500. „ Delirium in puerperis est sympto-
„ ma gravissimum in morte sæpissime desinens ,
„ vel in maniam diuturnam aliquando perpetuam
„ transiens.

Curatio.

Art. 1501. „ Remediis internis fluxus lochio-
„ rum, si opus sit, est sedulo promovendus; ti-
„ biis applicanda sunt *emplastra epispastica*, &
„ plantis pedum cataplasma sequens, *℞. Capit.*
„ *papav. cum seminibus contus. ℥iv. sal. armoniac.*
„ *℥ss. stercoris bovis recent. ℔j. sp. vini q. s. m. f.*
„ cataplasma.

UTERI PROCIDENTIA.

Ettmulleri sententia.

**Uteri pro-
cidentia.**

Art. 1502. Uteri procidentia vel magis pro-
prie prolapsus sinus pudoris, seu vagina in initio
est tantum exiguus tumor foras propendens inter
pudendi labia, in majorem molem concreescere
solet ad magnitudinem ovi asinerini, aliquando
capitis infantis, & ad genua usque propendens;
interdum ulceratur, immo gangrænescit. Ortum
plerumque ducit a fluore albo vel a partu diffi-
li, vel ab impetu obstetricis, hæc postrema est fe-
re incurabilis.

Curatio.

Art. 1503. Pars prolapsa convenienter in situm
naturalem reponenda est; *fotus astringentes* sunt
usurpandi in vino rubro & aqua ferrariorum de-
coct. quemadmodum in ano prolapso (1323.) item
fotus metroproctoticus Sydenhami sequens; *℞. Cort.*
querc. ℥ij. coq. in aq. font. ℔iv. ad dimid. sub fi-
nem addendo cort. granat. contus. ℥j. flor. rub.
granat. ana Mij. deinde add. vin. rub. ℔ss. cola-
tura sit pro fotu. „ *Pessi suberei* syndone involuti
„ interdum adhibentur. Interna sint *Rhabarba-*
„ *ram, calomel, chalybeata & amara*, & ut ver-
„ bo

„bo dicam remedia ad cachexiam & fluorem al-
 „bum. Decubitus in lecto ad aliquot septimanas
 „nonnullas hoc malo liberavit. „Abscindi po-
 „test imminente Gangrena, de qua operatione con-
 „sulantur scriptores chirurgi. „Utcunque recor-
 „dandum est peritissimi Barbetti effatum. Ute-
 „rum (inquit ille) sine vitæ periculo posse ex-
 „scindi, quemadmodum multi medici scribere
 „ausi fuerunt, perito anatomico intolerabile cen-
 „setur.



C A P. X V.

Sive Fasciculus Morborum decimus quintus.

M O R B I I N F A N T U M
in genere.

Harrisii sententia.

Art. 1504. **T**emperies infantum humidissima *Infantum morbi ab una causa nempe acido plerumque oriuntur.*
 est, & morbi eorum universi e-
 jusdem generis sunt, & ab una eademque causa
 ut plurimum producuntur: quemcunque enim af-
 fectum pati deprehenduntur infantes, hoc vel il-
 lo nomine insignitum, raro aut nunquam iis de-
 esse *faeces acidum redolentes*, & maxime ab initio
 ructuum acidorum copiam observare potui; ergo
 symptomata infantum singula, *acido*, ut parenti,
 ortum suum debent. „ *Ἄρα ὁξύς χυμός ἀντίτ'δεῖος*
 „ *τῶν λοιπῶν μάλιστα ἐστὶ* (inquit Hippocrates de vet.
 med.)

Art. 1505. Facillime in morbos dilabuntur in- *Diagnosis morborum quibus cri- teriis in- vestigan- da sit.*
 fantes, & nisi imperitius tractentur, facillime
 in sanitatem restituuntur. Percunctandum est, an
 nausea & vomitu, & quandiu laborarint, an lac
 vel cibum coagulatum ejecerint; an importuni

vagitus, vigiliæ & inquietudo torminibus ventris eos excruciaci indicarint; an ructus acidi vel singultus emittantur; an tussis adsit; an fæces vel pauciores quam par est, vel frequentiores fuerint; quo colore demum inficiantur, an albidæ, viridescentes, vel bile sint admodum saturatæ; an sitiant & febricitent; an sint ulcuscula in ore (*Aphthæ diætæ*;) an iis solemnis sit icor depluens pone aures; an epileptici sint; an tempus sit dentitionis; an tumescat abdomen; an color sit ictericus, vel phlegmonoides, &c.

*Nulla
pulsus
aut urina
habenda
est ratio.*

Art. 1506. Totidem sunt, quæ infantum pulsum accelerant, vel alias immutant, ut sententia exinde lata ut plurimum fallax futura sit. Urinæ infantum sanitate recta gaudentium sunt crassissimæ, adeo ut fere nulla exinde exsurgat indicatio.

*Causa
procatar-
ctica mor-
borum in-
fantilium*

Art. 1507. Causæ procatarcticae morborum infantilium sunt variae, nimirum interdum præexistunt diatheses morbosæ hæreditariæ a principiorum generationis conditione ac statu deductæ, aut a matre gravida plurimum pendentes; post has, causæ eorum affectus propius respicientes ad quatuor capita referri possunt. 1. Ad *frigus susceptum* quod affectibus febrilibus infantes disponet, &c. 2. *Nutricis lac magis crassum*, quod debetur vel intemperantiæ lactantis circa liquores spirituosos, vel circa amplexus venereos (unde moventur menses,) vel passioni hystericae, si nutrix sit hysterica. 3. Ad *præmaturam carniū deglutitionem*, quæ cruditates parit, exinde lumbrici & plurima incommoda. 4. Ad *potum liquorum spiritibus abundantium* concessum. Venter infantum, a quacunque causa id primario pendeat, in acidam intemperiem nunquam non facessit, unde fit, quod alimentum suum nequaquam in homogeneam chyli substantiam rite conteratur, verum in quoddam coagulatum transeat, ex quo morbi fere omnes iis contingunt; quodque istiusmodi coagulatio aut cuipiam aciditatis gradui iugiter inni-

CAP. XV. *Infantum Morbi in genere.* 515

innitatur, aut saltem exinde proficiscatur multo sæpius, quam ab alia quavis causa, luculentissime constabit, si quæ sensibus ipsis, aut demum curationi (quæ acidum obtundentibus, & coagulationes solventibus optime instituitur) fides certo adhiberi possit.

Art. 1508. Saltem si omnimodo vera non sit nostra hypothesis de acido in omnibus puerorum affectibus prædominium habente, votis nostris abunde sufficiet, si per *testacea & remedia absorbentia* dicta curationis methodus efficacior ac certior, quam ea, quæ hætenus passim obtinuit, evadat (quod experturo facile patebit.)

Hypothesis de acido confirmatur ex curationis methodo per absorbentia.

Art. 1509. *Corpulenti & obesi infantes*, pituita diffuentes, verticis regionem mollem (pulpæ ad instar tremulæ) & apertam, quam dicunt, Anglice *an open Mould*, ab anteriore ad posteriorem cranii suturam persæpe excurrentem diutius retinentes, Rachitidi, tussi convulsivæ, aphthis difficulter cedentibus, ac tandem scrophulis maxime sunt obnoxii. *Macilenti & strigosi* sunt omnium tenerissimi, acerrimo calore aduruntur, & in febres pessimi moris, hoc est, summe inflammatorias (pro ratione ætaturæ) & nervoso generi adversas, sunt ut plurimum proclives. — Pueri ex matribus hystericeis, teneris, morbosis, &c. orti a graviori aliquo morbo difficilius convalescunt.

Prognosis ex conformatione & corporis habitu, &c.

Art. 1510. Quod ad infantilium affectuum curationem attinet, in genere semper eorum imbecillitatem naturalem præ oculis habere imprimis oportet; & eligenda sunt medicamenta, quæ tenerissimis maxime conveniunt: etenim quo mitiora ac tutiora sunt remedia, quæ adhibemus, eo certius ex animi sententia succedet eventus.

Curatio :

Art. 1511. Quod ad *venæsectionem* puerorum attinet, quamvis materiæ febrilis in pulmones metastasis insignior, & tusses convulsivæ eam in minimis infantibus quandoque exigant, tamen

Phlebotomia raro necessaria

516 *Infantum Morbi in genere.* CAP. XV.
aperte constat eam non esse medicinam iis natura consentaneam, neque magis huic tenerimæ, quam decrepitæ ætati accommodam. Et proinde minime necessarium duco ejus auxilium implorare in quibuscunque infantum affectibus, nisi in *tussibus istis convulsivis*, vel ubi *febrim* subito exortam *tussis importuna* concomitari solet: vel in *contusionibus* gravioribus, quæ nonnunquam contingunt.

Ettmulleri sententia.

*Vires
mercurii
dulcis &
auri ful-
minantis.*

Art. 1512. In infantum cura latet quid singulari re in *mercurio dulci*, sed adhuc melius est *aurum fulminans*, dosi lactantibus est gr. j. vel gr. iij. pro dos. ij. horrendas dejectiones efficit, interdum etiam vomitus movet. In epilepsia, asthma- te convulsivo, torminibus, convulsionibus, &c. *Aurum fulminans* est sacra anchora. p. 1177. & 1179.

*De meco-
ni purga-
tione.*

Art. 1513. Infans recens natus purgetur cum *ol. amygd. dulc.* & *syr. violar.* vel de *rhabarbaro*, vel e *spin. cervin.* quod est optimum, idque toties, & tam diu repetatur, donec liberetur a sero mucilaginoso ventriculum occupante, & a *meconio* nigricante & spisso excremento in intestinis stabulante. *Colostrum* seu lac primum est alimentum medicamentosum, quod natura eum in finem generavit, ut modice nutriendo leviter pro infantis imbecillitate purget per aliquot dies.

Art. 1514. „ *Syrupus flor. malorum persicor.* est „ optimum, lenissimum, ac tutissimum emeti- „ cum pro infantulis; alvum quoque blande la- „ xat. Infantibus recens natis apprime propina- „ tur loco *ol. amygd. dulc.* & *syr. violar.* dos. a „ *ʒij.* ad *ʒj.* Est medicamentum praxi moderna „ comprobatum.

EFFLORESCENTIA PURPUREA.

Etmulleri sententia.

Art. 1515. Infantes tertio vel quarto a partu die (aliquando tardius) *efflorescentia cutis miliaris purpurea* (Anglice *the Red-Gum*) affliguntur, quæ cito evanescit. Mulierculæ pulv. Gasconicum, confect. alkerm. crocum in vino generoso, &c. solent exhibere; ope medica raro indiget.

Efflorescentia purpurea.

FEBRES INFANTUM.

Harrisii sententia.

Art. 1516. Prima indicatio in curandis febribus est *acidum* rite præparare, quo melius id eliminetur; hoc autem necessarium videtur antequam humores acidi poterint cum *apoëta* expurgari: nam secundum *Hippocratem* cocta, non eruda, sunt medicanda; hæc præparatio, non aggre-dienda est sudoriferis proprie dictis, sed potius absorbentibus, scilicet, pulveribus testaceis; *salia volatilia*, aut *lixivialia*, aut *spiritus volatiles*, in tenellis non sunt usurpanda, utpote ipsorum ætatulæ tenerrimæ minus congruentia.

In febribus curandis dua indicationes humorum præparatio & expurgatio.

Art. 1517. Infanti anniculo febricitanti, aut torminibus (ut plerumque fit) excruciato in hunc fere modum succurrere soleo, quarta quaque hora exhibeo chartam pulv. testac. ex sequentium nonnullis, ocul. & chel. cancrorum, test. ovorum, ostrearum, concharum, os. sepia, cret. coral. corallin. margar. matr. perlarum, lap. bezoar. pulv. Gascon. spec. de hyacinth. &c. dosis circiter ℥j. cum julap. sequent. exhibere soleo, ℥. Aq. lact. ℥iv. ceras. nigr. ℥ij. pæon. comp. epidem. ana ℥ij. sacchar. perlar. q. s. m. f. julap. facillime variari potest formula, servata semper eadem intentione. Convenit interdum emulsio ex amygd. dulc. &c.

Methodus medendi.

ad

518 *Febres Infantum.* CAP XV.
ad sitim extinguendam, & humores contempe-
randos.

*Catharsis
instituen-
da.*

Art. 1518. Tertio die a quo sum advocatus, nisi variolæ, morbilli, aut febris scarlatina, caput attollant, purgandum esse præcipio, infantem unius anni in hunc tere modum: ℞. *Syr. de cichor. cum rheo* ℥ij. *rhabarb. elect. pulv.* gr. xv. vel ℥j. *aq. lact. alexiter. cinnam. ten. ana* q. s. ad diluendum, misce. Vel ℞. *Syr. de rhamn. cathart.* ℥ij. *pulv. diasen.* gr. viij. m. vel ℞. *Pulv. cornachin.* gr. vj. sumat in coch. *aq. ceras. nigror.* nullum vero medicamentum magis accommodatum est ætati puerili ac *rhabarbarum*. Ad vim purgationis accelerandam *crystal. tartar. genuin.* ℥j. aut ℥ij. in haustul. juscul. avenac. exhiberi potest, & catharsis repeti debet alia atque alia vice pro re nata. „ Sed oportet medicum cavere : „ *Febres etenim infantum tumoribus criticis ter-* „ *minari non raro aptæ natæ sunt, quales sunt* „ *phyma vel phygethlon sub mento parotis pone* „ *aures, &c.* Ideoque in isto rerum statu cathar- „ *sis omnino differenda est, & suppuratio promo-* „ *venda.*

*Quid fa-
ciendum
in sym-
ptomatis
dissonis.*

Art. 1519. In symptomatis *ἀνόποις*, ex summa humorum putredine oriundis sæpe ex usu est *Æthiopsis mineralis* gr. vj. (imo ad ℥j vel 3℥.) vel *mercurii dulcis* gr. iv. cum flor. sulph. tantundem admixta in syr. alicujus grati cochleari parvo, nocte catharsin præcedente exhibere. His rite peractis plerumque cessant graviora symptomata, vel saltem multum leniuntur, ut proinde in vado jam res sit, quæ in extremo discrimine paulo ante fuerat.

I C T E R U S.

Sylvii sententia.

Art. 1520. Icterus plerisque infantibus mox a ^{icterus,} partu solet supervenire, immo nonnunquam illo infecti nascuntur, adeoque ipsius causam quandoque ante nativitatem in se continent; probabile est, quod ab humore glutinoso, pituita scilicet viscosa, ortum ducat. Existimo in his infantibus icterum saepe fieri posse absque ductus biliarii obstructione, a bilis scilicet spirituositate, & ideo ad effervescendum ineptitudine.

Art. 1521. Omnia remedia icterum curantia in- ^{Curatio.} fantibus non ita tuto exhibentur, quam adultioribus; pulvis sequens ex lacte materno exhibitus semel aut bis in die intra paucos dies icterum infantum curare solet, *℞ Pulv. croc. angl. bezoar. min. ana gr. j. m.* quoties alvus est adstrictior commode sollicitatur ac laxatur *rhabarbaro*, ac imprimis *syrupo de cichor. cum rheo*; prodest etiam *pulvis viperarum* (item *millepedes*, *sal succin. &c.*)

Art. 1522. „ Rara est mentio hujus affectus in ^{Plures} „ practico- rum libris, nihilominus tamen plures ^{hoc mor-} „ sane infantuli recens nati hoc morbo intere- ^{bo pereunt.} „ unt, ex muliercularum plerumque negligentia; „ ajunt enim, flavescent, & morientur, neque „ ullas suppetias aut quærunt aut explorant.

T O R M I N A V E N T R I S.

Etmulleri sententia.

Art. 1523. Tormina ventris frequenter mirum ^{Tormina} in modum affligunt recens natos, continuo plo- ^{ventris.} rant, pedibus calcitrant; crepitus copiosi emittuntur, excrementa sunt viridia; sunt plane motus convulsivi intestinorum; aliquando Hernia producitur.

Curatio. Art. 1524. Præmissis enemate & aliis laxantibus & pulveribus absorbentibus, sperma ceti cum ol. anisi est egregium; externe ol. cham. & rut. cum gutt. aliquot ol. anisi, junip. nuc. moschat. cui addi potest fel. bubul. q. s. pro linimento. *Enema ad tormina Fulleri.*

N. B.

Art. 1525. „ Hoc duntaxat serio admoneo (inquit *Harris*) tormina omnia, inquietudines, „ & vigilias infantum testaceis apte exhibitis æque „ certo demulceri, ac dolores ac vigilias adultorum ipsis narcoticis ad tempus tolli.

V O M I T U S.

Ettmulleri sententia.

Vomitus. Art. 1526. Vomitus est utilis in infantibus, ex quacunque causa oriatur, nisi sit nimius; in culpa est lac frequentissime.

Curatio. Art. 1527. Si sit nimius & discolorata rejiciantur, clyisma injiciendum est, & per os carminativa, nux moschat. &c. sunt exhibenda; externe stomacho frustulum panis tostii in vino generoso madefacti & cum aromatibus conspersi applicandum, &c.

A L V I A D S T R I C T I O, & Diarrhœa.

Ettmulleri sententia.

Alvi ad. Art. 1528. Alvus infantum ordinario est laxa, *strictio.* saltem bis in die exonerari debet; adstrictio plerumque oritur ex vitio lactis vel pultis.

Curatio. Præter usitata laxantia in hoc affectu præstantissimum remedium est muscerda a N. ij. ad vj. pro ratione ætatis in pulticula exhibitæ; usurpantur etiam possunt linimenta laxativa ex colocynth. scammon. &c. „ In tenellis sufficit inunctio venuris „ cum butyro ante focum; item ablutio quotidia-

„ diana [clunium & femorum , cum aqua fri-
 „ gida .

Art. 1529. „ Diarrhoea infantum (inquit Har- Diarr.
 „ ris) non *astringentibus* aut *narcoticis* cohiben- rhea .
 „ da est , sed potius humores ferocientes cum pul-
 „ veribus *testaceis* compescendi sunt , & contem-
 „ perandi , ut demum *rhabarbaro* expurgentur .
 „ Dysenteria infantibus (inquit *Barbette*) sæpius Dysent.
 „ perbenigna reperitur ; illa enim ad menses ali- ria .
 „ quot quandoque afficiuntur sine quovis incom-
 „ modo , modo res naturæ permittatur .

A T R O P H I A I N F A N T U M .

Ettmulleri sententia .

Art. 1530. Macies & atrophia infantum ex de- Macies &
 negato nutrimenti transitu ab obstructione lacteo- atrophia
 rum & glandularum mesenterii accidit . Membra quomodo
 macilenta evadunt , venter tumet , & indurescit , fit .
 ut plurimum secessus liquidi & copiosi observan-
 tur ; causa ut plurimum est viscositas ingestorum ;
 periculosum est malum . „ Quotquot hoc affectu
 „ extinctos aperui (inquit *Dolaur*) in iis glan-
 „ dulas mesenterii tumidas & obstructas [reperi ;
 „ denegato enim sic nutrimenti transitu , neces-
 „ sario partes nectare suo rorido privantur .

Art. 1531. Alimentum debet esse tenuissimum Curatio .
 & subtilissimum ; conveniunt *volatilia* & *martiata*
mitiora ; externe linimentum ex *gum. ammoniac.*
 &c. „ Marasmus seu extenuatio infantum (inquit
 „ *Sydenhamus in sched. mon. p. 55.*) quasi phthi-
 „ sica curatur exhibitione *infus. rhabarbari* in
 „ cerevisia ten. quod ipsum ego quoque aliquo-
 „ ties expertus sum . *Reusnerus* affirmat *Hillerum*
 „ infantes atrophia laborantes cum *tussilagine* ad
 „ instar homini frixa frequenter restituisse . (Suc-
 „ cus quoque ejusdem plantæ est maxime effi-
 „ cax .)

Art. 1532. Pro aridura partium valde commen-
 datur

Aridura datur arcanum aluminis Fœlicis Vvurzi p. 473. *partium*. valet etiam unguentum ad atrophiam ut & remedia ad *Rachitidem*.

TUSSIS CONVULSIVA.

Ettmulleri sententia.

Tussis convulsiva.

Art. 1533. Frequens est tussis infantum ferina, in qua multum ac diu tussunt, donec per vomitum rejiciant muscosum quid ex ventriculo, postea ad tempus cessat per dimidium præter propter diem, tum revertit simili modo. Ex ventriculo oritur, ut etiam *asthma infantum*, quod est anhelosa & sibilosa respiratio. „ Tussis infantum „ (ut recte observavit *Vvaldschmidius*) est fere „ semper *stomachalis*. „ Materia acida, mucilagi- „ nosa & tenax (inquit *Dolæus*) in ventriculo „ hospitans sæpissime est causa hujus affectus; in- „ terdum vero causa ferox advenire videtur, & „ nihil aliud esse, quam sal quoddam mediante aere „ corporibus tenellulis communicatum lympham- „ que coagulans, a qua acriori & stagnante vel „ præterfluente larynx afficitur, unde *tussis illa* o- „ ritur *convulsiva*. Frequentissime infantibus ac- „ cidunt *catarrhi* cum stertore in pectore a quo „ malo plures intereunt; febricitant enim, & suf- „ focantur; quare muniendi sunt infantes ab aere „ frigido; si enim ventis frigidis exponantur ex „ incuria nutricum vel matrum, facile in hunc „ morbum incidunt, & dein difficulter curantur.

Curatio. „ *Art. 1534.* Quoad curam hujus tussis furibun- „ dæ semper ad stomachum erit respiciendum; abs- „ que vomitu vix curari potest, cum eo tamen fa- „ cile depellitur, ut & *asthma* dictum; provocari „ potest cum penna oleo tincta, &c. Jusculum *rapa-* „ *rum* est mulierum euporiston, *sperma ceti* in jus- „ culo est egregium. „ Ingens solatium (inquit *Sy-* „ *denhamus*) adfert *venesectio* infantibus tussi „ convulsiva laborantibus, & remedia quælibet „ pectus.

*Catar-
rhus.*

*Venase-
ctio.*

„ pectori dicata longo post se linquit intervallo
 „ *method. p. 207. Phlebotomia & repetita catharsi, Catharsis*
 „ eaque sola expugnatur hæc tussis, sed leniora
 „ cathartica hic conveniunt, eaque sunt cochlea-
 „ tim ingerenda pro ratione ætatis *Ep. p. 29. Po-*
 „ tus & alimenta liquida (inquit *Vvillisius*) in
 „ quantitate solito minori sumantur, istius vice
 „ bochetum ex *sarsa, chin. santal. ras. ebor. C. C.* *Decoctum*
 „ cum ingredientibus diureticis & antispasmodicis *e lignis.*
 „ usurpetur; decoctum vel syr. ex castor. & croco
 „ item decoct. rad. pæon. mar. visc. quercin. hyssop.
 „ multos juvarunt.

Farrago sententiarum.

Art. 1535. Caro murium frixorum comesta
 vulgo specificum audit; sed super omnia muscus
 pyxidatus, quocunque modo sumptus, est reme- *Remedia*
 dium probatissimum, & raro fallax. Decoctio ex *nonnulla*
 musco arboris (inquit *Baglivius*) præsertim a quer- *alia.*
 cu pendente omnium præstantissima est, ut nos
 experti sumus, valet quoque in aliis morbis con-
 vulsivis *Aurum Mosaicum* (in aliis morbis con-
 vulsivis maxime efficax) in paulo ætate provectio-
 ribus tentari meretur, ut & ol. sulph. per campan.
 serum lactis recens a caseo pro potu ordinario
 bibatur. Expressio millepedum ad pertussim, iulap.
 moschat. syrupus ad tussim convulsivam, &c. quan-
 doque cum fructu usurpantur. 24. Milleped. in
 vin. alb. demers. q. v. exprime succum, & add.
 sacchar. alb. q. s. & f. s. a. syrupus; hic syrupus
 cochleatim sumptus (inquit *D. Cheyne in tracta-*
tu de Arthritide p. 116.) Tussim convulsivam in-
 fallibiliter tollit.

EPILEPSIA.

Vvillisi sententia.

*Epilepsia
quando
potissi-
mum ac-
cidit & a
qua cau-
sa.*

*Signa
præagi-
entia.*

Curatio :

Art. 1436. Epilepsia puerorum circa duo potissimum tempora in pueris convulsionibus maxime obnoxiiis reperiri solet, viz. intra primum a partu mensem, & circa dentium eruptiones; quam hujus morbi insultus etiam aliis temporibus, & quibusdam aliis de causis, non raro eveniant; cujusmodi sunt nutrix invaletudinaria, aut prægnans, lac in ventriculo coagulatum, aut in putrilaginem acidam aut amaram degenerans, intemperies febrilis, capitis aliarumque partium ulcera, aut exanthemata, subito evanescentia, acris mutationes, lunationis periodi, &c., Quando in infantibus (inquit *Dolæus*) frequentes oscitationes, pandiculationes, oculorum & palpebrarum leves motus, manuum commotiones, brachiorum extensiones, pavores & tremores, vigilias nimias observamus; epilepsia timenda est, quia sunt ejusdem prodromi.

Art. 1537. Antispasmodica medicamenta nutrici exhibeantur; sumat mane & vespere rad. *Ossem. pæon. mar. Ossem. scænic. dulc.* in haust. ser. lact. coct. Linimentum sequens circa nares, tempora & cervicem infantis epileptici usurpari potest, *℞. Ol. capivi, castor. ana ℥ij. succin. ʒß. m.* nuper mihi retulit medicus eruditus se novisse plures hoc remedio curatos, viz. *℞. Fol. cham. minutim incis. Mij.* includantur in duobus sacculis a lino tenui aut serico confectis, qui lacti calido intincti & expressi abdomini successive applicentur. *Untzerus* valde commendat fel catelli lactantis nempe ut totus succus cisti fellea exemptus puerulo cum pauca aq. flor. tilie propinetur.

Harrisii sententia.

Art. 1538. Ad convulsiones seu insultus epilepticos tollendos apprime etiam valent *pubverestestacei*, maxime si *castoreum* iis adjiciatur. In convulsionibus quamplurima pro specificis vulgo habita tam ab auctoribus gravissimis quam a practi-
 cis celeberrimis decantari solent: veruntamen virtutes eorum (quantum observare licuit) nostram de se expectationem videntur vix ac ne vix quidem explevisse. In paroxysmis infantum convulsivis, utpote a torminum prægredientium materia acri nervos omnes vecillanti jugiter obortis; ea, quæ *acidum* obtundunt, contemperant, aut infringunt, idque sine corporis novo æstu aut calefactione, quæque aciditatem sic infractam atque aculeis orbatam *per inferiora* deducunt, post alia infinita incassum tentata, veras continere vires huic symptomati horrendo debellando pares tandem agnoscentur.

Ad convulsiones testacea optima remedia.

Ettmulleri sententia.

Art. 1539. Epilepsia infantum plerumque ex his sex causis originem ducit. 1. A meconio retento 2. A lactis vitio. 3. A dentitione difficili. 4. Ab immoderato animi affectu nutricis. 5. Ab excrementis cohibitis. 6. A lumbricis.

Causæ

Art. 1540. Mirabilis est vis *sulphuris antimonii* & *auri fulminantis* in epilepsia dos. gr. j. vel in imbecillibus gr. iſſ. pro dos. ij. cum aliis appropriatis. (1512.)

Aurum fulminans.

„ *Ol. succin. gt. ij. vel iij. cum pari quantitate*
 „ *spiritus vitrioli in aq. ceras. nigr. exhibiti pue-*
 „ *rulos a paroxysmo statim plerumque liberant;*
 „ *sed præ omnibus quotcunque mihi hætenus in-*
 „ *notescunt oleum sulph. per campan. hunc mor-*
 „ *bam in infantibus præcipue primo mense felix*
 „ *citer*

Alia remedia.

„ citer expugnat; sumi potest in julapiis cephalicis ad sufficientem aciditatem. *Pulvis de gut.*
 „ *tet.* utilis est ad præcavendam recidivam.

D E N T I T I O.

Hippocratis sententia.

Dentitio.

Art. 1541. Ad dentitionem accedentibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, & maxime ubi caninos dentes producant, & iis qui inter pueros sunt crassissimi, & qui alvos duras habent. „ De plumis exeundis & novis nascentibus (inquit *Lister* in locum) idem „ gravis dolor atque febricula a vibus contingit; „ unde mutæ sunt, & canere desinunt. Idem quoque „ erucis in veteribus cuticulis deponendis accidit. *Germen dentis* (inquit *Dolæus*) in maxillis est instar albuminis ovi, mucosi & tenuis, in cellulis eorum contenti, quod de die in diem durius redditur, usque dum illa materia indurata gingivam perumpat: in hac perruptione miseri tenelli plurimis affliguntur symptomatibus: adsunt enim comites gingivarum pruritus, superflua caro, vesiculæ, fungi, maxillarum inflammationes, terrores, insomnia, vigiliæ, salivatio, vomitus, epilepsia, pavores, diarrhœæ, febres, convulsiones gingivarum, tubercula, dein abscessus, & non raro mors ipsa.

Modus eruptionis.

Tempus eruptionis.

Art. 1542. „ Licet nihil certi (inquit *Bonetus*) de termino eruptionis dentium statui queat, „ quippe in quibusdam citius, in aliis tardius „ prodeunt; tamen communiter observatum est „ dentes successive biennii spatio exire; ita ut „ primo septimo mense incisores, deinde maxillares tum 15. aut 17. mense canini vel oculares prorumpant. (Vide *Art. 1544.*)

Har-

Harrisi sententia.

Art. 1543. Nullus affectus infantibus tot gravia symptomata prognerare solet, quot dentitio difficilis & laboriosa; inter dentiendum enim ex inflammatione gingivarum non raro oriuntur tormina ventris, vigiliæ, inquietudines, profluvium alvi aut ejusdem constipatio, dejectiones & vomitus virides, aphthæ, febres, convulsiones, &c. Atque hæc accidentia (ut recte observat *Baglivius*) vitio solidi tantummodo succedunt, solidi nempe gingivarum irritati, puncti, crispatique a quibus ad intestina oscillatione producta graves oriuntur diarrhoeæ, quæ si non venerint, pejora veniunt mala (antedicta.)

Symptomata varia inter dentiendum.

Art. 1544. Dentitionis tempus est duplex; unum, quo dens osse maxillari primum emergere nititur, & quo gingivæ pars externa & superior absque aliquo ejusdem tumore, albido quodam circulo circumscribi ut plurimum solet; alterum est, quo dens mole jam auctior gingivam tumidam reddit, atque eam perumpere omni vi conatur, atque hoc solummodo postremo casu quandoque licet gingivas incidere. Quatuor, quinque vel sex mensibus a nativitate elapsis dentes ordinario incipiunt erumpere, primo incisores, deinde canini, & postremo molares; circa seprimum ætatis annum nova series producitur, & circa vigesimum primum dentes sapientie dicuntur. (Vid. *Art. 1542.*) Nonnulli, licet paucissimi, cum dentibus aliquot eruptis nascuntur. Ego novi foeminam sine dentibus, non modo in infantia, sed per totum vitæ stadium edentulam mansisse.

Duo dentitionis sunt tempora.

Art. 1545. Symptomata dentientium universa eidem fere methodo, remediis nempe acidum absorbentibus, & contemperantibus, ac deinde leniter expurgantibus plerumque cedunt.

Curatio.

Art.

Nota bene.

Art. 1546. „ Ordinario copiose salivant infantes dentibus erumpentibus, & adest plerumque diarrhoea; hæc si eveniant, bene præfagiunt: quocirca commode fricandus est dens erumpens cum folio tabaci circa nutricis digitum obvoluto & cerevisia parum madefacto, quod salivam & alvum leniter movet. Alvus lubrica perpetuo fervanda est; & si adsint convulsiones pulvis sequens *Vvillisi* locum habet, ℥. Ocul. cancr. margar. preparat. coral. rub. ana ℥j. ol. sulph. quantum pulvis imbibendo excipiet f. pulvis. Spiritus C. C. (inquit Sydenhamus in sched. mon. p. 54.) ut ut tritum & plane contemptum remedium (dos. gt. iiij. vel iv. in aq. ceras. nigr.) præ cæteris, quæ mihi innotescunt, medicamentis votis respondet in dentitione laborantibus. Convulsiones hinc oriundas minuta spiritus C. C. dosis foeliciter tollit (inquit Boerhaave.) In ventris torminibus ap- prime convenit enema ad tormina Seq. ℥. Cretæ pulv. ℥ss. herb. rut. flor. cham. ana Mss. coq. in q. f. aq. font. ad ℥iv. colatur. add. tinct. castor. dia-scord. ana ℥ij. syr. de mecon. ℥ss. ol. anis. gut. x. m.

L U M B R I C I.

Ettmulleri sententia.

Lumbrici.

Art. 1547. Lumbrici sponte prodeuntes vel per alvum vel per os raro sunt sine periculo; nam malignitatem in morbis denotant, unde fuga sibi volunt consulere. Authores practici studiose mo- nent in omnibus affectibus infantum curandis, imprimis obstructionibus semper ad lumbricos esse attendendum.

Signa lumbrico- rum.

Art. 1548. Primaria signa lumbricorum sunt in ore copiosa saliva jejuno stomacho, scalptura- narium, pavor in somno, stridor dentium, ven- tris tumor, tussis sicca, sitis, alvus lubrica, tor- mina

mina ventris jejunis, rubor & pallidor faciei alternatim.

Art. 1549. ℞. Argenti vivi ℥j. coq. in aq. simplic. (vel quod melius est in decoct. alb.) ℔ss. vel probe agitentur invicem in lagena vitrea post subsidentiam Mercurii decantetur liquor, & detur infantibus pro potu ordinario. Est experimentum certissimum ad enecandos lumbricos. „ Eiusmodi quoque est medicamentum istud per universam Italiam celebratum. ℞. Argent. viv. ℥j. infund. per noctem in aq. galegæ ℥j. decantetur liquor & propinetur mane. Boyle. „ Externe utile est linimentum sequens, ℞. Aloe ℥ij. myrrh. ℥ss. (ol. absynth. gt. vj.) fel. taurin. q. f. m. f. linimentum, cui addi possunt ad acuandum ol. colocynthidos guttæ aliquot: de aliis vermifugis alibi (684.) „ Cinnabaris nativa est remedium valde efficax, ac tutissimum, vermibus necandis. Pulvis Stanni, nempe stannum calcinatum est adhuc efficacius medicamentum, & fere inter specifica censetur; hinc pulv. vermifugus sequens Quincii. ℞. Stanni calcinat. musc. corallin. sem. sancton. ana ℥j. sabin. croc. ana ℥j. m. f. pulv. dos. a ℥ss. ad ℥j. alvum non movet. „ Author in ejusdem laudibus copiosior est; vid. locum. Emplast. vermifug. Batean. & Syrupus vermifugus ejusdem interdum usui esse possunt. „ In extremis utor aliquando Hydrargyro (inquit Chesneau) quod in vermibus necandis non habet simile. Ad pisi magnitudinem ex cochleari cum lacte parvulis sine noxa propinare soleo.

Art. 1550. Crinones seu comedones sunt vermiculi subcutanei infantes ad atrophiam disponentes; occupant plerumque loca musculosa, imprimis dorsi, scapularum humeri, crurum ac surarum; pruritum molestum excitant, indeque inquietos & vigiles reddunt infantes, tandemque in tabem adducunt. Cum lotione mercuriali sunt enecandi. „ Hi forte sunt vermes, quos Aetius describit, &

Remedia
ad lum-
bricos.

Crinones
seu come-
dones.

„dracunculos vocat; Æthiopes & Indos quan-
 „doque infestare solent; rarissime apud nos in-
 „veniuntur.

R A C H I T I S.

Boerhaavi sententia.

*Rachitis
 est morbus
 novus.*

*Methodus
 medendi.*

Art. 1551. Medio fere labente seculo decimo sexto in *Mediterraneis Britannia* primo, deinde per totam *Germaniam*, denique & per omnia *Europæ borealis* loca, ortus est morbus novus, hodie frequentissimus, qui *Rachitis* appellatur; infantibus nunquam connatus est, raro ante nonum ætatis mensem, vix unquam post biennium vitæ, sed spatio hoc medio frequens accidit.

Art. 1552. Curatio optima fit cibo levi, eupepto, sicciori, minus pingui, aromatibus mitioribus condito, sape dato & copia moderata. Potu paucò, meraco ex cerevisia, imprimis non veteri quidem, at diu cocta ac spissa; aere sicco, & calidiusculo; vestitu accurate sicco, ex lana confecto; gestatione, concussione, oscillatione, unctione in rheda; frictione multa, calida, sicca pannis fumo aromatum persusis instituta maxime ad abdomen & spinam; cantharidum iterata quandoque applicatione; vomitoriis lenibus aliquoties cum prudentia repetitis; purgantibus deinde roborantibus per aliquot dies successivos adhibitis; denique usu diu continuato medicamentorum roborantium, exsiccantium, antiscorbuticorum, & spiritus excitantium.

Psuchrolusia.

An immersio in aquam frigidam prodest? „Immo *psuchrolusia* in hoc affectu est valde efficax, „ut ex quotidiana experientia docemur, de qua „videatur *Floyer*, p. III. 145. 222. &c.

Glissonii sententia.

*Signa
 diagnost.*

Art. 1553. Signa diagnostica rachitidis sunt laxitas & mollities partium, debilitas & languor, ignavia & torpor; est in hoc affectu inæqualis par-

partium nutritio: caput justo majus, facies plenior & floridior, partes carnosæ infra caput in progressu morbi magis magisque indies extenuantur; adsunt protuberantiæ quædam, & nodi circa nonnullos articulos, maximeque in carpis conspicuæ, paulo minus in talis observantur; similes quoque tumores in costarum extremitatibus, quibus cum sterni cartilaginibus committuntur; ossa nonnulla incurvantur, præcipue tibiæ & fibulæ, hinc ossa ulni & radii, sed paulo minus & infrequentius, aliquando etiam ossa femoris & humeri; aliquando decurtatio quædam ossium, & deficiens eorum accretio secundum longitudinem; demum irregularis quædam capitis protuberantia, maxime ossis frontis antrorsum huc quoque referri potest; dentes tum tardius tum molestius erumpunt, levi occasione vacillant, aliquando nigrescunt, aut etiam frustulatim excidunt; pectus in ulteriori morbi gressu a lateribus angustius redditur, anterius acuminatur; adest quoque subtumida quædam abdominis repletio & hypochondriorum tensio; frequenter etiam tussis, respiratio difficilis multaue alia pulmonum vitia inducuntur. Hoc morbo afflicti sæpe lateralem decubitus modo dextrum modo sinistram averfantur ob coalescentiam pulmonum cum pleura vel tumorem in adverso latere.

Art. 1554. „ Interius hepar justo majus est,
 „ ventriculus & intestina in majorem molem as-
 „ surgunt; mesenterium glandulis justo majori-
 „ bus, si non strumis afficiatur; pulmones in-
 „ farcti & tumidi cernuntur, nonnunquam pu-
 „ rulentis strumosis & pleuræ adhærentes. Venæ
 „ jugulares & arteriæ carotides solito ampliores;
 „ denique partium fere omnium enervatio, item
 „ torpor quidam & ad motum segnities. Hic af-
 „ fectus plerumque ex se non est mortalis: non-
 „ nunquam tamen ingravescentibus symptomatis
 „ in tabem, hydropem pulmonum, aut ascitem de-

*Partes
 interna
 affecta.*

Prognosis.

„ generat; quo citius a partu ægrum invadit, eo
 „ periculosior est, quo major morbus eo dete-
 „ rior. Qui ante annum quintum non curantur,
 „ postea per totum vitæ spatium valetudinarii
 „ sunt. Scabies aut pruritus huic morbo superve-
 „ nientes ad curationem multi conferunt. Ma-
 „ yovv.

Remedia
 simplicia.

Art. 1555. Materia medica in hoc affectu sunt
 herbae omnes capillares, imprimis tricomanes, ra-
 dix osmund. regal. gemma dum vix erumpent fili-
 cis maris, lingua cervina, veronica mas, ruffila-
 go, radix rubiae tinctorum, curcum, sarsaparilla,
 chin. lignum guaiaci & ejusdem gummi, chalybs,
 sperma ceti, vermes terrestres, millepedes. Rha-
 barbarum præ aliis simplicibus commendamus;
 est enim medicamentum moderate calidum & sic-
 cum, spiritibus insitis omnium partium satis fa-
 miliare & amicum, torporem spirituum benigne
 excutit, mollitiem laxitatemque partium firmat,
 internam lubricitatem nonnihil corrigit; pulsus
 ad artus evocat, calorem externarum partium lau-
 get, internarum & imprimis earum, quæ nutri-
 tioni inserviunt, vigorem & activitatem fovet;
 est medicamentum profecto omni ætati & com-
 plexioni satis tutum.

Laus
 rhabar-
 bari.

Curatio.

Art. 1556. Cathartica appropriata præcipue ex
 rhabarbaro debitis intervallis repetita in hoc mor-
 bo prosunt; fonticuli & vesicatoria sunt utilia;
 enema sequens est valde proficuum, ℞. Fim. equi
 non castrati. ℥ss. sem. anis. fœniculi malv. contus.
 ana ℥ss. flor. cham. p. j. conq. in q. f. ser. lact. in-
 colatur. ℥iv. solv. syr. violar. ℥x. sacchar. rub. ol.
 ros. ana ℥ss m, f. enema. De Frictione hoc ob-
 servandum est, abstinendum esse a frictione, qua
 parte ossa prominent, & liberalius fricandum es-
 se partibus eorum cavis; non continuandam esse
 hanc actionem ultra levem ruborem in partibus
 excitatum. „ Quantum valet frictio in hoc mor-
 „ bo, ut etiam de viribus ruffilaginis speciatim

De fri-
 ctione.

„ in

„ in hoc affectu & atrophia curandis: vide *Ful-*
 „ *leri medicinam gymnastic.*

Mayovvii sententia.

Art. 1557. Quandoquidem Rachitidis causa in *Methodus*
 obstructione spinalis medullæ nervorumque inde *medendi*
 oriundorum imbecillitate consistit, præcipuæ in-
 dicationes curatoria sunt; ut *nervi roorentur*,
 & *obstructiones tollantur*; in hunc finem venæse-
 ctio, vel sanguinis detractio per hirudinum su-
 ctionem, medicamenta cathartica, item digesti-
 va, diuretica, diaphoretica & specifica in usum
 vocentur. Enemata laxantia injici possunt, non-
 nunquam corroborantia *ex decoct. fimi equin. flor.*
rorismarin. &c. Enem. terebinth. cum expressione
milleped. viv. &c. Catharsis institui potest cum
rhabarbaro item cum *calomel.* Fonticuli insuper
 opem egregiam præstant, præcipue, si inter pri-
 mam & secundam colli vertebra excitentur.
 Præter specifica vegetabilia laudatur *ens veneris*,
 inventum nobilis *Boylei*, ut & *salia volatilia*,
elixir proprietatis, *balsamum sulphuris*, nonnun-
 quam etiam *chalybis* usus convenit, utpote qui
 virtute insigniter aperiente donatur, idemque non
 tantum concoctionem juvat, sed etiam viscerum
 tonum firmat roboratque: verum illius usus non
 sine cautione instituendus est: etenim in tussi,
 pleuritide, infarctu pulmonum, febre hectica, mor-
 bisque id genus aliis a chalybis usu omnino absti-
 nendum est. Ad abdominis intumescientiam se-
 quens fomentatio multum confert, nempe ægro
 in vase satis amplo collocato *hordeum fermenta-*
tum, quod in aqua cocta aliquandiu infusum est
 (ut in cerevisia conficienda fieri assolet) eidem
 circumcirca tepide apponatur, maneatque æger
 eodem pene opertus ad sudoris provocationem.

Art. 1558. „ Succus e limacibus cum testis pa- *Alia rē.*
 „ rum contusis exstillans, vulgo, sed perperam, *mediā.*

„ *oleum limacum* vocatus, in hoc affectu prouusu
 „ interno & externo valde celebratur, præcipue
 „ in infantibus hecticis & phthisicis. Virtutes &
 „ usus remediorum sequentium lector ipse expen-
 „ dat; *Flores salis armoniac. martiati Batean.*
 „ *Cerevisia ad Rachitidem, aq. limacum pectora-*
 „ *lis, emplast. spinale, linimentum spinale, om-*
 „ *nium Fulleri.* Consulatur etiam Sydenhamus
 „ *de Rachitide Epist. p. 148.*

A P H T H Æ.

Sylvii sententia.

Aphthæ.

Art. 1559. Aphthæ sunt ulcuscula (satis nota) totam oris superficiem occupantia, neque par-
 cunt œsophago, ipsive ventriculo, quantum con-
 jectura assequi possumus; ut plurimum albican-
 tes sunt, subinde flavescentes, quandoque nigri-
 cantes, quæ postremæ sunt periculosiores. „ Aph-
 „ thæ (inquit *Dolæus*) quæ vulgo, sed perpe-
 „ ram, *ulcuscula* judicantur, sunt revera *escharæ*
 „ quædam sed leviusculæ, quæ in summitate pu-
 „ stularum quarundam in ore, &c. oriuntur.

Causa & curatio.

Art. 1560. Aphthæ nobis videntur ortum habe-
 re ab acidis humoribus halitibusve ad os delatis;
 quocirca curatio consistit in acidorum humorum
 halituumque correctione ac emendatione, & in
 partium affectarum ab aphthis liberatione, mun-
 datione, ac consolidatione; *testacea & pulveres*
absorbentes primario indicantur, & postea le-
 niter expurgandi sunt humores *syrupo de cichor.*
cum rhubarb. „ *Mucilago sem. cydon.* (inquit *Ett-*

Remedia varia.

„ *mullerus*) cum succo *sempervivi majoris* sub-
 „ actus linimentum præbet non inconueniens pro
 „ illinendis aphthis; præ cæteris vero *succus ra-*
 „ *parum* super ignem vase recto sine aqua assata-
 „ rum expressus sine saccharo est optimus; egre-
 „ gium est *album græcum & spiritus sulphuris* cum
 „ *melle rosaceo.* In puerulis aphthis laborantibus

„ (in-

„ (inquit *Bonetus*) nihil est quod tam præsentia-
 „ neam afferat opem , quam *oleum raparum* cum
 „ paucis saccharo . Sequens valde commendatur
 „ a *D. Boyle* , & profecto votis interdum respon-
 „ det ; ʒ. *Succi semperviv. maj. mellis opt. ana*
 „ p. æ. coq. paulisper ad clarificand. deinde add.
 „ *alum. rup. q. s.* ad saporem mediocriter auste-
 „ rum M. cum pluma illinentur os & guttur sin-
 „ gulis horis vel sæpius . Author hoc remedium
 „ tanquam specificum venditat , *Decoctum corti-*
 „ *cis interioris ulmi cum paulo mellis rosacei* est
 „ revera optimum aphthis curandis gargarisma .
 „ Non debemus in hoc affectu (inquit *Dolaus*)
 „ proclives esse ad purgandum ; quia facile diar-
 „ rheæ sequeretur , quæ pessima est . Sed de aph-
 „ this plura alibi (1136.)

MORBI CUTANEI.

Art. 1561. „ *Crusta lactea* , scabies (1178.) Ti- Scabies ,
 „ nea (995.) &c. sunt affectus , quibus infantes &c.
 „ sæpius tentantur . Eruptionibus scabiosis fre-
 „ quenter infestari solent in variis corporis parti-
 „ bus , præfertim facies eorum sicca ac foedissima
 „ scabie incrustari solent . *Hildanus* monet hos
 „ affectus non temere curandos esse , sed potius
 „ naturæ aliquamdiu relinquendos , nisi pericli-
 „ tantur partes musculosæ & nervosæ subjacen-
 „ tes . Usurpare licet *leniter purgantia & alteran-*
 „ *tia , antimonium diaphoreticum , æthiops mino-*
 „ *ræ* , &c. sunt proficua .

Ettmulleri sententia .

Art. 1562. Pro his affectibus interne conve- Curatio .
 „ niunt medicamenta ex *fumaria , tinctura coral.*
 „ *Rob. sambuci , diaphoretica , viperina , cinnabaris*
 „ *antimonii , mercurius dulcis* . Crusta est *humida &*
 „ *manans* , vel *crassa & sicca* ; in priori casu insper-

genda est cum lapide calaminari preparato, turia, ceruss. flor. sulph. camphora, &c. In posteriori uti licet oleo amygd. dulc. cum guttis aliquot ol. tartar. per deliquium, vel bals. sulph. lixiv. vulgar. &c. est in usurpandis remediis ex nicotiana; mercurius dulcis est tutior quam reliqua mercurialia; sequens est unguentum non inelegans contra tineam, ℞. Litharg. ceruss. ana ℥ij. flor. sulph. mercur. viv. ana ℥j. ol. ros. q. s. Instituaturs cura tineæ decrescente luna. De his affectibus alibi (1178.) plura.

Head-mould-shot. and Horse-shoe-head.

Art. 1563. „ In catalogo nostro Londinensi septimanatim morientium duo insignia morborum nomina sive titulos invenimus, viz. *Head-mould-shot. & Horse-shoe-head*, quos medici scriptores neutiquam, quod scio, tractarunt; plures tamen infantes his affectibus obeunt, ut ex prædicto calculo constat.

Art. 1564. „ *Head-mould-shot* est affectus infantulis jugiter connatus, in quo ossium cranii margines ad suturas, maxime coronalem, alii super alios obvolvuntur, unde meningium fibræ tenduntur & distrahuntur, nec non cerebrum ipsum comprimitur, & infantes convulsionibus non raro corripiuntur.

Art. 1565. „ *Horse-shoe-head* est affectus in quo cranii futuræ sunt nimis patentes, & spacia dehiscencia inter ossium margines intercedunt, quæ hiulca quandoque non nisi annis aliquot supplentur. Signum est frequenter imbecillitatis ac brevis vitæ. Nutrices loca affecta spiritu vini vel spiritu sacchari perfricare solent, cui nonnullæ addunt albumen ovi & ol. palmæ.

L U E S V E N E R E A.

Harrisii sententia.

Art. 1566. Infantes a nutricibus lactantibus infecti, quanquam maculis pustulis ulceribusque sca-
rent, quanquam & nocturnis illis doloribus erunt excruciat
excruciati, facillime omnium restituuntur. *Fa-*
rina sarsaparillæ fere insipida, saltem nullo gustu
ingrato, panatellis aut pulticulis suis, ut par est
commista, addito etiam ventriculi gratia *santali*
citri polline, *cathartici* debitis intercalatis,
tenerrimæ ætati, ut læte nonnunquam observa-
vi, salutem perfectam reddidit.

Infantes
quomodo
curantur

P H T H I R I A S I S.

Ettmulleri sententia.

Art. 1567. Phthiriasis est morbus pedicularis, cui plerumque obnoxii sunt pueri: Abluatur caput cum *lixivio*, in quo coctum fuit *sem. staphisagr.* & inungatur cum linimento sequente, *℥. Ol. spic.* *℥ij. amygd. dulc.* *℥ss. unguent. nicotian.* *℥vj.* misce; pediculi omnes interibunt spatio unius noctis.

Morbi pe-
dicularis
curatio.

Art. 1568. „ Pulvis baccharum *Cocculi Indici* capiti inspersus certo certius pediculos interimit. „ *Condrochius* (qui peculiarem de iis tractatum scripsit) millies expertum in puerulis tradit hunc pulverem etiam in exigua quantitate cum adipe suilla vel pomo cocto & similibus permistum, & capiti appositum egregie pediculos interficere, & felicius, quam *staphidem agriam* tutiusque quam *hydrargyrum*.

Cocculi
indicus

Art. 1569. „ In adultis, pro pediculis cancro- sis inguina incolentibus necandis *sapo nigra* inun- „ eta est remedium infallibile, neque opus est ut „ aliud quodcunque exquiramus. *D. Turner lac.* „ *sublimat.* proponit; sed est medicamentum non „ adeo tutum genitalibus usurpandum.

Pediculi
inguina-
les.

Art.

TheBuggs

Art. 1570. „ Est animalculum quoddam foedissi-
 „ mum ac maxime invisum, cuius nemo Græco-
 „ rum vel Romanorum authorum, quod scio,
 „ meminit, nomine vernaculo a Bugg, civibus
 „ Londinensibus doloroso & venenoso morfu sa-
 „ tis superque notum, Ricino, insecto livido
 „ cruoris pleno, qui canibus, ovibus, & bobus
 „ valde infestus est, non multum dissimile est.
 „ Nescio an supradictus Pulvis cocculi Indici (Art.
 „ 1568.) circa spondas & stragulas conspersus hoc
 „ animalculum maxime detestandum interimeret,
 „ necne. D. Sharrv asseruit, quod, si locus de-
 „ morsus statim cum alumine rupeo saliva solu-
 „ to fricetur, virus illico suspendetur, & dolor
 „ evanescet.



C A P. XVI.

Sive Fasciculus Morborum decimus sextus.

TRACTATUS DE VENENIS.

*Ex pluribus, iisque optimis, scriptoribus, more no-
 stro collatio, non sine propriis aliquot symbolis,
 quibusdam in locis interjectis, concinnatus.*

Proœmi-
um.

Art. 1571. **V**itam hominum, quibus venenum
 aliquod illatum sit, in ancipiti
 esse & in angustiis versari experientia nimis fre-
 quenti satis compertum est, venenatorumque sym-
 ptomata nullam pati cunctationem, sed medelam
 citam ac promptissimam exposcere. Ideoque ne
 opusculum hocce manuale in tanta rerum præci-
 pitatione ac difficultate subsidio tam necessario pla-
 ne destituatur, schedulam hanc de venenis, tan-
 quam quid desideratum, adjeci.

Art.

Art. 1572. Utrum quidpiam in se & absolute *Venenum* *quid.* venenum sit, multum ambigitur: e contra omnia venena esse nec sine veneno quicquam existere asserere non dubitavit *Paracelsus*; dosis sola (inquit ille) facit, ut venenum sit, vel non: cibis enim vel potus quilibet quantitate majori æqua assumptus, attestante eventu, sæpius venenum fit, vel, quod ad idem redit, mortem violentam affert. Sed quum *de venenis* loquamur, intelligenda sunt illa, quæ in minutissima ut plurimum sui quantitate corporibus nostris insigniter nocent, eo nomine vocari.

Art. 1573. Venenum in genere definiri potest, id, quod intus assumptum vel extrinsecus admis- *Veneni* *definitio.* sum qualitate quadam vel agendi ratione corporibus nostris vehementer nocere aptum est: non enim est de veneni essentia, ut hominem semper interimat; sed satis est, si illum arcana quadam facultate vehementer lædat; posterioris generis sunt omnia illa, quæ *insaniam, stoliditatem vel fatuitatem* inducunt homines non penitus interficientia.

Art. 1574. Non est hujus instituti inani speculationi tempus impendere de variis venenorum *Venena* *quomodo* *perimunt* modis agendi, aut litem movere, utrum venena perimant *nimio calore vel frigore, vasorum erosione, vel humorum putrefactione, lancinante nervorum irritatione, vel vehementi spirituum animalium in furorem agitatione, &c.* est enim maxima varietas. Interim tamen operæ pretium erit id adnotare, quod scribit *Sylvius*; quamvis (inquit ille) acrimonia omnis sensum caloris producere videatur in partibus sensibilibus, reperiuntur tamen in nostris corporibus duo acria effervescentiam diversam producentia, tum calidam tum calore destitutam, non tantum sensui manifestam, & ideo ab invicem distinctam, sed diversis remediis cedentem. Si quis venenorum effecta & symptomata, quæ in homine solent excitare attentamente consideraverit, agnoscat illa omnia ortum suum

suum ac efficaciam debere alterutri vel utrique acri, cujus acrimonia vel patet vel latet; quoties patet veneni acrimonia, prompta est ipsius actio humorumque corruptio sentiturque confestim ejus noxa; quoties latet, lenta & tarda est ejusdem actio, humorumque corruptio, nec nisi paulatim observatur ejus noxa.

Venenorum duo genera.

Art. 1575. Quandoquidem duobus modis corpora nostra venenis afficiuntur, nimirum ore sumptis vel extra in corpus immixtis, de utrisque seorsim agendum est, & primo de venenis ore sumptis;

Signa veneni sumpti.

Art. 1576. Signa veneno intus assumpto supervientia sunt quæ sequuntur: ructus foetidi & mali saporis, mox pulsus & cordis motus insignis mutatio, virium lapsus, cordis angustia, palpitatio, lipothymia, syncope, interdum vertigo, visus obfuscatio, tremores, convulsiones, singultus, stupor, mordicatio & dolores, & quandoque erosiones ventriculi & intestinorum, sitis, urinæ suppressio, vomitus materiae pravae, interdum, & alvi profluvium, extremarum refrigeratio, sudores frigidi, linguæ intumescencia, labia tumefacta & nigricantia, ventriculi & hypochondriorum intumefactio atque extensio, interdum totum corpus intumescit & inflatur maculis passim in corpore erumpentibus, & postremo mors ipsa. Verum non omnia hæc symptomata in omnibus accidunt.

Prognosis.

Art. 1577. Magna est venenorum differentia alia aliis sunt magis perniciofa, alia citius alia tardius pro ratione quantitatis, qualitatis & reliquis eorum circumstantiis hominem enecant. Prognosis potissimum a copia & vehementia symptomatum petenda est, si idonea medicamenta statim adhibita fuerint, & ex eorum usu melius æger habeat, de vita non est desperandum. In convalescentibus vero sæpius accidit, quod a veneno maligna diathesis corpori imprimatur, quæ pertinaciter hæret, & longo post tempore sese exeret,

& diu.

& diuturnos ac periculosos morbos parit. Opinio ista vulgaris ficta est ac falsa, quæ Indos ab iisque Italos ita artem veneficam statuit calluisse, ut in statum diem aut tempus prædeterminatum, siue fuerit septimana, siue mensis, siue annus, venenatos omnes certo conficere possint: natura enim quibuslibet venenis huic aut altero æque totis viribus se opponit, & lethale virus reprimat aut frustratur.

Art. 1578. Quoad curationem venenorum in *Curatio.* genere indicationes communes sunt tantum duæ, nempe ut venenum per viam per quam in corpus ingressum est, (si possibile) revocetur & expellatur, & deinde ut idoneis alexipharmacis expugnetur. Ex natura & ratione alexipharmacorum & bezoardicorum, quæ magna ex parte cardiaca audiunt, proclives sumus conjecturam facere illa non proprie in venenum ipsum agere, sed saltem corpus roborare, ut ad venenum expellendum sufficiat, atque ita saltem per accidens in venenatis prodesse. Ex prædictis luculenter patet, quod danda sit opera, ut venena ore sumpta quamprimum e corpore evacuentur: atque ut id commodissime fiat per vomitum, vomitoria autem non debent esse fortiora acria aut corrodentia; sed leniora, & parata ex iis, quæ lentorem obtinent, & naturam mucilaginosam vel oleosam habent, quæ veneni acrimoniam aliquo modo obtundere possunt. In his casibus festinandum est nullaue interposita mora quæ ad manum sunt exhibenda. In hoc negotio, quod cunctationem non patitur, aqua tepida cum multo oleo permista reliquis omnibus quocunque viribus fere æquipollet; deficiente oleo butyrum ejus vices supplere potest; valent etiam juscula mucilaginosa & pingua, &c. Non autem satis est semel vomitum provocare, sed tamdiu is continuandus est, donec nulla amplius veneni in ventriculo indicia ex sapore, odore, nausea, dolore, & morfu deprehendantur. Si venenum a
ven-

ventriculo ad intestina descenderit, quod sæpius accidit, iterata clysterum injectione illuenda est alvus, & e veneno emundanda; purgantia quoque lenia propinanda sunt, ut intestina superiora liberentur, conveniunt *cassia*, *manna*, *rhabarbarum* & similia; utiles sunt *emulsiones ex amygd. dulc. sem. melon. cydon. gum. arab. &c. cum syr. de althæa*. Tandem si quæ reliquæ veneni in corpore supersint, a corde & visceribus avertendæ sunt & ad ambitum corporis pellendæ, & per sudores evacuandæ, quod alexipharmaca itidem præstant, & omnino utile & necessarium est ab alexipharmacorum usu non statim desistere, sed ea aliquamdiu continuare, donec maligna dispositio corpori impressa expugnata sit. *Theriaca Andromachi* contra omnia venena cujuscunque generis præ reliquis quotcunque remediis optimam esse *antidotum* jure merito communi suffragio censetur; sed majori solita dosi ad drachmas duas vel tres exhibenda est (inquit D. Harris in *Pharmacolog. Antiempir.* p. 285.) ab hac vero regula interdum declinandum est; nam de opio cauto opus est, quando cum venenis narcoticis rem habeamus. Interim instituendus est conveniens victus; lac in cibo & potu a quamplurimis authoribus valde commendatur; reliqui cibi sint pingues & unctuosi; utilia sunt iuscula glutinosa e pedibus vitulinis, rasuris eboris, C. C. &c.

Venenorum
divisio.

Art. 1579. Venenorum in specie divisio maxime naturalis a differentia corporum, quibus insunt, petenda est; existunt enim venena *vegetabilia*, *mineralia*, & *animalia*: ex his sufficiet eminentiora quædam tractare, unde ex istis exemplaribus ante oculos positis praxis de reliquis facili negotio derivari potest.

V E N E N A V E G E T A B I L I A.

Art. 1580. Ex plantarum classe *cicuta* & *aconi-* *Cicuta*
tum primas obtinent, utpote apud antiquos scri- *Aconi-*
 ptores frequentissime memoratæ. *Cicutam* plan- *tum.*
 tam esse venenatam foliis, radicibus, & succo
 expresso, pluribus exemplis passim apud authores
 probari potest. Folia interdum errore pernicioso
 loco chærefolii & petroselini colliguntur, & in-
 ter acetaria devorantur; radices pro pastinacis in-
 caute comestæ quosdam interemerunt; succum es-
 se exitialem ex *Atheniensium* consuetudine satis
 constat, qui mortis sententia damnatis propina-
 bant; ex hoc lethali pharmaco occubuisse dicitur
Socrates ille philosophorum sapientissimus; verum
 enim vero quodnam fuisset istud venenum *Atti-*
cum, an merus *cicutæ* succus, vel ex hoc & aliis
 pharmacis compositum, haud satis constat, quin
 in dubium vocari possit; sed hic non est disputan-
 di locus.

Art. 1581. Rationibus & experimentis depre- *Cicuta*
 henditur *cicutam* esse calidam & acrem (quod *calida* &
 contra universæ antiquitatis suffragium *doctissimus* *acris.*
Vvepherus indubitate comprobavit) suisque acu-
 leis membranam nerveam potissimum ventriculi
 ferire ac fibras ejus ad violentam constrictionem
 irritare, unde tum ob vellicationis vehementiam,
 tum ob constrictionis atrocitatem maxime circa
 orificia ventriculi, ubi nervi insigniores dissemi-
 nantur, præsidem systematis nervosi in furorem
 agit, unde convulsiones, &c. & cerebrum & cor
 in consensum rapiuntur.

Art. 1582. Affectus *cicutæ* intus sumptæ sunt *Effectus*
 præcordiorum & ventriculi dolor cum sensu pun- *cicuta in-*
 ctionis & ardoris ibidem, quasi temulentia ali- *tus sum-*
 qualis, vertigo, epilepsia cum sensuum abolitio- *pta.*
 ne, & mira capitis artuum & totius corporis suc-
 cussione & torsione, spasmi universales, effluxus
 san-

sanguinis ex auribus, tumor pugni virilis magnitudine circa scrobiculum cordis, singultus, inanes vomendi conatus, faciei & abdominis intumescencia, fluxus spumæ viridis ex ore post mortem.

Curatio. Art. 1583. Indicationes itaque curativæ erunt cicutam quantocius ex ventriculo educendam esse, ejusque acrimoniam infringendam, spiritus vitales consumptos a vehementia symptomatum instaurandos, aut ob motum sanguinis varium vel interceptum oppresses excitandos, labem ventriculo vel intestinis impressam, sive inflammatio sive denudatio membranæ nervæ, sive exulceratio sit, emendandam, & vires laudabili victus ratione restituendas & conservandas. Cicuta brevior, tutior & certior via exturbabitur e ventriculo vomitu tempestive concitato, neque necessum est, ut vomitoriis fortioribus utamur, ut ventriculum vehementer irritent & stimulent, cum jam alias ad constrictionem a cicuta pellectus sit; sufficiunt aquæ & olei tepidi largi & iterati haustus. Ad vomitum quoque in hoc casu ciendum valent iuscula pingua, decoctum hordei cum oleo simplici, aqua tepida cum butyro, lac cum oleo & butyro, sincerum aut aqua dilutum, cerevisia cum oleo & butyro; oleum lini vel nucis per se nauseabunda sunt, ideoque commodiora ad vomitum facilitandum aquæ tepidæ, lacti, decocto hordei, cerevisiæ, aut iusculis cujuscunque generis permixta, quæ una opera cicutæ acrimoniam demulcent & obtundunt. Pergendum est in hoc opere, donec omnis cicuta e ventriculo pulsa sit. Si vero ventriculus his in expellendo adjutus voto non respondeat, & vomitus tardetur, ad fortiora vomitoria recurrendum est, ad oxymel scilliticum, sal vitrioli, decoctum cort. virid. jugland. decoctum fol. nicotianæ, &c. Dum hæc tentantur pingua enemata injiciantur & ano suppositoria intrudantur ex mele & sale cæstis hier. pier. sapone sal. gem. vel alumine, &c.

Cly-

Clysteres enim & suppositoria motum peristalticum intestinorum sursum vergentem deorsum proliciunt. Vix licitum est catharticum propinare nisi lenissimum. Educta ita e ventriculo & intestinis *cicuta* omni vel maxima parte, tum demum ad *vinum generosum* & *alexipharmaca* deveniendum est. Antidoti magnæ, *Tberiaca*, *Mithridatium*, *electuarium Orvietanum*, &c. prosunt quatenus dissolvunt sanguinem & lympham alicubi stagnantes. Huc pertinent etiam *aquæ cordiales dictæ*, *confectiones de hyacinth. alkermes*, *lapis bezoardicus*, item *tinctura bezoardica*, *salia volatilia*, *mixtura simplex Paracelsi*. Cum suspicio sit tunicas ventriculi aut intestinorum erosas esse aut ulcerosas, haud consultum est cibos aromatibus condire, multo minus aceto, neque vino nimium indulgere; magis prodest *decoctum hordei cum passulis*, *sem. anisi* aut *decoctum rad. chin. sassaf.* &c.

Art. 1584. Probabile est (inquit clarissimus D. Mead) *cicutam antiquorum*, de qua *Vvepherus* tractatum edidit fuisse nostram *œnanthem cicutæ* facie succo viroso, quæ *cicuta* vulgari multo exiosior est. *Raius* vero noster, rei herbariæ peritissimus, *cicutam majorem vulgarem venenum fuisse Atheniensem* asserit, & *cicutam aquaticam*, de qua *Vvepherus* integrum librum conscripsit, fuisse *cicutariam palustrem*. vid. *Hist. Plant.* Vol. I. p. 451. 452. *Oenanthem autem cicutæ facie esse plantam ab ambobus diversam* vid. eandem p. 441. Doctissimus vero laudatus author forsan conjecturam suam sustinere potest, & per me licet, sustineat; non est mihi litigandi otium, nec animus. Interim agnoscendum est has plantas cognatas esse, nec viribus aut facie valde dissimiles.

Art. 1585. *Oenanthem aquaticam cicutæ facie* apud *Raium* loco citato ad hunc modum descriptam invenimus; „ *Paludapio* foliis non absimilis „ est *rutæ pratensis* similior (nostra sententia *apio* „ aut *petroselino* similior quam *Thalictro*) multo

*Cicuta
œnanthe
œcicuta-
ria.*

*Oenan-
thes a-
quat. de-
scripta.*

„ pullulatu virore retro colore & facie *cicutæ*.
 „ Caules bicubitales spargit e radice in pares *as-*
 „ *phodeli* albi bulbos multipartita & quasi bra-
 „ chiata nullius fibræ vinculo aut interventu con-
 „ tinuos, teneros gustu acres & ingratos, succo
 „ lacteo primum deinde flavescente viroso & exul-
 „ cerante prægnantes. In rivulis non in septen-
 „ trionalibus duntaxat, sed & meridionalibus *An-*
 „ *glia* provinciis copiose provenit. „ An radices
 hujus plantæ sint venenatæ & malignæ vel salubres
Raius dubitat, & rem in medio relinquit ulteriori
 examini subjiciendam. Sed de earundem maligni-
 tate sequens historia omnem tollit dubitandi ansam.

Historia
ænanthes
comesæ.

Art. 1586. Ad tertium lapidem ab oppido ubi
 jam pluribus annis commoratus sum medicinam
 faciens, septem circiter abhinc annos, a quatuor
 pueris comesæ fuerunt *radices ænanthes*, quod in
 hunc modum eveniebat; hi pueri hora undecima
 ante meridianam e *schola alphabetica* egressi, per
 prata palantes, ad ripam rivuli has radices repe-
 riebant, & cum candelabri fragmento, quod ad
 manum fuit, effodiebant; opere egregie delecta-
 bantur, & plures jam nacti aiebant alii aliis, hæ
 sunt *radices dauci teneræ*, *young Carrots*, statim
 mutuis incitamentis, non famis, sed petulantis
 luxuriæ causa, illas avide devorabant. Quid fit?
 domum abeunt, ægrotare incipiunt, quod factum
 fuit, celabant. Hi liberi fuerunt tres filii & una
 filia ex iisdem parentibus orti, patre vero tunc
 temporis solo superstite; eorum natu minimus
 quartum annum nondum compleverat, & maxi-
 mus nonum non attigerat; filius medius quintum,
 & puella sextum aut septimum agebat annum.
 Vagiebant, ejulabant; pater natorum aspectu con-
 territus, quid mali sit, nesciebat. Porro obtume-
 scebant, vertigine corripiebantur, proni in ter-
 ram cadebant, superveniebant spasmi horren-
 di cum tota sensuum abolitione, vomebant omnes,
 puella supra ac infra violenter purgata est, subin-
 de

de vero in lucidis intercapedinibus edebant & bibebant. Pater lacrymans miserabili & subitanea natorum omnium *metamorphosi* vehementer percussus varia in animo volvebat; secundum vulgi opinionem *incantamentis vel malis artibus* admiranda hæc symptomata inducta fuisse credebat. In lucidis intervallis rogabat, nunquid comedissent? rem nondum agnoscunt; deinde in oculis facto scrutinio inventa sunt frustula quædam *cujusdam radice*, hoc detecto, qui loqui potuerunt, veritatem fatentur omnes de *isthac radice* esitasse, unde statim de veneno suscepto orta est suspicio: & extemplo nuncius cum radice ad me defertur; forte fortuna *radicem facie agnovi*; ipse autem tunc temporis alias occupatus *pharmacopolam* consilio & subsidiis idoneis instructum mox demisi, qui misellos invenit veneno fere confectos; nunc omnes, nunc hunc, nunc alium paroxysmis epilepticis cum gravissimis spasmodis & spuma oris laborantes. Jussu meo multum oleum cum aquæ tepidæ crebris haustibus larga manu propinavit. Exantlato ita ventriculo, medicamentum, quod mihi maxime arridebat, fuit *tinctura bezoartica*, qua fretus alia ascisci fore supervacuum credidi, nisi quod iis modico vino in languoribus indulsi. Dosis *tincturæ* maximo natu fuit coch. iss. & parvulis diminuta quantitate pro ratione ætatum 6ta vel 8va quaque hora cum haustulo cerevisiæ; interim brodiis & lacticineis nutriebantur. Post 24. horas duo ex iis pristinae sanitati restituti sunt multo tamen debilitati; reliqui duo tardius convalescebant, nec ante quintam vel sextam diem excussa est veneni labes; iis *clysteres* sæpius injici curavi, & fortasse alia nonnulla remedia exhibui, quorum jam mihi excidit memoria: evasere omnes, sed non sine maxima difficultate; & jam, dum hæc scribo, vivi sunt.

Art. 1587. Idem paterfamilias, vir fidei integerrimæ, mihi narravit se biennio post habuisse

*Porcus ex.
esu ænan-
thes in-
terfectus.*

porcum, qui e propugnaculis prorepens vagus per agros aberravit, & in idem pratum incidit, ubi more istorum animalium ruspantem credibile est has radices gustasse & devorasse: nam post paucas horas vehementer ægrotabat; accersebatur *veterinarius* quidam e vicinio, qui manus auxiliares porrexerat, sed frustra; nam animal moriebatur convulsus spumosa ex ore saliva effluente.

Corona imperialis, esula euphorbium, helleborus.

Art. 1588. Radix bulbosa *coronæ imperialis* intus sumpta affectus fere eosdem habet ac cicutæ attestante *Johanne Rhodio apud Vrepherum*; ideoque eandem exigit medendi methodum. *Esula* sive *tithymali* quoque fere omnes sunt acres & maligni, intro assumpti violenter admodum purgant, ventriculum & intestina excoriant, adurendi vim obtinent, & cicutæ viribus perniciosissimis propemodum æquipollent. De *Euphorbio* & *Helleboro* idem dicendum est, si in nimia quantitate exhibeantur, & etiam quibusdam aliis pharmacis emeticis & catharticis usu vulgari nimis frequenter adhibitis.

Aconitum sive napellus.

Art. 1589. Quod *aconitum* sive *napellus* a tota substantia sua summum sit venenum & perniciosum in necandis hominibus & quadrupedibus ut vix etiam approbatissimis antidotis succurri possit, nisi contestim applicentur præsidia, ex sententia medicorum fere omnium notum est. *Napellus* in jugis montium *Alpinorum* nutritus vires admodum noxias obtinet, adeo ut inter venena vegetabilia jure merito princeps censeatur, delatus vero in hortos in locis humidioribus malignitatem magna ex parte deponit.

Effectus intus sumpti.

Art. 1590. Symptomata ab assumpto *Napello* sunt quæ sequuntur intumescencia labiorum, linguæ & totius faciei, oculorum prominentia, pectoris gravitas, compressiones cordis, tremor partium, vertigines, syncope, horror, mania, & lethargus, quæ omnia accidunt, & si intoxicatus evaserit, febre hæctica tamen miser corripitur.

Art.

Art. 1591. De remediis adversus perniciosum *Curatio*
hoc venenum (veneno ipso prius vomitione red-
dito & reliquis de curando veneno in genere
(1578.) recte observatis) commendatur *radix*
contrayerv. a ʒj. ad ʒj. cum Theriaca vel Mi-
thridatio exhibita. Sunt qui succum *Raphani* in-
tus sumptum tanquam certissimum remedium de-
cantant: plurimum prodesse aliqui volunt *lapidem*
bezoard. oriental. ex Matthioli experimento in
duobus reis comprobato, lib. iv. cap. 73. in Dioscorid.

Art. 1592. *Cocculæ officinarum* sive *bacca coc-* *Cocculæ*
ci Indici inter venena merito numerantur: in be- *officina-*
stis etenim (ex experimentis *Vvepheri* constat) *rum*.
symptomata invasionis ordine & sævitia non di-
sparia iis quæ *cicuta aquatica* in hominibus effi-
cit; certum est iis inesse vim deleteriam impen-
se irritantem *helleboro albo* similem. Quamobrem
qualis sit medendi methodus ab hoc veneno as-
sumpto supra in sectione de *cicuta* (1583.) per-
cipienda sit.

Art. 1593. *Taxus arbor* foliis, succo, & bac- *Taxus*.
cis, hominibus & jumentis lethalis est. Hoc ve-
neno infecti frigus in toto corpore percipiunt,
strangulationis metum incurrunt, & alvi proflu-
vium dysentericum patiuntur, & plerumque re-
pentina morte moriuntur. Facta per vomitum ne-
cessaria evacuatione propinandum est vinum ge-
nerosum in quo infusa sunt *folia absynthii, flores*
rorismarini, rad. zedoariæ, serpent. virgin. sem.
cardamom. cum aliis aromatibus. Ad febrem &
alvi profluvium conducunt *terra sigillata, bolus*
Armenus, lapis bezoar. coral. rub. rad. tormen-
till. &c.

Art. 1594. *Opium*, quod vi sua polychresta, *Opium*.
nunquam satis laudata, qua & somni nobis dul-
cedinem conciliat, & doloris suave lenimen præ-
stat, & quævis in republica nostra microcosmica
turbata pacatiora reddit, in dosi plus justo exhi-
bitum venenum evadere nemini non notum est,

in quantum verissimum est, quod etiamsi illius facies una sit *Angelica*, altera tamen sit *Diabolica*; quamobrem prudentia summa & maxima cautela in opiatīs exhibendis omnino requiruntur; eorum usus promiscuus & profusus *cane peius & angue* vitandus est. *Narcotica* enim, quæ stuporem sensui inferunt, non temere in usum ducenda sunt, nec nisi in vehementissimis doloribus, ubi vires dolorum acerbitate concidunt, ut cessantibus doloribus vires recolligant. Adulatoris est medici, aut auram popularem captantis ea ob levissimam aliquam causam nimis frequenter & manu supra modum liberali propinare. Sed hoc obiter dictum sit; de opio veneno dicturus sum.

*Effectus
opii in ni-
mia quan-
titate.*

Art. 1595. Effectus opii in nimia quantitate sumpti sunt, qui sequuntur: ardor ventriculi, ponderis sensus ibidem, alacritas aliqualis in initio cum risu *Sardonico*, partium omnium relaxatio ac debilitas, mentis alienatio, memoriæ lapsus, oculorum obfuscatio ex tunicarum relaxatione variis coloribus coram oculis apparentibus, ipsa cæcitas, linguæ balbuties, sopor, pulsus rarus, efflorescens faciei rubor, maxillæ inferioris laxitas, labiorum intumescencia, spirandi difficultas, furor & mania, salacitas, cutis pruritus vehemens, nausea, vertigo, affectiones comatosæ, apoplecticæ, vomitus, singultus, pulsus turbatus, spasmi, sudores frigidi, syncopes, & lipothimiæ, expiratio frigida, mors. Omnia hæc symptomata in omnibus vix occurrunt, sed quædam in his, quædam in aliis pro diversitate constitutionum; pharmaci quantitatis, &c.

Curatio.

Art. 1596. Curatio in hoc primario consistit, ut (quod in omnibus venenis faciendum) vomitus provocetur, at, si ad intestina jam penetraverit venenum, clysteres acriores injiciantur, ac demum dosis *Cremoris tartari* propinetur. Et postea *opii antidoti* exhibeantur, inter quas *salia lixiv-*
via-

CAP. XVI. *Venena vegetabilia.* § 51

vitalia aliis supereminet, ut & *sapo albus* vel *patrius tartareus*, si comparari possit. Commendatur haustus *vini veteris* vel *spiritus vini* cum *vittello ovi* ad noxiam *resinam*, *opii* partem perniciosissimam, *ventriculo* adhærentem subigendam. Postremo ad *medicamenta acida* deveniendum est; excitandus est æger omni arte, & se labore aliquo exerceat; *aeri frigido* se nudum exponat; immo in *graviori casu* commendatur *immersio in aqua frigida*.

Art. 1597. *Hyoscyamus niger vulgaris* est planta soporifera & venenosa odore foetido facile se prodens. Ex esu *radicis*, *foliorum*, vel *seminum* oriuntur symptomata sequentia, *ariditas faucium* & *linguæ*, *artuum stupefactio*, *spirituum languor*, *pruritus universalis*, *mentis alienatio*, *vociferatio*, *delirium*, *vertigo*, *visus depravatio* aut *abolitio*, *dyspnœa*, *suffocatio*. Quoad curam vid. *opium*. Art. præcedenti.

Hyoscyamus.

Art. 1598. *Solanum lethale*, *Bella Donna*, est planta maligna & stupefaciens; illius *baccæ* quandoque a *pueris incaute* comeduntur, quas vocant *cerasa sylvestria*; symptomata ex his comestis sunt *sitis intensa*, *raucitas*, *cardialgia*, *sopor gravis*, *cæcitas*, *mentis alienatio*, *delirium*, *hypocondriorum tensio*, *convulsionες*, *affectus apoplectici*, *mors*.

Solanum.

Art. 1599. *Ejusdem commatis narcotici* est *Mandragora*, ut etiam *coriandrum*, sicut a quibusdam affirmatur; sed de hoc haud satis convenit inter *Botanicos* & *Medicos*.

Mandragora & *coriandrum.*

Art. 1600. *Nux vomica narcotica* est & virulenta, ea utuntur ad *canes* & *feles* interimendos: hæc animalia *nuce vomica* devorata intra paucas horas convulsi moriuntur. Neque dubitandum est quin eisdem in homine haberet effectus. *Avibus* certe non minus perniciosam esse ex frequenti nostratum experientia constat, qui ejus pulvere carnibus insperso *corvos*, *cornices*, aliasque aves

Nux vomica.

noxias inescare & perdere solent. Vide opium quoad curam. (1596.)

Planta *Art. 1601.* Hæ plantæ *narcotica* ultimo recitatae naturæ fere ejusdem cum opio sunt quoad malignitatis speciem & operandi modum; ideoque non opus est hisce diutius immorari, sed brevitatibus causa remittendus est lector ad sectionem de opio. (*Art. 1595.*)

Fungi.

Art. 1602. Fungi sunt infimum & ignobilissimum vegetabilium genus, quorum & si aliqui simpliciter venenati sunt, & in cibum non veniunt, alii tamen a nimis delicatulis edules sunt: omnes facile nocere possunt, ut non sine causa *Seneca* fungos voluptuarium venenum nominaverit, & *Plinius* cibum *ancipitem* illos dixerit. *Athanasius Kircherus* in lib. de peste hæc habet; *Fungus, qualiscunque sit, semper malignus est, semper exitialium qualitatum apparatu instructus: & si non statim sentiatur, frequenter tamen comesus nescio quid successu temporis occultæ machinationis interiore viscerum administratione molitur.* Apagete ergo perniciofa isthæ gulæ blandimenta. Quæ tanta voluptas ancipitis cibi? An usque adeo vitæ tædet, ut eam tam vili offa permuremus, mortemque semper in procinctu stantem *ultra sollicitemus?* ita vitam nostram, quam non accepimus, facimus brevem, nec inopes ejus sed prodigi fimus.

*Effectus
fungorum*

Art. 1603. Fungi (præcipue species venenatae) comesi sensum suffocationis & strangulationis in faucibus inducunt, ventriculum inflant, singultum excitant, choleram morbum producunt, interdum epilepsiam, syncopen, sudorem frigidum, somnum profundum, &c. immo mortem ipsam, sicut ex plurimis historiis in authoribus fide dignis videre licet.

Historia.

Ego ipse ex improvise imprudenti esu fungorum aliquando in *diarrhæam mali moris* incidi cum gravissimo *Tenesmo*, & perpetuo mejendi desiderio.

derio, quod *Tenesmus vesicæ urinariæ* appellari potest. Diarrhœam naturæ prius relinquendam esse causam ejusdem tunc temporis ignorans judicavi (nulla enim aderat nausea vel ventriculi gravamen) quam die 3. malo persistente & crescente de esu fungorum animo revolventi cogitabam. Quocirca dosin rhabarbari masticaui, ex qua tamen nullum juvamen accepi. Die 4. ingravescente morbo cum insigni virium jactura, nec non aliquali affectu vertiginoso, & ani excoriatione dolorifica vesperi emeticum ex infuso *radicis ippecacuan.* propinavi, ex quo ter vel quater evomui, & deinde hora decubitus dosin *Confectionis Fracastorii* deglutivi, unde feliciter omnino liberatus sum.

Art. 1604. Quoad curationem, fungi (si fieri possit) statim vomitu rejiciendi sunt, & reliqua *Curatio* de veneno in genere curando jam dicta probe observanda. *Salia lixivialia* ægros mirabiliter juvant, speciatim *lixivium ex cineribus sarmentorum vitis.* Contra nocumenta fungorum nil præstantius invenitur quam *Theriaca Andromachi cum oxymelite simpl. vel scillitic. gallinarum fimum duntaxat candidum decoctum mulso venena fungorum boletorumque astringit ex Plinio, Lister de Humo-ribus p. 392.*

V E N E N A M I N E R A L I A.

Art. 1605. Postquam de venenis e plantis, sectionibus præcedentibus actum est, proximo loco eminentiora quædam venena in classe *Venena mineralia.* *mineralium tum naturalium tum arte factorum* percurrendum est; ac primo de arsenico.

Art. 1606. Arsenicum primi subsellii esse venenum lippis & tonsoribus notum est; duplex est, *Arsenicum.* nativum vel factitium; nativum iterum est duplex, nempe, *auripigmentum*, seu *arsenicum aureum*, *citrinum*, & *sandaracha*, seu *arsenicum rubrum*:

brum: factitium itidem duplex ex his per sublimationem conficitur, alterum ex auripigmento, & appellatur *arsenicum album crystallinum*, alterum ex sandaracha, & vocatur simpliciter *arsenicum*. Intra corpus assumpta alterutra arsenici species eadem fere gravissima symptomata inferit; sandaracha tamen mitior est auripigmento, auripigmentum arsenico albo crystallino, quod omnium est perniciosissimum.

*Effectus
intus
sumpti.*

Art. 1607. Arsenicum intra corpus admissum virulentiam suam primum exerit pungendo, vellicando, irritando, urendo; unde ventriculi ardor & dolor atrocissimus, intestinorum cruciatus vehementissimus, vomitus, sitis inextinguibilis, linguæ, faucium, & gulæ ariditas & asperitas, singultus; sequuntur anxietates gravissimæ, cordis palpitatio, lypothymia, extremorum frigus; superveniunt interdum vomitus & dejectiones nigrae, foetidae, cadaverosae, ventriculi & intestinorum gangraena aut sphacelus, postremo mors violenta.

Curatio.

Art. 1608. Quoad curationem, præmissis universalibus αἵμα & πύρω evacuantibus, quemadmodum in curatione venenorum in genere jam dictum est (1578.) hic valde conferunt diluentia, oleosa, mucilaginosae, &c. Insuper ex observatione *Vvepheria* constat *bezoardicum minerale cum butyro permixtum* acrimoniam hujus veneni infringere.

Inunctio.

Art. 1609. Inunctio ejus externa est etiam valde periculosa & perniciosa: extant etenim historiae in scriptoribus medicis nonnullorum, qui unguento, cui arsenicum commistum est, sese illeverunt, extinctorum, aliorum insanientium, aliorum perpetuo claudicantium, &c.

*Argentum
vivum.*

Art. 1610. Argentum vivum in venenorum numerum vix referendum est; notum est enim, quod in quibusdam casibus innoxie hauriatur ad aliquot uncias: peioris vero perniciiei multoties

existit ejus usus externus, ut videre est in iis, qui in Lue Venerea vel scabie *unguentis mercurialibus* utuntur; quamplurimis exitio inopinato fuit; tremorem, stuporem, paralylin, claudicationem perpetuam, &c. intulit; aliis pravam corporis diathesin vix unquam sanabilem produxit, Novi quendam, qui scabie laborans curandi gratia *cingulam mercurialem* circa lumbos adhibuit; partes omnes infra cingulam stupebant, & paralyticæ evasere: pro illo restituendo variæ methodi incassum tentatæ fuerunt; tandem ad *Thermas Bathonienses* missus est, sed reducem parum in melius mutatum, irritis omnibus aliis, *salivatione mercurio excitata* & decocto e lignis a morbo penitus liberavi.

Historia.

Art. 1611. Tametsi argentum vivum virulentum non sit; nonnulla tamen ex illo præparata sunt maxime venenosa, ut *mercurius præcipitatus varius*; ast omnium gravissima symptomata & damna infert *mercurius sublimatus corrosivus* intus sumptus; suo contactu instar ignis adurentis omnia corrumpit; hinc si sumptus sit, statim lingua & fauces vehementer exasperantur; oriuntur dolores ventriculi tormentosi cum abdominis distentione, vomitus vehementissimi cum maximo nixu, ejicitur materia mucosa, spumea, interdum cruenta, istiusmodi quoque sunt dejectiones alvinæ, quæ frequentes sunt cum doloribus acerbissimis, adest sitis ardentissima, insatiabilis, accidit gravissima inflammatio ac intumescencia linguæ ac faucium, superveniunt deliquia, sudores frigidi, tremores, convulsiones; brevi ventriculo & intestinis gangranam patientibus æger dicto citius obitu miserabili cadit.

Mercurius præcipitatus & sublimatus.

Art. 1612. Proh dolor! tam ingenti malo haud datur par remedium. Basis curæ in summa festinatione maxime fundatur; quod factum opus est omni procrastinatione sublata suscipiendum est; quantum præstare possumus, adnitendum est, ut ven-

Curatio.

ventriculus a veneno vomitione provocata liberetur. Non est vir fortis, cui animus non crescit in ipsa rerum difficultate. Armamenta, quæ præ manibus præstio sunt usurpanda. Quid vulgarius oleo, butyro, & aqua tepida, quibus raro pauperum casæ carent? attamen & hæc præstantissima sunt ad muniendas partes internas contra veneni aculeos; hæc si quæ alia hostis exturbationem citissimam promovent, hæc demulcent, hæc denique magnis *Antidotis* viam sternunt, illarum usum tutiorem efficiunt, ut venenosa labes impressa emendetur. Extra corpus nostrum vidimus in præcipitatione magisteriorum per oleum tartari a corporibus solutis omnem vim corrosivam tolli, unde sperare licet oleum tartari per deliquium, vel sal tartari, vel absynthii, & similia salia fixa alcalia & lixivialia ad virulentiam huius veneni domandam aliquid præstare posse, & revera opem præstant ultra omnia alia *antidota*, quæ hætenus novimus, quod enim scribunt de viribus *chrystalli*, & *similibus*, ego illis vix fidem habeo.

Art. 1613. Sublimatum corrosivum vel aliud quodvis venenum intra ventriculum admissum statim emetico aliquo propinato ejiciendum est (inquit D. *Shavv*) ideoque æruginem æris ad gr. i. vel ij. exhiberi suadeo; quoniam promptissime ac sine mora operabitur: hoc vero esset venenum ingerere ad aliud expellendum; quod tamen quibusdam fortasse minus incongruum videatur; clavus enim clavo pellitur, & ignis igne expellitur; sed ego malim *tutioribus remediis* malum aggredi. De Æruginæ æris proximo articulo.

Æs viride
de & ex
antimonio
male
preparatum.

Art. 1614. Æs viride intra corpus sumptum perniciosissimum est venenum, & etiam nonnulla ex antimonio male preparata sunt æque virulenta. Hæc sunt ejusdem fere naturæ cum arsenico, licet gradu paulo inferiori, similiaque symptomata excitare solent; eandemque itaque curationis

tionis methodum requirunt; ideoque non opus est ut de his singulatim differam.

Art. 1615. Spiritus acidi, ut *aqua fortis*, *spiritus nitri*, *spiritus* & *oleum vitrioli* & *similia* vulgo venena audiunt; verum quicquid præstant potius corrosione quam venenositate facere videntur. Per imprudentiam vel errorem quodocunque in ventriculum dimittantur, statim instar ignis faucium & linguæ, ventriculi ac intestinorum tunicas cum diris cruciatibus erodunt, & suffocationem instantaneam minantur, & hominem in extremum vitæ periculum conjiciunt.

Art. 1616. Cito ac mature idonea auxilia adhiberi debent, lenientia & viscida opem ferunt, item pingua, oleosa, & mucilaginosa plurimum valent, privatim *mucilago seminum cydoniorum*, *gum. tragacanth.* &c. magnam utilitatem præstant. Sumptis venenis erodentibus (inquit *Montanus*) non est præstantius remedium *lacte bovino*, si bibatur in magna quantitate ad exigentiam sitis, quia semper sequitur sitis ingens tali sumpto veneno; hic quoque *salia fixa* corrosionem minuunt, ut & *pulveres testacei* &c.

Art. 1617. Sunt etiam *recrementa quædam metallica ex plumbo*, & *alia ex illo factitia*, quæ inter venena numerantur, viz. *Lithargyrum* & *cerussa* & *minium*: hæc vires *Arsenici* quodammodo æmulantur, sed non adeo exitiosas possident. Qui hæc venena sumpserunt, eodem modo curandi sunt, ac ii qui ipsum *Arsenicum* hauserunt. (1603.)

VENENA ANIMALIA.

Art. 1618. Restant jam venena, quæ venenosa animalia homini communicant, tractanda: atque hæc ex *morsu*, *ictu*, vel *ipsorum esu* corporibus nostris nocumento sunt.

Art. 1619. E venenosorum animalium numero

*Spiritus
acidi aq.
fortis &c.*

Curatio

*Lithargy-
rum, ce-
russa &
minium.*

*Venena
anima-
lia.*

*Serpentes
& angues.*

Serpentes imprimis sunt. In omnibus cujuscunque generis serpentum sive anguim, sive viperarum moribus virus morsus tempore in vulnus infunditur, unde funesta omnia symptomata consequentia excitantur. Authores venenum *viperæ* inter ea, quæ statim enecant, & ea quæ tardius intermunt medium esse constituunt. Ideoque pro exemplo reliquorum istius generis sit *viperæ*:

Viperæ:

Art. 1620. *Vipera* est animal *viviparum*, reliqui serpentes sunt *ovipari*. De morbi nonnunquam septem horarum spatio, interdum non ante tertium diem intereunt. *Viperæ* plurimum iratæ, & tempore æstivo sunt magis lethales, item in regionibus calidioribus sunt magis nocivæ, quam in frigidioribus, quod omnino verum est de omnibus serpentum & anguim generibus. Culter anatomicus detexit liquorem quendam subflavum a viperarum sanguine secerni glandulis duabus conglomeratis, parte anteriore sincipitis locatis, ex diversis aliis miopribus conflatis, quæ communi membrana teguntur quorum singulæ vas excretorium exhibent, quæ vasa se uniendo ductum formant ad radices dentium incisorum perforatorum decurrentem; ibique in vesicula liquidum hoc deponunt, vix guttulam quantitate superans, constat ex *microscopica observatione* CC. D. Mead particulis salinis egregie minutis, quasi spiculorum instar hoc liquidum scaturire.

*Symptomata
morsum
viperæ
consequentia.*

Art. 1621. Symptomata morsum *viperæ* consequentia sunt dolor acutus & punctorius in loco vulnerato, tumorque primo ruber & postea livescens, sensim in partes vicinas latius serpens; cutis æstuat erumpentibus vesiculis; progressu temporis supervenit insignis languor, pulsus celer, debilis, & quandoque intermittens, cordis palpitatio, sensuum stupefactio, præcordiorum anxietas, ventriculi ægritudo summa cum vomitu bilioso, oculorum hebetudo, interdum dolores circa umbilicum, vel circa hepatis regionem, respi-

Spiratio difficilis, singultus, tremores, convulsiones, sudores gelidi, extremorum frigus, mors ipsa tragœdiam claudens, nisi malo remediis succurratur, vel peculiaris vulnerati vigor, & innatum robur venenum vincant. Si demorsus superstes sit, tumor cum inflammatione aliquandiu manet; interdum sanies e vulnuscule manat, & pustulæ quædam circa idem herpetis exedentis ad instar erumpunt; cutis universa flavescit, tanquam in ictericis.

Art. 1622. Venenorum extra in corpus admissorum curandi ratio a tribus potissimum indicationibus pendet; primo ut venenum statim extrahatur; secundo ut inhibeatur, ne ad interiora serpat; & tertio ut si quid venenijam in arterias & venas penetraverit, alexipharmacis expugnetur, eodem plane modo ac in venenis ore sumptis. Id quod habet *Celsus* de serpentum morfu, quicquid fuit in praxi antiquorum, complectitur; imprimis (*inquit ille*) membrum supra vulnus deligandum est, non tamen nimium vehementer, ne torpeat; dein venenum extrahendum est *cucurbitula* applicata facta prius scarificatione profunda, vel alterius hominis in ore ulcus non habentis exsuctione; venena enim serpentum non gustu sed in vulnere nocent (*sed ab hoc experimento sanos carere suadeo*) neque alienum est circa vulnus scalpello incidere. „ Plaga postea *spiritu vini in quo Theriaca* „ *vel Mithridatum dissolutum sit*, abluenda est. Vivum etiam gallinaceum pullum per medium divisum vulneri imponere proficit; huc etiam facit hædi agnive caro calida loco vulnerato applicata. Necessarium est quoque demorsum exsorbere portionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quod calori movendo par est, nec humorem intus coire patitur; nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt. Quoad praxin recentiorum animadvertendum est, quod testatur

*Curatio
generalis
& parti-
cularis.*

stat *Boyleus*, scilicet, quod si statim a morfu, paulo eminus a parte *ferrum bene ignitum* teneatur, venenum adeo enervat, ut demorsum sospitem & incolumem conservet, ne quid mali nisi dolorem in parte cito evanescentem patiatur: longe vero melius & tutius, videtur quod alii docent, locum profunde exurere *cauterio actuali*. Sed præ omnibus quotcunque *axungiam viperinam* vulnere affrictam (modo exemplo fiat) esse præsentaneum remedium sine ulla interiorum ope quamplurimis experimentis constat; sed quoniam hæc axungia non semper in promptu sit, & virus celeriter transiens massam sanguineam contaminare possit, topicis aliis appropriatis, quæ præ manibus sunt non neglectis remedia interna quam ocissime exhibenda sunt, inter quæ instar omnium eminet *sal viperarum*, quod ægro in lecto decumbenti sufficienti quantitate datum, & aliquoties repetitum ad levem sudorem suscitandum sine alio auxilio curam absolvit. Quæ veneno in genere adversantur, hic conferunt ut *Cardiaca, bezoartica, Theriacalia, alexiteria*, &c. Generale *Antitoxicon prophylacticum* nullum omnino hætenus cognoscitur, quin & repugnat tale esse.

Aspis. Art. 1623. *Aspis* omnium serpentum est longe vehementissimus; tam exiguum infligit vulnus, ut omnem fere oculorum aciem effugiat, vix puncturam acus æquans, per illud tamen tantæ perniciæ venenum infundit, quod intra paucas horas totum corpus pervadit, hominemque citissime e medio tollit, nec tamen dolorem multum infert, sed supervenit capitis gravitas, oculorum caligo, sensuum hebetudo, stupor, segnities, somnolentia, faciei pallor, corporis refrigeratio, crebræ oscitationes, spasmi, & tandem, nisi cito succurratur, trium horarum spatio ipsa mors. Ab *Aspide* demorsi eodem modo curantur, ac a vipera, vel aliis serpentibus læsi.

Aranei. Art. 1624. *Araneorum* licet plures species re-
partant.

CAP. XVI. *Venena Animalia.* § 62

periantur alii aliis venenosiores, omnes tamen uno eodemque modo nocent, viz. ictu per vulnusculus venenum in corpus infundunt, vel in esculenta vel potulenta illapsi & ingesti hominem lædunt, vel postremo combusti fumo suo nocent. Accidit in parte demorsa stupor cum frigoris sensu & horrore, ventris intumescencia, flatus in intestinis, faciei pallor, lacrymæ involuntariæ, partium extremarum tremor, & affectiones spasmodicæ, sudor frigidus, perpetua & vana mingendi cupiditas, membri virilis tensio.

Art. 1625. Ad ictum arnearum eodem observa- Curatio.
vanda est methodus ac in moribus aliorum animalium venenatorum; privatim autem plane admirandæ sunt vires foliorum ficus ad hoc venenum domandum, si icti statim lac ex foliis manans bis aut ter in vulnus instillent venenum omnino extinguit, & dolores tollit, & reliquorum symptomatum ingruentium occasionem præscindit. Ad araneos deglutitos propinandum est vomitorium sicut in aliis venenis intra corpus sumptis, neque omittenda sunt alexipharmaca ordinaria, speciatim vere resina abietis sicca multum præstare dicitur; commendatur etiam allium frequenter comesum, vinumque aromatizatum &c.

Art. 1626. Ab ictu scorpionis acerbissimus dolor non solum in parte affecta, sed & in toto Scorpionis ictus.
corpore sentitur; locus vulneratus inflammatur & tumet, circa plagam emergunt pustulæ; adest tremor, pallor, frigus, singultus, vomitiones &c.

Art. 1627. Ad scorpionis ictum scorpio ipse est Curatio.
pulcherrimum medicamentum (inquit Celsus;) quidam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt; quidam super prunas eo imposito vulnus suffumigant, & carbonem ejus super vulnus deligant; quidam allium cum ruta mistum oleoque contritum adhibent. „ Sed præ reliquis externis, quemadmodum axungia viperina morsum viperæ fa-

nat, ita *oleum scorpionum* eorundem ictui me-
detur. Interna eadem sunt ac in aliis venena-
torum animalium moribus.

Bufo.

Art. 1628. Bufo sive rubeta est animal veneno plenum, ut non immerito *terrestris toxici & contagiosæ virulentia bursa* appelletur. Maximo in hominem odio est *bufo*, & vicissim in *bufonem homo*. Et si bufones dentibus careant, gingivis tamen, quas perduras & scabras habent, partem cui adhæserint, sic arcte constringunt, ut venenum suum in partem indeque totum corpus per constrictæ partis poros adigant. Venenositas *bufonum* non videtur in alio consistere, quam vel in eorum furore, vel in eorum excrementis, speciatim *urina acri caustico volatili sale imprægnata*, quam acrimoniam obtinere videtur ex alimentis, nempe minutulis istis *scarabæis*, qui in eorum ventriculo & colo reperiuntur: bufones enim mortui omni veneno carere dicuntur. Venenum suum mictu, saliva & vomitu in herbas eructant, præsertim vero in *fraga*, quæ vehementer appetere dicuntur. Bufonum venenum non modo intus ingestum perniciosum est, sed etiam *cuti aspersum*, nisi locus statim *urina vel aqua salsa* abluatur.

*Bufonis
veneni ef-
fectus &
curatio.*

Art. 1629. Admisso bufonis veneno ægri flaves-
cunt, toto corpore intumescunt, labris lingua-
que nigricantibus balbutiunt, dyspnœa asthmati-
ca corripuntur, vomitu, sudore frigido, vertigi-
ne, convulsione, syncope, & tandem morte pre-
henduntur. Ideoque procurare vomitum quamprimum medicum oportebit, præsertim si venenum ore sumptum fuerit, *clysterem* injicere, veneni vim omnibus alexiteriis calidis & attenuantibus infringere, ut *Theriaca & Mithridatio in vino generoso dissolutis*; tandem vero *balneis æstuariis*, & valido multoque exercitio ipsum digerere,

*Cantha-
rides.*

Art. 1630. Cantharides extra corpori applicatæ interdum vesicæ nocent, stranguriam faciunt, immo sanguinis mictionem excitant. Intus sum-

ptæ

ptæ omnes fere ab ore ad anum usque humani corpori partes internas arrodunt, inflammant, atque exulcerant, unde febris ardens; in ore resinæ cedri vel pini sapor percipitur; imprimis vero partibus urinæ dicatis sua natura insensæ sunt, unde in illis ardorem inflammatorium, excoriationem, penis continuam erectionem, cruentam & dolorificam stranguriam, vel omnimodam ischuriam excitant, quæ tandem vasorum urinariorum gangræna & ipsa mors consequuntur.

Art. 1631. Ad curam primo loco opera danda *Curatio* est, ut *Cantharides* e corpore quamprimum ejiciantur, idque per vomitorium cum aqua tepida vel jure pingui; *clysteres* quoque ex diluentibus & oleosis injiciendi sunt; ad acrimoniam etiam obtundendam æger copiose bibat *lacticina*, *emulsion*es, *oleosa*, & *mucilaginosæ*; commendatur etiam *terra Lemnia*, & præ omnibus aliis (attestante D. Gronvelt) *camphora*.

Art. 1622. Pulvis *adamantis*, *crystalli*, *vitri*, *metallorum variorum limaturæ*, & similia dici possunt *venena mechanica*, quæ intra corpus admiffa, quasi tot *cultelli*, viscera lancinant & incidunt; atque ita mortem vel subitanæam vel lentiores inducunt, artemque nostram illudunt. *Venena mechanica*

Art. 1633. Superest adhuc alia venenorum familia, nimirum *spiritus vinosi* & *potus inebriantes stillatitii*, horum enim nimis frequens & profusa ingurgitatio (uti pessima consuetudo obtinet) tot hominum *Myriades*, quot sunt in cælo *stellæ*, trucidavit; immo plures *deciescentenis millibus* ex hoc quam ab omnibus reliquis quotcunque venenis occubuerunt, minime dubitandum est; unde hoc malum perniciosissimum vocare soleo *Kαρὶ ἔξοχῳ The Harm*, jocone an serio dicam. Quamplurimis non tantum morbos gravissimos parit, sed aliquando etiam quibusdam ipsam mortem subito affert, quo nomine, si non *veneni* appellationem mereatur, quo alio id possit, ego sal-

tem assequi vel conjicere nequeo. (vid. *Art.* 1572, 1573.) Spiritus vini intus sumptus omnibus fere animantibus vitam adimit; immo vegetabilibus quibuscunque more pabuli exhibitus, *ne parente vite exempta*, mortem infert.

Malum
vix cura-
bile.

Art. 1634. Ingratum onus medicis generosis incumbit. Istiusmodi spirituum ardentium *helluones* noctes atque dies juxta suum cacoethes detestabile ignem liquidum perpetuo pitissantes, quum coctiones omnes delerunt, solida universa enervarunt, & liquida corruperunt; cum fabrica jamjam diu vacillans collapsura est, nostram openpetunt. Quid fit? *Scabinorum* munere fungendum est; & forte fortuna exantlatione peracta & lasanis ac scaphiis in sentinam decapulatis, & labe quodammodo refarcita rursus actum agere statim satagunt, & ut canis immundus vel amica luto sus, ad sordem & illuviem se protinus recipiunt; atque ita vitæ suæ non inopes, sed prodigi, quam non acceperunt illam faciunt brevem. Quid faciamus *Medici* vel quid faciant *Theologi*? medicamenta nihil valere possunt, & consiliis auscultare nolunt. Omnia incassum erunt, in impii veneni amplexus ruunt, stupidi & occæcati evadunt, rationibus & consiliis *marpessæ* cautibus surdiores; in æternum sitiunt, & sitientes bibunt quasi *dipsade morsi*, & quo plus potæ plus sitiuntur aquæ, *aquæ istæ stillatitiæ mortiferæ*, quibuscum, qua festinatione possunt, scenam claudunt in ipso mortis articulo *lagenam exposcentes*. Proh Dolor!

Encomi-
um tem-
perantia.

Art. 1635. O beatam temperantiam! nunquam satis laudandam, nunquam satis admirandam! primævæ ætatis, quam fecisti auream, *decus & tutamen*! tui ipsius suadelam utique & pretium! lætis aliquando *Saturni* temporibus visam! puris piisque animis in omni ævo cultam usque & colendam. Tu es, si quod uspiam in terris, *verum Archæi sedativum*, & conservatrix mentis sanæ

in

in corpore sano. Tu recta deducis tui cultores ad longam & jucundam senectutem vultu placido & juvenili, grato & amabili. Tu denique tui ipsius inimicorum laudibus ornaris, & amabilis etiam ab ipsis diceris, quibus, te imprudentissime repudiata, manet *Satyrici maledictio*, ut, *virtutem hanc videant intabescantque relicta.*

JUDICIUM de DEFUNCTO VENENATO:

Art. 1636. Adumbratis sic pro instituti ratione *Judicium de defuncto Venenato:* venenorum (præcipuorum saltem) natura, agendi modo, & medendi methodo; operæ pretium erit paucis attingere, *quomodo Medicus suum judicium ferat*, si quando vocatus fuerit ad defuncti cadaver inspiciendum, ubi ex repentina morte & aliis circumstantiis de veneno clanculum dato inciderit suspicio. Hoc autem ex supradictis magna ex parte ediscendum est, si ad singula venenorum genera probe attendatur. Testimonia eminentiora hominis veneno corrosivo metallico vel vegetabili enecati, sunt, quæ sequuntur, *externus superficiei tumor, maculaeque nigrae, fuscae vel lividae, linguae tumor nigricans, unguis nigri, vel lutei, facile labentes, capillorum spontaneus manipularisque casus.* In aperto cadavere viscerum livor, colorque citrinus, vel nigredo, ventriculi ac intestinorum *gangrena & sphaceli*; hæc sunt manifesta veneni indicia, si adfuerint signa antegressa, nimirum *vomitibus perpetuis, tormina, alvi dejectiones cruentæ, urinae ardores, oscitationes, convulsiones, syncope, sudores frigidi, palpitatio cordis, obmutescencia, & alia id genus dira symptomata in superioribus passim enumerata.* Narcotica & opiata (quantum ego scio) nullum omnino externum sui signum relinquunt, præter *horridum oculorum obtutum*; signa antegressa in *Art. 1595.* recensentur. Sed in judicio ferendo ex signis supradictis summam inter prudentiam &

edicendi parsimoniam medicus versari necessum habeat: namque ea omnia indicia, quæ ex eros-
sis forte per venenum visceribus colligi poterint,
ex humore acri intra ipsum hominem generato
fieri queunt. Consultius proinde erit, reum,
nullo certo ipsum convincente argumento, accu-
sati criminis absolvere, quam infontem morti
adjudicare, quod jura divina & humana voluif-
se patet: dantur tamen interdum calus tam ex-
tra dubium positi, ut alia ratione judicandum ef-
se necesse sit,



EPILOGUS.

ATque jam tandem ventum est ad umbilicum. Æquum est igitur, ut lector benevolus serio admoneatur hæc commentariola negliger, confuse, ruditer, ac memoriæ tantum causa, usui privato primario, conscripta fuisse: & nullus dubito, quin omnes fere, qui in praxi medica aliquandiu versati fuerunt, præstantioribus adminiculis ex propriis adversariis suppedientur; sed quoniam rerum facies obscura multo major est quam illuminata; & de rebus non omnes eodem modo cogitamus; haud incongruum mihi videtur alios fructum aliquem ex hisce meis laboribus percepturos esse, sicut invicem ego me ex aliorum lucubrationibus uberrimum emolumentum consecutum esse libenter agnosco.

De unico tantum me hoc loco hortari sufficiat; scilicet, ne quis brevibus hisce stricturis nimiam fidem adhibeat, sed potius authores ipsos ubicunque consulat: nam in transferendis eorum sententiis verisimile est me frequenter errasse, aut saltem sensum obscure aut imperfecte tradidisse. *Dulcius ex ipso fonte bibuntur aquæ.*

Deus optimus maximus, quo tanquam fonte æternum inexhausto omnia bona ac fausta continuo descendunt, a cujus gratia felix medicæ artis successus, præ aliis quibuscunque, jugiter pendet, his quæ sincero animo ex aliorum operibus fideliter collegi, & quæ ex observatione propria & experientia scripsi pro sua bonitate favere dignetur, quo in publici commodum, privato semper antefendum, cedant.

Δόξα τῷ ἐν ὑψίστοις Θεῷ.

Typographus ad Lectorem.

BREVITATIS causa, ne Liber in molem nimis ingentem cresceret, remediorum formulas, in impressione priori editas, *Pharmacopœia Londinensis, Bateana, & Fulleri*, nemini fere, ut credidit, ignotas, earundem nuda solummodo recitatione facta, authorumque designatione, in tertia hujus Operis editione omitendas duxit Author. Cum autem omissio ista non parum incommodi Lectoribus afferat, qui usum remediorum hic discunt, formulas vero aliunde quærere coguntur, & sæpe deficientibus citatis libris habere non possunt; formulas ipsas describendas curavi, relicta tamen Authorum designatione, ut si forte aliquis typographicus error irrepat, facile corrigatur, utque cum libris, a quibus desumuntur, sicuti libeat, conferri queant. Aliquas Author ipse Operi suo inseruit, hasque, indicatis articulis ubi leguntur, non repetendas judicavi.

Sciat itaque Lector, quod per literam capitalem B Pharmacopœia Bateana designetur, & per reliquas literas initiales, ut infra, indicantur Authorum nomina, viz.

B. Pharmacopœia Bat.	Mu. Musgrave
Bar. Barbette	P. Pitcairnius
Bo. Boerhaave	Pu. Purcell
D. Diemerbroeck	P. L. Pharm. Lond.
E. Estmuller	R. Radcliff
F. Fuller	S. Sydenham
G. Greenfield	Syl. Sylvius
H. Harris	T. Turner
L. Lister	VV. Vvillis.
M. Morton	

Acetum

Acetum Pestilentielle. B.

℞. Rad. angel. zedoar. ana ℥j. bacc. junip. ℥ij. rut. M. iij. acet. opt. ℔iij. macera, ac cola. Pro suffitu, & oris collutione grassante peste.

Æthiops mineralis. B.

℞. Fl. sulphur. p. ij. mercurii crud. p. i. exactis. mixta incende, ut f. Pulvis nigerrimus s. a. Usus in Lue Venerea, Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.

Aluminatum. B.

℞. Succ. limon. ℔j. alumin. ℥ss. coque & depuma. Valet in rubore faciei, pustulis, &c.

Antihæcticum Poterii. B.

℞. Fit ex regul. antimonii martiati & stan. angl. ana colliquatis cum triplo nitr. detonatis, & aqua edulcatis s. a.

Apozema Diureticum. G. Vide Art. 735.

Aqua Balsamica. F.

℞. Heder. terrest. marrhub. alb. hyssop. puleg. ana M. iij. Rad. enul. irid. florent. ana ℥ij. terebinth. venet. (cum ol. tart. dissolut.) ℥iv. lact. ℔vj. sp. vin. ℔ss. destillentur in arena. Apprime convenit in tussi pulmonali & phthisi incipiente.

Aqua Benedicta. B.

℞. Calcis viv. elect. ℔j. superaffund. aq. fluvial. bullient. ℔viiij. post debitam ebullitionem & residuam filtra ad usum.

Aqua

*Aqua Cosmetica. P. Art. 1147.**Aqua Divina Fernelii. Art. 1147.**Aqua Limachum scorbutica. F.*

℥. Limac. cum testis contus. ℥iij. cort. aurant. recent. ℥iij. herb. becabung. nasturt. aquat. aparin. ana M. iij. fer. lact. ℥vj. fiat distillatio, &c.

Aqua limacum pectoralis. F.

℥. Limac. contus. ℥iij. mic. panis alb. ℥xiij. nuc. mosch. ℥vj. herb. heder. terrest. M. vj. fer. lact. ℥vj. distil.

Aqua omnium florum. B.

℥. Fit ex stercore vaccino Majo collect. cum vin. alb. 3ia parte distillato, vel ex stercore vaccin. & limac. cum testis contus. distillatis.

Aqua Ophthalmica Sapphirina. B.

℥. Fit ex aqua calcis viv. ℥j. salis armoniac. ℥iij. in pelvi ænea maceratis, donec colorem sapphirinum acquirat. In quamplurimis oculorum affectibus valet.

*Aqua Prophylactica. Art. 191.**Aqua Scelotyrbica. F.*

℥. Rad. raphan. sylv. ari, cort. aurant. recent. ana ℥iij. herb. cochlear. hortens. persicar. ana M. iv. nasturt. aquat. becabung. salv. menth. ana M. iij. nuc. Mosch. ℥iij. cerevis. annos. ℥xij. distill.

Aqua

Aqua Theriacalis. D. Art. 192.

Arcanum Cosmeticum. B.

℥. Talchi ven. subtilissime pulv. p. j. ol. camphor. p. j. digere in B. M. ad summam albedinem.

Aurum Fulminans. B.

Fit ex auro in aqua reg. solut. & cum oleo tart. præcipitat. edulcando, siccandoque, f. a.

Aurum Mosaicum. B.

Fit ex stanno, mercurio, sale armoniaco, & sulphure mixtis & sublimatis f. a.

Balneum Psoricum. Bar.

℥. Rad. lapath. acut. brion. ana ℥vj. fol. fumar. M. vj. flor. cham. M. iij. furfur. ℔j. sulphur. crud. ℥ij. nitri ℥j. alum. ℥i℥. sal. commun. ℥ij. aq. font. q. f. ad balneum.

Balsamum Rhamelii.

℥. Sapon. venet. ℥ij. camphor. ℥ij. ad ℥℔. sp. vin. q. f. f. a. balsamum.

Balsamum Saturninum. B.

Fit ex sacchar. saturn. ℥iv. spir. terebinth. ℥xij. f. a. digestis.

Balsamum sulph. Anisatum. B.

℥. Flor. sulphur. p. j. ol. Anis. p. iv. digere (lenissimo calore) donec sulphur solvatur, ut fiat balsamum rubicundum.

Be-

Bezoarticum mineral. B.

Fit ex butyro antimonii ℥j. & sp. salis ℥iij. vel
q. s. mixtis & ternis cohobiis distillatis.

Bolus ad Casum. F.

℥. Sperm. cet. ℥j. sal. volat. CC. gr. v. balsam:
peruv. gt. v. theriac. ven. ℥ss. syr. de mecon. q.
s. m.

Cataplasma Anginosum. F.

℥. Fieuum ℥iv. alb. canis ℥ss. flor. sulph. pi-
per. long. ana ℥j. sp. vin. commun. ℥ij. ol. absyn-
th. chym. gt. xvj. diacod. q. s. m.

Cataplasma de Cymino. F.

℥. Cepar. sub ciner. assat. ℥iss. croc. gr. xv. ol.
succin. gt. xij. pulv. sem. cym. ungt. dialth. ana
℥iij. m.

Cataplasma de Halecibus. F.

℥. Rad. brion. alb. ℥ij. sapon. nigr. ℥iij. carn.
halec. (vel encrasicularum) ex muria ℥iv. sal. com.
℥iss. m.

Cataplasma Hydropicum. F.

℥. Sterc. bovin. recent. ℥ij. bacc. laur. pulv.
℥ss. rad. brion. alb. rec. ℥j. sem. cym. pulv. flor.
sulph. ana ℥iv. cum aq. calcis (vel lixiv. fort.)
f. cataplasma addendo axung. porcin. ℥iv.

Cataplasma ex nido Hirundinis. Art. 207.

Cataplasma de Ovis. F.

℞. Vitel. ov. ad duritiem coct. N. iv. ol. fuc-
cin. ℥ij. sem. lin. q. f. m.

Cataplasma Pestilentiale. B.

℞. Stercor. columb. ℥iv. croc. ℥ss. mithridat.
theriac. Lond. sem. sinap. ana ℥j. tereb. q. f. m.
Pro bubonibus rumpendis.

Cataplasma de Pomis. F.

℞. Pulp. pom. (non auster.) assat. ℥j. panis alb.
(in lact. coct. & express.) ℥ss. alb. ov. j. troch. alb.
rhas. pulv. ℥ij. m.

Cataplasma de Rapis. F.

℞. Rad. rapar. in furno coct. ℥viii. herb. rut.
contus. M. iv. sem. sinap. contus. ℥ij. ol. junip. ℥ij.
unguent. nervin. q. f. m. f. cataplasma pulv. eu-
phorb. aspergend.

Cataplasma soleare. B.

℞. Fol. rut. virid. ℥ij. rad. brion. rec. ℥iv. fer-
ment. acerrim. sal. sapon. nigr. ana ℥ss. mustard.
℥iiij. contus. add. acet. q. f.

Cataplasma stomachicum. F.

℞. Theriac. ven. ℥vj. cinnam. garyoph. pulv.
ana ℥j. ol. cinnam. menth. gt. vj. absynth. gt. ij.
acet. q. f. m.

Cataplasma Suppedale. Mu. Art. 934.

Ceratum de Lapide calaminari. T.

℞. Butyr. recent. mense Maji collect. insals. cer. citrin. ana ℥iiiss. ol. oliv. puriss. ℥iv. lapid. calamin. select. subtilissime trit. & cribrat. ℥ij. ℥x. liquecant cera & butyrum super ignem lentum una cum oleo, & colatis statim insperge pulverem gradatim continuo agitando mixturam e fundo vasis, donec frigescece incipiat, & pulvis non amplius subsidere possit.

Cerevisiam ad Cancrum. F.

℞. Lign. guaiac. ℥iv. sassafr. rad. sarsap. oxy-lap. filipend. cynoglos. cort. jugland. ana ℥ij. herb. Robert. Lamii, ana M. iv. milleped. pint. j. præp. pro cong. iv. cerevis.

Cerevisia de Dauco. F.

℞. Sem. dauc. sylv. ℥vj. passul. maj. ℥xij. f. saccul. pro cong. iv. cerevis.

Cerevisia Hydropica. F.

℞. Ciner. genist. cribrat. ℥ss. rad. raphan. sylv. ℥iv. irid. florent. calam. arom. enul. ana ℥ij. lign. guaiac. sassafr. bacc. junip. sem. dauc. sylv. ana ℥j. sem. sinap. ℥ij. præp. pro cerevis. cong. iv.

Cerevisia Hysterica. F.

℞. Rasur. lign. buxi ℥ss. fol. visc. querc. concis. M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vj. ad iv. & in doliolo suspend. saccul. seq.

℞. Rad. præon. mar. recent. ℥ss. brion. alb. ℥iv. herb.

PHARMACOPOEIA. 575

herb. artemis. melis. ana M. vj. puleg. rut. ana M. ij. sem. dauc. sylv. angel. (vel pastin. sylv. ana ℥ij. rasur. stanni (in nod. ligat.) ℔ss. præp. s. a.

Cerevisia Ictérica. F.

℥. Ras. ebor. ℥j. marrhub. alb. M. iv. coq. in cerevis. nov. cong. vj. ad iv. colatur. suspend. saccul. seq.

℥. Rad. oxylap. ℔ss. curcum. rub. tinct. ana ℥ij. urtic. ℥iv. herb. chelidon. maj. aparin. fragar. cum toto, cort. berber. ana M. iv. sterc. ovil. (in nodul.) ℥iv. milleped. viv. pint. j. limatur. chalyb. ℔j. præp. ut artis est.

Cerevisia melanagoga. Art. 443.

Cerevisia ad Melancholiam. Art. 443.

Cerevisia Purgans Hydropica. F.

℥. Rad. irid. nostrat. ℥iv. raphan. sylv. ℥ij. enul. seil. ana ℥j. sem. sinap. bacc. junip. lign. sassafr. ana ℥ij. cort. winter ℥ss. cort. interior. sambuc. ebul. ana ℥ij. sen. ℥iv. rad. hellebor. nigr. jalap. agar. ana ℥ss. præp. pro cong. iv.

Cerevisia ad Rachitidem. F.

℥. Rad. osmund. reg. (vel ejus defectu filic. mar.) glycyrrhiz. lign. sassafr. ana ℥j. cort. fraxin. heder. arbor. ana ℥ss. summit. tamarisci. herb. ling. cervin. ana M. iv. milleped. viv. N. 250. passul. sol. ℥iv. præp. saccul. pro cong. j.

Cerevisia Scorbutica. F.

℥. Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. coq. in Cerevis. nov. generosissimæ cong. v. ad iii℔. in do-

doliol. reposit. affunde Succ. Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ana ℥ij. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso. ℥. Rad. Oxylap. ℥iv. Sassafr., Chinæ, Bac. junip. ana ℥ij. Ras. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Aglimon. Fled. terr. ana M. ij. Antimon. crudi ℥ij. Præp. f. a.

Cerevisia ad Scrophulas. F.

℥. Rasur. guaiac. sassafr. cort. jugland. arbor. rad. oxylap. filipend. cynoglos. ana ℥ij. herb. geran. Robert. Lamij, ana M. iv., passul. sol. ℥ij. milleped. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Chalybs sine acido. B.

Paratur humectando limaturam martis decies sale absynth. in aq. cichor. solut. & siccando in aere sicco ac tepido, postea f. pulv. subtilissimus.

Chalybs Tartarizatus. B.

℥. Limatur. mart. mund. tart. alb. pulverisat. ana ℥vj. aq. fumar. q. s. f. massa, coq. in vase fictili in clibano (calore lento) ad siccitatem f. pulv. deinde add. aq. fumar. ut ante & coq. iterum ut ante. & ad 3iam vicem, & postremo f. pulv. ad usum reservand.

Cinnabaris Antimonii. B.

Fit sublimando caput mortuum post distillationem butyri antimonii relictum, & rectificando f. a.

Collyrium Boyleanum.

℥. Aq. rorismarin. ℥ij. aloë subtilissime pulv. ℥ss. vitriol. alb. vitr. antimon. croc. metallor. ana ℥vj. dig-

digere leni calore per mensem; decantetur liquor purus. *In omnibus fere oculorum affectibus vix datur par remedium.*

Collyrium certum. R.

℞. Aq. plantag. euphras. ros. ana ℥j. trochisc. alb. rhas. ℥ij. lapid. tut. ℥ij. vitriol. roman. gr. ij. m. pro collyrio.

Decoctum amarum febrifugum. M. Art. 36.

Decoctum catechu compositum. F.

℞. Rasur. guaiac. sassaf. ana ℥iij. santal. citr. & rub. ana ℥ij. terræ Japon. pulv. ℥ss glycyrrhiz. ℥j. salv. sicc. M. j. coq. in aq. hord. ℔ij. ad ℔ij. colatur. add. diacod. ℥ij. ol. anis. gt. j. m.

Decoctum Coccineum. F.

℞. Nitri ℥j. sacchar. alb. ℥iv. coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in aq. font. (vel potius decoct. alb.) bullientis ℔ij. coq. & despuma, & per residentiam depuretur.

Decoctum Ictericum. F.

℞. Rad. curcum. rub. tinct. ana ℥j. herb. chelidon. maj. cum toto M. ij. lumbric. mundat N. xx. coq. in aq. & vin. rhenan. ana ℔iiss. ad ℔ij. colatur. add. tinct. croc. (aq. theriac. parat.) ℥j. syr. e s. rad. ℥ij. m.

Decoctum Incrassans. F.

℞. Gum. arab. crasse pulv. ℥iij. coq. in aq. hord. q. s. ad ℔ij. colatur. add. syr. de alth. ℥iij. m.

Decoctum ad morsum canis rabidi. B.

℞. Fol. rut. ℥vj. rad. allii. theriac. Lond. ana ℥iv. limatur. stanni ℥iv. cerevis. illupulat. veter. ℔iv. coq. ad consumption. dimid. & macera, & cola. De morsus capiat coch. vj. bis in die per dies ix. & applicetur magna loco affecto.

Decoctum Nephriticum. F.

℞. Rad. alth. ℥i℔. liquirit. ℥℔. herb. virg. aur. M. ij. alth. parietar. ana M. j. sic N. iv. bacc. junip. sem. petrosel. macedon. bardan. milii sol. (sub med. coction. addit.) ana ℥j. coq. in liquor. posset. vin. alb. alterat. ℔iiij. ad tertiæ partis consumption. colatur. add. syr. de alth. ℥iiij. vel iv. m.

*Decoctum Nigrum. Art. 48.**Decoctum Phthisicum. F.*

℞. Flor. bellid. maj. M. j. limac. mundat. N. iiij. rad. eryng. condit. ℥℔. hord. perlat. ℥iiij. coq. in aq. font. ℔i℔. ad ℔j. cola.

Decoctum Sistens. F.

℞. Pulv. bol. armen. ℥j. cret. puriss. ℥iiij. coq. in aq. font. ℔iiij. ad ℔ij. colaturæ per resident. depurat. add. diascord. ℥℔. aq. cinnam. fort. syr. cydon. e ros. sicc. ana ℥ij. ol. nuc. mosch. gt. ij. m.

Decoctum ad Sitim. B.

℞. Fol. acetos. M. ij. coq. in aq. font. q. s. ad ℔j. colatur. add. succ. 12. limon. vin. rhenan. ℔ij. sacchar. alb. q. s. ad gratiam m.

De-

Decoctum Stypticum. F.

℞. Rad. urtic. consolid. maj. ana ℥i℥. herb. millefol. plantag. ana M. j. cort. granat. gum. arab. ana ℥ij. sem. papav. alb. hyosciam. ana ℥iij. coq. in aq. font. ℥iij. ad ℥ij. colatur. add. syr. e ros. sicc. ℥iv. sacchar. saturn. ℥j. croc. mart. astring. ℥iv. m. dos. ℥iv. bis in die.

Decoctum Variolosum. F.

℞. Rad. scorzoner. ℥i℥. glycyrrhiz. ℥℥. fic. N. viij. passul. sol. exacinat. ℥j. ras. C.C. ℥ij. cocciel. (integ. sub finem add.) ℥iv. coq. in aq. hord. ℥iij. ad ℥ij. colatur. add. syr. garyoph. limon. ana ℥j. m.

Decoctum Ulmi. B.

℞. Cort. interior. ulmi rec. ℥iv. coq. in aq. font. ℥iij. ad dimid. colaturæ rubicundæ (instar. vin. rubelli) add. syr. de rub. Idæ & de mor. ana ℥i℥. m. f. gargarism. elegantiss.

Electuarium contra Abortum. F.

℞. Conserv. ros. rub. cydon. nuc. mosch. cond. succ. chermes, syr. cydon. syr. e coral. ana ℥℥. spec. de hyacinth. ℥iij. aromat. ros. croc. mart. astring. ana ℥ij. sacchar. saturn. ℥j. ol. nuc. mosch. gut. iv. m.

Electuarium Boyleanum. F.

℞. Sem. papav. alb. pulverisat. hyosciam. alb. ana ℥℥. syr. papav. errat. conserv. ros. rub. ana ℥i℥. m. t. elect. dos. quant. jugland. bis in die.

Electuarium Cephalicum. F.

℞. Rad. pæon. mar. pulv. ℥ss. cran. human. cin-
nab. antimon. ana ℥ij. nuc. moschat. condit. ℥ss.
syr. pæon. comp. ℥ij. ol. rorismarin. salv. ana gt. iv.
m. f. electuarium.

*Electuarium Chalybeatum. Pu. Art. 405.**Electuarium de Colophonia. F.*

℞. Conserv. flor. Lamii. alb. ℥iss. diascord. zin-
zib. condit. pulv. colophon. ana ℥ss. ol. cinnam.
gut. iv. syr. e ros. sicc. q. f. m.

Electuarium Epilepticum. B.

℞. Sterc. albissim. pavon. siccat. rad. pæon. mar.
ana ℥ij. rad. valerian. ℥j. sem. pæon. excort. ℥iij.
carvi ℥ss. pulverisatis add. mel. anthosat. q. f. m.
f. electuarium.

*Electuarium Hydragogum. Syl. Art. 825.**Electuarium Hystericum. F.*

℞. Conserv. atriplic. olid. ℥iv. ol. succin. gut.
48. m.

Electuarium Martis. F.

℞. Conserv. absynth. roman. cochlear. hortens.
ana ℥iij. zinzib. cond. ℥iss. rubig. chalyb. (in sub-
tilem pollinem redact.) ℥vj. ol. caryoph. ol. sas-
safir. ana gut. vj. syr. e 5. rad. ℥j. m.

Electuarium Peruvianum astring. F.

℞. Cort. peruv. pulv. ℥j. bals. de tolu, terr. japon. pulv. ana ℥j. syr. Boyleanum q. s. m. f. elect. pro dos. x.

Electuarium Peruv. epilepticum. F.

℞. Cort. peruv. pulv. ℥vj. rad. serpent. virgin. pulv. ℥ij. cum q. s. syr. pæon. comp. f. elect.

Electuarium Stypticum. F.

℞. Conserv. ros. rub. ℥iij. croc. mart. astring. ℥iij. sacchar. saturn. ℥j. syr. cydon. vel e ros. sicc. ℥ss. m. f. elect.

Electuarium e zinzibere. F.

℞. Conserv. ros. rub. ℥iij. zinzib. cond. ℥j. ol. cinnam. gut. iv. ol. garyoph. gut. ij. m.

Emplastrum Cephalicum. F.

℞. Empl. de beton. ℥ss. gum. caran. tacamach. ana ℥iij. bals. totulan. ℥ij. bals. peruv. vel capiv. ℥j. f. empl.

Emplastrum Ischiaticum. F.

℞. Pic. Burgund. ℥ij. galban. ℥j. sulph. viv. ℥ij. succin. ℥j. hermodact. rad. ireos florent. sem. cym. Por. cham. ana ℥ss. petrol. q. s. m. f. empl.

Emplastrum Mamillare. B.

℞. Sperm. cet. ℥j. cer. alb. ℥ij. galban. aceto præp. ss. ol. sambuc. q. s. f. empl.

Emplastrum Pleuriticum. F.

℞. Empl. paracel. de sapon. ana ℥j. unguent. populn. ℥ss. camphor. ℥ij. m. liquefiant lento igne perpetuo agitando cum spatula; quando frigesce-re incipiant, addatur camphora & f. empl. molle.

Emplastrum de Pyrethro. F.

℞. Galban. colat. sagapen. ammoniac. (vin. alb. solut. & colat.) ana ℥j. pulv. rad. pyreth. sem. si-nap. ana ℥ss. tereb. ven. q. s. m.

Emplastrum Roborans. F.

℞. Empl. stomach. magistral. ℥ij. oxycroc. (ri-te præp.) ℥ij. gum. caran. tacamach. ana ℥j. bal-sam. toltutan. ℥ij. bals. peruv. ℥j. ol. cinnam. ga-ryoph. nuc. mosch. ana gut. ij. menth. absynth. ana gut. j. f. empl.

Emplastrum Smeeticum. B.

℞. Minii ℥ss. ol. oliv. ℥ij. sapon. alb. ℥iv. ce-ræ ℥ij. coq. s. a. & f. empl.

Emplastrum ad Strumas. 1. B.

℞. Empl. de cicuta cum ammoniac. ℥iv. gum. elem. ℥ss. mercur. sublimat. corrosiv. ℥x. m. f. empl.

Emplastrum ad Strumas. 2. Bar.

℞. Empl. de ranis cum mercur. ℥ss. galban. ℥ij. sacchar. saturn. sal. volat. ammoniac. ana ℥ss. ol. rub. q. s. f. empl.

Emul-

Emulsio Asthmatica. F.

℞. Milleped. viv. N. 120. contus. sensim affund. aq. puleg. ℥vj. in liquore fortiter expresso dissolv. gum. ammoniac. ℥iij. colatur. add. tinct. benzo. ℥iij. m. dos. coch. j. ex haust. decoct. pectoral. saepe in die.

Emulsio Bruneri. F.

℞. Gum. ammoniac. ℥ss. dissolv. (in mortar.) in aq. hyssop. frigid. ℥iv. & vin. rhenan. ℥ij. colatura fit pro haust. ij. urgente suffocationis periculo in asthmate capiend.

Emulsio Peoniata. B.

℞. Sem. pæon. decort. ℥j. contus. affund. aq. rut. ceras. nigr. pæon. comp. ana ℥vj. f. emulsio, add. sacchar. perlat. q. s.

Emulsio Styptica. F.

℞. Rad. consolid. maj. ℥iv. coq. in aq. font. ℔iij. ad ℔ij. cum colatura & sem. papav. alb. hyoscyam. amygd. dulc. excort. ana ℥ss. sal. prunel. ℥ss. sacchar. saturn. ℥j. & sacchar. alb. ℥j. f. emulsio.

Enema acre. Bo.

℞. Pulv. colocynth. ℥ss. fol. tabac. ℥ss. coq. in aq. font. q. s. ad ℥x. admisce sal. gem. ℥ij. f. enema.

Enema amarum. F.

℞. Rad. serpent. virg. contus. ℥j. pulp. colocynth. (in nodulo ligat.) ℥j. herb. tanacet. summit. fabin. ana Mss. coq. in aq. font. q. s. ad ℥vj. colatur. add.

584 PHARMACOPOEIA.
add. ol. hyperic. ℥ss. ol. absynth. chym. ℥ss. spec.
hier. picr. ℥ss. m.

Enema Apoplecticum. F.

℥. Rad. pyreth. ℥ss. herb. rut. Mij. pulp. colo-
cynth. (in modul. ligat.) ℥ss. coq. in aq. font. q. s.
ad. ℥xij. colatur. add. intus. croc. metallor. ℥iij.
tinct. castor. ℥ss. ol. succin. sal. gem. ana ℥ij. f.
enema.

Enema Balsamicum. F.

℥. Rad. alth. ℥j. herb. malv. parietar. mercurial.
ana M. j. sem. lin. ℥ss. coq. in q. s. aq. font. ad ℥xij.
colatur. add. tereb. vitel. ov. solut. ℥ss. ol. lin. ℥ij.
elect. linitiv. ℥j. m. f. enema.

Enema Emolliens. G. Art. 735.

Enema Febrifugum.

℥. Cort. peruv. subtilissime pulv. ℥ij. coq. mul-
tiplici coctione in aq. font. donec redeat ad ℥ss.
colaturæ turbidæ add. diascord. ℥ss. ol. anis. gut.
j. m.

Enema Hystericum. F.

℥. Rad. Aristol. rotund. bryon. alb. ana ℥ss.
herb. rut. matricar. puleg. flor. cham. ana M. ss.
coq. in q. s. aq. font. ad. ℥xii. in colatur. dissolv.
asæ foetid. ℥j. ol. succin. ℥ij. sacchar. rub. ℥j. m.

Enema e quatuor Oleis. F.

℥. Ol. lin. cham. ana ℥vj. ol. scorpion. ℥ij. te-
reb. ℥ij. m.

Ene-

Enema Terebinthinatum. F.

℞. Urin. sani ℥j. terebinth. venet. vitel. ov. solut.
℥j. ol. anis. ℥j. theriac. januens. ℥j. m.

Enema ad tormina. F.

℞. Cret. pulv. ℥ss. herb. rut. flor. cham. ana M.
℥. coq. in q. s. aq. font. ad ℥iv. colatur. add. tinct.
castor. diascord. ana ℥ij. syr. de mecon. ℥ss. ol. anis.
gut. x. m.

Enema de Verbasco. F.

℞. Herb. cicut. hyoscyam. ana M. j. verbasco. flor.
sambuc. ana M. ℥. coq. in aq. ferrat. q. s. ad ℥xij. in
colatura dissolv. vitel. ov. N. j. ol. lin. ℥ij. ol. succin.
℥ss. bals. sulph. ℥ij. m.

Ens Veneris. B.

℞. Vitriol. mart. opt. reverberat. & lot. p. j.
sal. armoniac. p. ij. sublimentur s. a. cum tribus
chobiis.

Epithema de Calce. F.

℞. Calc. viv. ℥ij. mellis liquid. q. s. f. f. mistura
aliquando sapo vulgaris addatur.

Epithema de saccharo Saturni. F.

℞. Acet. ℥ss. sacchar. saturn. ℥j. m. Huic immer-
gatur petia lintea dupla, & frigide cordis regioni
applicetur, & quoties tepescet renovetur; ad narium
hemorrhagiam expertus laudo.

Epi-

Epithema Saponaceum. F.

℞. Spirit. lumbricor. magistr. ℥vj. sp. cochlear. ℥ij.
sp. sal. armoniac. ℥vj. sapon. venet. ℥ss. camphor. ℥vj.
opii ℥j. croc. ℥ss. digere aliquot dies & cola.

Epithema Stomachicum. F.

℞. Sp. vin. camphorat. ℥iv. theriac. androm. ℥ij.
ol. garyoph. gut. xvj. ol. nuc. mosch. gut. viij. ol.
menth. gut. iv. anis. absynth. ana gut. ij.

Expressio Asthmatica. F.

℞. Milleped. viv. N. 128. contus. affund. aq. hyssop. ℥iv. puleg. ℥ij. pæon. comp. ℥j. in liquore expresso dissolv. gum. ammoniac. gr. xxxij. colatur. add. tinct. benzo. ℥ij. syr. balsam. ℥j. ol. anis. gt. j. sp. sal. armoniac. q. s. ad justum acorem conciliandum. Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Diuretica. VV.

℞. Milleped. viv. tinct. sal. tart. ana ℥ij. contunde & fortiter exprime. Dos. gt. xl. vel l.

Expressio Millepedum Simplex. F.

℞. Milleped. viv. ℥iij. sacchar. alb. ℥ij. simul contus. affund. vin. alb. ℥bj. probe misceantur, & coletur liquor.

Expressio Millepedum IctERICA. F.

℞. Milleped. viv. N. 100. croc. ℥ss. nuc. mosch. ℥ss. sacchar. alb. ℥ss. contus. affund. aq. chelidon. ℥iv. lumbricor. magistr. ℥ij. f. expressio.

Expressio millepedum ad Pertussim. F.

℞. Milleped. viv. mund. ℥ij. pulv. sem. anis. ℥j. nuc. mosch. ℥ss. sacchar. alb. ℥j. contus. affund. aq. puleg. ℥vj. bryon. comp. pæon. comp. ana ℥j. f. expressio.

Ex.

Expressio scorbutica calida. F.

℥. Herb. cochlear. hortens. nasturt. aquat. beccabung. chelidon. maj. ana M. iv. contus. add. vin. alb. ℥ss. aq. raphan. comp. lumbricor. magistr. ana ℥iv. f. expressio, cui add. sp. cochlear. ℥ij. sacchar. alb. ℥ij. m.

Expressio scorbutica temperata. F.

℥. Herb. beccabung. nasturt. aquat. tarax. aparin. ana M. iv. mal. aurant. (cum corticibus) N. iv. contus. affund. vin. alb. aq. flor. sambuc. ana ℥bj. per subfidentiam clarificetur & cum sacchar. ad libitum edulcetur.

Extractum Pectorale. F.

℥. Maltæ opt. cong. iß. aq. cong. ij. f. alæ f. a. cong. j. huic claræ & non fermentatæ add. passul. solis exacinat. & concis. ℥ss. glycyrrhiz. ℥j. ter. japon. ℥j. coq. donec ℥iv. sint evaporatæ: postmodum exprimendo coletur; denique (additis coccinel. ℥iv.) percoq. ad mellaginem. *Est egregium incrassans.*

Flores salis Armoniaci martiati. B.

Fit ex limaturis martis & sale armoniaco ana sublimatis, aeri exponendo caput mortuum, miscendo cum dimid. quant. sal. armoniac. siccando, & sublimando f. a.

Fotus Adstringens. F.

℥. Cort. querc. ℥ij. granat. ℥ss. flor. balauft. ros. rub. ana M. j. coq. in aq. ℥iv. ad ℥ij. colatur. add. vin. rub. Lisbon. ℥ss. m. addi possunt alum. ℥ij.

Fotus ad Calculum. G. Art. 735.

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem. F.

℥. Rad. cæpar ℥ij. sem. lin. ℥j. herb. hyoscyam. ver-

588 PHARMACOPOEIA:

verbasco. linar. millefol. ana M. ij. coq. in aq. font. ℥vj. ad ℥iv. in colatura dissolv. opii ℥ij. m.

Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum. F.

℥. Herb. verbasco. millefol. plantag. fol. sambuc. ana M. iv. cort. granat. ℥j. coq. in aq. & vin. rub. astring. ana ℥iiij. ad tertiæ partis consumption. in colatura dissolv. alumin. ℥ss. sacchar. saturn. ℥ij.

Fotus lateralis. F.

℥. Rad. alth. capit. papav. alb. (scis. & cum sem. contus.) ana ℥ij. sem. lin. foenugr. cym. bacc. lauri ana ℥j. herb. malv. matricar. ana M. iiij. coq. in aq. ℥viiij. ad dimid. cola.

Fotus Podagricus. F.

℥. Herb. chamæpit. abrot. ana M. iv. coq. in aq. font. ℥vj. ad ℥iv. in colatura dissolv. sal. tartar. sal. armoniac. ana ℥iv. m.

Fotus Spirituosus. F.

℥. Aq. regin. Hungar. ℥vj. sp. lavend. comp. cochlear. ana ℥iss. sp. sal. armoniac. ℥ss. camphor. ℥v. ol. terebinth. gut. 80. m. digerantur.

Fotus Stomachicus. F.

℥. Vin. rub. ℥j. sp. vin. commun. acet. vin. ana ℥ss. absynth. menth. ana Mss. rad. bistort. ℥ss. cort. granat. ℥ij. garyoph. mac. nuc. mosch. cinnam. ana ℥j. theriac. ven. ℥ss. macerentur clausæ in baln. mar. duas horas; colatura sit pro fotu.

Fotus ad Tympanitidem. F.

℥. Nitri ℥ij. sal. armoniac. ℥i. sp. vin. tenuioris multo phlegmate imbuti ℥ij. m. & dissolve in vitro.

Galbanetum Sennerti. B.

℥. Gum. galban. p. j. sp. terebinth. pij. ol. lavend. p. ss. digere & distilla ex retorta s. a.

Gar.

Gargarisma Anginosum . F.

℞. Herb. aquileg. M.ij. cort. inter. ulmi ℥i. fung. sambuc. glycyrrhiz. alb. canis ana ℥ss. coq. in q. s. aq. font. ad ℥ij. in colatura dissolv. sal. armoniac. ℥ij. syr. de rub. idæ. mel. ros. ana ℥ij. m.

Gargarisma Commune .

℞. Aq. plantag. ℥x. ros. rub. ℥iij. syr. e mor. ℥ij. mel. ros. ℥j. ol. vitriol. q. s. ad aptam aciditatem m.

Gargarisma contra Fœtorem . F.

℞. Myrrh. ℥ij. rad. irid. florent. cyperi calam. aromat. angel. Hispan. ana ℥j. garyoph. ℥ss. flor. rorismarin. M. j. infund. clausæ & calide duas horas in aq. font. ℥ss. vin. alb. ℥iv. colatur. add. aq. regin. Hungar. ℥vj. tinct. benzo. ℥j. m.

Gargarisma Myrrhisatum 1. F.

℞. Vin. rub. astring. ℥j. myrrh. pulv. ℥ij. m.

Gargarisma Myrrhisatum 2. F.

℞. Myrrh. pulv. ℥j. dissolv. in mortar. cum vitel. ov. ℥ij. add. mel. ros. ℥ij. vin. alb. ℥ss. m.

Gargarisma ad Pituitam . F.

℞. Aq. Hyssop. ℥x. sp. vin. rectificat. ℥j. sp. cochlear. ℥ss. sp. castor. ℥ij. sp. sal. armoniac. ℥iv. pulv. rad. pyrethr. ℥j. mel. ℥iv. m.

Gargarisma Prunellorum . F.

℞. Cort. prunellor. sylvestr. ℥ij. coq. in q. s. aq. font. ad ℥ij. in colatura dissolve alumin. ℥iv. acer. ℥ij. mel. ros. ℥iv. m.

Gargarisma in Variolis . S. Art. 134.

Gargarisma Variolosum . 1. M. Art. 139.

Gargarisma Variolosum . 2. F.

℞. Hord. perlut. glycyrrhiz. ana ℥ss. rad. alth. vi-
ciar.

ciar. ana ℥j. ficuum N. xij. fung. sambuc. M. j. coq. in q. s. aq. font. ad ℥iij. colatur. add. oxymel. scilicet. mel. ros. ana ℥ij. m.

Gargarisma pro Uvula. F.

℥. Herb. aquileg. M. iv. flor. ros. rub. balauſt. ana M. ſs. piper. long. ℥iv. myrrh. ℥ij. coq. in aq. font. ℥iij. & vin. alb. ℥ſſ. ad tertiæ partis conſumptionem. colatur. add. ſp. vin. ſyr. e mor. de rub. de idæ. ana ℥ij. m.

Haustus Diaphoreticus. F.

℥. Aq. card. ben. ℥iij. epidem. theriacal. ſyr. de mecon. ana ℥ſſ. antimon. diaphor. ℥j. theriac. androm. ℥ij. ſp. ſal. armoniac. gut. xij. m.

Haustus Diureticus Acidus. F.

℥. Aq. raphan. comp. ℥iſſ. ſp. vin. gallic. ſucc. limon. ana ℥ſſ. ſyr. violar. ℥j. m. f. haust.

Haustus contra Fluorem. F.

℥. Alb. ov. N. j. conquaſſato add. aq. cinnam. fort. ℥iſſ. m.

Haustus Hydragogus. F.

℥. Gum. gamand. crem. tart. pulv. ana gr. xiv. ol. junip. gut. iij. diſſolv. diligenter in mortar. in vin. alb. ℥iij. addendo ſacchar. alb. ℥iſſ. m.

Haustus Japonicus. F.

℥. Aq. ſpermat. ranar. ℥ij. ſyr. e ros. ſicc. ℥ij. ter. japon. pulv. ℥j. ſacchar. ſaturn. gr. iv. ol. cinnam. chym. gut. j. laudan. liquid. gut. xx. m.

Haustus Pleuriticus.

℥. Ol. ſem. lini frigide extract. ℥iij. ſperm. cer. ℥ij. ol. nuc. moſch. gut. ij. aq. cinnam. hord. ſyr. papav. errat. ana ℥vj. m. f. haust. quam calidiſſime ſumend.

Ha-

Haustus Saponaceus. F.

℞. Sapon. venet. ras. a ℥ij. ad ℥iv. coq. in lact. ℥vj. ad ℥iv. colaturæ add. sacchar. alb. tantillum.

Haustus Saturninus. F.

℞. Aq. spermat. ranar. ℥ss. acet. ℥ss. succ. urticae ℥ij. syr. de mecon. ℥vj. sacchar. saturn. gut. vj. alum. gr. iij. sang. dracon. ℥ss. m.

Infusum Cephalicum. F.

℞. Sterc. pavonis alb. ℥iv. milleped. contus. ℥j. aq. ceras. nigr. vin. alb. ana ℥ss. infund. 24. horas frigide, colaturæ per manicam clarificatæ add. aq. Langii ℥iij. sp. lavend. comp. ℥ss. ol. nuc. mosch. gut. iij. syr. pæon. comp. ℥vj. m.

Infusum Chalybeatum Amarum. Art. 48.

Infusum Fracastorii.

℞. Theriac. androm. ℥ij. diascord. ℥ss. coccinel. ℥ss. infund. clausæ & calide per horæ quadrant. in aq. lact. alex. ℥vj. colatur. add. aq. cinnam. fort. syr. cydon. ana ℥j. m. *dosis coch. iv. quarta vel sexta quaque hora pro re nata.*

Infusum Traumaticum. F.

℞. Caulium virid. solani lignosi concis. ℥iv. coccinel. ℥j. vin. alb. ℥ss. infund. calide & clausæ per noctem, colatur. add. syr. heder. terrest. ℥iv. theriac. ven. ℥ss. m.

Injectio ad Gonorrhœam. E.

℞. Aq. calc. viv. ℥iv. mercur. dulc. ℥ss. sacchar. saturn. ℥j. m. pro injectione. *Usurpetur liquor per residentiam depuratus.*

Ulapium Moschatum. F.

℞. Aq. rosar. damascen. ℥vj. naphthæ ℥j. cinnam. hord.

hord. ℥ij. pæon. comp. ℥iſſ. moſch. ambræ griſ.
(cum ſal. C. C. trit.) ana gr. ij. croci (ſciſſi & in no-
dul. ligat.) ℥j. ol. garyoph. gut. j. confect. alkerm. ℥ij.
ſyr. caryoph. ℥iſſ. m.

Julapium Stomachicum. F.

℥. Vin. Xeroenſis, aq. cinnamom. hord. ℥iv. aq.
menth. gent. comp. ſyr. cydon. ana ℥ij. ol. garyoph.
nuc. moſch. ana gut. ij. m. addi poſſint theriac. ven.
℥ij.

Lac Sublimatum.

℥. Aq. calc. viv. ℥iv. mercur. ſublimat. corroſiv.
gr. xij. diſſolv. in vitroleni calore. *Poteſt augeri vel
minui quantitas ſublimati, prout fortius aut debilius
medicamentum efficere volueris.*

Lac Virginal. P. L.

℥. Alumin. rupei ℥iv. coq. in aq. font. ℔ij. ad ter-
tias; tum ℥. Litharg. auri ℔ſſ. vin. alb. ℔iſſ. deco-
quantur ad ℔j. colentur, ambæque aquæ commi-
ſceantur, & agitentur donec albeſcant.

Linimentum Anodynum. R. Art. 236.

Linimentum Paralyticum. F.

℥. Unguent. martiat. ℥ij. petrol. ol. ſpicæ, ana
℥iij. pulv. euphorb. ℥j. ol. ſuccin. ℥iſſ. ol. roriſmarin.
℔ſſ. m.

Linimentum Pſorjcum. Bir.

℥. Sulph. crud. ℥ij. ſapon. venet. ℥iſſ. nitri præp.
℔ſſ. litharg. aur. ℥ij. mercur. dulc. ℥iſſ. unguent. alb.
camphorat. ℥j. ol. lign. rhod. gut. iv. m. f. linimen-
tum.

Loboch Myrrhiſatum. F.

℥. Myrrh. pulv. ℥ij. croc ℔ſſ. nuc. moſch. ℔ſſ. mel-
lis ℥ij. M.

Loboch

Loboch ad Raucedinem. F.

℞. Sperm. ceti ℥ss. sacchar. alb. ℥j. optime simul contus. in mortario sensim add. syr. balsam. q. s. m.

Loboch Rubrum. F.

℞. Conserv. fruct. cynosbat. ℥ss. syr. bac. sambuc. ol. amygd. dulc. ana ℥j. m.

Loboch Viride. F.

℞. Sapon. venet. ras. ℥ij. ol. amygd. dulc. syr. violar. ana ℥j. m.

Loboch Vitellinum. F.

℞. Sperm. cet. ℥iiss. subigatur in mortario cum vitel. ov. N. j. & add. ol. amygd. dulc. syr. de alth. ana ℥j. m.

*Lotio Lanfranci. Art. 984.**Mistura Acida.*

℞. Aq. plantag. syr. papav. erratic. ana ℥iss. ol. vitriol. ℥ij. misce.

Mistura Balsamica Nephritica. F.

℞. Balsam. capiv. ℥ss. ol. junip. chym. ℥ss. vitel. ov. N. ij. syr. de alth. ℥iiss. aq. persicar. ℥x. m.

Mistura Consolans. F.

℞. Vin. Xeroens. ℥ss. aq. cinnam. fort. ℥iv. aq. ros. sacchar. cand. alb. ana ℥ij. succ. chermes colat. ℥j. spec. lætif. Galeni ℥ij. fol. auri N. iv. ol. nuc. moschat. gut. iv. m.

Mistura Corallata. F.

℞. Coral. rub. subtilissime lævigat. ℥ij. sal. absynth. ℥iv. succ. limon. ℥iv. aq. cinnam. fort. ℥ij. M. stent in vitro capaci.

Mistura Ecephrætica. F.

℞. Summit. pini concis. M. vj. coq. in aq. font. ℥iv. ad ℥ij. colaturæ fortiter expressæ add. succ. depurat. cochlear. hortens. ℥j. beccabung. nasturt. aquat. tarax. ana ℥ss. aq. raphan. comp. ℥iij. huic misturæ dissolve vitriol. Mart. ℥viij. per noctem reponatur, ut subsideat fæx lutea; dein liquori claro effuso adde sal. absynth. ℥iv. sacchar. alb. ℥xij. m.

Mistura Expectorans. F.

℞. Tinctur. benzo. ℥ss. tinct. croc. tinct. myrrh. tinctur. gum. ammoniac. sp. sal. armoniac. ana ℥j. aq. hyssop. ℥vj. lumbricor. magistral. ℥iij. syr. de prassio ℥ij. m.

*Mistura simplex Paracelsi. Art. 78.**Mistura Stomachica. F.*

℞. Aq. cinnam. fort. ℥j. ol. vitriol. ℥j. ol. garyoph. gut. xxiv. m.

Nitrum Saturnisatum. B.

℞. Sacchar. saturn. nitri ana p. æ. Solve in aceto distillato & crystallisa f. a.

Nodulus Hystericus. B.

℞. Castor. pulv. ℥ss. asæ foetid. ℥j. ol. succin. ℥ss. misce, & in serico involve, ut fiat nodulus, &c.

Ol. Ranarum. B.

Coque ranas vivas N. 12. in ol. olivar. ℥iij. per ho-

horam & deinde exprime. In cancro specificum perhibetur.

Oxymel Asthmaticum. F.

℞. Rad. zedoar. ℥j. coq. in aq. font. ℔ij. ad ℔i℥. colaturæ add. gum. ammoniac. (in acet. ℥iv dissolut.) ℥j. colaturæ add. mellis ℥iv. coq. despuma & cola. *Dentur roch. iij. mane & vesperi per menses aliquot.*

Phœnigmus. Mu. Art. 934.

Pilulæ Balsamicæ. M.

℞. Milleped. præp. ℥iij. gum. ammoniac. purissim. ℥i℥. flor. benzoin. ℥ij. vel. ℥j. extract. croc. balsam. peruv. ana ℥j. balsam. sulph. terebinth. vel anisat. q. s. f. massa.

Pilulæ Catharticæ in Scorbuto.

℞. Gum. ammoniac. ℥j. calomel. ℥ij. extract. hel-lebor. nigr. ℥ij. balsam. peruv. parum m. f. massa pil. dos. ℥ij.

Pilulæ ad Colluviem. F.

℞. Calomel. ℥ij. sacchar. saturn. ℥j. camphor. amyl. ana ℥i℥. balsam. capiv. q. s. m. f. pil. pro dos. xij.

Pilulæ de Creta Palmarii. B.

℞. Aloes opt. ℥j. cret. albis. succin. alb. gentian. myrrh. rad. fraxinel. ana ℥j. mithridat. ℥iv. tereb. lot. ℥ij. syr. de Alth. q. s. f. massa pil. *Sunt qui addunt calomel. ℥i℥. vel ℥vj. Dos. ℥ij. vel ℥j. omni nocte ad dies xv.*

Pilula Diuretica. F.

℞. Test ovar. calcinat. ℥ss. camphor. ℥j. cantharid. ℥ss. tereb. ven. q. s. f. pil. pro dos. iij.

Pilula Hydragoga. F.

℞. Gambog. pulv. a gr xij. ad gr. xvj. ol. Junip. gut. ij. mithridat. q. s. f. pil. pro una dosi.

*Pilula Hydropica Bontii. Art. 825.**Pilula Hysterica. F.*

℞. Galban. colat. asæ foetid. myrr. ana ℥j. castor. camphor. sal. succin. ana ℥ss. ol. succin. gut. iv. balsam. peruv. q. s. f. massa, cui (quoties res postulaverit) adjici possunt sal. chalyb. ℥ij. exindeque dicantur pil. hyster. chalyb.

Pilula Volatiles.

℞. Sal. volat. C. C. vel sal. volat. ammoniac. ℥ij. gum. ammoniac. ℥j. extract. croc. pulv. carn. viper. ana ℥j. bals. peruv. q. s. m. f. massa pil.

*Pulvis Diureticus. G. Art. 735.**Pulvis Epilepticus de gutteta dictus. B.*

℞. Rad. fraxinel. visc. quercin. contrayerv. serpent. virgin. pæon. mar. (debito tempore collect.) sem. pæon. mar. magist. C. C. magist. ungu. alcis ana ℥ij. rad. valerian. sylv. ℥j. coral. rub. cran. human. ana ℥ij. lapid. hyacinth. ℥j. bezoar. occident. ℥ss. orient. ℥j. m. f. pulvis subtilis; adde mosch. gr. v. fol. auri N. 30. m.

Pul-

Pulvis Hemoptoicus. F.

℞. Sem. hyoscyam. papav. alb. ana ℥ij. ter. sigil. lapid. hæmatit. ana ℥j. sacchar. ros. ℥vj. m. f. pulv.

Pulvis Pleuriticus. B.

℞. Flor. sulph. ℥ij. dent. apri, mandib. lucii piscis ana ℥j. flor. papav. rhœad. ℥ss. m. f. pulvis Dos. ℥j.

Pulvis Uvularis. F.

℞. Ter. japon. flor. balaustr. ana ℥j alum. piper. long. ana ℥ss. m. f. pulvis. *Modus usurpandi est, ut lingua speculo oris depressa, pulvis (ope fistulæ) insuffletur uvulæ, & operatio pro re nata repetenda.*

Pulvis Uvularis. 2. B.

℞. Flor. balaustr. rad. bistor. tormentil. ana ℥ij. alum. ℥j. m. f. pulv.

Semicupium Hildani. Art. 988.

℞. Rad. & fol. alth. rad. & fol. malv. rad. scænicul. apii, petroselin. eryng. marin. ana ℥ij. (rad. raparum ℥ij.) herb. parietar. violar. veronic. flor. cham. melilot. genist. sambuc. ana M. j. sem. lin. scænugr. ana ℥j. petroselin. anis. scænic. genist. ana ℥ij. coq. in q. s. aq. font. pro semicupio.

Stypticum Regis. B.

Vitriolo soluto, filtrato, cum aceto distillato præcipitato, edulcato, & siccato affunde oleum vitrioli, & distilla ex retorta ad siccitatem; caput mortuum digere cum spiritu vini, filtra calide ac ab-

598 PHARMACOPOEIA.
strahe. Solve salem in fundo remanentem cum qua-
druplo aquæ per digestionem, & f. nypiticum.

Succi Antiscorbutici.

℞. Fol. cochlear. hortens. beccabung. nasturt.
aquat. ana p. æ. contundantur & exprimatur succus
ad ℥ij. deinde add. vin. alb. vel rhenan. ℥j aq. ra-
phan. comp. succ. aurant. acid. ana ℥ss. misce dos.
℥iij. bis in die sine vel cum paucō saccharo.

Suffitus ad Catarrhum.

℞. Oliban. succin. benzo. styrac. calam. gum.
guaiac. balsam. toltan. ana ℥ij. f. pulvis crassus
pro suffumigio capitis.

Syrupus de Peto. F.

℞. Succ. peti anglic. ℥iv. oxymel. simpl. ℥iv. hy-
dromel. ℥j. misce & digere quatuor dies, ut optime
defæcetur: tunc decanta iterumque digere ut supra,
donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit:
adde postea sacchar. ℥ij. & coq. in syrup. f. a.

Syrupus Vermifugus. B.

℞. Fol. helleborastr. rec. ℥ij. Hagiopermi ℥ss.
rad. bryon. rec. ℥ss. absynth. roman. M. ij. coq. in
aq. font. q. s. ad ℥j. colatur. add. sacchar. alb. ℥j.
& coq. ad syrup. f. a.

Tabellæ Domestica. S. Art. 488.

Tabellæ Embryonum. B.

℞. Pulv. rad. bistort. ebor. coral. rub. coriandr.
præp. ana ℥ss. succin. alb. crystal. bacc. cherm. ana
℥ij. sacchar. alb. ℥xvj. aq. cydon. q. s. coq. f. a. adden-
dool. cinnam. gut. vj. affund. & f. tab. f. a.

Tin-

Tinctura Antiphthisica. F.

℞. Sacchar. saturn. vitriol. mart. ana ℥j. sp. vin. rectific. ℥viii. reponē in frigido donec rubescat spiritus.

Tinctura Bezoartica. B.

℞. Rad. enul. angel. zedoar. serpent. virg. ana ℥ss. croc. opt. ℥j. myrrh. cinnam. cort. citr. sicc. ana ℥vj. fol. scord. rut. ana M. ss. theriac. androm. ℥iij. opii thebaic. ℥ij. sp. tart. rectific. ℥xv. sp. vitriol. ℥iij. sp. bacc. sambuc. & sp. bacc. junip. rectific. ana ℥xviii. digere s. a. ac filtra, tum add. sal. succin. ℥j. camphor. ℥ij. digere iterum ad usum. Dos. a ℥iij. ad ℥j.

Tinctura Cantharidum. G.

℞. Pulv. cantharid. ℥j. sp. nitri fortissim. ℥ij. digere simul horas 24. Sic cantharides plane dissolventur, & liquor rubicundus erit; huic superaffund. sp. vin. ℥vj. digere simul, quo diutius eo melius: postea filtretur tinctura, & ad usum reservetur. Dos. a gut. xij. ad xl. bis in die in haustul. vin. alb. vel rhenan.

Tinctura Epileptica. F.

℞. Castor. opt. ℥ss. succin. flav. in tenuissim. pulverem redact. croc. angl. ana ℥ij. flor. recent. lil. conv. val. ℥j. his affund. sp. vin. camphorat. sp. lavend. comp. sp. sal. armoniac. ana ℥iv. digerantur. absque calore dies vj. in vitro clauso; postea filtretur tinctura, vel decantetur a facibus per colum. Dos. a ℥. ad ℥j. in aq. ceras. nigr.

Tinctura Gum. Lacca. F.

℞. Pulv. gum. lacc. ℥ss. alum. ust. ℥j. sp. cochlear. ultimo extillantis ℥viii. phiala arcte inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Vapor ad Anginam. F.

℞. Piper. pulv. ℥j. lact. ℥ij. coq. ad ℥iſſ. dein ponatur in lagena stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiat.

Vinum Chalybeatum. P. L.

℞. Chalyb. præpar. ℥j. Croci pulverisati & in nodulo inclusi gr. viij. Vini albi odori ℥ij. infunde frigide per triduum, aut quatrimum, sæpe interea agitando, in verso vase. Tum F. colatura per manicam Hipp. serveturque usui.

Vinum Chalybeatum. 2. F.

℞. Limatur. chalyb. ℥ij. succ. aurant. acid. N. viij. (vel potius ℥iv.) stent simul horas 24. Dein. add. vin. alb. ℥iv. cinnam. ℥ss. garyoph. ℥ij. mac. Div. stent tepide dies iv. dos. ℥iij. bis in die.

Vinum Hydropicum. F.

℞. Rad. irid. florent. ℥ij. enul. scill. ana ℥ss. cort. sambuc. ebul. ana ℥j. cort. winteran. ℥ij. sennæ ℥ij. hellebor. nigr. agur. jalap. ana ℥ij. vin. alb. ℥iv. Infunde frigide. Dos. ℥iv.

Vinum Viperinum. B.

℞. Viperas foemellas vivas tempore verno collectas

PHARMACOPOEIA: 607

lectas N. vj. vin. hispan. opt. ℥vj. macera (vase optime clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum . Sunt qui macerant vyperas excoriatas (rejectis interaneis, cauda, ac capite) in vin. hispan. per aliquot dies. *Dos.* ℥iij. vel iv. *bis in die ad longum tempus.*

Vitriolum Martis. B.

℥. Alcoh. vin. ℥iv. ol. vitriol. ℥ij. serva simul in vase ferreo ad dies xv. vel ad siccitatem. *Dos.* a gr. ij. ad vj.

Unguentum Digitale. B.

℥. Butyr. majal. ℥iij. flor. digitalis rec. contus. quot infarciri possunt, insolentur dies 30. deinde coq. s. a. & s. expressio.

Unguentum Hemorrhoidale. F.

℥. Unguent. populn. ℥j. ol. succin. ℥ij. m. f. unguent.

Unguentum Pleuriticum. F.

℥. Unguent. dialth. ℥j. ol. lin. ℥ss. ol. cymini: ℥ss. camphor. ℥ss. sp. sal. armoniac. ℥ss. m.

Unguentum ad Ulcera Venerea. P.

℥. Mercur. præcipit. rub. ℥ij. mercur. præcipit. alb. ℥j. ol. tart. per deliq. ℥ij. unguent. pomat. ℥ij. m.

SYLLABUS

Symptomatum Morborum,

S I V E

Ægrotorum passiones variæ enumeratæ, & ad calculum redactæ, in hunc finem, ut Morbos eorumque Causas Medicus facilius, promptius & certius inveniat, introspiciat & cognoscat, unice constructus.

Usus hujus Indicis neminem latere potest.

MEDICUS juvenis & in Praxi minus exercitatus, ægrum suum de omnibus apte interroget, atque ex ipsius, vel cohabitantium ministrantiumve ore Symptomata & Queremonias omnes sedulo expiscetur: hoc facto, singula Symptomata in Indice investiget; & librum ipsum (quoties opus sit) variis in locis consulat; indeque de natura Morbi, utcunque obscuri, complicati, judicium justum & raro fallax formare valeat.

Syllabus Symptomatum.

A

Symptoma.	Morbus.	Art.
Abdominis dolores	} Alvi Retentio	611
Vid. ventris dolores		
& tormina		

Abdo-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Abdominis intumescen- tia Vid. ventris intumescencia	<i>Hydrops ascites</i> <i>Vesicalis</i>	801 815
Tumor Vid. Ventris tumor	<i>Empyema</i>	240
Absumptio corporis Ægrotudo gravissima	<i>Phthisis nervosa</i> <i>Arthritis</i>	513 911
Alvus adstricta	<i>Ventriculi morbus</i> <i>Arthritis</i> <i>Colica</i> <i>Iliaca passio</i>	581 925 643 666
Alvi excrementa albicantia	<i>Celiaca</i>	629
Grisea vel pallida Cineritii coloris Levia & ventosa Instar stercoris bovini	<i>Icterus</i> <i>Colica</i>	843 646
Viridia	<i>Tormina ventris</i>	1523
Alvi fluxus	<i>Diarrhœa</i>	617
Chylosus Vid. Dejectiones diarrhœa.	<i>Cœliaca</i>	629
Alvus lubrica vel soluta Vid. Diarrhœa.	<i>Lumbrici</i> <i>Ventriculi morbus</i>	1548 585
Alvi retentio	<i>Ventriculi morbus</i>	581
Alvus segnior	<i>Arthritis</i>	925
Amor	<i>Phthisis nervosa</i>	518
Anhelatio Vid. Dyspnœa respiratio anhelosa	<i>Peripneumon. noth.</i>	214

Ani-

Symptoma.	Morbus	Art.
Animi deliquium.	} Affect. hyster.	402
	} Syncope	571
Ani pruritus	Ascarides	681
Procidentia vid. proci- dentia ani		
Anthrax vid. carbunculus	Pestis	170
Anxietas vid. præcordio- rum anxietas	} Febris ardens	65
	} Hydrophobia	445
	} Pestis	170
Aphonia	} Colica	649
Vid. rancedo	} Lumbrici	683
Aphthæ	} Dysenteria	636
	} Febris continua	61
Apoplexia leuiuscula	} Affectio hysterica	396
	} Febris intermit. spur.	37
Appetitus diminutio	} Phthisis	522
	} Ventriculi morbus	602
Appetitus insuetorum	} Gravido	1421
	} Ventriculi morbus	603
Nimius	} Lumbricus latus	678
	} Arthritis	908
	} Ventriculi morbus	603
Aquarum ex utero fluxus immaturus	} Abortus	1144
Ardor lumborum	Diabetes	695
Artuum dolores	} Arthritis	908
	} Scorbutus	884
	} Rheumatismus	854
Lassitudo	} Catarrhus	469
	} Febris lenta	69
Atrophia	Scorbutus	879
Auris interne suppuratio	Pleuritis	228

Symptoma.	Morbus.	Art.
Aurium tinnitus	<i>Lues venerea</i>	961
	<i>Febris ardens</i>	66
	<i>Febris petechialis</i>	83
	<i>Febris puerperarum</i>	1498
B		
Borborygmi & murmura intestinatorum Vid. ructus, flatus	<i>Affectio hyster.</i>	400
Bulimus	<i>Affectio hyster.</i>	408
	<i>Ventriculi morbus</i>	604
Bubo in inguine	<i>Lues Venerea</i>	961
	<i>Febris maligna</i>	77
Bubones	<i>Pestis</i>	171. 180
C		
Cachexia	<i>Scorbutus</i>	869
Calor & frigus se mutuo excipientia	<i>Morbilli</i>	123
Calor hecticus	<i>Phthisis</i>	494
	<i>Post variolas</i>	145
Calor urens	<i>Febris ardens</i>	62. 65. 103
Capillorum defluvium	<i>Phthisis</i>	493
	<i>Venenum</i>	1636
Caput iusto majus	<i>Hydrocephalus</i>	832
	<i>Rachitis</i>	1553
	<i>Febr. fere omnes</i>	34. 58. &c.
	<i>Affectio hysterica</i>	396
Capitis dolor	<i>Alvi retentio</i>	611
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Sudor anglicus</i>	194
Capitis dolor cum infi- gni ardore	<i>Cephalalgia</i>	280. 281
Cum		

Symptoma.	Morbus.	Art.
Cum aliquali frigoris sensu	Cephalalgia	280
Capitis dolor gravativus	Cephalalgia	280
Periodicus	Febris intermittens	37
Capitis dolor punctorius & gravativus	Scorbutus	869
Capitis & dorsi dolor	Variolæ	131
Capitis gravitas	Catarrhus	469
Capitis tumor aquosus	Hydrocephalus	832
Carbunculus	Pestis	171. 181
Cardialgia	Lumbrici	683
Caries ossium	Post variolas	145
Carunculæ in Urethra	Lues venerea	990
Catarrhus	Febris lenta	69
	Phthisis	491
Cervicis dolor	Febris ardens	66
Cholera morbus	Febris intermittens	37
Chyli per alvum fluxus	Celiaca	629
Per Urinam	Diabetes	697
Circumrotatio objecto- rum visibilium	Vertigo	300
Claudicatio fatuorum more	Chorea Sancti Viti	319
	In variolarum apparatu	173
	Febris intermittens	73
	Febris remittens	05
Colici dolores	In parturientibus	1425
	Calculus renum	793
	Affectio hysterica	369
Color purpureus sub con- cavo oculorum	Chlorosis	1329
	Scorbutus	898
Colliquatio humorum	Febris colliquativa	73
Coma	Febris ardens	65. 114
	Febris eruptiva	118
	Hæmorrhoides	1259
Condylomata circa anum	Lues venerea	961
Congelatio	Catalepsis	350. 351
	Con.	

Symptoma.	Morbus.	Art.
Contractura partium	Convulsio tonica	365
Convulsio	{ Febris ardens	65. 116
	{ Febris eruptiva	118
Convulsiones infantum	{ Dentitio	1543
	{ Lumbrici	1548
Convulsivi motus	{ Epilepsia	375. 379
	{ Venenum	1576
	{ Chlorosis	1399
Cordis palpitatio	{ Affectio hysterica	396
	{ Scorbutus	869
	{ Sudor anglicus	194
	{ Venenum	1576
Corona subcærulea vel subrubescens sub oculis	{ Chlorosis	1392
Coryza	Febris lenta	69
Crises febrium	Febris continua	58. 59. 91
Cruris stupor	Nephritis	708
Crurum tumor frigidus	Hydrops	809
Crusta alba, in sanguine	{ Pleuritis	228
	{ Rheumatismus	354
Cutis densitas ac scabri- ties tumida cum rugis & fissuris, &c.	{ Elephantiasis	1199
Flavedo vid. flavedo cutis	{ Cutis siccitas vide siccitas cutis	

D

Decubitus in unum tan- tum latus	{ Empyema	240
In latus morbosum	{ Pleuritis	224
In latus oppositum		

Symptoma.	Morbus.	Art.
Deglutitio difficilis	{ Angina	200
	{ Febris ardens	66
	{ Variolæ	144
Penitus impedita	Paralysis gulæ	343
Dejectiones albæ vel cineritiæ	{ Icterus	840
	{ Calculus in vesica fellea	843
Dejectiones albicantes griseæ vel pallidæ	{ Celiaca	629
Aquosæ	Dysenteria	633
Membranaceæ	Dysenteria	635
Mucosæ	Dysenteria	631
Purulentæ cum carunculis	{ Dysenteria	636
Sanguinolentæ	{ Dysenteria	631
Vid. fluxus cruentus		
Ventosæ & leves instar Stercoris bovin	{ Colica	646
Viridis vel insoliti coloris	{ Colica biliosa	643
	{ Formina ventris	1523
Delirium	{ Calentura	64
	{ Febris	32.58.65.115
	{ Lumbrici	683
Delirium furiosum sine febre. Melancholicum sine febre. Rabiosum	Mania	427
	Melancholia	427
	Hydrophobia	450
Perpetuum & immane	{ Phrenitis	245.247
	{ Paraphrenitis	254
Dentium caries & vacillatio	{ Scorbutus	869
Hæmorrhagia		
Stridor	{ Epilepsia	379
	{ Lumbrici	1548
		Ad

Symptoma.	Morbus.	Art.
Ad diaphragma gravitas	<i>Empyema</i>	240
	<i>Affectio hysterica</i>	396
Diarrhœa	<i>Arthritis</i>	918
	<i>Phthisis</i>	497
	<i>Scorbutus</i>	870
	<i>Variolæ</i>	132
Diarrhœa colliquativa	<i>Febris</i>	109
Diarrhœa infantum	<i>Dentitio</i>	1543
	<i>Lumbrici</i>	1548
Cum dejectionibus subviridibus, vide Dejectiones varii coloris	<i>Morbilli</i>	123
Oleosa	<i>Diarrhœa</i>	619
	<i>Cholera morbus</i>	607
Tormentosa	<i>Dysenteria</i>	631
	<i>Febris intermittens</i>	37
	<i>Febris remittens</i>	50
	<i>Spasmus Cynicus</i>	362
Distortio oris		
Dolor abdominis vid. ab- dominis dolor		
Artuum vid. Artuum dolores		
Capitis vid. capitis dolor		
Dolor circa cordis regio- nem	<i>Pestis</i>	183
Circa scrobiculum cordis	<i>Ventriculi morbus</i>	599
Dorsi & capitis	<i>Variolæ</i>	131
Ad claviculum & mamas	<i>Peripneumonia vera</i>	216
Insignis sub costis no- this	<i>Inflammatio ventriculi</i>	258

Symptoma.	Morbus.	Art.
Dolor Cervicis vid. cervicis dolor.		
In artubus ardens, pungens, lacerans, pulsans, &c.	Arthritis	918
Obscurus in hypocondrio dextro	Hepatitis	268
In hypocondrio sinistro	Inflammatio lienis	271
Intestinorum vid. intestinorum dolor		
In oculorum bulbis	Phrenitis	255
Lenis in alterutro pectoris loco	Vomica Pulmonis	443
Punctorius versus omoplatas	Pleuritis	212. 216
In qualibet thoracis parte	Pleuritis	218
Medium ventrem affligens cinguli instar	Colica biliosa	614
Circa umbilicum intensissimus	Iliaca passio	666
Subter sternum	Scorbutus	880
Universalis contundens & lancinans	Feb. Petech.	79. 112
Erratici externum corporis habitum occupantes	Rheumatismus	854. 857
Nocturni	Lues venerea	961
Parturientium emuli	Febris intermittens	37
	Colica	1452
Vagi præcipue crurum	Scorbutus	869
Dorsi & capitis dolor	Variola	131
Dorsi spinæ inflexibilitas	Calculus renum	728
	Dysp.	

Symptoma.

Morbus.

Art.

Dyspnœa	{	Hydrops	801
Vid. Respirandi difficul- tas		Phrenitis	255
Dysenteria		Febris remittens	50
Dysuria		Ulcus renum vel vesicæ	720

E

Efflorescentiæ maculosæ	{	Erysipelatis quædam spe- cies a Rash	1168
		Febris maligna	75
		Morbilli	123
		Variolæ	125
Confluentes		Febris scarlatina	122
Miliaris purpurea in infantibus recens natis	{	Red-Gum.	1515
Empyematis signa		Hydrops pectoris	836
Epileptici paroxysmi		Variolæ	131
Erysipelatosus tumor		Variolæ	142
Exanthemata	{	Pestis	170
		Variolæ	138
Excrementa alvina albi- cantia, grisea vel palli- da, chylosa	{	Cæliaca	629
Levia & ventosa in- star stercoris bovi- ni	{	Colica	646
Viridia	{	Tormina ventris	1523
Vid. dejectiones co- loris varii, &c.			
Extenuatio partium car- nosarum	{	Atrophia infantum	1530
		Phthisis	494
		Phthisis nervosa	513

F

Symptoma.	Morbus.	Art.
Facies plenior & floridior in infantibus	Rachitis	1553
Scabiosa infantum	Crusta lactea	1561
Turgida & subtumida	Febris	96
Faciei pallor	Chlorosis	1392
Rubor	Febris ardens	66
Rubor & pallor alternatim	Lumbrici	1548
Rubor pustulosus	Gutta rosacea	1143
Rubor post pastum	Cruditus ventriculi nidorosa	584
Faucium dolor & inflammatio	Angina	200
Febris ardens	Inflammatio alicujus visceris	62
	Inflammatio ventriculi	258
	Catarrhus	469
Febris lenta	Diabetes	695
	Empyema	240
	Cachexia	793
Febricula	Chlorosis	1392
	Rheumatismus	854. 857
Flatus in ventriculo & in intestinis	Affectio hysterica	402
	Scorbutus	869
	Ventriculi morbus	588
Flavedo cutis	Cachexia	794
	Icterus	840
Fluctuatio in Abdomine	Ascites	809
Fluctuatio in Abdomine aquæ sensus	Hydrops pectoris	801
	Hydrops uteri	1434

Symptoma.	Morbus.	Art.	
Fluxus cruentus	Dysenteria	636	
	Hæmorrhoides	1263	
	Inflammatio pancreatis	267	
Foveæ a digitorum im- pressione	Scorbutus	1263	
	Hydrops	801	
	Oedema	1272	
Feigus & calor superve- niens	Febris intermittens	34	
	& in initiis fere omnium	102	
Frigoris sensus	in capitis verti- ce	Affect. hysterica	396
	in abdomine	Colica	646
	per dorsum	Affect. hysterica	402
Furunculi	Scorbutus	869	
	Variolæ	145	
G			
Gangræna & caries	post variolas	145	
Genarum rubor	Phthisis	494	
Genitalium tumores œde- matosi	Lues venerea	985	
Gesticulationes variæ	Chorea Sancti Viti	391	
Gingivarum cruentatio	Scorbutus	869. 889. 892	
			Erosiones
			Laxitas
Inflammatio	Dentitio in infantib.	1543	
	Parulis	1235	
Globi sensus in abdomine	Colica hysterica	661	
Gonorrhœa virulenta	Lues venerea	964	
	Gonorrhœa Catarrh.	966	
Gravitas corporis	Hydrophobia	451	
	Empyema	240	
	Ad diaphragma	Feb. ardens	66
Ad tempora			

Symptoma .	Morbus.	Art.
Gravitas circa ventriculi regionem	} Feb. petech.	82
Gravitatis sensus in perinaeo		
Gutturis dolor ulcerosus	} Feb. Eruptiva	118
Gutturis ac pectoris stridor		
H		
Hæmorrhagia narium	Feb. ardens	66
	Feb. continua	58
	Feb. sui generis	1096
	Variolæ	132
Hæmoptoe	Feb. sui generis	1096
	Phthisis	533-536
Hæmorrhoidum fluxus	Vomitus cruentus	596
Halitus foetens intolerabilis	Secundina retentæ	1483
Halitus gravis	Scorbutus	869
Hebetudo visus	Cataracta incipiens	1085
	Feb. ardens	66
Hemicrania	Cephalalgia	282
	Feb. intermittentes	37
Horripilatio	Abortus	1441
	In initiis fere omnium febrium	
Humorum colliquatio	Feb. colliquativa	73
Hypocondriorum distentio	Affectio Hysterica	399
	Colica	646
Oppressio & angustia	Feb. eruptiva	118
	Phthisis	522

I.

Symptoma.

Morbus.

Art.

Icterus	} Colica	646.	841
Ignavia & torpor in pueris	} In pregnantibus		846
	Rachitis		1553
Inappetentia	{ Phtisis nervosa		513
	Ventriculi morbus		602
Indigestio	{ Melancholia		426
	Ventriculi morbus	579.	&c.
Indigestorum per alvum excretio	{ Lienteria		627
Inflatio circa scrobiculum cordis	{ Asthma		547
Inflatio ventriculi	{ Affectio Hysterica		401
	Cholera morbus		607
Inquietudo universalis	{ Febr. ardens		65
	Febr. maligna		74
Intestinorum dolor atrocissimus	{ Colica		643
Vehemens pulsatorius, &c.	{ Iliaca passio		666
	Inflammatiō intestinorum		261
Ad punctum determinatus	{ Colica		643
Circa umbilicum intensissimus	{ Iliaca passio		666
Intestinorum prolapsus	Hernia		1310
Intumescencia abdominis vid. abdominis & ventris intumescencia			
Intumescencia faciei, abdominis, totius corporis	{ Venenum	1576. 1590.	&c.
Iracundia	{ Diarrhoea.		621
	Hydrophobia.		445
	Qq 4		Ischu

Symptoma.	Morbus.	Art.
Ischuria	{ Calculus renum vel vesic.	752
	{ Sanguinis dyscrasia	756
Jugularium venarum intumescencia	{ Apoplexia	325
L		
Labiorum intumescencia & nigrities	{ Venenum	1576
Lac in mammis collectum	Gravidatio	1420
Lactis species sed non verum	{ Mola	1487
Lacrymæ invitæ	{ Feb. ardens	66
	{ Feb. eruptiva	118
	{ Affectio Hypocondr.	400
Languores gravissimi	{ Arthritis in ventricul.	916
	{ Sudor Anglicus	194
	Syncope	571
Lassitudo artuum	Feb. lenta	69
	Icterus	840
Lassitudo spontanea	Chlorosis	1394
	Fluor albus	1412
	Scorbutus	869
Totius corporis	{ Feb. ardens	65
	{ Feb. continua	58
	Pleuritis	212
Lateris dolor punctorius	{ Feb. intermittens	37
Laxitas & mollities partium in pueris	{ Rachitis	1553
Lingua alba	{ In februm initis morbil.	123
	li	
Sicca, flava, nigra	{ Feb. ardens	65
exusta	{ Petechialis	83
	{ Pestis	170

Symptoma .	Morbus .	Art.
Linguae intumescencia	<i>Venenum</i>	1476
Linguae scabrities	{ <i>Feb. ardens</i>	65
	{ <i>Feb. continua</i>	58. 107
Lipothymia vid. Syncope		
Lipyria	<i>Febris</i>	104
Livor vultus	<i>Angina</i>	200
Lochia per aliena loca ex- creta	{ <i>Lochia</i>	1487
Fœtorem cadavero- sum referentia	{ <i>Secundina retenta</i>	1483
	{ <i>Feb. continua</i>	58. 112
Lumbago	{ <i>Feb. intermittens</i>	34
	{ <i>Rheumatismus</i>	854
Gravativa	<i>Fluor albus</i>	1413
Lumborum ardor	<i>Diabetes</i>	695
Dolor ardens & pun- gens	{ <i>Nephritis</i>	708
Dolor fixus gravati- vus	{ <i>Calculus renum</i>	728
	{ <i>Rheumatismus</i>	854
Superiorum dolor ob- tus	{ <i>Pancreatis Morbus</i>	596
	{ <i>Feb. petechialis</i>	83
Lumbrici	{ <i>Horrenda Symptomat.</i>	686
	{ <i>Variolæ . Male eminentur.</i>	

M

Macula albescens in oculo	<i>Albugo</i>	1049
Maculæ cutaneæ fuscæ	<i>Ephelides</i>	1150
Maculæ lividæ in sangui- nis superficie	{ <i>Lues venerea</i>	962
	{ <i>Feb. petechialis</i>	80
Maculæ rubræ pulicum morsibus similes	{ <i>Morbilli</i>	123
	{ <i>Variolæ</i>	125
Rubescences latiores	<i>Feb. scarlatina</i>	110

Mar-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Mac. Rubræ, majusculæ, rotundæ distinctæ	} Feb. petechialis	86
Flavescentes, nigrescentes	} Feb. petechialis	83.86
	} Pestis	172
Lividæ pallescentes	} Feb. petechialis	80.86
	} Variolæ	143
Nigræ, fuscae vel lividæ	} Venenum	1636
	} Pestis	172
Maculæ purpureæ	} Scorbutus	869
	} Variolæ	132
Nigræ violaceæ	} Pestis	172
	} Variolæ	144
Macularum rubrarum vel purpurearum eruptiones	} Phthisis scorbutica	527
	} Scorbutus	869
Maculæ exiguae more lentiginis rubræ aut flavæ in fronte, temporibus, &c. erumpentes	} Lues venerea	961. 962
Mammarum intumescencia	} Gravidatio	1420
	} Mola	1426
	} Uterus inflatus	1429
Detumescencia	} Abortus	1441
Meiendi perpetuum desiderium	} Variolæ	137
	} Calculus vesicæ	720
	} Stranguria	761
Memoriæ debilitas	} Apoplexia	314
	} Paralysis	336
Mensium suppressio	} Conceptus	1420
	} Uterus inflatus	1429
Mentis alienatio	} Chorea Sancti Viti	394
Mictio dolorosa	} Ulcus vesicæ	718

Mictio.

Symptoma.

Morbus.

Art.

Mictio purulenta	Empyema	244
	Gonorrhœa	787
	Fluor albus	ibid.
	Ulcus renum vel vesicæ	720
	Calculus	787
Mictus sanguinis	Febris ardens	66
	Mictus cruentus	767
	Pestis	170
	Variolæ	132
	Scorbutus	787
Micturitio	Variolæ	137
	Stranguriæ	761
	Diarrhœa	621
Mœror	Mœror	843
	Phthisis nervosa	518
Motus manuum & pedum deprivatio	Colica pictorum	655
Motus tremulus & undu- latorius objectorum vi- sibilium	Vertigo	303
Motus in imo ventre	Affect. Hyst.	287
Motus in utero lenis blan- dus ordinatusque	Conceptus	1420
Tremulus & palpi- tans	Mola	1426
Muscarum pilorum, &c. simulacra ante oculos volitantia	Gutta serena	1059. 1090

N

Narium excrescentia al- ba rubra vel livida Pruritus Scalptura	Polypus narium	1108
	In feb. ardente	66
	Lumbrici	1458

Nau-

Symptoma.	Morbus	Art.
Nausea & vomitus	<i>Alvi retentio</i>	611
	<i>Calculus renum</i>	739
	<i>Conceptus</i>	1421
	<i>Feb. intermittens</i>	34
	<i>Nephritis</i>	713
Nephritici dolores	<i>Affect. Hyst.</i>	396
	<i>Arthritis</i>	920
	<i>Feb. intermittens</i>	37
Nodi & tophi	<i>Arthritis</i>	910
	<i>Lues venerea</i>	961
Nodi in carpis & costarum extremitatibus	<i>Rachitis</i>	1553
O		
Objectorum visibilium circumrotatio, motus tremulus & undulatorius	<i>Vertigo</i>	303
Obtumescentia subitanea	<i>Lumbrici</i>	689
	<i>Fissura cranii</i>	1335
	<i>Venenum</i>	1636
Oculi cavi	<i>Empyema</i>	240
	<i>Phthisis</i>	493
Oculorum horridus obtus	<i>Venenum ex opio</i>	1636
Oculorum distillatio	<i>Morbilli</i>	123
Defluxio serosa	<i>Epiphora</i>	1064
Gravedo	<i>Morbilli</i>	123
Inflammatio cum tumore, ardore & dolore	<i>Ophthalmia</i>	1021
Insolita mutatio	<i>Febris maligna</i>	77
Puncturæ	<i>Febris eruptiva</i>	118
Rubedo	<i>Febris eruptiva</i>	117
Splendor	<i>Peripneumonia vera</i>	216
	Odor	

Symptoma.

Morbus.

Arti.

Odor cadaverieus	{	Febris	28
		Gangrena	1385
		Mortis signum	28
OEdematosus corporis habitus	{	Anasarca	799
		Leucophlegmatia	797
		Phibisis nervosa	513
OEdematosi tumores	{	Scorbutus	858
		Post variolas	145
Ophthalmia		Febris intermittens	37
Oppressio pectoris		Febris eruptiva	117
Oris distortio		Spasmus Cynicus	362
Fœtor		Scorbutus	889
Pruritus		Scorbutus	869
Ossium crepitus		Scorbutus	885
Incurvatio		Rachitis	1553
Tumor vel protuberantia vid. nodi & topi	{	Rachitis	1553
		Spina ventosa	1286
Ozæna		Lues venerea	961

P

Palati ulcus		Lues venerea	961
Palpebræ inversæ		Ectropium	1018
Palpebra oedematosa		Hydatis	1001
Palpebrarum gravitas		Febris eruptiva	118
Intumescencia	{	Chlorosis	1393
		Morbilli	123
Pruritus & rubor		Tracoma	1009
Papillarum color in lividum mutatus	{	Conceptus	1420
Palpitatio cordis vid. cordis palpitatio			
Paralysis	{	Colica Pictonum	655
		Scorbutus	880

Paro-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Parotides	Post variolas	145
Pectoris gravitas	Empyema	242
Mala conformatio	Asthma	545
	Phthisis	494
Ingens oppressio	Febris eruptiva	117
	Febris miliaris	1497
	Peripneumonia notha.	221
Stridor	Peripneumonia vera	216
Pedum tumor	Hydrops pectoris	836
In penis summitate dolor exquisitus	Calculus vesicae	730. 739.
Pruritus & frequens ere. ctio		743
Periodicus symptomatum recursus	Febris intermittens	34
	Febris remittens	49
Peripneumonia	Arthritis	919
Pervigilium vid. vigiliae nimiae	Febris ardens	65
Petechiae	Febris petechialis	79. 80
	Variola	140. 142
Phrenitis	Febris ardens	65
	Febris continua	58
Pica	Conceptus	1421
	Ventriculi morbus	603
Pleuritici dolores	Febris intermittens	37
	Febris remittens	50
	Lumbrici	683
	Asthma	554
	Chlorosis	1392
Præcordiorum anxietas	Febris eruptiva	117
	Febris maligna	74
	Febris petechialis	82
	Febris puerperarum	1495
Dolor	Febris ardens	66
	Febris maligna	74

Præ-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Præcord. Inflatio	Melancholia	426
Perturbatio	Colica hysterica	663
Præputii inflammatio & tumor	Lues venerea	961
Tumor sine coloris mutatione	Tumor flatulentus	1298
Procidentia ani	Calculus vesicæ	730
Pruritus ani	Ascarides	681
Totius corporis	Icterus	840
	Psora	1181
Pruritus manuum vel pedum cum ardore, rubore &c.	Pernio	1250
Molestus in infantibus	Crinones	1550
Circa juncturas	Psora	1181
Prunella	Febris	107
Ptyalismus vid. salivatio		
Pubis ardor & dolor &c.	Inflammatio vesicæ	717
Pulmonum coarctatio	Asthma	545
	Peripneumonia notha	214
Pulsatio in abdomine	Colica	646
Subtus ventriculum	Affectio hysterica	400
Pulsus velox	Febris in genere	20
Fortis uno tenore pergens	Idem	32
Celer, debilis, vacillans	Idem	32
Celer, inæqualis	Sudor Anglicus	194
Debilis ac languidus	Febris maligna	74
Durus	Pleuritis	227
Fortis	Apoplexia	326
Tardus	Scorbutus	886
Pupilla angusta	Cataracta	1060
Nigrior & amplior	Gutta serena	1088

Symptoma.	Morbus.	Art.
Pus albo-flavescens ab oculis extillans	} <i>Fistula lacrymalis</i> <i>Phthisis</i>	1083
Puris viscidis serreatio		527
Pustulæ albidæ relinquentes crustulas femina millii referentes	} <i>Herpes miliaris</i>	1162
Pustulæ accumulativæ urgentes		1160
Densæ, dolorosæ, rubræ cum inflammatione latius serpentes	} <i>Erysipelas</i>	1168
Pustulæ Flavæ, siccæ cum arida crusta sparsim per corpus, speciatim in fronte & mento, &c.		962
Inflammatoriæ partem exulcerantes	} <i>Herpes exedens</i>	1165
Plures congestæ, squamosæ, &c.		1188
Parvæ rubescentes cum cutis duritie & pruritu insigni	} <i>Psora</i>	1180
Subrubræ		131
Variæ in pene & alibi	<i>Lues venerea</i>	961
Urticationes referentes	<i>Erysipelas species</i>	1168
Pustula (vel potius tuberculum) sublivida, vel subnigra vel alba.	} <i>Epinyctis</i>	1237

Symptoma.	Morbus.	Art.
Raucedo	Catarrh. suffocativus	479
	Colica	649
	Febris lenta	69
	Lues venerea	961
	Lumbrici	683
Clangosa	Catarrh. suffocativus	482
	Febris eruptiva	118
	Variola	155
Recurfus poti liquoris per nares	Angina	200
Resolutio partium nervo- sarum	Paralysis	332. 335
Respiratio anhelosa, labo- riosa, & sibilosa	Asthma	545. 554
Respiratio ejusmodi in infantibus	Asthma infantum	1533
Cita & anhelosa	Febris eruptiva	118
	Peripneumonia notha	214
	Secundina retenta	1483
Densa	Variola	155
	Febris ardens	65
	Peripneumonia vera	216
	Angina	206
Difficilis	Catarrh. suffocativus	479.
		482
	Colica hysterica	663
	Hydrops	801
	Hydrops pectoris	837
	Icterus	840
	Peripneumonia notha	216.
		242
	Phrenitis	255
	Rachitis	1553
	Scorbutus	855
	Vomica pulmonis	541. 543

Symptoma.	Morbus.	Art.
Rheumatici dolores	<i>Febris remittens</i>	50
	<i>Lues venerea</i>	961
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Dysenteria</i>	631
	<i>Febris intermittens</i>	34
Rigor & horror	<i>Febris omnis</i>	20
	<i>pestis</i>	183
	<i>Pleuritis</i>	212
	<i>Rheumatismus</i>	854
	<i>Abortus</i>	1441
Per vices recurrens	<i>Melancholia</i>	434
Risus Sardonicus	<i>Phthisis</i>	494
Rubor genarum	<i>Affectio hysterica</i>	399
Ructus	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Ventriculi morbus</i>	581
	<i>Nephritis</i>	708
	<i>Asthma</i>	547
	<i>Ventriculi morbus</i>	583
	<i>Idem</i>	584
	<i>Melancholia</i>	426
	<i>Venenum</i>	1576
Acidi	<i>Lumbrici</i>	1548
	<i>Diabetes</i>	703
Affidui	<i>Febris continua</i>	61
	<i>Phthisis</i>	495
Insipidi	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Variola</i>	132
Nidiosi	<i>Chorea Sancti Viti</i>	394
	<i>Dysenteria</i>	631
Saporis varii	<i>Hæmorrhoides</i>	1260
	<i>Febris continua</i>	58
Tetri odoris	<i>Empyema</i>	243
Saliva copiosa		
Spumosa		
Salivatio		
Saltationes admirandæ		
Sanguis sincerus per al- vum		
Sapor oris ingratus, vel amarus		
Tetrus vel putridus		

Symptoma.	Morbus.	Art.
Scabies ferina & inveterata cum tuberculis mollibus vel indolentibus	<i>Lepra</i>	1191
Scotomia	<i>Apoplexia</i>	314
Screatus crudus & glutinosus filamentis nigris distinctus	<i>Asthma</i>	548
Scrobiculi cordis dolor	<i>Colica hysterica</i>	653
Inflatio	<i>Asthma</i>	547
Segnities	<i>Chlorosis</i>	1393
	<i>Icterus</i>	840
Segnities & torpor in infantibus	<i>Rachitis</i>	1553
Siccitas cutis	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Icterus</i>	840
	<i>Fungorum esus</i>	1603
	<i>Hepatitis</i>	268
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Febris ardens</i>	65.105
	<i>Febris continua</i>	58
	<i>Diabetes</i>	695
	<i>Hydrops</i>	801
	<i>Venenum</i>	1576
	<i>Morbilli</i>	123
	<i>Variolæ</i>	131
	<i>Apoplexia</i>	315
	<i>Coma, lethargus, carus</i>	295.296.297
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Pestis</i>	176
	<i>Sudor anglicus</i>	197
	<i>Affectio hysterica</i>	396
	<i>Epilepsia</i>	375
	<i>Febris</i>	116
	R r 2	Spi

Symptoma.	Morbus.	Art.
Spirandi difficultas, vid. respiratio difficilis		
Spirituum depressio	Febris maligna	74
	Febris miliaris	1497
Spuma circa os	Angina	200.206
	Apoplexia	315
	Epilepsia	379
Sputum sanguinis vid. hæ- moptoe	Febris ardens	66
	Peripneumonia	216
	Pleuritis	212
Stercoris per os ejectio	Iliaca passio	666
Sternutatio	Morbilli	123
Stertor insignis	Apoplexia	315
Stridor dentium. vid. den- tium stridor.		
Stridor pectoris vid. pe- ctoris stridor.		
Stomachi gravedo	Hydrophobia	445
	Vesicantium applicatio	110
Stranguria	Nephritis	713
	Arenæ vel sabulum	746
	Scorbutus	869
Stupor in genere	Venenum	1576
Stupor brachii aut pedis	Apoplexia	314
Cruris	Nephritis	708
	Febris continua	58. 111
Sudores	Feb. intermittens	34
	Scorbutus	869
Colliquativi	Phthisis	499
Copiosi	Colica biliosa	649
Critici	Febris	91
Glutinosi	Febris	97
Morbifici	Morbi soporosi	294
Perpetui & copiosissi- mi	Sudor anglicus	194

Suffo-

Symptoma.	Morbus.	Art.
	Scorbutus	869
	Angina	200
Suffocationis periculum	Asthma	554
	Catarrh. suffocativus	479
	Uvulae procidentia	1133
Superciliorum gravitas	Gutta serena	1088
Suppuratio auris interni	Pleuritis	228
Surditas	Febris maligna	77. 99
Syncope vid. languores	Ascarides	681
gravissimi	Lumbrici	683
	Venenum	1576
Tendinum subsultus	Febris continua	32
	Febris eruptiva	118
	Ascarides	681
Tenesmus	Calculus vesicae	730. 741
	Fœtus mortuus	1481
	Ulcus vesicae	718
Testium inflammatio	Lues venerea	961
Testiculi retractio	Calculus renum	728
	Nephritis	708
Thoracis totius dolor	Peripneumonia notha	214
Gravedo	Peripneumonia vera	216
Tibiarum dolores	Scorbutus	880
Tinnitus aurium. vid. aurium tinnitus	Angina	200. 200
Tonsillarum tumor		
Tophi & nodi vid. nodi		
Tormina ventris. vid. ventris tormina	Lumbrici	683
	Scorbutus	809
	Febris	32
	Iracundia	358
	In senio confectis	358
	Secundina retenta	359
	Venenum	1576
Tremores		

Symptoma.	Morbus.	Art.
Tristitia	Icterus	843
Tuberculum acutum in	Carbunculus	171
flammatorium	Furunculus	1233
Durum, lividum vel	Cancer	1289
nigricans	Ascites	801
Tumor abdominis	Empyema	240
Acuminatus glandu-	Phyma	1239
larum	Oedema	1272
Tumor albicans, frigidus,	Hydrocephalus	832
indolens	Parotis	1243
Aquosus capitis	Natta	1308
Pone aures	Anasarca	799
Carnosus magnus in	Paronychia	1247.1248
dorso	Scrophula	1277
Corporis totius.	Scirrhus	1275
In digitorum extre-	Cancer	1289
mis manuum vel	Hemorrhoides	1259
pedum	Phlegmone	1226
Durus, indolens, mo-	Bubo	1241
bilis, sine coloris	Tumor flatulentus	1298
mutatione		
Durus, livescens, in-		
dolens		
Durus, lividus vel ni-		
gricans, puncto-		
rius		
In ano varicosus		
Cum inflammatione		
& dolore pulsatorio		
Inflammatorius in		
inguine vel suba-		
xilla		
Levis digito cedens &		
digito pressus fo-		
vea non relinquens		

Tumor

Symptoma.	Morbus.	Art.
Tumor mollis sine coloris mutatione plerum- que pulsans	<i>Aneurisma</i>	1255
Mollis & latus inter cranium & cutim	<i>Talpa</i>	1305
Mollis in juncturis	<i>Lupia</i>	1302
Ossis vel ejusdem pro- tuberantia	<i>Spina ventosa</i>	1286
In præcordiis	<i>Inflammatio ventric.</i>	258
In tendine doloris expers	<i>Ganglium</i>	1301
Varicosus venarum spermaticarum	<i>Hernia varicosa</i>	1270
Ex laxata venarum tunica	<i>Varix</i>	1257
Tufficula	<i>Febris ardens</i>	65
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Morbilli</i>	123
	<i>Affectio Hysterica</i>	396
	<i>Febris lenta</i>	69
Tuffis	<i>Pleuritis</i>	212
	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Tuffis stomachalis</i>	485
Cum dolore capitis	<i>Peripneumonia notha</i>	214
Humida diuturnior	<i>Asthma</i>	554
	<i>Phthisis</i>	491
Perpetuo molesta	<i>Asthma</i>	554
	<i>Febris eruptiva</i>	118
Immanis	<i>Hydrops</i>	821
Importuna & sicca	<i>Hydrops pectoris</i>	836.837
Infantum ferina	<i>Tuffis convulsiva</i>	1533
	<i>Empyema</i>	240
Sicca & molesta	<i>Lumbrici</i>	1548
	<i>Vomica pulmonis</i>	543
Stomachalis	<i>Tuffis</i>	485

F

Symptoma.	Morbus.	Art.
Ventriculi ægritudo summa	<i>Sudor anglicus</i>	197
Ventriculi Æstus	<i>Arthritis</i>	925
Cum dolore molesto & intensissimo	<i>Cardialgia</i>	600
Dolor gravativus	<i>Ventriculi morbus</i>	584
Inflatio	<i>Scorbutus</i>	869
Inflammatio	<i>Asthma</i>	547
	<i>Scorbutus</i>	869
Ventriculi mordicatio & dolor vehemens	<i>Venenum</i>	1576
Ventris dolor	<i>Scorbutus</i>	880
Ventris intumescencia	<i>Graviditas</i>	1420
	<i>Uterus inflatus</i>	1429
Æqualiter in omnem dimensionem	<i>Mola</i>	1426
Circa umbilicum minus prominens	<i>Hydrops peritonæi</i>	817
	<i>Colica</i>	643
Tormina vid. tormina ventris	<i>Dysenteria</i>	631
	<i>Lumbrici</i>	683
	<i>Scorbutus</i>	877. 880
In infantibus	<i>Dentitio</i>	1543
	<i>Lumbrici</i>	1548
Circa umbilicum	<i>Iliaca passio</i>	666
Infra umbilicum	<i>Secundina retenta</i>	1483
Ventris tensio	<i>Scorbutus</i>	869
	<i>Ascites</i>	809
	<i>Gravidatio</i>	1420
Ventris tumor	<i>Hydrops ovarii</i>	1436
	<i>Mola</i>	1426
	<i>Tympanites</i>	827
	<i>Uterus inflatus</i>	1429
In infantibus	<i>Rachitis</i>	1553

Ven-

Symptoma.	Morbus.	Art.
Ventris tumor durus cum corporis extenuatione	<i>Atrophia infantum</i>	1530
Verrucæ circa anum	<i>Hæmorrhoides</i>	1248
	<i>Lues venerea</i>	961
Vertigo	<i>Apoplexia</i>	314
	<i>Peripneumonia notha</i>	214
	<i>Venenum</i>	1576
Vesiculæ ambustorum si-		
miles	<i>Variolæ</i>	135
Aqueæ		140
Miliares		143
Serosæ subflavæ	<i>Febris miliaris</i>	1497
Vibices	<i>Febris petechialis</i>	79
	<i>Febris continua</i>	58.113
	<i>Febris maligna</i>	74
	<i>Febris eruptiva</i>	118
Vigiliæ pertinaces	<i>Hydrophobia</i>	445
	<i>Mania</i>	438
	<i>Morbus solitarius</i>	289
	<i>Peripneumonia notha</i>	210
	<i>Pestis</i>	179
Virium prostratio	<i>Icterus</i>	840
	<i>Febris maligna</i>	174
	<i>Febris petechialis</i>	82
Subitanea	<i>Pestis</i>	79
	<i>Sudor Anglicus</i>	194
	<i>Venenum</i>	1576
Visus abolitio	<i>Cataracta</i>	1054
	<i>Gutta serena</i>	1088
	<i>Venenum</i>	1576
Obfuscatio	<i>Opium</i>	1596
Visus hebetudo. vid. hebetudo visus		
Ulcus palati. vid. palati ulcus		

Ulcus

Symptoma.	Morbus	Art.
Ulcus finuosum in oculi cantho	Fistula lacrymalis	1083
Ulcera cancrofa & callofa	Cancer	1289
	Lues venerea	961
Corroſiva	Herpes exedens	1165
	Variolæ	156
Ungues recurvi	Empyema	240
	Hydrops pectoris	836
	Phthiſis	493
Ungues nigri vel lutei	Venenum	1636
	Affectio Hysterica	396
	Colica	643
	Conceptus	1421
Vomitus	Febris intermittens	37
	Lumbrici	683
	Phthiſis	494
	Variolæ	131. 137
Enormes	Cholera morbus	607
	Pestis	183
Bilioſi & pituitoſi	Iliaca paſſio	668
	Renum Inflammatio	713
Cruenti	Pancreatis morbus	596
Materiæ nigræ	Ventriculi morbus	596
Humorum diverſico- lorum	Melancholia	426
	Venenum	1576
Stercoris	Iliaca paſſio	666
Vox clangofa	Catarrh. ſuffocativus	479
	Febris ardens	65
	Variolæ	155
Vocis privatio	Catarrh. ſuffocativus	482
	Colica	649
	Lumbrici	683
Voracitas nimia	Affectio Hipochondriaca	408
	Ventriculi morbus	604

Symptoma.	Morbus.	Art.
Urina sanorum similis	Febris maligna	74
	Infantum febris	776
Urina alba	Lumbrici	776
	Variola	776
	Affectio hysterica	777
	Asthma	549
	Cachexia	777. 793
Urina aquosa, tenuis & pallida	Chlorosis	777
	Colica nephritica vel hysterica	663
	Febris maligna	777
	Nephritis	708
	Variola	137
Chylosa	Diabetes	697
	Diabetes	698
Copiosa	Affectio hysterica	777
	Asthma	549
	Arthritis	909
Crassa & rubra	Colica	644
	Scorbutus	663
	Icterus	840
Crocea & flava	Hypocondr. affectio	779
	Scorbutus	779
Cruenta vid. mictus sanguinis	Calculus	787
	Scorbutus	787
Dulcis	Diabetes	663
	Icterus	843
Nigra & viridis	Febris quartana	781
	Morbus virulentus vel venenatus	781
Nigra & tenuis	Febris ardens	66
	Colica biliosa	646
Pauca	Hydrops	801
	Nephritis	708

Symptoma	Morbus	Art.
Urina pinguis	Diabetes	965
	Febris ardens	784
	Febris colliquativa	784
	Febris hectica	784
	Ulcus renum	784
	Ulcus renum vel vesicæ	718.720
Purulenta	Empyema	787
	Fluor albus	787
	Gonorrhœa	787
	Pleuritis & Peripneumonia	787
	Arthritis	780
Rubicunda	Febris continua	58.97
	Nephritis	708
	Peripneumonia notha	214
	Scorbutus	780
	Variolæ	137
Urinæ ardor	Colica biliosa	646
	Dysuria	763
	Lues venerea	961
	Renum inflammatio	713
Urinæ subita mutatio a turbida & crassa in tenuem & pallidam	Phrenitis	246
	Stranguria	761
Urinæ stillicidium	Colica biliosa	646
	Ischuria	752.&c.
Suppressio	Nephritis	713
	Venenum	1576
In Urina carunculæ & filamenta	Ulcus ren. vel vesicæ	718
	Affectio hysterica	784
Cremor innatans	Phthisis	784

Symptoma.	Morbus.	Art.
In Urina materia crassa vel mucilaginosa	Dysuria	763
Bullæ & spuma	Mania	784
Sedimentum crassius farinæ simile	Morbus diuturnus	786
Sedimentum lateritii coloris	Febris intermittens	37
Vultus livor	Angina	209
	Hydrops	809
	Febris ardens	66
Rubor insignis	Febris scarlatina	120
	Peripneumonia	216
In Utero ponderis sensus instar lapidis	Mola	1426



I N D E X

M O R B O R U M .

A

	Art.		
A Bortus	1441	<i>Apepsia</i>	589
A Acrochordones	1001	<i>Aphibæ Adultorum</i>	1136
	1325	<i>Infantum</i>	1559
<i>Ægilops</i>	1083	<i>Apoplexia</i>	308
<i>Affectus Catarrhales</i>	468	<i>Appetentia Canina</i>	604
	478	<i>Aridura Partium</i>	1532
<i>Albugo seu Leucoma</i>	1049	<i>Arthritis</i>	908
<i>Alvi adstrictio in infanti-</i>		<i>Anomala</i>	933
<i>bus</i>	1528	<i>Ascarides</i>	681. 682
<i>In adultis</i>	611	<i>Ascites</i>	807
<i>Alvi Fluxus</i>	617	<i>Asphixia</i>	571
<i>Alvi Retentio</i>	611	<i>Assodes</i>	63
<i>Amaurosis sive Gutta Se-</i>		<i>Asthma</i>	545
<i>rena</i>	1088	<i>Continuum</i>	ibid.
<i>Ambustio</i>	1202	<i>Periodicum</i>	546
<i>Anasarca</i>	799	<i>Convulsivum</i>	552
<i>Anchyloblepharon</i>	1013	<i>Humidum & Siccum</i>	
<i>Anchylops</i>	1083		554
<i>Aneurisma</i>	1251	<i>Infantum</i>	1533
<i>Angina</i>	200	<i>Atheroma</i>	1303
<i>Arthritica</i>	940	<i>Atoniatonblepharon</i>	1016
<i>Natha</i>	208	<i>Atrophia Infantum</i>	1530
<i>Sine Tumore</i>	202	<i>Scorbutica</i>	527. 872
<i>Ani procidentia</i>	1322		879
<i>Animi Morbi</i>	421	<i>Oculi</i>	1070
<i>Anorexia</i>	602	<i>Aurium Morbi</i>	1120
<i>Anthraxosis</i>	1039		
<i>Anxietas Præcordiorum</i>	599		

B

<i>Bronchocele</i>	1320
<i>Bubo Benignus</i>	1241
<i>Buæ</i>	

Index Morborum.

Bubo Pestilentialis 171
180
Venerens 973. 991
Buggs 1570
Bulimia 408. 604

C

Cachexia 792
Calculus Renum & Vesicae 727
Calentura 64
Callus in Ulceribus 1369
Cancer 1289
Canis Rabiosi Morsus 444
Capitis Contusio 1335
Dolor 276
Vulnera 1361
Carbunculus Pestilentialis 171. 181
Cardialgia 600
Caries Ossis 1370
Caruncula in Urethra 990
Carus 297
Catalepsis, Catoche, Congelatio 350
Cataphora 294
Cataracta sive Suffus. 1054
Catarrhus 469
Suffocativus 479
Cephalalgia 276
Chalazion 1001
Chemosis 1021
Chlorosis 1392
Cholera Morbus 607
Chorea Sancti Viti 391
Chylificatio Laesa 579
Cicatrix sive Macula in Oculo 1049

639
Clavi 1325
Cæliaca 617. 629
Urinalis 697
Colica Arthritica 936
Colica Biliosa 643. 659
Hysterica 653
Pictonum 655
Scorbutica 895
Coma 294
Coma Vigil 299
Combustio 1202
Cum pulvere pyrio 1213
A fulmine 1214
Comedones sive Crinones 1550
Concussio Capitis 1336
Congelatio 350
Contusio 1329
Capitis 1336
Convolutus seu Chordapson 666
Convulsio 361
Infantum 1536
Scorbutica 872
Tonica 365
Cordis Palpitatio 563
Polypus 577
Tremor 567
Vermes 562
Corpulentia nimia 789
Coryza 475
Cranii Fissura 1335
Crapula 605
Crinones seu Comedones 1550
Crithe 1001
Cruditatis acida & nidorosa 580. 583
Cru-

Crusta lactea
Cutis nigredo
Cynanche

1561
 1148
 206

E

D

Dejectiones unguinosæ in
Scorbuto 879
Delirium in Febris 115
Melancholicum 427
In puerperio 1500
Delirium Rabiosum 444
Dentitio 1541
Dentium Morbi 1112
Dolor 1117
Nigredo 1113
Vermes 1119
Diabetes notha & vera
 693.695.&c.
Diarrhœa 618
Arthritica 918.937
Infantum 1529
Scorbutica 876.882
Digestio 591
Dolor Capitis 276
Dolores nocturni Ven. 979
Post Partum 1490
Vagi Scorbutici 872.
 884.894
Dysenteria 631
Incruenta 633
Dyspnœa Scorbutica 872.
 875. 890
Dysuria 763

Ecchymosis 1329
Ectropium 1018
Efflorescentia Purpurea in
Infantibus 1515
Elcos oculi 1074
Elephantiasis Græc. seu
Lepra Arabum 1197
Elodes 63
Emphysema 999. 1298
Empyema 361
Empyema 240
Encanthis 1081
Ephelides 1150
Ephialtes sive Incubus 463
Epilepsia 375
Puerorum 1536
Epinyctis 1237
Epiphora 1064
Erysipelas 1167
Alia Species 1168
Scorbuticum 872
Symptomaticum 1177
Essere 1153
Exanthemata 172.181
Excrescentia præternatu-
rales 1308
Carnosa in vesica cal-
culum mentientes 731

F

Fascinatio 395
Febres in genere 1.2.&c.
Ardens seu Causæ 62
 Fe-

Index Morborum.

<i>Febris Catarrhalis</i>	69
<i>Colliquativa</i>	73
<i>Continua</i>	10
<i>Ephemera</i>	7
<i>Eruptiva</i>	117
<i>Hæctica</i>	500
<i>Infantum</i>	1516
<i>Intermittens</i>	34. 35.
<i>&c.</i>	
<i>Lactea</i>	1494
<i>Lenta</i>	68
<i>Lipyrria</i>	104
<i>Maligna</i>	74
<i>Miliaris</i>	1497
<i>Petechialis</i>	79
<i>Pituitosa</i>	71
<i>Cum Prunella</i>	107
<i>Remittens</i>	49
<i>Scarlatina</i>	120
<i>Scorbutica</i>	902
<i>Febrium Symptomata</i>	102
	103
<i>Fissura Cranii</i>	1335
<i>Offis</i>	1342
<i>Fistula in Ano</i>	1379
<i>Lacrymalis</i>	1083
<i>In ulceribus</i>	1369
<i>Flatus</i>	588
<i>Fluor Albus</i>	1410
<i>Fluxus Hepaticus</i>	641
<i>Fractura Offis</i>	1341
<i>Complicata</i>	1344
<i>Fungus</i>	1377
<i>Furor Uterinus</i>	1418

G

Ganglium	1301
Gangræna	1384

Genitalium Tumores œde-	
matosi in Lue Ven.	985
Gingivarum Affectus	1116
Laxitas	872
Glaucoma	1062
Gonorrhœa vera & notha	
non virulenta	955
Virulenta	964
Grando	1001
Gule Paralysis	343
Gustus lesiones	1110
Gutta Rosacea	1143
Gutta serena	1088

H

Head-mould-shot	1563
Horse-shoe-head	1565
Hæmoptysis	533
Hæmorrhagia Naviū	1096
Hæmorrhoides	1259
Hæctica Febris	494. 500.
	504
Hemicrania	282
Hemiplegia	312. 316. 329
Hepatitis	268
Hernia, ejusq; species	1309
Hernia aquosa	1316
Carnosa	1318
Varicosa	1270
Herpes Exedens	1165
Miliaris	1162
Simplex	1159
Hippos	1017
Hordeolum	1001
Hydatis	ibid.
Hydrocele seu Hernia a-	
quosa	1316
Hydrocephalus	832
Sf	Hy.

<i>Hydrophobia</i>	444	<i>Insignia</i>	<i>Bacchantium</i>	1144
<i>Hydrops</i>	801.809			
<i>Ovarii</i>	1436	<i>Ischias</i>		931.952
<i>Pectoris</i>	636	<i>Ischuria Renalis & Vesicalis</i>		752
<i>Peritonæi</i>	817			
<i>Succus</i>	826			
<i>Vesicalis</i>	815			
<i>Uteri</i>	1432			
<i>Hypochondriaca & Hysterica affectio</i>	396	<i>Lactis fugatio</i>		1493
<i>Hypopyon</i>	1036	<i>Lagophthalmia</i>		1014
<i>Hyposphagma</i>	1052	<i>Lectimigi</i>		765
		<i>Lentigines</i>		1149
		<i>Lepra</i>		1191
		<i>Græcorum</i>		1194
		<i>Lethargus</i>		296
<i>Icterus</i>	840	<i>Leucoma seu Albugo</i>		1049
<i>Infantum</i>	1520	<i>Leucophlegmatia</i>		797
<i>Ignis Sacer</i>	1167	<i>Lichen</i>		1157
<i>Ileos sive Iliaca Passio</i>	666	<i>Lienis Inflammatio</i>		271
<i>Imperigo</i>	1188	<i>Lienteria</i>		626.627
<i>Inappetentia</i>	602	<i>Linguae Paralysis</i>		345
<i>Incontinentia Urinæ</i>	765	<i>Vitia</i>		1110
<i>Incubus</i>	463	<i>Lipothymia</i>		571
<i>Infantum Morbi in genere</i>	1054.&c.	<i>Lippitudo sive Ophthalmia</i>		1021
<i>Inflammatio in genere</i>	199	<i>Lipyria</i>		63.104
<i>Aurium</i>	1120	<i>Lithiasis</i>		733.738
<i>Cordis</i>	560	<i>Lithonriptica</i>		73
<i>Hepatis</i>	268	<i>Lochia</i>		1485
<i>Intestinorum</i>	261	<i>Loquela amissa</i>		1111
<i>Lienis</i>	271	<i>Lues Venerea</i>		961
<i>Mammarum</i>	1228	<i>Infantum</i>		983
<i>Mesenterii</i>	263	<i>Lumbrici</i>		675
<i>Pancreatis</i>	267	<i>Lati</i>		677.678
<i>Renum</i>	708.713	<i>In Infantibus</i>		1547
<i>Testium</i>	1231	<i>Lupia</i>		1302
<i>Ventriculi</i>	258	<i>Lupus</i>		1289
<i>Inoculatio variolarum</i>	158	<i>Luxatio Ossium</i>		1337
		<i>Lycanthropia</i>		429

Ma-

M

<i>Macies Infantum</i>	1530
<i>Macula sive Cicatrix in Oculo</i>	1049
<i>Maculae Hepaticae</i>	1151
<i>Scorbuticae</i>	888
<i>Madarosis</i>	1012
<i>Malacia</i>	603
<i>Mammarum Tumores</i>	1228. 1493
<i>Mania & Melanch.</i>	425
<i>Meconii purgatio in Infantulis</i>	1513
<i>Meiopsis</i>	1072
<i>Melancholia</i>	425
<i>Meliceris</i>	1303
<i>Memoria laesa</i>	414
<i>Menstruatio</i>	1395
<i>Mensium difficultas</i>	1402
<i>Menses cum dolore fluentes</i>	1405
<i>Fluxus nimius</i>	1406
<i>Per loca aliena fluentes</i>	1404
<i>Suppressio</i>	1398
<i>Mesenterii Inflamm.</i>	263
<i>Mictus Cruentus</i>	767
<i>Miserere mei</i>	668
<i>Mola</i>	1425
<i>Aquosa Vesicul.</i>	1428
<i>Ventosa</i>	1429
<i>Morbi Nervini</i>	274
<i>Morbilli</i>	123
<i>Morsus Canis Rabidi</i>	444
<i>Mydriasis</i>	1071
<i>Myopia</i>	1093

N

<i>Narium Morbi</i>	1105
<i>Nata Natta seu Napta</i>	1308
<i>Nausea & Vomitus</i>	594
<i>Necrosis</i>	1384
<i>Nephritis</i>	708. &c.
<i>Arthritica</i>	920
<i>Notha Scorbutic.</i>	895
<i>Noli me tangere</i>	1289
<i>Nyctalopia</i>	1095

O

<i>Obesitas seu Corpulentia nimia</i>	789
<i>Obdormitio Membr.</i>	356
<i>Oculorum Morbi</i>	997. &c.
<i>Oculorum Ulcera</i>	1073
<i>Oedema</i>	1272
<i>Oedema Oculi</i>	1033
<i>Oedematosi Tumores Genital. in Lue Ven.</i>	985
<i>Olfactus amissus</i>	1105
<i>Opisthotonos</i>	361
<i>Ophthalmia</i>	1021
<i>Epidemica</i>	1029
<i>Humida & sicca</i>	1023
<i>Scrophulosa</i>	1031
<i>Ossium fractura</i>	1341
<i>Luxatio</i>	1337
<i>Otalgia</i>	1122
<i>Ovarii Hydrops</i>	1436
<i>Oule</i>	1049
<i>Ozena</i>	1105

P		<i>neus</i>	1154
		<i>Phlyctæne, oculi vitium</i>	1037
<i>Palpebrarum Morbi</i>	998	<i>Phrenitis</i>	245
<i>Palpitatio Cordis</i>	563	<i>Phthiriasis</i>	1020.1567
<i>Pannus, oculi vitium</i>	1041	<i>Phibisis ab Apostematibus</i>	
<i>Paracynanche</i>	206	<i>Ulceribus</i>	521
<i>Paralysis & Paresis</i>	332	<i>Asthmatica</i>	529
<i>Gula</i>	343	<i>A Chlorosi vel mensi-</i>	
<i>Lingua</i>	345	<i>bus obstructis</i>	538
<i>Oculi</i>	1078	<i>A Diarrhœa vel Dy-</i>	
<i>Scorbutica</i>	878	<i>senteria</i>	523
<i>Paraphimosis</i>	986	<i>A Gonorrhœa vel</i>	
<i>Paraphrenitis</i>	254	<i>fluore albo</i>	520
<i>Paraplegia seu paraplexia</i>		<i>Ab Hæmorrhag.</i>	519
	312.329.332	<i>Ab Hypochond. vel</i>	
<i>Paronychia</i>	1246	<i>Hyster. affect.</i>	531
<i>Pedis digitorum</i>	1248	<i>Ab ictero</i>	540
<i>Parotis</i>	1243	<i>A Lactatu</i>	522
<i>Parasynanche</i>	206	<i>Nervosa</i>	513
<i>Partus difficilis</i>	1450	<i>A Pleuritide vel pe-</i>	
<i>Parulis</i>	1235	<i>ripneumonia</i>	539
<i>Pediculi Inguinales</i>	1569	<i>Pulmonaris</i>	491.494
<i>Penis Amputatio</i>	986	<i>Scorbutica</i>	527
<i>Peribrosis Oculi</i>	1076	<i>Scrophularis</i>	524
<i>Pericranii læsio</i>	1362	<i>Varia</i>	ibid.
<i>Perinæi ruptura</i>	1492	<i>Pladrosis</i>	1000
<i>Peripneumonia notha</i>	214	<i>Phygethlon</i>	1240
	221	<i>Phyma</i>	1239
<i>Vera</i>	216.220	<i>Pica</i>	603
<i>Arthritica</i>	919	<i>Plege Oculi</i>	1079
<i>Pernio</i>	1250	<i>Pleuritis Arthritica</i>	913
<i>Pervigilium</i>	289	<i>Notha</i>	218.224
<i>Pestis</i>	163	<i>Occulta</i>	227
<i>Phimosis & Paraphimosis</i>		<i>Vera</i>	212.218
	986	<i>Plica Polonica</i>	992
<i>Phlegmones</i>	1226	<i>Pneumatocèle seu Hernia</i>	
<i>Phlogosis</i>	1021	<i>ventosa</i>	1313
<i>Phlyctæne, morbus cura-</i>		<i>Podagra</i>	908
			Po.

Index Morborum.

645

<i>Polypus Cordis</i>	577
<i>Narium</i>	1108
<i>Polypi in Pleuritide</i>	234.
	235
<i>Presbytia</i>	1094
<i>Procidencia Ani</i>	1322
<i>Proptosis</i>	1045.1069
<i>Pruritus vid. Psora</i>	
<i>Psora sive Scabies</i>	1180
<i>Psorophthalmia</i>	1003
<i>Pterygium</i>	1041
<i>Pudendorum Excoriatio</i>	
	1492
<i>Tumores Oedematosi</i>	
	1491
<i>Punctura Tendinis</i>	2351
<i>Purpurea Efflorescentia in Infantibus.</i>	1515

R

<i>Rachitis</i>	1551
<i>Ranula</i>	1244
<i>Raucedo</i>	472
<i>Red Gum</i>	1515
<i>Renum Inflammatio</i>	708
<i>Ulcus</i>	715
<i>Rheumatismus</i>	854
<i>Rheuma Oculi</i>	1068
<i>Rhexis</i>	1047
<i>Rubedo Maculosa</i>	1144
<i>Ruptura Perinaei</i>	1492

S

<i>Sabafati seu Tinea</i>	995
<i>Salivatio</i>	702
<i>Sarcocoele seu Hernia car-nosa</i>	1318

<i>Sarcoma Narium</i>	1109
<i>Scabies Humida & Sicca</i>	1178
	1180
<i>Scabies sive Psora</i>	1180
<i>Scirrhus</i>	1275
<i>Scleriasis</i>	1008
<i>Sclerophthalmia</i>	1007
<i>Scorbutus</i>	869
<i>Scotomia</i>	303
<i>Scrophula</i>	1277
<i>Secundina retenta</i>	1484
<i>Serpigo</i>	1160
<i>Singultus</i>	369
<i>Sirones</i>	1155
<i>Somnus</i>	293
<i>Soporosi Morbi</i>	294
<i>Spasmi</i>	367
<i>Spasmus Cynicus</i>	362
<i>Sphacelus</i>	1384
<i>Spina ventosa</i>	1286
<i>Steatoma</i>	1303
<i>Sterilitas</i>	1424
<i>Sternutatio</i>	373
<i>Stomachica Remedia</i>	592
<i>Strabismus</i>	1079
<i>Stranguria</i>	761
<i>Scorbutica</i>	906
<i>Struma</i>	1277
<i>Stupor</i>	355
<i>Scorbuticus</i>	878
<i>Sudamina</i>	1152
<i>Sudor Anglicus</i>	193.196
<i>Suffusio sive Catar.</i>	1054
<i>Suggillatio Oculi</i>	1052
<i>Suppressio Urinae</i>	752.&c.
<i>Surditas</i>	100
<i>Surfeit</i>	136
<i>Sycosis</i>	1009
<i>Synanche</i>	206

Syn-

Synchysis

1040

Syncope

571. 574

Synovia

1365

T

Talpa seu Testudo

1305

Tarantismus

462

Tendinis Punctura

1351

Tendinum vulnera

1349

Tenesmus

640

Terminthus

1238

Tetanus

361

Tinea seu Sabasati

995

Tinnitus aurium

1124

Tonsillarum Inflamm.

206

Tophus

1001

Tophi Arthritici

915

Tormina Ventris Infan-

tum

1523

Scorbutica

872

Torpor

355

Tortura Oris

362

Trauma

1009

Tremor

358

Cordis

567

Scorbuticus

878

Trichiasis

1011

Tumores in genere

1217

Albi

1283

Capsulares

1300

Flatulenti

1298

Tussis

484

Convulsiva

1533

Epidemica

487

Stomachalis

485

Tylosis

1009

Tympanitis

826

V

Vari

1156

Variola

130

Distincta

131

Confluentes

132

Maligna

142

Variolarum Inoculatio

158

Varix

1257

Venena in genere

1571

Aconitum

1589

Æs viride

1614

Angues

1619

Antimonialia

1614

Aqua fortis

1615

Aranei

1624

Argentum vivum

1610

Arsenicum

1606

Aspis

1623

Bella donna Vid. Co-

rona Imperialis

Bufo

1628

Cantharides

1630

Cerussa

1617

Cicuta

1580

Cicutaria

1584

Cingula Mercur.

1610

Cocculæ officinarum

1592

Coriandrum

1599

Corona Imperial.

1588

Esula

ibid.

Euphorbium

ibid.

Fungi

1602

Helleborus

1588

Hyoscyamus

1597

Lithargyrum

1617

Mandragora

1599

Mercurius precip. &

sub.

Index Morborum.

647

<i>sublim.</i>	1611	<i>Ulceræ Venerea</i>	984
<i>Napellus</i>	1589	<i>Ulcus Vesicæ</i>	718
<i>Nux vomica</i>	1600	<i>Unguis Oculi</i>	1041
<i>Oenanthe</i>	1584	<i>Vomica Pulmonis</i>	541
<i>Opium</i>	1594	<i>Vomitum</i>	594
<i>Scorpio</i>	1626	<i>Cruentus</i>	596
<i>Serpentes</i>	1619	<i>Infantum</i>	1526
<i>Solanum</i>	1598	<i>Urinæ Ardor in Lue Ve-</i>	
<i>Spiritus acidi</i>	1615	<i>nerca</i>	988
<i>Spiritus vini</i>	1633	<i>Incontinentia</i>	765
<i>Sublimatus Mercurius</i>	1611	<i>Suppressio</i>	752
<i>Taxus</i>	1593	<i>Suppressio ex Sanguinis dyscrasia</i>	756
<i>Tithymalus</i>	1588	<i>Uroscopia sive Urinarum</i>	
<i>Vipera</i>	1620	<i>Prognosis</i>	775
<i>Ventriculi Inflammatio</i>	258	<i>Uteri Hydrops</i>	1432
<i>Vermes</i>	675	<i>Uteri Procidencia</i>	1502
<i>In auribus</i>	1123	<i>Uterus Inflatus</i>	1429
<i>In Corde</i>	562	<i>Vulnera</i>	1345
<i>Verrucæ</i>	1325	<i>Arteriarum</i>	1346
<i>Vertigo</i>	300	<i>Capitis</i>	1361
<i>Vesicæ Ulcus</i>	718	<i>Lethalia</i>	1352
<i>Vigilia</i>	289	<i>Musculi Temporalis</i>	1353
<i>Visus Hebetudo</i>	1085	<i>Nervorum</i>	1348
<i>Ulceræ</i>	1366	<i>Sclopetorum</i>	1358
<i>Ulcus Aurium</i>	1120		1359
<i>Ulcuscula Glandis & Præputii</i>	968	<i>Tendinum ac Membranarum</i>	1348
<i>Ulcus cordis</i>	559. 560	<i>Uvula Relaxatio sive Pro-</i>	
<i>Ulceræ Oculorum</i>	1074	<i>cidencia</i>	1133
<i>Oris & Palati</i>	972		
<i>Ulcus Renum</i>	715		
<i>Ulcuscula Vaginæ</i>	969		

X

Xerophthalmia 1005

NOI

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

COncediamo Licenza a *Lorenzo Basegio* Stampatore di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato: *Synopsis Universæ Medicinæ Practicæ, sive doctissimorum virorum de morbis, eorumque causis, & remediis judicia, &c. Authore J. Allen;* in due tomi già da lui medesimo stampato nell'anno 1742. osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 14. Marzo 1748.

(Daniel Bragadin Cav. Pr. Rif.

(Barbon Morosini Cav. Pr. Rif.

(

Registrato in Libro a Carte 22. al Num. 170.

Michiel Angelo Marini Seg.

Licenziato dal Magist. Eccell. contro la Bestemmia.

Francesco Gadaldini Seg.

